

مفت تقسیم کے لیے

آزادی کی شاعری



درسی کتاب

ریاضی

برائے جماعت 9



سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

طبع کنندہ

یونیورسل بک ڈپو، حیدرآباد۔



جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو محفوظ ہیں۔

تیار کردہ: ایسوسی ایشن فار اکیڈمک کوالٹی (آفاق) برائے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

سندھ کے تعلیمی مدارس کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بینظیر آباد بورڈ کیلئے بطور واحد درسی کتاب۔

نظر ثانی: صوبائی ریویو کمیٹی ڈائریکٹوریٹ آف کیریکیولم ایسیمیٹ اینڈ ریسرچ، سندھ جام شورو۔

منظور کردہ: محکمہ تعلیم مدارس و خواندگی ادارہ نصاب جائزہ و تحقیق حکومت سندھ

مراسلہ نمبر SO(C)SELD/STBB-18/2021

نگران اعلیٰ
عبدالعلیم لاشاری

چئیرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

پروجیکٹ ڈائریکٹر
خواجہ آصف مشتاق

ایسوسی ایشن فار اکیڈمک کوالٹی (AFAQ)

مینجنگ ڈائریکٹر
شاہد وارثی

ایسوسی ایشن فار اکیڈمک کوالٹی (AFAQ)

سپروائزر
داریوش کافی

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

چیف سپروائزر
یوسف احمد شیخ

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

پروجیکٹ مینیجر
رفیع مصطفیٰ

ایسوسی ایشن فار اکیڈمک کوالٹی (AFAQ)

نظر ثانی کردہ

- ♦ مسٹر عبدالسلیم
- ♦ مسٹر محمد صغیر شیخ
- ♦ مسٹر محمد وسیم
- ♦ مسٹر محمد افضل احمد
- ♦ پروفیسر محمد فاروق خان
- ♦ مسٹر اعجاز علی سبھیپوٹو
- ♦ مسٹر نذیر احمد میمن
- ♦ مسٹر محمد یاسر انصاری
- ♦ مسٹر آفتاب علی

ایڈیٹر

- ♦ مسٹر میر سرفراز خلیل ساند

کنسلٹنٹ:

- ♦ کامران لطیف لغاری: اے ایس ایس
- ♦ میر سرفراز خلیل ساند: جے ایس ایس

مصنفین

- ♦ مسٹر آفتاب علی
- ♦ مسٹر سید آفاق احمد
- ♦ پروفیسر محمد فاروق خان
- ♦ مسٹر اویس سراج
- ♦ مس اقرامغل
- ♦ مسٹر عمر خان

مترجمین

- ♦ مس سعدیہ جبین
- ♦ مس حفصہ

ٹیکنیکل اسسٹنس اور کوآرڈینیشن

- ♦ جناب محمد ارسلان شفاعت گدی

اشاعت کا سال: 2024

مطبع: یونیورسل بک ڈپو، حیدرآباد۔

پیش لفظ

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام درسی کتابوں کی تیاری اور اشاعت ہے تاکہ ہماری نئی نسل کو سائنس، ٹیکنالوجی اور انسانیت کے شعبوں میں نئی صدی کے چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت، مہارت اور صلاحیت سے آراستہ کیا جاسکے۔ درسی کتابوں کا مقصد عالمی بھائی چارے کو اجاگر کرنا اور ہمارے آباؤ اجداد کے اعمال کی عکاسی کرنا اور ہمارے بھرپور ثقافتی ورثے اور روایت کے روشن نمونوں کو پیش کرنا ہے۔

نئی اشاعت میں تعارفی پیرا گراف، انفارمیشن ڈبہ، خلاصے اور مختلف قسم کی وسیع مشقیں ہیں جن کے بارے میں میرے خیال میں نہ صرف دلچسپی پیدا ہوگی بلکہ کتاب کی افادیت میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپنی محدود وسائل کے باوجود اس کتاب کی اشاعت میں بہت تکلیف اور اخراجات اٹھائے۔ درسی کتاب درحقیقت آخری لفظ نہیں ہے اور اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگرچہ مصنفین نے اپنی سطح پر بہترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم تصور اور ضرورت کے لحاظ سے، اب بھی کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم اساتذہ، طالب علموں، والدین، تحقیق کرنے والوں اور اس سطح کے لیے لکھی جانے والی کتابوں سے متعلق تمام افراد سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کتاب سے متعلق ردِ عمل اور تجاویز دیں تاکہ ہم اس کتاب کو مزید بہتر بنا سکیں۔

ہماری آرگنائزیشن ان تمام مصنفین، اس کتاب کو نظر ثانی کرنے والوں اور ایسوسی ایشن فار آئیڈ مک کوالٹی (AFAQ) کی احسان مند اور شکر گزار ہے جن کی انتھک کوششوں نے اس کتاب کو اس لیول یا سطح کے لیے لکھی جانے والی تمام کتابوں کے مقابلے کے قابل بنادیا ہے۔

چیئر مین

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، جام شورو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	پونٹ نمبر
01 - 26	حقیقی اور کمپلیکس اعداد	1
27 - 53	لوگر تھم	2
54 - 83	الجبری اظہاریے اور الجبری کٹے	3
84- 105	عمل تجزی	4
106 - 124	الجبرا توڑ پھوڑ	5
125 - 138	یک درجی مساواتیں اور غیر مساواتیں	6
139 - 163	خطی یا لائن (لینئر) گراف اور اس کے استعمالات	7
164 - 183	دو درجی مساواتیں	8
184 - 194	متماثل مثلثات	9
195 - 205	متوازی الاضلاع اور مثلث	10
206 - 216	خط اور زاویے کے ناصف	11
217 - 225	مثلث کے اضلاع اور زاویے	12
226 - 237	عملی جیومیٹری - مثلثیں	13
238 - 245	رقبہ سے متعلق مسئلے	14
246 - 253	مثلث کے اضلاع کا عکس / تخمینہ	15
254 - 270	کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا تعارف / تجزیاتی جیومیٹری	16
271	جوابات	

حقیقی اور کمپلیکس اعداد



یونٹ

REAL AND COMPLEX NUMBER


حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- جان جائیں گے کہ مکمل حقیقی اعداد کا سیٹ ناطق اور غیر ناطق اعداد کا یونین سیٹ ہوتا ہے۔
- حقیقی اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کر سکیں گے۔
- ختم ہونے والے ناختم ہونے والے اور تکراری اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کر سکیں گے۔
- ناطق اور غیر ناطق اعداد کی اعشاری نمائندگی میں فرق کر سکیں گے۔
- حقیقی اعداد کی خصوصیات کو جان کر سکیں گے۔
- جذری اور مجذور مقداروں کے تصورات کی وضاحت کر پائیں گے۔
- جذری اور قوت نمائی شکل کے جملوں میں فرق واضح کر پائیں گے۔
- جذری جملوں کو قوت نمائی جملوں میں تبدیل کرنے اور قوت نمائی جملوں کو جذری جملوں میں بدل سکیں گے۔
- اساس، قوت نما اور قدر کی یاد دہانی کرانا۔
- قوت نمائی کے قوانین کی مدد سے اُن جملوں (مقداروں) کو مختصر کر سکیں گے۔ جن میں قوت نما موجود ہے۔
- کمپلیکس اعداد کے تصور کی تعریف کرنا اور ایک کمپلیکس عدد $z = a + ib$ میں ظاہر کرنا جس میں a اور b دو حقیقی اعداد ہوں اور $i = \sqrt{-1}$ خیالاتی (imaginary) عدد ہو۔
- $z = a + ib$ میں a کو حقیقی حصہ اور b کو خیالاتی حصہ سمجھ سکیں گے۔
- کمپلیکس عدد کے کانجوگیٹ (conjugate) کی تعریف کرنا۔
- دیئے ہوئے دو کمپلیکس اعداد کے درمیان برابری کا تصور جان سکیں گے۔
- کمپلیکس اعداد کی بنیادی نشانیاں پر جمع و تفریق و ضرب اور تقسیم کو استعمال کر سکیں گے۔

تعارف:

ہم سابقہ جماعتوں میں اعداد کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ قدرتی اعداد (گنتی کے اعداد)، مکمل اعداد صحیح اعداد، ناطق اور غیر ناطق اعداد وغیرہ۔
یہ تمام اعداد حقیقی اعداد کے سیٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ پس، حقیقی اعداد کی درجہ بندی نیچے دی گئی ہے۔



1.1 حقیقی اعداد

1.1.1 دہرا حقیقی اعداد کا سیٹ ناطق اور غیر ناطق اعداد کے سیٹ کا یونین سیٹ ہوتا ہے۔

حقیقی اعداد کا سیٹ ناطق اور غیر ناطق اعداد کے سیٹ کا یونین ہوتا ہے۔ جیسا کہ $R = Q \cup Q'$
ہم پہلے ناطق اور غیر ناطق اعداد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ حقیقی اعداد کی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں جیسا کہ ناطق اعداد کی خصوصیات ہوتی ہیں۔

1.1.2 حقیقی اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کرنا۔ (Represent Real Numbers on the number line)

ہم مکمل اعداد اور صحیح اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کرنا سابقہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم حقیقی اعداد کو بھی نمبر لائن پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ آئیے درج ذیل مثالوں کو مشاہدہ کریں۔

مثال 01 $-\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{2}$ کو نمبر لائن پر ظاہر کیجیے۔

حل:



چونکہ دی گئی نمبر لائن میں نقطہ P_1 عدد $-\frac{1}{2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نقطہ P_2 عدد $\frac{1}{2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔

مثال 02

-1.5 اور $1\frac{1}{5}$ کو نمبر لائن پر ظاہر کیجیے۔

حل:

دی گئی نمبر لائن پر نقطہ P_1 عدد -1.5 کو اور نقطہ P_2 عدد $1\frac{1}{5}$ کو ظاہر کرتا ہے۔



1.1.3 بحر لائن پر۔۔۔۔۔

محدود دور لا محدود اعشاری اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کرنا

وضاحت

نمبر لائن پر اعشاری اعداد کو ظاہر کرنے سے پہلے، نقاط کو ناطق اعداد $\frac{a}{b}$ کے ساتھ مطابقت کی جاتی ہے۔ جبکہ a, b مثبت صحیح

اعداد ہوں) ہم ہر ایک حصہ کی لمبائی کو b حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر a^{th} نقطہ نمبر لائن کے اصل (Origin) کے دائیں طرف $\frac{a}{b}$

کو ظاہر کرتا ہے اور بائیں طرف متماثل فاصلے پر $-\frac{a}{b}$ کو ظاہر کرتا ہے۔



مثال 01

درج ذیل محدود اعشاری کسروں کو نمبر لائن پر ظاہر کریں۔

i. $\frac{3}{2}$

ii. $\frac{5}{4}$

i. $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$



ii. $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$



مثال 02

درج ذیل لامحدود اعشاری کسروں کو نمبر لائن پر ظاہر کریں۔



i. $\frac{11}{6}$

ii. $-\frac{5}{3}$

i. $\frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}$



iii. $-\frac{5}{3} = -1\frac{2}{3}$



ناطق اور غیر ناطق اعداد کی اعشاری نمائندگی میں فرق کرنا

جب ہم ناطق اعداد کو اعشاری اعداد کی شکل میں لکھتے ہیں تو ہمیں دو قسم کے اعشاری اعداد حاصل ہوتے ہیں۔ محدود اعشاری اعداد اور لامحدود تکراری اعشاری اعداد جبکہ غیر ناطق اعداد کو لامحدود غیر تکراری اعشاری اعداد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کو نیچے دیئے گئے جدول میں ظاہر کیا گیا ہے۔

نمبر شمار	اعداد	تفریحات
1.	$\frac{1}{2} = 0.5$	محدود اعشاری کسر
2.	$\frac{1}{4} = 0.25$	محدود اعشاری کسر
3.	$\frac{1}{3} = 0.333...$	لامحدود تکراری اعشاری کسر
4.	$\frac{9}{11} = 0.818181...$	لامحدود تکراری اعشاری کسر
5.	$\sqrt{2} = 1.414213...$	لامحدود غیر تکراری اعشاری کسر
6.	$\sqrt{3} = 1.73205...$	لامحدود غیر تکراری اعشاری کسر

مشق 1.1

1. درج ذیل اعداد میں سے ناطق اور غیر ناطق اعداد کی نشاندہی کیجئے اور پھر ان تمام کو الگ الگ خانوں میں لکھیں۔

- (i) $\frac{1}{5}$ (ii) $\frac{\sqrt{2}}{8}$ (iii) $\frac{5}{\sqrt{6}}$ (iv) $\frac{2}{8}$ (v) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (vi) $\sqrt{8}$
 (vii) 0 (viii) π (ix) $\sqrt{5}$ (x) $\frac{22}{3}$ (xi) $\frac{1}{\pi}$ (xii) $\frac{11}{12}$

2. درج ذیل کسر کو اعشاری اعداد میں تبدیل کریں اور پھر محدود اعشاری کسر اور لامحدود اعشاری کسر کی نشاندہی کیجئے۔

- (i) $\frac{5}{8}$ (ii) $\frac{4}{18}$ (iii) $\frac{1}{15}$ (iv) $\frac{49}{8}$ (v) $\frac{207}{15}$ (vi) $\frac{50}{76}$



مفت تقسیم کے لیے



3. درج ذیل ناطق اعداد کو نمبر لائن پر ظاہر کیجئے۔

(i) $\frac{8}{10}$ (ii) $-\frac{8}{10}$ (iii) $1\frac{1}{4}$ (iv) $-1\frac{1}{4}$ (v) $\frac{2}{3}$ (vi) $-\frac{2}{3}$

4. 1 اور 2 کے درمیان تمام حقیقی اعداد کی فہرست بنائیں۔

5. π (pi) ایک غیر ناطق عدد ہے وضاحت کیجئے۔

6. صحیح بیان پر (✓) کا نشان لگائیں۔

(i) $\frac{5}{7}$ ایک غیر ناطق عدد کی مثال ہے

(ii) π ایک غیر ناطق عدد ہے۔

(iii) 0.31591 لامحدود اور غیر تکراری اشاری کسر کی ایک مثال ہے۔

(iv) 0.123 تکراری اعشاری عدد کی ایک مثال ہے۔

(v) 0 اور 1 کے درمیان والے عدد ہیں۔

(vi) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ناطق عدد کی ایک مثال ہے۔

1.2 حقیقی اعداد کی خصوصیات

حقیقی اعداد کی خصوصیات بلحاظ جمع اور ضرب پائی جاتی ہیں۔ a اور b دو حقیقی اعداد ہو تو ان کا حاصل جمع (sum) $a + b$ اور ان کا حاصل ضرب (Product) ab یا $a \times b$ یا ab لکھا جاتا ہے۔

1.2.1 حقیقی اعداد کے خصوصیات کے بارے میں جاننا۔

(a) حقیقی اعداد کی خصوصیات بلحاظ جمع

(i) خاصیت بندش

کوئی سے دو حقیقی اعداد a اور b کے لیے۔

$$a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow a + b \in \mathbb{R}$$

e.g. (i) $5, 7 \in \mathbb{R} \Rightarrow 5 + 7 = 12 \in \mathbb{R}$

(ii) $\frac{4}{5}, \frac{3}{4} \in \mathbb{R} \Rightarrow \frac{4}{5} + \frac{3}{4} = \frac{16 + 15}{20} = \frac{31}{20} \in \mathbb{R}$



(ii) خاصیت مبادلہ: Commutative Property

کوئی سے دو حقیقی اعداد a اور b کے لیے۔

$$a + b = b + a$$

خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع کہلاتی ہے۔

(i) $3 + 7 = 7 + 3$

(ii) مثلاً $\sqrt{5} + \sqrt{6} = \sqrt{6} + \sqrt{5}$

(iii) خاصیت تلازم (Associative Property)

کوئی سے تین حقیقی اعداد a, b, c اور c کے لیے۔

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

خاصیت تلازم بلحاظ جمع کہلاتی ہے۔

مثلاً $(4 + 5) + 6 = 4 + (5 + 6)$

(iv) جمعی ذاتی عنصر: Additive Identity

$$a + 0 = a = 0 + a, \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

0 کو اضافی شناخت کہا جاتا ہے

مثلاً $3 + 0 = 3 = 0 + 3, \quad \frac{7}{8} + 0 = \frac{7}{8} = 0 + \frac{7}{8}$

(v) جمعی معکوس (Additive Inverse)

حقیقی اعداد کے سیٹ $\mathbb{R}$ میں ہر رکن a کا ایک اور صرف ایک ہی جمعی معکوس $-a \in \mathbb{R}$ موجود ہے جیسا کہ $a + (-a) = 0 = (-a) + a$

مثلاً: $6 + (-6) = 0 = (-6) + 6 = 0$

لہذا 6 اور -6 ایک دوسرے کا جمعی معکوس ہیں

(b) حقیقی اعداد کی خصوصیات بلحاظ ضرب۔

(i) خاصیت بندش (Closure Property)

کسی دو حقیقی اعداد کا حاصل ضرب بھی ایک حقیقی عدد ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ $a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow ab \in \mathbb{R}$ اس کی خاصیت بندش بلحاظ ضرب کہلاتی ہے۔

(i) مثلاً $5, 7 \in \mathbb{R} \Rightarrow (5)(7) = 35 \in \mathbb{R}$

(ii) $\frac{3}{5}, \frac{6}{7} \in \mathbb{R} \Rightarrow \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{6}{7}\right) = \frac{18}{35} \in \mathbb{R}$, etc

خاصیت مبادلہ (Commutative Property)

کوئی سے دو حقیقی اعداد a اور b کے لیے $ab = ba$ خاصیت مبادلہ بلحاظ ضرب کہلاتی ہے۔

- (i) $\sqrt{3}, \sqrt{5} \in \mathbb{R} \Rightarrow (\sqrt{3})(\sqrt{5}) = (\sqrt{5})(\sqrt{3})$ مثلاً
(ii) $3, 4 \in \mathbb{R} \Rightarrow 3 \times 4 = 4 \times 3$ وغیرہ۔

خاصیت تلازم (Associative Property)

کوئی سے تین حقیقی اعداد a, b اور c کے لیے

$$(ab)c = a(bc)$$

خاصیت تلازم بلحاظ ضرب کہلاتی ہے۔

- (i) $4, 5, 6 \in \mathbb{R}$, پھر $(4 \times 5) \times 6 = 4 \times (5 \times 6)$, مثلاً

- (ii) $\frac{2}{5}, 4, \sqrt{3} \in \mathbb{R}$, پھر $(\frac{2}{5} \times 4) \times \sqrt{3} = \frac{2}{5} \times (4 \times \sqrt{3})$ وغیرہ۔

(iv) ضربی ذاتی عنصر (Multiplicative Identity)

حقیقی اعداد کے سیٹ $\mathbb{R}$ میں ایک اور صرف ایک ہی حقیقی عدد $1 \in \mathbb{R}$ موجود ہے جو ضربی ذاتی عنصر کہلاتا ہے۔

$$a \times 1 = 1 \times a = a \text{ '1' جبکہ}$$

$$1 \times 3 = 3 \times 1 = 3, \text{ مثلاً}$$

$$\frac{3}{5} \times 1 = 1 \times \frac{3}{5} = \frac{3}{5} \text{ وغیرہ۔}$$

ضربی معکوس (Multiplicative Inverse)

سیٹ $\mathbb{R}$ میں ہر حقیقی عدد a ($a \neq 0$) کا ضربی معکوس ایک اور صرف ایک ہی نمبر $\frac{1}{a}$ or $a^{-1} \in \mathbb{R}$ موجود ہوتا ہے۔

جبکہ $\frac{1}{a}$ کا ضربی معکوس کہا جاتا ہے۔

$$a \times \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \times a = 1 \text{ جبکہ یا}$$

$$3 \times \frac{1}{3} = 1 = \frac{1}{3} \times 3 \text{ مثلاً اگر}$$

لہذا 3 اور $\frac{1}{3}$ ایک دوسری کا ضربی معکوس ہیں۔

ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ جمع. Distributive property of Multiplication over addition.

کوئی سے تین حقیقی اعداد a, b اور c کے لیے

$$a(b+c) = ab+ac, \text{ (i)}$$

ہر ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ جمع کہلاتی ہے۔ (بائیں خاصیت تقسیمی)

(ii) $(a+b)c = ac + bc$ یہ ضرب کے خاصی تقسیمی بلحاظ جمع کہلاتی ہے۔ (دائیں خاصیت تقسیمی)

مثلاً $3(5+7) = 3 \times 5 + 3 \times 7$ (بائیں خاصیت تقسیمی)

$(3+7)2 = 3 \times 2 + 7 \times 2$ (دائیں خاصیت تقسیمی)

نوٹ: $a(b-c) = ab - ac$ یہ ضرب کی خاصی تقسیمی بلحاظ تفریق کہلاتی ہے۔

(d) حقیقی اعداد کی برابری کی خصوصیات

حقیقی اعداد کی برابری کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) عکسی خاصیت (Reflexive Property)

اگر $a \in \mathbb{R}$ ہو تو پھر $a = a$ ہوتا ہے۔

(ii) خاصیت تشاکل (Symmetric Property)

اگر $a, b \in \mathbb{R}$ ہو تو $a = b \Leftrightarrow b = a$

(iii) متعدی خاصیت (Transitive Property)

اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$ پھر $a = b$ اور $b = c \Leftrightarrow a = c$.

(iv) جمعی خاصیت (Additive Property)

اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$ پھر $a = b \Leftrightarrow a + c = b + c$.

(v) ضربی خاصیت (Multiplicative Property)

اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$ اس طرح کہ $a = b$ پھر $ac = bc$.

(vi) تیسخی خاصیت بلحاظ جمع (Cancellation Property w.r.t addition)

اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$ اگر $a + c = b + c$ پھر $a = b$

(vii) تیسخی خاصیت بلحاظ ضرب (Cancellation Property w.r.t multiplication)

اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$ اور $c \neq 0$ اگر $ac = bc$ پھر $a = b$

حقیقی اعداد کی نابرابری خصوصیات. Properties of Inequalities of Real Numbers.

حقیقی اعداد کی نابرابری خصوصیات درج ذیل ہیں

(ii) خاصیت ثلاثی (Trichotomy Property)



اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$ پھر $a > b$ یا $a < b$ یا $a = b$.

(iii) متعدی خاصیت (Transitive Property)

اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$ پھر

(a) $a < b$ اور $b < c \Rightarrow a < c$,

(b) $a > b$ اور $b > c \Rightarrow a > c$.



(iii) جمعیت خاصیت (Additive Property)

پھر $a, b, c \in \mathbb{R}$ اگر

- (a) $a < b \Rightarrow a + c < b + c,$
 (b) $a > b \Rightarrow a + c > b + c.$

(iv) ضربی خاصیت (Multiplicative Property)

پھر $a, b, c \in \mathbb{R}$ اور $c > 0$ اگر

- (a) $a > b \Rightarrow ac > bc,$
 (b) $a < b \Rightarrow ac < bc,$

پھر $c < 0$ اگر

- (a) $a > b \Rightarrow ac < bc$
 (b) $a < b \Rightarrow ac > bc$

(v) ضربی معکوس خاصیت

اگر $a, b \in \mathbb{R}$ کی نشانی ایک جیسی ہے تو پھر

- (a) اگر $a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ اور اگر $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} \Rightarrow a > b$

- (b) اگر $a > b \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ اور اگر $\frac{1}{a} > \frac{1}{b} \Rightarrow a < b$


(vi) تنسیخی خاصیت

اگر $a, b, c \in \mathbb{R}$

- (a) $a + c > b + c \Rightarrow a > b$
 (b) $a + c < b + c \Rightarrow a < b$

اس طرح (a) $ac > bc \Rightarrow a > b$, یہاں $c > 0$

- (b) $ac < bc \Rightarrow a < b$, یہاں $c > 0$



مشق 1.2

(1) درج ذیل جملوں میں حقیقی اعداد کی خاصیت کی نشاندہی کیجئے۔

$$(i) \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{2}$$

$$(ii) \frac{4}{3} + \left(1\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{4}{3} + 1\frac{1}{3}\right) + \frac{2}{3}$$

$$(iii) 9 \times \left(\frac{10}{9} + \frac{20}{9}\right) = \left(9 \times \frac{10}{9}\right) + \left(9 \times \frac{20}{9}\right)$$

$$(iv) \left(\frac{4}{5} + \frac{5}{7}\right) \times \frac{7}{8} = \left(\frac{4}{5} \times \frac{7}{8}\right) + \left(\frac{5}{7} \times \frac{7}{8}\right)$$

$$(v) \left(\frac{7}{5} - \frac{3}{5}\right) \times \frac{10}{15} = \left(\frac{7}{5} \times \frac{10}{15}\right) - \left(\frac{3}{5} \times \frac{10}{15}\right)$$

$$(vi) \frac{d}{c} \times \frac{e}{f} = \frac{e}{f} \times \frac{d}{c}$$

$$(vii) 11 \times (15 \times 21) = (11 \times 15) \times 21$$

$$(viii) \frac{2}{11} \times \frac{11}{2} = \frac{11}{2} \times \frac{2}{11} = 1$$

$$(ix) \left(\frac{3}{5}\right) + \left(-\frac{3}{5}\right) = \left(-\frac{3}{5}\right) + \left(\frac{3}{5}\right) = 0$$

$$(x) \left(\frac{a}{b}\right) \times \left(\frac{b}{a}\right) = \left(\frac{b}{a}\right) \times \left(\frac{a}{b}\right) = 1$$

$$(xi) \frac{15}{10} \times \left(\frac{8}{5} - \frac{4}{10}\right) = \left(\frac{15}{10} \times \frac{8}{5}\right) - \left(\frac{15}{10} \times \frac{4}{10}\right)$$

$$(xii) \frac{\sqrt{2}}{3} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{3} = 1$$

(2) مندرجہ ذیل میں خالی جگہ پر درست حقیقی عدد لکھ کر حقیقی اعداد کی خاصیت کو درست کیجئے۔

$$(i) \frac{\sqrt{2}}{5} + \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\square}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}}{5}$$

$$(ii) \frac{7}{10} + \left(\frac{70}{\square} + \frac{16}{33}\right) = \left(\frac{7}{\square} + \frac{16}{10}\right) + \frac{16}{\square}$$

$$(iii) \frac{99}{50} \times \frac{50}{99} = \square$$

$$(iv) \left(\frac{59}{95}\right) \times \left(\frac{95}{59}\right) = \square$$

$$(v) (-21) + (\square) = 0$$

$$(vi) \frac{5}{8} \times \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{7}\right) = \left(\frac{\square}{\square} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{5}{8} \times \frac{\square}{\square}\right)$$

(3) خاصیت کو درست کرنے کے لیے خالی جگہ پُر کریں۔

$$(i) 5 < 8 \text{ and } 8 < 10 \Rightarrow \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(ii) 10 > 8 \text{ and } 8 > 5 \Rightarrow \underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(iii) 3 < 6 \Rightarrow 3 + 9 < \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(iv) 4 < 6 \Rightarrow 4 + 8 < \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

$$(v) 8 > 6 \Rightarrow 8 + 8 > \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$$

(4) خالی جگہ پر کیجئے اور خاصیت کو درست کیجئے۔

(i) $5 < 7 \Rightarrow 5 \times 12 < \underline{\quad} \times \underline{\quad}$

(ii) $7 > 5 \Rightarrow 7 \times 12 > \underline{\quad} \times \underline{\quad}$

(iii) $6 > 4 \Rightarrow 6 \times (-7) \underline{\quad} 4 \times (-7)$

(iv) $2 < 8 \Rightarrow 2 \times (-4) \underline{\quad} 8 \times (-4)$

(5) درج ذیل اعداد کا جمعی اور ضربی معکوس معلوم کیجئے۔

(i) 3

(ii) -7

(iii) 0.3

(iv) $\frac{-\sqrt{5}}{5}$

(v) $\frac{9}{\sqrt{12}}$

(vi) 0

1.3 مجذور اور جذری مقداریں۔

1.3.1 مجذور اور جذری مقدار کی شناخت / پہچان۔

فرض کیجئے۔ $n \in \mathbb{Z}^+$ (مثبت صحیح اعداد کا سیٹ) $n > 1$,

اور $a \in \mathbb{R}$ پھر کسی حقیقی عدد x کے لیے۔

جیسا کہ $x^2 = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x = \sqrt{a}$ (square root of a)

اس طرح $x^3 = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{3}} \Rightarrow x = \sqrt[3]{a}$ (cube root of a)

$x^4 = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{4}} \Rightarrow x = \sqrt[4]{a}$ (4^{th} root of a)

عام طور پر

$x^n = a \Rightarrow x = a^{\frac{1}{n}} \Rightarrow x = \sqrt[n]{a}$ (n^{th} root of a)

$\sqrt[n]{a}$ میں 'a' مجذور اور 'n' اشاریہ (Index of the root) کہلاتا ہے۔

$\sqrt{\quad}$ کا نشان جذری نشان کہلاتا ہے۔

1.3.2 کسی بھی جملے کے جذری مقدار اور قوت نمائی شکل میں فرق۔

ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ $x = \sqrt[n]{a}$ ایک جذری شکل ہے۔

اس طرح $a^{\frac{1}{3}}, a^{\frac{2}{3}}, a^{\frac{3}{2}}, a^{\frac{1}{n}}, a^{\frac{m}{n}}$ قوت نمائی شکل کی چند مثالیں ہیں۔

یاد رہے کہ

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

یہاں $\sqrt[n]{a}$ اس کی جذری شکل ہے اور $a^{\frac{1}{n}}$ اس کی قوت نمائی شکل ہے۔

جذر کے چند متغیر نتائج درج ذیل ہیں۔

$$a, b \in \mathbb{R}^+ \wedge m, n \in \mathbb{Z}$$

$$(i) \quad \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

$$(ii) \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$(iii) \quad \frac{a}{\sqrt{a}} = \sqrt{a}$$

$$(iv) \quad \sqrt{a} \times \sqrt{a} = \sqrt{a^2} = a$$

$$(v) \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = 1$$

$$(vi) \quad m\sqrt{a} \pm n\sqrt{a} = (m \pm n)\sqrt{a}$$

$$(vii) \quad \sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^{-n}} = \sqrt{\left(\frac{b}{a}\right)^n}$$

اس طرح

$$(i) \quad \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$(ii) \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$(iii) \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$(iv) \quad \sqrt[mn]{a^n} = a^{\frac{n}{mn}} = a^{\frac{1}{m}}$$

$$(v) \quad \sqrt[mn]{a} = \sqrt[n]{a^{\frac{1}{m}}} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = a^{\frac{1}{mn}}$$

$$(vi) \quad \sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n^2]{a} = a^{\frac{1}{n^2}}$$

$$(vii) \quad \sqrt[n]{a^n} = a$$

$$(viii) \quad \frac{\sqrt[n]{a^n}}{\sqrt[n]{a^n}} = 1$$

1.3.3 جذری شکل میں دیے گئے جملے کو قوت نمائی شکل میں تبدیل کرنا۔

جذر اور قوت نمائی شکلوں کی خصوصیات بہت مفید ثابت ہوتی ہیں جب ہم جذریا قوت نماد والی قدروں کو حل کرتے ہیں۔



مثال 01 جذری شکل میں دی گئی مقداروں کو قوت نمائی شکل میں تبدیل کیجئے۔

$$(i) \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (ii) \sqrt[3]{18} \quad (iii) \sqrt[5]{\frac{5}{7}} \quad (iv) \sqrt[9]{\left(\frac{x}{y}\right)^2} \quad (v) \sqrt[4]{(ab)^3}$$

حل

$$(i) \sqrt{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (ii) \sqrt[3]{18} = (18)^{\frac{1}{3}} \quad (iii) \sqrt[5]{\frac{5}{7}} = \left(\frac{5}{7}\right)^{\frac{1}{5}}$$

$$(iv) \sqrt[9]{\left(\frac{x}{y}\right)^2} = \left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{2}{9}} \quad (v) \sqrt[4]{(ab)^3} = (ab)^{\frac{3}{4}}$$

مثال 02 قوت نمائی شکل میں دی گئی مقداروں کو جذری شکل میں تبدیل کریں۔

$$(i) \left(\frac{5}{7}\right)^{\frac{1}{3}} \quad (ii) (12)^{\frac{n}{2}} \quad (iii) (-7)^{\frac{3}{4}} \quad (iv) \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{2}{5}} \quad (v) \left(-\frac{x}{y}\right)^{\frac{m}{n}}$$

حل


$$(i) \left(\frac{5}{7}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{5}{7}} \quad (ii) (12)^{\frac{n}{2}} = \sqrt{(12)^n} \quad (iii) (-7)^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{(-7)^3}$$

$$(iv) \left(\frac{y}{x}\right)^{-\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{\left(\frac{y}{x}\right)^{-2}} = \sqrt[5]{\left(\frac{x}{y}\right)^2} \quad (v) \left(-\frac{x}{y}\right)^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{\left(-\frac{x}{y}\right)^m}$$

مشق 1.3

1. مہذبہ اور اشاریہ کی نشاندہی کیجئے۔

$$(i) \sqrt[3]{5} \quad (ii) \sqrt[4]{\frac{x}{y}} \quad (iii) \sqrt[5]{x^2yz}$$



2. درج ذیل کو قوت نمائی شکل میں تبدیل کیجئے۔

(i) $\sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)}$

(ii) $\sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^5}$

(iii) $\sqrt[3]{\left(\frac{y}{x}\right)^{-5}}$

(iv) $\sqrt[3]{(yz)^7}$

(v) $\sqrt[9]{27}$

(vi) $\sqrt[3]{(-64)^2}$

(vii) $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^m}$

(viii) $\sqrt[5]{(xy)^3}$

(ix) $\sqrt[3]{\sqrt{\frac{4}{3}}}$

3. درج ذیل کو جذری شکل میں تبدیل کیجئے۔

(i) $(5^3)^{\frac{1}{7}}$

(ii) $(ab^{-2})^{\frac{1}{3}}$

(iii) $\left[\left(\frac{5}{7}\right)^3\right]^{\frac{5}{7}}$

(iv) $\left(\frac{b}{a}\right)^{-\frac{m}{2}}$

(v) $\left[\left(\frac{11}{13}\right)\left(\frac{12}{13}\right)\right]^{\frac{1}{5}}$

1.4 قوت نمائے قوانین۔

1.4.1 اساس، قوت نما اور قوت نما کو دہرائیں

قوت نمائی شکل، a^n (پڑھا جائے 'a' کی قوت نما 'n') میں ہم 'a' کو اساس اور 'n' کو 'a' کی قوت کا انڈکس کہتے ہیں نتیجہ جبکہ $a \in \mathbb{R}$ ، a^n اس کی قیمت کہلاتی ہے۔ 1.4.2 قوت نمائے قوانین کو استعمال کرتے ہو ان جملوں (اعداد) کو مختصر کریں جن میں قوت نما موجود ہو۔

(i) حاصل ضرب کی قوت کا قانون

(a) If $a, b \in \mathbb{R}$ and $x, y \in \mathbb{Z}^+$
 $a^x \times a^y = a^{x+y}$ پھر

درج ذیل مثالیں اس قانون پر منحصر ہیں۔

(a) $a^2 \times a^3 = a^{2+3} = a^5$

(b) $3 \times 3^5 = 3^{1+5} \times 3^6 = 729$

(ii) قوت کی قوت کا قانون

اگر $a \in \mathbb{R}$ اور $(a^x)^y = a^{xy}$ ، then $x, y \in \mathbb{Z}^+$ ، ہو تو

درج ذیل مثالیں اس قانون پر منحصر ہیں

(a) $(5^2)^4 = 5^{2 \times 4} = 5^8$



$$(b) \left\{ \left(\frac{6}{11} \right)^4 \right\}^3 = \left(\frac{6}{11} \right)^{4 \times 3} = \left(\frac{6}{11} \right)^{12}$$

$$(c) \left\{ \left(-\frac{3}{4} \right)^3 \right\}^3 = \left(-\frac{3}{4} \right)^{3 \times 3} = \left(-\frac{3}{4} \right)^9 = -\left(\frac{3}{4} \right)^9$$

(iii) حاصل ضرب کی قوت کا قانون

لیے $a, b, \in \mathbb{R}$ اور $n \in \mathbb{Z}^+$ کے

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

درج ذیل مثالیں اس قانون پر منحصر ہیں

$$(a) (xy)^3 = x^3 y^3 \quad (b) \left\{ \left[\frac{8}{9} \right] \left[\frac{7}{11} \right] \right\}^3 = \left(\frac{8}{9} \right)^3 \left(\frac{7}{11} \right)^3$$

(iv) قوتوں کے حاصل تقسیم کا قانون

اگر $a, b, \in \mathbb{R}$ اور $n \in \mathbb{Z}^+$ ہو تو $b \neq 0$ جبکہ $\left(\frac{a}{b} \right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ دی گئی مثالیں اس قانون پر منحصر ہیں۔

$$(a) \left(\frac{5}{8} \right)^3 = \frac{5^3}{8^3} \quad (b) \left(\frac{f}{g} \right)^4 = \frac{f^4}{g^4}, g \neq 0$$

(v) کسر کی قوت کا قانون

اگر $a \in \mathbb{R}$ اور $a \neq 0$ اور $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ہو تو۔

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \text{ if } m > n$$

$$= \frac{1}{a^{n-m}}, \text{ if } n > m,$$

اگر $m = n$ ہو تو

$$a^{m-n} = a^{m-m} = a^0 = 1$$

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{a^m}{a^m} = \frac{a^n}{a^n} = 1 \text{ اس طرح}$$

دی گئی مثالیں اس قانون پر منحصر ہیں۔

$$(a) \frac{3^5}{3^2} = 3^{5-2} = 3^3 = 27$$

$$(b) \frac{7^3}{7^5} = \frac{1}{7^{5-3}} = \frac{1}{7^2} = \frac{1}{49}$$



یاد رکھیے!

$(-a)^n = a^n$ اگر n ایک جفت قوت نہ ہو۔

$-a^n$ اگر n ایک طاق قوت نہ ہو۔



یاد رکھیے!

اگر غیر صفری حقیقی نمبر کی قوت نہ صفر ہو تو

اس کی قیمت 1 کے برابر ہوگی۔

مثلاً: $3^0 = 1$.



مشق 1.4

1. حل کریں۔

(i) $\frac{3^5}{3^2}$

(ii) $\frac{2^4 \cdot 5^3}{10^2}$

(iii) $\frac{(a+b)^2 \cdot (c+d)^3}{(a+b) \cdot (c+d)^2}$

2. قوت نما کے قوانین کا استعمال کر کے حل کریں۔

(i) $\left(\frac{1}{3}\right)^4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^5$

(ii) $\left(\frac{3}{4}\right)^5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2$

(iii) $\left(-\frac{4}{5}\right)^3 \times \left(-\frac{4}{5}\right)^5$

(iv) $(-3 \times 5^2)^3$

(v) $[3 \times (-4)^2]^3$

(vi) $\left(-\frac{a}{bc}\right)^5 \times \left(-\frac{a}{bc}\right)^4$

(vii) $\left(-\frac{c}{d}\right)^2 \left(-\frac{c}{d}\right)^3 \left(-\frac{c}{d}\right)^5$

(viii) $mn^2t^4n^3m^5t^7$

(ix) $a^2c^5b^2a^3c^3b^4a^4$

3. قوت نما کے قوانین کا استعمال کر کے حل کریں۔

(i) $(5^2)^3$

(ii) $\{(xy)^3\}^5$

(iii) $\{(-4)^2\}^5$

(iv) $\{(-3)^3(-4)^2\}^3$

(v) $\left(\frac{b^2}{5}\right)^3$

(vi) $\left\{\left(-\frac{4}{9}\right)^2\right\}^3$

(vii) $\{(z^3)^2\}^4$

(viii) $\{(mm^2m^3m^4)^2\}^5$

(ix) $-[(-0.1)^2(-0.1)^3(-0.1)^4]^2$

1.5 کمپلیکس اعداد

کمپلیکس اعداد کے تصور کی تعریف کرنا اور ایک کمپلیکس عدد a کو z میں ظاہر کرنا جس میں a اور b دو حقیقی اعداد ہوں اور $z = a + ib$ خیالی عدد ہو۔ جبکہ a حقیقی حصہ اور b خیالاتی حصہ ہو۔

ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی حقیقی عدد کا مربع کبھی بھی منفی نہیں ہوتا۔ پس مساوات $x^2 + 1 = 0$ کا حل حقیقی نہیں ہو سکتا۔ حقیقی اعداد میں اس کمی کو دور کرنے کے لیے ریاضی دانوں نے ایک نیا عدد $\sqrt{-1}$ متعارف کروایا جسے خیالی ایکا کہا جاتا ہے جس کی خاصیت $i^2 = -1$ ہے جس کی وجہ سے تمام مساواتوں $x^2 + a = 0, a > 0$ کو بھی حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اعداد جیسے کہ $\sqrt{-1} = i, \sqrt{-5} = \sqrt{5}i, \sqrt{-49} = 7i$ خالصتاً خیالاتی اعداد ہیں۔



کمپلیکس عدد کی تعریف:

$a+ib$ ایک ایسا عدد ہے جہاں a اور b دو حقیقی اعداد ہیں اور i ایک خیالاتی عدد ہے جیسا کہ $i = \sqrt{-1}$ اسے کمپلیکس عدد کہتے ہیں اور اسے z سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ $z = 3+4i$ ایک کمپلیکس عدد ہے۔ کسی بھی کمپلیکس عدد $a+ib$ کو جوڑے کی شکل میں (a, b) کے طور پر بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$5+8i = (5, 8) \text{ جیسا کہ}$$

1.5.2 $z = a+ib$ کو حقیقی حصہ a اور b ایک خیالاتی حصے کے طور پر پہچاننا۔

کمپلیکس عدد $z = a+ib$ میں، a اس کا حقیقی حصہ اور b اس کا خیالاتی حصہ کہلاتا ہے۔ کمپلیکس نمبر عدد کا حقیقی حصہ $\text{Re}(z)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور خیالاتی حصہ کو $\text{Im}(z)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال دیئے گئے کمپلیکس عدد کا حقیقی اور خیالاتی حصہ کی نشاندہی کیجئے۔

$$z = 3 - 2i$$

$$\text{Re}(z) = a = 3 \text{ اور } \text{Im}(z) = b = -2 \text{ یہاں}$$

1.5.3 کمپلیکس عدد کے کانجوگیٹ کی تعریف کانجوگیٹ کمپلیکس عدد z کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

کمپلیکس عدد z کے کانجوگیٹ کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے

$$\bar{z} = a - ib \text{ جیسا کہ اگر } z = a + ib \text{ ہو تو}$$

$$\bar{z} = (a, -b) \text{ یا اگر } z = (a, b) \text{ ہو تو}$$

$$\bar{z} = a + ib \text{ اور اگر } z = a - ib \text{ یا}$$

$$\bar{z} = (a, b) \text{ اگر } z = (a, -b) \text{ ہو تو}$$

کمپلیکس عدد کے کانجوگیٹ میں ہم صرف خیالاتی حصہ کی نشانی بدل دیتے ہیں۔

نوٹ: اگر کسی بھی کمپلیکس عدد $z = (\bar{z})$

مثال درج ذیل کمپلیکس اعداد کا کانجوگیٹ معلوم کیجئے۔

$$(i) 3 + 4i$$

$$(ii) \left(-\frac{4}{5}, \frac{5}{4}\right)$$

حل

$$(i) z_1 = 3 + 4i \text{ فرض کیجئے:}$$

$$(ii) z_2 = \left(-\frac{4}{5}, -\frac{5}{4}\right) \text{ فرض کیجئے:}$$

$$\bar{z}_1 = \overline{3+4i} \text{ تو}$$

$$\bar{z}_2 = \overline{\left(-\frac{4}{5}, -\frac{5}{4}\right)}$$

$$\bar{z}_1 = 3 - 4i$$

$$\bar{z}_2 = \left(-\frac{4}{5}, \frac{5}{4}\right)$$



1.5.4 کمپلیکس اعداد میں برابری کا تصور اور اس کی خصوصیت

دو کمپلیکس اعداد تب برابر ہوتے ہیں اگر ان کے حقیقی حصے اور خیالیاتی حصے یکساں ہوں۔

$$\text{اگر } \forall a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ اور } a + ib = c + id \text{ اور اگر } a = c \text{ اور } b = d$$

مثال 01 اگر $4x + 3yi = 16 + 9i$ تو x, y کی قیمت معلوم کیجئے۔

حل: دیا گیا ہے کہ

$$4x + 3yi = 16 + 9i \Rightarrow 4x = 16 \text{ اور } 3y = 9,$$

$$\Rightarrow \frac{4x}{4} = \frac{16}{4} \text{ اور } \frac{3y}{3} = \frac{9}{3}, \Rightarrow x = 4 \text{ اور } y = 3.$$

مثال 02 اگر $x^2 + iy^2 = 25 + i36$ تو x اور y کی قیمت معلوم کیجئے۔

حل: دیا گیا ہے کہ

$$x^2 + y^2i = 25 + 36i \Rightarrow x^2 = 25 \text{ اور } y^2 = 36,$$

$$x = \pm\sqrt{25} \text{ اور } y = \pm\sqrt{36} \Rightarrow x = \pm 5 \text{ اور } y = \pm 6$$

مشق 1.5

1. درج ذیل کمپلیکس اعداد کو $a+ib$ کی شکل میں لکھیے۔

(i) $(1, 2)$

(ii) $(2, 2)$

(iii) $(3, 4)$

(iv) $(-1, 1)$

(v) $(-2, 2)$

(vi) $(-3, 4)$

2. درج ذیل کمپلیکس اعداد کے حقیقی اور خیالیاتی حصے لکھیے۔

(i) $1 + 2i$

(ii) $9i + 4$

(iii) $(-5, 6)$

(iv) $-1 - i$

(v) $\left(-\frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{4}{5}\right)i$

(vi) $2i - 1$

3. درج ذیل کمپلیکس اعداد کے کانجوگیٹ معلوم کیجئے۔

(i) $3 + 2i$

(ii) $(4, 9)$

(iii) $(-1, 1)$

(iv) $1 - i$

(v) $\left(-\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right)i$

(vi) $3i + 1$



4. دیئے گئے اعداد میں تصدیق کیجئے کہ $\overline{z} = z$

(i) $\left(\frac{4}{7}\right) + \left(\frac{9}{10}\right)i$

(ii) $\left(-\frac{9}{11}\right) + \left(\frac{10}{9}\right)i$

(iii) $\frac{1}{2} - 3i$

(iv) $2 + 3i$

(v) $-2 - 3\left(-\frac{10}{9}\right)i$

(vi) $4x + 3iy$

5. x اور y کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ

(i) $x + yi = -5 + 5i$

(ii) $x^2 + iy^2 = \frac{16}{9} + \frac{9}{25}i$

(iii) $y^2 + \frac{x}{3}i = 121 - \frac{9}{5}i$

(iv) $\frac{\sqrt{5}}{3}x - \frac{3}{\sqrt{2}}yi = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \frac{2\sqrt{2}}{9}i$

1.6 کمپلیکس اعداد پر بنیادی عوامل

1.6.1 کمپلیکس اعداد پر جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کا استعمال کیجئے

(i) کمپلیکس اعداد کی جمع

فرض کیجئے $z_1 = a + ib$ اور $z_2 = c + id$ دو کمپلیکس اعداد ہوں تو z_1 اور z_2 کی حاصل جمع

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + ib) + (c + id) \\ &= (a + c) + i(b + d) = (a + c, b + d). \end{aligned}$$

مثال 01 اگر $z_1 = 6 + 9i$ اور $z_2 = -1 + 2i$ تو $z_1 + z_2$ معلوم کیجئے۔

حل: معلوم ہے کہ $z_1 = 6 + 9i = (6, 9)$ اور $z_2 = -1 + 2i = (-1, 2)$

ہم جانتے ہیں کہ $z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d) = (a + c, b + d)$



یاد رکھیے!

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$\begin{aligned} \therefore z_1 + z_2 &= (6, 9) + (-1, 2) \\ \Rightarrow z_1 + z_2 &= (6 - 1, 9 + 2) \\ \Rightarrow z_1 + z_2 &= (5, 11) \end{aligned}$$

(ii) کمپلیکس اعداد کی تفریق:

فرض کیجئے $z_1 = a + ib$ اور $z_2 = c + id$, $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$

اگر $z_1 - z_2 = (a + ib) - (c + id)$ ہو تو

$$= (a - c) + i(b - d) = (a - c, b - d) \text{ پھر}$$



یاد رکھیے!

$$(a, b) - (c, d) = (a - c, b - d)$$

مثال 01 اگر $z_1 = -7 + 2i$ اور $z_2 = 4 - 9i$ ہو تو $z_1 - z_2$ معلوم کیجئے۔

حل: دیا گیا ہے کہ $z_1 = -7 + 2i = (-7, 2)$ اور $z_2 = 4 - 9i = (4, -9)$

ہم جانتے ہیں کہ $z_1 - z_2 = (a - c, b - d)$

$$\begin{aligned} \therefore z_1 - z_2 &= (-7 - 4, 2 + 9) \\ \Rightarrow z_1 - z_2 &= (-11, 11) \end{aligned}$$



(iii) کمپلیکس اعداد کی ضرب:

فرض کیجئے $z_1 = a + ib$ اور اگر $z_2 = c + id$ اگر دو کمپلیکس اعداد ہوں تو $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$



یاد رکھیے!

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a + ib)(c + id) = c(a + ib) + di(a + ib) = ac + bci + adi + bdi^2 = (ac - bd) + i(ad + bc) \quad i^2 = -1$$

مثال 01 اگر $z_1 = 3 + 4i = (3, 4)$ اور $z_2 = -3 - 4i = (-3, -4)$ ہو تو حاصل ضرب معلوم کیجئے۔

$$\text{حل: } z_1 = 3 + 4i = (3, 4) \text{ اور } z_2 = -3 - 4i = (-3, -4)$$

$$z_1 z_2 = (ac - bd, ad + bd) \quad \text{ہم جانتے ہیں کہ}$$

$$\therefore z_1 z_2 = (3, 4) \cdot (-3, -4)$$

$$\Rightarrow z_1 z_2 = (-9 + 16, -12 - 12) = (7, -24)$$

(iv) کمپلیکس اعداد کی تقسیم


فرض کیجئے $z_1 = a + ib = (a, b)$ اور $z_2 = c + id = (c, d)$, $z_2 \neq 0$ جبکہ اور تمام z_1 اور z_2 حقیقی اعداد ہیں۔




یاد رکھیے!

$$\frac{(a, b)}{(c, d)} = \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{a + ib}{c + id} \\ &= \frac{a + ib}{c + id} \times \frac{c - id}{c - id} \\ &= \frac{(ac + bd) + i(bc - ad)}{c^2 + d^2} \\ &= \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} \right) + i \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right) \\ &= \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right) \end{aligned}$$





مثال 01 حل کیجئے۔ $\frac{2+3i}{4+2i}$

حل:

$$\begin{aligned} & \frac{2+3i}{4+2i} \\ &= \frac{2+3i}{4+2i} \times \frac{4-2i}{4-2i} \\ &= \frac{(8+6)+i(12-4)}{(4)^2-(i2)^2} \\ &= \frac{14+8i}{20} \\ &= \frac{14}{20} + i \frac{8}{20} \\ &= \frac{7}{10} + i \frac{4}{10} \\ &= \left(\frac{7}{10}, \frac{4}{10} \right) = \left(\frac{7}{10}, \frac{2}{5} \right) \end{aligned}$$

مثال 02 تقسیمی فارمولہ کے استعمال سے کمپلیکس اعداد پر تقسیم کا عمل کیجئے۔ $(-1, 3) \div (2, -4)$

حل فارمولا:

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(a, b)}{(c, d)} = \left(\frac{ac+bd}{c^2+d^2}, \frac{bc-ad}{c^2+d^2} \right) \\ \frac{(-1, 3)}{(2, -4)} &= \left(\frac{(-1)(2) + (3)(-4)}{2^2 + (-4)^2}, \frac{(3)(2) - (-1)(-4)}{2^2 + (-4)^2} \right) \\ &= \left(\frac{-2-12}{4+16}, \frac{6-4}{4+16} \right) \\ &= \left(\frac{-14}{20}, \frac{2}{20} \right) \\ &= \left(\frac{-7}{10}, \frac{1}{10} \right) \end{aligned}$$



مشق 1.6

1. دیئے گئے کمپلیکس اعداد پر ریاضیاتی عوامل کو انجام دیجئے۔

(i) $(3, 2) + (9, 3)$

(ii) $\left(\frac{3}{2}, \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right)$

(iii) $(15, 12) - (10, -9)$

(iv) $\left(\frac{4}{5}, \frac{8}{15}\right) - \left(\frac{4}{5}, \frac{6}{10}\right)$

(v) $(1, 2)(1, -2)$

(vi) $(4, -5)(5, -4)$

(vii) $(3, -7) \div (3, 2)$

(viii) $(4, 5) \div (2, -3)$

2. حل کیجئے اور جواب کو $a + ib$ کی شکل میں لکھیے۔

(i) $\frac{-1}{1+i}$

(ii) $(1+i)^4$

(iii) $\left(\frac{1}{1+i}\right)^2$

(iv) $(1+i)^8$

3. اگر $z_1 = -4 + 6i$ اور $z_2 = 2\frac{1}{2} - 2i$ ہو تو تصدیق کیجئے۔

(i) $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$

(ii) $\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$

4. اگر $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = 1 - i$ ہو تو تصدیق کیجئے۔

(i) $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

(ii) $\left(\frac{\overline{z_1}}{z_2}\right) = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

اعادہ مشق 1

خالی جگہ پُر کریں۔

(i) $\sqrt{5}$ کا ضربی معکوس _____ ہے۔

(ii) _____ $Q \cup Q' =$

(iii) $\mathbb{R}$ حقیقی اعداد میں جمعی ذاتی عنصر _____ ہے۔

(iv) _____ $5 + (6+7) = (5+6) +$

(v) _____ $3 + (-3) =$

(vi) _____ π



(vii) $\frac{22}{7}$ ایک عدد ہے۔

(viii) $-3 + 5i$ کا کنجوگیٹ ہے۔

(ix) $2i(3-i)$ میں حقیقی حصہ ہے۔

(x) دو کمپلیکس اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب ہے۔

جیسا کہ $(a, b) \cdot (c, d) =$

2. درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیں اور درست کے لیے 'د' اور غلط کے لیے 'غ' لکھیے۔

(i) $\mathbb{R}$ ایک خاصیت بندش بلحاظ ضرب ہے۔ د/غ

(ii) اگر $x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z$ د/غ

(iii) اگر تمام $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x(y-z) = xy - xz$ حقیقی اعداد ہوں تو۔۔۔ د/غ

(iv) ہر دو خیالاتی اعداد کا حاصل ضرب بھی حقیقی عدد ہوتا ہے۔ د/غ

(v) دو حقیقی اعداد کا حاصل جمع بھی ایک حقیقی عدد ہوتا ہے۔ د/غ

3. درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے۔

(i) $\sqrt{5}$ کا جمعی معکوس ہے۔

(a) $-\sqrt{5}$

(b) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(c) $\sqrt{-5}$

(d) -5

(ii) $(5i) \cdot (-2i) =$

(a) -10

(b) 10

(c) $-10i$

(d) $10i$

(iii) $3(5+7) = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 7$ میں خاصیت ہے۔

(a) خاصیت مبادلہ

(b) خاصیت تلازم

(c) خاصیت تقسیمی

(d) خاصیت بندش

(iv) $\sqrt{-2} \times \sqrt{-2} =$

(a) 2

(b) -2

(c) $2i$

(d) $-2i$





خلاصہ

♦ ناطق اور غیر ناطق اعداد کا یونین ایک حقیقی اعداد کا سیٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$

♦ لامحدود اعشاری اعداد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تکراری اور غیر تکراری لامحدود اعشاری

♦ حقیقی اعداد کی خصوصیات بلحاظ جمع اور ضرب

(i) خاصیت بندش

$$a + b \in \mathbb{R} \text{ اور } ab \in \mathbb{R}, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

(ii) خاصیت تلازم

$$a + (b + c) = (a + b) + c \text{ اور } a(bc) = (ab)c, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(iii) خاصیت مبادلہ

$$a + b = b + a \text{ اور } ab = ba, \forall a, b \in \mathbb{R}$$

(iv) ذاتی عنصر کی خاصیت

$$a + 0 = a = 0 + a \text{ اور } a \cdot 1 = a = 1 \cdot a, \forall a \in \mathbb{R}$$

(v) تقسیمی خاصیت

$$a(b + c) = ab + ac \text{ or } (b + c)a = ba + ca, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

(vi) معکوس کی خاصیت

$$a + (-a) = 0 = -a + a \text{ اور } a \times \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \times a, \forall a \in \mathbb{R} \wedge a \neq 0$$

♦ نمبر لائن: ایک افقی لائن جس پر حقیقی عدد ظاہر کیئے جاتے ہیں جسکو نمبر لائن کہتے ہیں۔

♦ جذر اور مجذور: $\sqrt[n]{a}$ میں، $\sqrt{\quad}$ کو جذری علامت کہتے ہیں۔



♦ قوت نما کے قوانین:

$$a^x \times a^y = a^{x+y} \text{ تو } x, y \in Z^+ \text{ اور } a, b \in \mathbb{R} \text{ (i)}$$

$$(a^x)^y = a^{xy} \text{ تو } x, y \in Z^+ \text{ اور } a \in \mathbb{R} \text{ (ii)}$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \text{ تو } n \in Z^+ \text{ اور } \forall a, b \in \mathbb{R} \text{ (iii)}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \text{ تو } n \in Z^+ \text{ اور } \forall a, b \in \mathbb{R} \text{ (iv)}$$

♦ کمپلیکس اعداد: اگر $z = a + ib = (a, b)$ ایک کمپلیکس عدد ہے جبکہ b ایک حقیقی حصہ اور z ایک خیالی حصہ ہے

$$i = \sqrt{-1} \text{ کا اور}$$

♦ کسی بھی دو کمپلیکس اعداد $z_1 = a + ib$ اور $z_2 = c + id$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d)$$

$$z_1 - z_2 = (a - c) + i(b - d)$$

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2}\right) + i\left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2}\right)$$



لوگر تھم

2

یونٹ

LOGARITHMS

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- عام صورت میں دیے گئے عدد کو سائنسی انداز میں اور اسی طرح لکھیے بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
- لوگر تھم کی تعریف کر سکیں گے کہ اساس 'a' پر کسی عدد y کے لوگر تھم سے مراد 'a' کا وہ قوت نما 'x' ہے جس سے 'a' حاصل ہو جائے۔
- (یعنی $a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x, a > 0, y > 0, a \neq 1$)
- کسی عدد کا log معلوم کرنے کے لیے لوگر تھم کی جدول کا استعمال کر سکیں گے۔
- ضد لوگر تھم (antilog) کے تصور کو سیکھ کر متعلقہ جدول (antilog table) کی مدد سے کسی عدد کا ضد لوگر تھم معلوم کر سکیں گے۔
- کیلکولیٹر (calculator) کی مدد سے کسی بھی عدد کا لوگر تھم اور ضد لوگر تھم معلوم کر سکیں گے۔
- عام اور قدرتی لوگر تھم کے درمیان فرق واضح کر سکیں گے۔
- سیکھ سکیں گے کہ $\log_{10} y$ کے بدلے $\log_e y$ اور $\log y$ کے بدلے $\ln y$

(i) $\log_{10} y = x \Leftrightarrow y = 10^x,$

(ii) $\ln y = x \Leftrightarrow y = e^x.$

• لوگر تھم کے مندرجہ ذیل قوانین ثابت کر سکیں گے۔

(i) $\log_a (mn) = \log_a m + \log_a n$

(ii) $\log_a \left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n,$

(iii) $\log_a m^n = n \log_a m,$

(iv) $\log_a m \cdot \log_m n = \log_a n.$

لوگر تھم کے قوانین کو استعمال کر کے ضرب، تقسیم اور اعداد کی کوئی قوت جیسے پیچیدہ ریاضیاتی عوامل کے استعمال کو جمع اور تفریق جیسے آسان ترین عوامل میں تبدیل کر سکیں گے۔



تعارف:

عظیم مسلمان ریاضی دان ابو محمد موسیٰ الخوارزمی نے لوگر تھم کو متعارف کرایا تھا ان کے بعد سترہویں صدی عیسوی میں جان نیپئر (John Napier) نے لوگر تھم کے تصور کو مزید واضح کیا اور اس کے لیے جدول تیار کیے۔ ان جدول میں بنیاد 'e' استعمال کی گئی۔ 'e' ایک عظیم ناطق عدد ہے جس کی تقریباً قیمت 2.71828 ہے پروفیسر ہنری برکس (Henry Briggs) نے 1631 میں 10 کی بنیاد والی جدول تیار کی۔

لوگر تھم کے استعمال نے طویل اور دشوار حسابی عمل کو مختصر اور بہت آسان کر دیا ہے۔

2.1 سائنسی ترمیم Scientific Notation



سائنسی ترمیم ایک خاص شکل ہے جس کے ذریعے با آسانی لکھا جاسکتا ہے۔

2.1.1 عام ترمیم میں دیئے گئے عدد کو سائنسی ترمیم میں لکھنا۔

ریاضی اور سائنس کی دیگر شاخوں میں انتہائی چھوٹے اور بڑے اعداد کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین سے سورج تک فاصلہ تقریباً 150,000,000 کلومیٹر اور پلانٹیشن ایٹم کا وزن 0.000,000,000,000,000,000,000,001,7 گرام ہے۔

اس طرح کے اعداد کو عام ترمیم میں لکھنا نہ صرف مشکل بلکہ زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ سہولت کی خاطر سائنسدانوں نے بہت چھوٹے اور بہت بڑے اعداد کو لکھنے کے لیے ایک جامع، بالکل ٹھیک اور موزوں طریقہ رائج کیا جسے سائنسی ترمیم کہتے ہیں۔

مذکورہ بالا حصے (2.1.1) میں دیئے گئے عدد کو سائنسی ترمیم میں آسانی کے ساتھ بالترتیب 1.5×10^8 کلومیٹر اور 1.7×10^{-27} گرام لکھا جاسکتا ہے۔



مندرجہ ذیل امثال سے سائنسی ترمیم کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔

مثال :01

درج ذیل اعداد کو سائنسی ترمیم میں لکھیے۔

- (i) 400900 (ii) 0.000058

حل:

(i) دیئے گئے عدد میں نقطہ اعشاریہ اکائی کے ہندسہ کے بعد ہے۔ اس لیے نقطہ اعشاریہ کو پانچ درجے دائیں سے بائیں جانب حرکت میں

اس طرح $400900 = 4.009 \times 10^5$ یہ اس عدد کی مطلوبہ ترمیم ہے

(ii) دیئے گئے عدد میں نقطہ اعشاریہ کے بعد 7 ہندسے ہیں، ساتویں درجہ پر غیر صفری ہندسہ ہے، اس لیے نقطہ اعشاریہ کو چھ درجے میں

بائیں جانب حرکت دیں۔ اس طرح $0.0000075 = 7.5 \times 10^{-6}$

لکھیں جو مطلوبہ سائنسی ترمیم ہے۔

مثال :02

درج ذیل اعداد کو عام ترمیم میں لکھیں۔

- (i) 2.76×10^6 (ii) 5.24×10^{-4}

- (i) 2.76×10^6

چھ درجے دائیں طرف حرکت دیں گے لیکن یہاں 2 ہندسے ہیں۔ بس ہم دائیں طرف چار صفر کا اضافہ کریں گے۔

چنانچہ $2.76 \times 10^6 = 2760000$ مطلوبہ عام ترمیم ہے۔

حل:

(ii) ----- میں 10 کا قوت نما منفی چار (-4) ہے اس لیے ہم نقطہ اعشاریہ کو دائیں بائیں جانب چار درجے حرکت دیں گے۔ لیکن

یہاں صرف ایک ہندسہ نقطہ اعشاریہ سے پہلے ہے۔ لہذا ہم ہندسہ 5 سے پہلے تین صفر کا اضافہ کریں گے۔

چنانچہ $5.24 \times 10^{-4} = 0.000524$ مطلوبہ عام ترمیم عدد ہے۔

مشق 2.1

1- درج ذیل اعداد کو سائنسی ترمیم میں لکھیے۔

(i) 9700	(ii) 4,980,000	(iii) 96,000,000
(iv) 4169	(v) 84,000	(vi) 0.718
(vii) 0.00643	(viii) 0.0074	(ix) 0.21005

2- درج ذیل اعداد کو عام ترمیم میں لکھیے۔

(i) 7×10^4	(ii) 8.072×10^{-10}	(iii) 6.018×10^6
(iv) 7.865×10^8	(v) 2.05×10^{-4}	(vi) 7.25×10^{10}
(vii) 4.502×10^6	(viii) 2.865×10^{-8}	(ix) 3.056×10^6

2.2 لو گر تھمنز (Logarithms)

ضرب اور تقسیم کے پیچیدہ ریاضیاتی عملیات کو باآسانی حل کرنے کے لیے ایک موزوں طریقہ اخذ کیا گیا ہے جسے لو گر تھم کہتے ہیں۔

2.2 ایک حقیقی عدد اساس 'a' کے لو گر تھم کی تعریف۔

(جبکہ $a \neq 1$ اور $a > 0$, $y > 0$) $a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x$

اگر $a^x = y$ ہو تو x کا اساس 'a' پر y کا لو گر تھم کہلاتا ہے اور اسے $a \neq 1$ اور $a > 0$, $y > 0$ $\log_a y = x$ لکھتے ہیں۔

$$a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x$$

پس $a^x = y$ کو قوت نمائی شکل اور $\log_a y = x$ کو لو گر تھمی شکل کہتے ہیں۔

مندرجہ ذیل امثال کی مدد سے قوت نمائی شکل اور لو گر تھمی شکل کو باآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

مثال 01: $2^{-4} = \frac{1}{16}$ کو لو گر تھمی شکل میں لکھیں۔

حل: $2^{-4} = \frac{1}{16}$ مترادف ہے $\log_2 \frac{1}{16} = -4$ کے۔

مثال 02: $\log_3 81 = 4$ کو قوت نمائی شکل میں لکھیں۔

حل: $3^4 = 81$ مترادف ہے $\log_3 81 = 4$ کے

مثال 03: $\log_4 2$ کی قیمت معلوم کریں۔

حل: اگر $x = \log_4 2$

تو قوت نمائی شکل میں لکھنے سے۔

$$\begin{aligned} \therefore 4^x &= 2 \\ \Rightarrow (2^2)^x &= 2^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x &= 1 \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

مثال 04: اگر $\log_x 8 = \frac{3}{2}$ ہو تو 'x' کی قیمت معلوم کریں۔

حل: چونکہ $\log_x 8 = \frac{3}{2}$

لہذا

یا مساوات کے دونوں طرفیں قوت نما $\frac{2}{3}$ لینے سے

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x)^{\frac{3}{2}} &= 8 \\ \Rightarrow (x)^{\frac{3}{2}} &= 2^3 \\ \Rightarrow (x^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}} &= (2^3)^{\frac{2}{3}} \\ \Rightarrow x &= 2^2 \\ \Rightarrow x &= 4 \end{aligned}$$

مثال 05: اگر $\log_{64} x = \frac{-2}{3}$ ہو تو x کی قیمت معلوم کریں۔

حل: چونکہ

$$\begin{aligned} (64)^{\frac{-2}{3}} &= x \quad \Rightarrow (4^3)^{\frac{-2}{3}} = x \\ 4^{-2} &= x \quad \Rightarrow \frac{1}{4^2} = x \\ \frac{1}{16} &= x \quad \Rightarrow x = \frac{1}{16} \end{aligned}$$

مشق 2.2

1. درجہ ذیل کو لوگر تھی شکل میں لکھیے۔

(i) $7^3 = 343$

(ii) $3^{-4} = \frac{1}{81}$

(iii) $10^{-3} = 0.001$

(iv) $\sqrt[3]{8} = 2$

2. درج ذیل کو قوت نمائی شکل میں لکھیے۔

(i) $\log_{27} 81 = \frac{4}{3}$

(ii) $\log_2 \frac{1}{8} = -3$

(iii) $\log_{10} 1 = 0$

(iv) $\log_{10}(0.01) = -2$

3. نامعلوم عدد کی قیمت معلوم کیجئے۔

(i) $\log_{32} x = \frac{1}{2}$

(ii) $\log_a 3 = \frac{1}{2}$

(iii) $\log_{\sqrt{5}} 25 = y$

(iv) $\log_4 x = \frac{3}{2}$

(v) $\log_{10} 100 = y$

(vi) $\log_a 64 = 3$

(vii) $\log_a 1 = 0$

(viii) $\log_{55} 55 = y$

(ix) $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$

2.2.2 عام لوگر تھم، خاصہ اور مینٹسا

عام لوگر تھم :- عام لوگر تھم کی اساس '10' لی جاتی ہے۔ ایسے لوگر تھم کو عام لوگر تھم یا برگز لوگر تھم بھی کہا جاتا ہے۔

عام لوگر تھم کو ایسے لکھا جاتا ہے۔

$$\log y = x \Leftrightarrow y = 10^x$$

کسی عدد کے لوگر تھم کا خاصہ اور مینٹسا:-

کسی عدد کا لوگر تھم دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک صحیح عددی حصہ دوسرا کسری حصہ / عشری حصہ کسی عدد کے لوگر تھم کے صحیح عددی حصے کو لوگر تھم کا خاصہ (characteristic) کہتے ہیں اور ایک عشری حصہ جو ہمیشہ مثبت ہوتا ہے اس عشری حصے کو مینٹسا (Mantissa) کہتے ہیں۔

نوٹ: کسی عدد کے لوگر تھم کا خاصہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے لیکن مینٹسا ہمیشہ مثبت ہی ہوتا ہے۔ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہم لوگر تھی جدول کا استعمال کرتے ہیں۔

سائنسی ترمیم میں اگر عدد کا قوت نمائے 10 ہو تو وہ اس عدد کے لوگر تھم کا خاصہ کہلاتا ہے اور مینٹسا کی قیمت ہم لوگر تھی جدول سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ جسے بعد ازاں بیان کیا جائے گا۔

مثال 01: درج ذیل اعداد کا خاصہ معلوم کیجئے۔

0.765, 0.04, 0.004567, 2.134, 23.56 اور 3456.

نمبر شمار	عدد	سائنسی ترمیم	لوگر تھم کا خاصہ
1	0.765	7.65×10^{-1}	-1 or $\bar{1}$
2	0.04	4.0×10^{-2}	-2 or $\bar{2}$
3	0.004567	4.5467×10^{-3}	-3 or $\bar{3}$
4	2.134	2.134×10^0	0
5	23.56	2.356×10^1	1
6	3456	3.456×10^3	3

کیا آپ جانتے ہیں؟

کسی عدد کے لوگو تھم کا منفی خاصہ $\bar{2}, \bar{3}$ لکھنے کے بجائے 2, -3 بالترتیب لکھا جاسکتا ہے جب منٹیا منفی ہوتا ہے تو ہم اس کو لازمی مثبت عدد میں تبدیل کر لیتے ہیں کیونکہ منٹیا ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔

- ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ: خاصہ کسی عدد کے لوگر تھم کا خاصہ جو '1' سے بڑا ہو ہمیشہ غیر منفی ہوتا ہے۔
- کسی عدد کے لوگر تھم کا خاصہ جو '1' سے چھوٹا ہو ہمیشہ منفی ہوتا ہے۔

منٹیا:

لوگر تھمی جدول کی بدولت ہم کسی عدد کے لوگر تھم کا منٹیا معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ جدول 7 ہندسی اعداد کا لوگر تھم حاصل کرنے کے لیے تشکیل دیئے گئے ہیں۔ لیکن جدید دور میں عملی مقاصد حاصل کرنے کے لیے 4 ہندسی اعداد کا لوگر تھم معلوم کرنے کے لیے جدول دیئے گئے ہیں جو کہ صحیح اور درست حاصل کے لیے مفید ہیں۔

2.2.3 کسی عدد کا لوگر تھم معلوم کرنے کے لیے جدول کا استعمال درج ذیل مشقوں کی مدد سے جدول ہم کسی بھی عدد کا لوگر تھم معلوم کرنے کا طریقہ سکھیں گے۔

مثال 01: درج ذیل لوگر تھمی اعداد کا منٹیا معلوم کیجئے۔

(i) $\log (43.254)$ (ii) $\log (0.002347)$.

حل: (i) نقطہ اعشاریہ کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے 43.254 کو رائنڈ آف کرنے سے چار اہم ہندسوں والا عدد 4325 بنائیں گے۔






(ii) اب لو گر تھی جدول میں 43 کے سامنے کی قطار تلاش کریں گے۔

(iii) افقی طور پر تیسرے ہندسے یعنی '2' پر جائیں۔ 43^{rd} قطار اور 2^{nd} کالم کے تقاطع پر دیئے گئے عدد 6355 کو نوٹ کریں گے۔

(iv) دوبارہ افقی طور پر اسی قطار میں فرق والے کالم 5 کے نیچے دونوں کے تقاطع پر عدد '5' درج ہے۔


(v) 5 کو 6355 میں جمع کر کے حاصل کردہ نمبر 0.6360 مطلوبہ منٹیا ہو گا۔





Logarithm Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0041	0082	0123	0164	0205	0246	0287	0328	0369	4	5	6	7	8	9	0	1	2
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0683	0721	0758	4	5	6	7	8	9	0	1	2
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1073	1107	3	4	5	6	7	8	9	0	1
13	1139	1171	1206	1239	1271	1303	1336	1367	1399	1430	3	4	5	6	7	8	9	0	1
14	1461	1492	1523	1553	1583	1613	1643	1672	1701	1730	3	4	5	6	7	8	9	0	1
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3	4	5	6	7	8	9	0	1
16	2041	2068	2095	2121	2148	2174	2201	2227	2253	2279	3	4	5	6	7	8	9	0	1
17	2304	2328	2353	2378	2402	2426	2450	2474	2498	2521	2	3	4	5	6	7	8	9	0
18	2553	2577	2601	2625	2648	2671	2694	2717	2739	2761	2	3	4	5	6	7	8	9	0
19	2783	2805	2827	2849	2870	2891	2912	2933	2953	2974	2	3	4	5	6	7	8	9	0
20	3000	3021	3041	3061	3081	3101	3121	3141	3161	3181	2	3	4	5	6	7	8	9	0
21	3201	3221	3241	3261	3281	3301	3321	3341	3361	3381	2	3	4	5	6	7	8	9	0
22	3401	3421	3441	3461	3481	3501	3521	3541	3561	3581	2	3	4	5	6	7	8	9	0
23	3601	3621	3641	3661	3681	3701	3721	3741	3761	3781	2	3	4	5	6	7	8	9	0
24	3801	3821	3841	3861	3881	3901	3921	3941	3961	3981	2	3	4	5	6	7	8	9	0
25	4001	4021	4041	4061	4081	4101	4121	4141	4161	4181	2	3	4	5	6	7	8	9	0
26	4201	4221	4241	4261	4281	4301	4321	4341	4361	4381	2	3	4	5	6	7	8	9	0
27	4401	4421	4441	4461	4481	4501	4521	4541	4561	4581	2	3	4	5	6	7	8	9	0
28	4601	4621	4641	4661	4681	4701	4721	4741	4761	4781	2	3	4	5	6	7	8	9	0
29	4801	4821	4841	4861	4881	4901	4921	4941	4961	4981	2	3	4	5	6	7	8	9	0
30	5001	5021	5041	5061	5081	5101	5121	5141	5161	5181	2	3	4	5	6	7	8	9	0
31	5201	5221	5241	5261	5281	5301	5321	5341	5361	5381	2	3	4	5	6	7	8	9	0
32	5401	5421	5441	5461	5481	5501	5521	5541	5561	5581	2	3	4	5	6	7	8	9	0
33	5601	5621	5641	5661	5681	5701	5721	5741	5761	5781	2	3	4	5	6	7	8	9	0
34	5801	5821	5841	5861	5881	5901	5921	5941	5961	5981	2	3	4	5	6	7	8	9	0
35	6001	6021	6041	6061	6081	6101	6121	6141	6161	6181	2	3	4	5	6	7	8	9	0
36	6201	6221	6241	6261	6281	6301	6321	6341	6361	6381	2	3	4	5	6	7	8	9	0
37	6401	6421	6441	6461	6481	6501	6521	6541	6561	6581	2	3	4	5	6	7	8	9	0
38	6601	6621	6641	6661	6681	6701	6721	6741	6761	6781	2	3	4	5	6	7	8	9	0
39	6801	6821	6841	6861	6881	6901	6921	6941	6961	6981	2	3	4	5	6	7	8	9	0
40	7001	7021	7041	7061	7081	7101	7121	7141	7161	7181	2	3	4	5	6	7	8	9	0
41	7201	7221	7241	7261	7281	7301	7321	7341	7361	7381	2	3	4	5	6	7	8	9	0
42	7401	7421	7441	7461	7481	7501	7521	7541	7561	7581	2	3	4	5	6	7	8	9	0
43	7601	7621	7641	7661	7681	7701	7721	7741	7761	7781	2	3	4	5	6	7	8	9	0
44	7801	7821	7841	7861	7881	7901	7921	7941	7961	7981	2	3	4	5	6	7	8	9	0
45	8001	8021	8041	8061	8081	8101	8121	8141	8161	8181	2	3	4	5	6	7	8	9	0
46	8201	8221	8241	8261	8281	8301	8321	8341	8361	8381	2	3	4	5	6	7	8	9	0
47	8401	8421	8441	8461	8481	8501	8521	8541	8561	8581	2	3	4	5	6	7	8	9	0
48	8601	8621	8641	8661	8681	8701	8721	8741	8761	8781	2	3	4	5	6	7	8	9	0
49	8801	8821	8841	8861	8881	8901	8921	8941	8961	8981	2	3	4	5	6	7	8	9	0
50	9001	9021	9041	9061	9081	9101	9121	9141	9161	9181	2	3	4	5	6	7	8	9	0
51	9201	9221	9241	9261	9281	9301	9321	9341	9361	9381	2	3	4	5	6	7	8	9	0
52	9401	9421	9441	9461	9481	9501	9521	9541	9561	9581	2	3	4	5	6	7	8	9	0
53	9601	9621	9641	9661	9681	9701	9721	9741	9761	9781	2	3	4	5	6	7	8	9	0



Logarithm Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mean Differences									
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
58	7635	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
63	7994	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
66	8195	8202	8209	8215	8222	8229	8235	8241	8248	8254	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
69	8389	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8438	8445	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
76	8809	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8898	8904	8910	8915	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
78	8921	8927	8932	8938	8943	8948	8954	8960	8965	8971	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
88	9445	9450	9455	9460	9465	9470	9475	9480	9485	9490	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
94	9731	9736	9740	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9895	9899	9903	9908	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

(ii) حل:

 $\log(0.002347)$ کے لیے۔

حل: نقطہ اعشاریہ اور ہندسہ 2 سے پہلے موجود صفر کو وقتی طور پر نظر انداز کریں اور 23 قطار اور 4 کالم کے تقاطع پر موجود 3692 نمبر کو نوٹ کریں۔ 23 کے سامنے فرق والے کالم 7 کے تقاطع پر 13 درج ہے۔ 3692 اور 13 کو جمع کر کے حاصل کردہ نمبر 3705 ہے۔

لہذا $\log(0.002347)$ کا منشیہ 0.3705 ہوگا۔

مثال 03: درج ذیل اعداد کا لوگر تھم معلوم کریں۔

حل: فرض کیا

(i) 278.27 (ii) 0.07058

$$x = 278.27$$

دونوں طرف $\log$ لگانے سے

$$\therefore \log x = \log(278.27),$$

مساوات کے دونوں طرف لوگر تھم لینے سے۔

(i) 278.27 کو رائنڈ آف کرنے سے چار اہم ہندسوں والا عدد 278.2 ہے۔

$$(ii) 278.3 = 2.783 \times 10^2 \text{ (سائنسی ترمیم میں لکھنے سے)}$$

لہذا خاصہ 2

(iii) منشیہ معلوم کرنے کے لیے وقتی طور پر نقطہ اعشاریہ کو نظر انداز کیا اور حاصل کردہ نمبر 2783 ہے۔

لوگر تھمی جدول کا استعمال کر کے ہم منشیہ حاصل کرتے ہیں جو کہ ہے۔

$$= 0.8487 \text{ منشیہ}$$

(iv) خاصہ اور منشیہ کو جمع کر کے حاصل کردہ نمبر 2.8487 ہے۔

لہذا 2.4445

حل:

(1) رائنڈ آف کو نظر انداز کرنے سے چار ہندسوں والا عدد 7058۔

$$(2) -2 \text{ or } \bar{2} = \text{دیئے گئے نمبر کو سائنسی ترمیم میں تبدیل کرتے ہیں لہذا } 7058 \times 10^{-2}.$$

(3) اعشاریہ کو نظر انداز کر کے منشیہ معلوم کرتے ہیں جو خاص لوگر تھمی

جدول استعمال کرتے ہوئے کا منشیہ ہے 0.8487 is 7058

$$(4) \text{ خاص اور منشیہ کو جمع کریں۔ حاصل لوگر تھم } x = \log(0.07058) = \bar{2}.8487$$

یاد رکھیے!


اہم ہندسوں کے ایک ہی تسلسل کے اعداد

کے لاگر تھم میں ایک ہی منشیہ ہوتا ہے۔

مثلاً نمبرز 0.004576, 0.04576,

0.4576, 45.76 وغیرہ کا منشیہ یکساں

ہوتا ہے۔



مشق 2.3

1. درج ذیل لو گر تھم کا خاصہ اور منبیا معلوم کیجئے۔

- | | | |
|------------|-------------|----------------|
| (i) 8 | (ii) 5054 | (iii) 9.992 |
| (iv) 765.3 | (v) 0.00329 | (vi) 0.0000300 |

2. درج ذیل اعداد کا لو گر تھم معلوم کیجئے۔

- | | | |
|------------|-------------|---------------|
| (i) 9 | (ii) 55.56 | (iii) 29.592 |
| (iv) 405.3 | (v) 0.00469 | (vi) 0.000076 |

3. اگر $31.09 = 1.4926$ ہو تو لو گر تھمی جدول کا استعمال کیے بغیر درج ذیل اعداد کا لو گر تھم معلوم کیجئے۔

- | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| (i) $\log 3.109$ | (ii) $\log 310.9$ | (iii) $\log 0.003109$ |
| (iv) $\log 3109$ | (v) $\log 310.942$ | (vi) $\log 310926$ |

2.2.4 (Antilogarithms) ضد لو گر تھم کا تصور اور متعلقہ جدول کا استعمال کسی عدد کا ضد لو گر تھم معلوم کرنے کے لیے۔

اگر $\log x = y$ ہو تو x کو y کا ضد لو گر تھم کہا جاتا ہے۔

اسے اس طرح لکھتے ہیں۔ $\text{Antilog}(y) = x$, if $\log x = y$

کسی عدد کا ضد لو گر تھم کو جدول استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل دو اصولوں کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔

اصول 1: اگر خاصہ غیر منفی n ہو تو ضد لو گر تھم میں صحیح عددی حصی میں ہندسوں کی تعداد $n+1$ ہوتی ہے۔

اصول 2: اگر خاصہ منفی n ہو تو ضد لو گر تھم میں نقطہ اعشاریہ کے فوراً بعد صفروں کی تعداد $n-1$ ہوتی ہے۔

ضد لو گر تھم معلوم کرنے کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے کی جاتی ہے۔



Antilogarithm Table

Antilogarithm Table																				
											Mean Differences									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	0000	0	0	1	1	1	1	2	2	2	
01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	0	0	1	1	1	1	2	2	2	
02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	0	0	1	1	1	1	2	2	2	
03	1072	1074	1076	1078	1081	1084	1086	1089	1091	1094	0	0	1	1	1	1	2	2	2	
04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	0	1	1	1	1	1	2	2	2	
05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146	0	1	1	1	1	1	2	2	2	
06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	0	1	1	1	1	1	2	2	2	
07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	0	1	1	1	1	1	2	2	2	



Antilogarithm Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	0	1	1	1	1	2	2	2	3
09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	0	1	1	1	1	2	2	2	3
10	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285	0	1	1	1	1	2	2	2	3
11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	0	1	1	1	2	2	2	2	3
12	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346	0	1	1	1	2	2	2	2	3
13	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377	0	1	1	1	2	2	2	2	3
14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	0	1	1	1	2	2	2	2	3
15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1438	1442	0	1	1	1	2	2	2	2	3
16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476	0	1	1	1	2	2	2	2	3
17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	0	1	1	1	2	2	2	2	3
18	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1545	0	1	1	1	2	2	2	2	3
19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	0	1	1	1	2	2	2	2	3
20	1585	1588	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	0	1	1	1	2	2	2	2	3
21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656	0	1	1	1	2	2	2	2	3
22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694	0	1	1	1	2	2	2	2	3
23	1698	1702	1706	1710	1714	1718	1722	1726	1730	1734	0	1	1	1	2	2	2	2	3
24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774	0	1	1	1	2	2	2	2	3
25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	0	1	1	1	2	2	2	2	3
26	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	0	1	1	1	2	2	2	2	3
27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	0	1	1	1	2	2	2	2	3
28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945	0	1	1	1	2	2	2	2	3
29	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991	0	1	1	1	2	2	2	2	3
30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	0	1	1	1	2	2	2	2	3
31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	0	1	1	1	2	2	2	2	3
32	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	0	1	1	1	2	2	2	2	3
33	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183	0	1	1	1	2	2	2	2	3
34	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234	1	1	1	1	2	2	2	2	3
35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	1	1	1	1	2	2	2	2	3
36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	1	1	1	1	2	2	2	2	3
37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	1	1	1	1	2	2	2	2	3
38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	1	1	1	1	2	2	2	2	3
39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	1	1	1	1	2	2	2	2	3
40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	1	1	1	1	2	2	2	2	3
41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	1	1	1	1	2	2	2	2	3
42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	1	1	1	1	2	2	2	2	3
43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	1	1	1	1	2	2	2	2	3
44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812	1	1	1	1	2	2	2	2	3






Antilogarithm Table


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	1	1	2	3	3	4	5	5	6
46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	1	1	2	3	3	4	5	5	6
47	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013	1	1	2	3	3	4	5	5	6
48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	3	4	4	5	6	6
49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	3	4	4	5	6	6
50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	2	4	4	5	6	7
51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304	1	2	2	3	4	5	5	6	7
52	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381	1	2	2	3	4	5	5	6	7
53	3388	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459	1	2	2	3	4	5	6	6	7
54	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540	1	2	2	3	4	5	6	6	7
55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622	1	2	2	3	4	5	6	7	7
56	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707	1	2	3	3	4	5	6	7	8
57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793	1	2	3	3	4	5	6	7	8
58	3802	3811	3819	3828	3837	3846	3855	3864	3873	3882	1	2	3	4	4	5	6	7	8
59	3890	3899	3908	3917	3926	3936	3945	3954	3963	3972	1	2	3	4	5	5	6	7	8
60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064	1	2	3	4	5	6	6	7	8
61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	4256	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	4365	4374	4385	4395	4406	4416	4426	4436	4446	4457	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	4467	4477	4487	4498	4508	4519	4529	4539	4550	4560	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667	1	2	3	4	5	6	7	9	10
67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4742	4753	4764	4775	1	2	3	4	5	7	8	9	10
68	4786	4797	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887	1	2	3	4	6	7	8	9	10
69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000	1	2	3	5	6	7	8	9	10
70	5012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5105	5117	1	2	4	5	6	7	8	9	11
71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	1	2	4	5	6	7	8	10	11
72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	5333	5346	5358	1	2	4	5	6	7	9	10	11
73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483	1	3	4	5	6	8	9	10	11
74	5495	5508	5521	5534	5546	5559	5572	5585	5598	5610	1	3	4	5	6	8	9	10	12
75	5623	5636	5649	5662	5675	5689	5702	5715	5728	5741	1	3	4	5	7	8	9	10	12
76	5754	5768	5781	5794	5808	5821	5834	5848	5861	5875	1	3	4	5	7	8	9	11	12
77	5888	5902	5916	5929	5943	5957	5970	5984	5998	6012	1	3	4	5	7	8	10	11	12
78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6152	1	3	4	6	7	8	10	11	13
79	6166	6180	6194	6209	6223	6237	6252	6266	6281	6295	1	3	4	6	7	9	10	11	13
80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6415	6427	6442	1	3	4	6	7	9	10	12	13
81	6457	6471	6486	6501	6516	6531	6546	6561	6577	6592	2	3	5	6	8	9	11	12	14





Antilogarithm Table																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	6714	6730	6745	2	3	5	6	8	9	11	12	14
.83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902	2	3	5	6	8	9	11	13	14
.84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063	2	3	5	6	8	10	11	13	15
.85	7079	7095	7112	7129	7145	7161	7178	7196	7211	7228	2	3	5	7	8	10	12	13	15
.86	7244	7261	7278	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396	2	3	5	7	8	10	12	13	15
.87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7516	7534	7551	7568	2	3	5	7	9	10	12	14	16
.88	7585	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745	2	4	5	7	9	11	12	14	16
.89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925	2	4	5	7	9	11	13	14	16
.90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110	2	4	6	7	9	11	13	15	17
.91	8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8299	2	4	6	8	9	11	13	15	17
.92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492	2	4	6	8	10	12	14	15	17
.93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690	2	4	6	8	10	12	14	16	18
.94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892	2	4	6	8	10	12	14	16	18
.95	8913	8933	8954	8974	8995	9016	9036	9057	9078	9099	2	4	6	8	10	12	15	17	19
.96	9120	9141	9162	9183	9204	9226	9247	9268	9290	9311	2	4	6	8	11	13	15	17	19
.97	9333	9354	9376	9397	9419	9441	9462	9484	9506	9528	2	4	7	9	11	13	15	17	20
.98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750	2	4	7	9	11	13	16	18	20
.99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977	2	5	7	9	11	14	16	18	20





مثال 01: وہ اعداد معلوم کیجئے جن کے لوگر تھم کی قیمت درج ذیل ہو۔

- (i) 1.3247 (ii) 2.1324

حل: فرض کریں۔

اب 1.3247 کی قیمت معلوم کرنا ہے۔

(i) یہاں خاصہ = 1 اور منٹیا = 0.3247 ہے۔

(ii) ضد لوگر تھم کے جدول میں 0.32 کے سامنے والی قطار تلاش کریں۔

(iii) افقی طور پر تیسرے ہندسے کو دیکھتے جو کہ 4 ہے 32nd قطار اور 4th کالم کے تقاطع پر موجود نمبر 2109 نوٹ کریں۔

(iv) دوبارہ افقی طور پر اسی قطار اور فرق والے 7th کالم کے نیچے دونوں کے تقاطع پر نمبر 3 لکھا ہوا ہے۔

(v) 2019 اور 3 کو جمع کرنے سے حاصل کردہ نمبر 2112 ہے۔

چونکہ خاصہ '1' ہے اسلئے حاصل کردہ نمبر میں '1' جمع کرنے سے 2112 حاصل ہوا۔ اسلئے 2112 میں نقطہ اعشاریہ بائیں جانب سے دو

ہندسوں کے بعد لگایا جائے گا۔ مطلوبہ ضد لوگر تھم 21.12 ہے۔

$$x = \text{antilog}(\bar{2}.1324), \text{ Here } \text{Log } \bar{x} = \bar{2}.1324$$

(ii) 2.1324 میں

حل: فرض کریں

یہاں خاصہ = $\bar{2}$ اور منٹیا = 0.1324

اب 0.13 کو ضد لوگر تھم کے جدول میں دوسرے کالم میں دیکھئے، اس کے مطابق چار اہم ہندسوں والا حاصل کردہ نمبر 1356 ہے۔

اسی کالم کے فرق والے 4th کالم میں دونوں کے تقاطع پر نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔

پس مطلوبہ نمبر 0.01356 ہے۔

2.2.5 کیلیکولیٹر کے استعمال سے کسی عدد کا لوگر تھم اور ضد لوگر تھم معلوم کرنا۔

مثال 01: کیلیکولیٹر کے استعمال سے (41230) کی قیمت معلوم کیجئے۔

حل: فرض کریں



(i) کیلیکولیٹر پر 'Log' کا بٹن دبائیں۔

(ii) اب نمبر 41230 کا اندراج کریں۔ (ہم اس کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں)

(iii) چھوٹی بریکٹ بند کریں اور برابر کی علامت لگائیں۔

لہذا ہم 4.615213335 کی قیمت کیلیکولیٹر کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔

$$\log(41230) = 4.615213335 \text{ ہے جس کو کہ}$$



مثال 02: کیلیولیٹر کی مدد سے (4.615213335) کی قیمت معلوم کریں۔

- حل:** ہم ضد لوگر تھم کا بٹن استعمال کریں گے۔
 (i) پہلے شفٹ کا بٹن دبائیں۔
 (ii) اب $\log$ کا بٹن دبائیں۔
 (iii) چھوٹی بریکٹ میں (4.615213335) کا اندراج کریں۔
 (iv) اب اینٹر کا بٹن دبائیں۔

حاصل کردہ نمبر 41230.00002 ہے جسے رائونڈ آف کر کے حاصل کردہ نمبر 41230 ہے۔

$$\text{antilog}(4.615213335) = 41230.00002 \text{ پس}$$

2.3 عام لوگر تھم اور قدرتی لوگر تھم میں فرق

عام لوگر تھم کی اساس 10 ہوتی ہے اور اس کے $\log_{10}(x)$ کی بجائے $\log(x)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جبکہ قدرتی لوگر تھم کی اساس e ہوتی ہے (ایک غیر مطلق عدد ہے جس کی قیمت 2.718281 ہے) اسے $\log_e(x)$ کی بجائے $\ln x$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مشق 2.4

1. جدول کے استعمال سے اعداد معلوم کیجئے جن کا عام لوگر تھم درج ذیل ہے۔

- | | | |
|-------------|-------------|---------------|
| (i) 3.56721 | (ii) 1.7427 | (iii) 0.35749 |
| (iv) 5.8196 | (v) 4.3847 | (vi) 0.9187 |

2. کیلیولیٹر کی مدد سے درج ذیل اعداد کا لوگر تھم معلوم کریں۔

- | | | |
|------------|-------------|---------------|
| (i) 900 | (ii) 45.54 | (iii) 36582 |
| (iv) 826.3 | (v) 0.00851 | (vi) 0.000097 |

3. مندرجہ ذیل میں _____ کی قیمت معلوم کریں (بذریعہ کیلیولیٹر)

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| (i) $\log x = 1.7505$ | (ii) $\log x = 0.6609$ | (iii) $\log x = 1.6132$ |
| (iv) $\log x = 3.4800$ | (v) $\log x = 7.0038$ | (vi) $\log x = 0.2665$ |

2.4 لوگر تھم کے قوانین

2.4.1 درج ذیل لوگر تھم کے قوانین ثابت کیجئے۔

- (i) $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$
 (ii) $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$

$$(iii) \log_a m^n = n \log_a m$$

$$(iv) \log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

(i) قانون حقیقی اعداد $a > 0$, m, n, a جبکہ $a \neq 1$, $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$ کے لیے۔

ثبوت:

فرض کیجئے $\log_a m = x$ اور $\log_a n = y$ ہو تو $m = a^x$ اور $n = a^y$

اب $mn = a^x \cdot a^y$

(قانون قوت نما) $mn = a^{x+y}$

قوت نمائی شکل کو لوگر تھی شکل میں تبدیل کرنے سے $\log_a(mn) = x + y =$

پس $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$

نوٹ: دو حقیقی اعداد کے حاصل فرق کا لوگر تھم ان کے لوگر تھم کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔

(ii) قانون حقیقی اعداد $a > 0$, m, n, a جبکہ $a \neq 1$ کے لیے۔

$$\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n$$

ثبوت:

فرض کیجئے $\log_a m = x$ اور $\log_a n = y$ ہو تو $m = a^x$ اور $n = a^y$

(قانون قوت نما) $\frac{m}{n} = \frac{a^x}{a^y}$

$\frac{m}{n} = a^{x-y}$

قوت نمائی شکل کو لوگر تھی شکل میں تبدیل کرنے سے۔


$$\Rightarrow \log_a \frac{m}{n} = x - y$$

$$\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n \quad \text{لہذا}$$

نوٹ: دو حقیقی اعداد کے حاصل تقسیم کا لوگر تھم ان کے لوگر تھم کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔

(iii) قانون حقیقی اعداد $a > 0$, m, n, a جبکہ $a \neq 1$ کے لیے۔

$$\log_a m^n = n \log_a m$$



ثبوت: فرض کیجئے: $\log_a m = x$ Then $m = a^x$

$$m^n = (a^x)^n$$

$$m^n = a^{nx}$$

(قانون قوت نما)

قوت نمائی شکل کو لو گر تھی شکل میں تبدیل کرنے سے

$$\Rightarrow \log_a m^n = nx$$

$$\log_a m^n = n \log_a m \text{ پس}$$

نوٹ: کسی حقیقی عدد n کا قوت نما n ہو کالو گر تھم اس کے لو گر تھم اور قوت نما n کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔

(iv) لو گر تھم میں اساس کی تبدیلی کا اصول
حقیقی اعداد n, a, b جبکہ $a > 0$ اور $a \neq 1$ ہو تو

$$\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

ثبوت: فرض کیجئے: $\log_a n = x$

$$n = a^x$$

دونوں طرف میں لو گر تھم اساس 'ط' پر لینے سے۔

$$\log_b n = \log_b a^x$$

$$\log_b n = x \log_b a$$

$$\therefore \log_b m^n = n \log_b m$$

$$x = \frac{\log_b n}{\log_b a}$$

$$\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a} \text{ پس}$$

مثال 01: $\log_a (2bc)$ کو لو گر تھم کے مجموعے کے طور پر ظاہر کیجئے۔

حل: لو گر تھم کے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے۔

$$\log_a (2bc) = \log_a 2 + \log_a b + \log_a c,$$

پس، یہ مطلوبہ لو گر تھم کا مجموعہ ہے۔

مثال 02: $\log(52.5 \times 63 \times 4.567)$ کو لو گر تھم کے مجموعے کے طور پر ظاہر کیجئے۔

$$\log(52.5 \times 63 \times 4.567) = \log 52.5 + \log 63 + \log 4.567$$

حل: لو گر تھم کے قوانین کے مطابق

پس، یہ مطلوبہ لو گر تھم کا مجموعہ ہے۔



نوٹ:

- (i) $\log_a(mn) \neq \log_a m \times \log_a n$
(ii) $\log_a m + \log_a n \neq \log_a (m + n)$

مثال 03: $\log\left(\frac{213.1}{34.22}\right)$ کو لوگر تھم کے فرق کے طور پر ظاہر کریں۔

حل: لوگر تھم کے فرق کے قانون کے مطابق۔

$$\log\left(\frac{213.1}{34.22}\right) = \log 213.1 - \log 34.22.$$

پس، یہ لوگر تھم کے فرق کے مطابق لکھا گیا ہے۔

مثال 04: $\log\left(\frac{213.1}{34.22}\right)$ کو لوگر تھم کے حاصل ضرب کی شکل میں لکھیں۔

حل: ہم جانتے ہیں کہ $\log_a m^n = n \log_a m$

$$\therefore \log_a 2^x = x \log_a 2.$$

مشق 2.5

1. درج ذیل لوگر تھم کو $\log_a x$ ، $\log_a y$ اور $\log_a z$ کی اصطلاحات میں لکھیے

(i) $\log_a \frac{x^3 y}{z^2}$

(ii) $\log_a \sqrt{xy^2 z}$

(iii) $\log_a \left(\sqrt[3]{x^{-1} \sqrt{y^3}} \div \sqrt{y^3 \sqrt{x}} \right)$

(iv) $\log_a \frac{x \sqrt{y^3}}{\sqrt[3]{z^2 x^5}}$



2. واحد لوگر تھم کی شکل میں ظاہر کیجئے۔

$$(i) \log_a 20 - \log 15 + \frac{1}{2} \log \frac{9}{2}$$

$$(ii) \frac{1}{3} \log_a (x-1)^3 + \frac{10}{9} \log_a (x+1) - \frac{1}{9} \log_a (x+1)$$

$$(iii) \log x - 2 \log x + 3 \log (x+1) - \log (x^2 - 1).$$

3. اگر $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ اور $\log 5 = 0.6990$ قیمت معلوم کیجئے۔

$$(i) \log 15 \quad (ii) \log 64 \quad (iii) \log \sqrt{5 \times 2} \quad (iv) \log 48$$

$$(v) \log \sqrt{18} \quad (vi) \log 30 \quad (vii) \log \frac{8}{3} \quad (viii) \log \frac{5}{\sqrt{3}}$$

4. ثابت کیجئے:

$$(i) \log_b m \times \log_m a = \log_b a \quad (ii) \log_a b \times \log_c a = \log_c b$$

$$(iii) \log_b a \cdot \log_c b \cdot \frac{1}{\log_c a} = 1 \quad (iv) \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

5. تصدیق کیجئے۔

$$(i) \log_5 7 \times \log_7 25 = 2 \quad (ii) \log_3 2 \times \log_2 81 = 4$$

$$(iii) \log_5 343 \times \log_7 25 = 6 \quad (iv) \log_6 16 \times \log_2 216 = 12$$

2.5 لوگر تھم کے قوانین کا اطلاق

2.5.1 لوگر تھم کا اطلاق ضرب، تقسیم اور قوت نمائی سوالات کے طویل عمل کو جمع اور تفریق کے آسان ترین طریقہ کار میں تبدیل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔


درج ذیل امثال کی مدد سے لوگر تھم کے قوانین کا اطلاق باآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

مثال 01: لوگر تھم کی مدد سے $(28.74)(8.573)$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

حل: فرض کیجئے۔ $x = (28.74)(8.573)$

دونوں طرف میں لوگر تھم لینے سے۔





$$\therefore \log x = \log(8.573 \cdot 28.74)$$

$$\Rightarrow \log x = \log(8.573) + \log(28.74)$$

$$\Rightarrow \log x = 0.9332 + 1.4585$$

$$\Rightarrow \log x = 2.3917$$

$$\therefore x = \text{antilog}(2.3917)$$

$$x = 246.4 \text{، پس}$$

مثال 02: لوگر تھم کی مدد سے $\frac{213.1}{34.22}$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

$$x = \frac{213.1}{34.22}$$

حل: فرض کیجئے کہ
دونوں طرفین میں لوگر تھم لینے سے

$$\log x = \log \left(\frac{213.1}{34.22} \right)$$

$$\Rightarrow \log x = \log \left(\frac{213.1}{34.22} \right)$$

$$\Rightarrow \log x = \log 213.1 - \log 34.22, \left(\log \left(\frac{a}{b} \right) = \log a - \log b \right)$$

بحوالہ لوگر تھمی جدول ہمیں معلوم ہے کہ

$$\log x = 2.3286 - 1.5343 = 0.7943$$

$$\Rightarrow \log x = 0.7943,$$

ضد لوگر تھم لینے سے

$$x = \text{antilog}(0.7943), \text{ ضد لوگر تھم کی جدول کو دیکھنے سے}$$

$$x = 6.227, \quad (\because \text{خاصہ } 0 = \text{مینیٹیا } 0.7943)$$

بحوالہ ضد لوگر تھم کے جدول سے ہم جانتے ہیں کہ

$$\text{پس، } \frac{213.1}{34.22} \text{ کی مطلوبہ قیمت } 6.227 \text{ ہے۔}$$



مثال 03: لوگر تھم کے قانون کے مطابق $\sqrt{\frac{3.41 \times 37.92}{2.34}}$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

$$x = \sqrt{\frac{3.41 \times 37.92}{2.34}}$$

حل: فرض کیجئے کہ
دونوں طرف میں لوگر تھم لینے سے

$$\begin{aligned} \log x &= \log \left(\frac{3.41 \times 37.92}{2.34} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \log \left(\frac{3.41 \times 37.92}{2.34} \right) \\ &= \frac{1}{2} (\log 3.41 + \log 37.92 - \log 2.34) \\ &= \frac{1}{2} (0.5325 + 1.5788 - 0.3692) \\ &= \frac{1}{2} (1.7424) \\ &= 0.8712 \\ x &= \text{antilog } (0.8712) \\ &= 7433 \\ &= 7.433 \end{aligned}$$

مثال 04: 4^5 میں ہندسوں کی تعداد معلوم کیجئے۔

حل: فرض کیجئے۔ Let $n=4^5$
مساوات کے دونوں طرف میں لوگر تھم لینے سے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} \therefore \log n &= \log 4^5 & (\because \log a^n = n \log a) \\ \Rightarrow \log n &= 5 \log 4 \\ \Rightarrow \log n &= 5 \times 0.6021 & (\text{since } \log 4 = 0.6021) \\ \Rightarrow \log n &= 3.0105 \end{aligned}$$

ہندسوں کی تعداد = خاصہ + 1

پس، میں ہندسوں کی تعداد $4^5 = 3+1=4$



مشق 2.6

1. لوگر تھم کی مدد سے درج ذیل کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

(i) 57.86×4.385

(ii) $25.753 \times 0.5341 \times 490.8$

(iii) $\frac{25.753}{0.5341}$

(iv) $\frac{(790.6 \times 30.32)}{25.753}$

(v) $\frac{99.87}{(8.369) \times (0.785)}$

(vi) $\sqrt[5]{2.709} \times \sqrt[7]{1.239}$

(vii) $\frac{(26.62)^{\frac{1}{2}} \times (87.19)^3}{\sqrt{69.53}}$

(viii) $\frac{(4308)^3 \times \sqrt{80.06}}{(0.3387)^3}$

2. درج ذیل میں ہندسوں کی تعداد معلوم کیجئے۔

(i) 4^{12}

(ii) 7^{25}

(iii) 3^{30}

(iv) 5^{20}

(v) 9^{30}

لوگر تھم کی مدد سے ذیل کی قیمتیں معلوم کیجئے۔



Review Exercise 2

1. دیئے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور درست جواب کے انتخاب کے لیے درست پر دائرہ لگائیں اور غلط جملے کے انتخاب کرنے پر غلط دائرہ لگائیں۔

(i) 0.025 کو سائنسی ترمیم میں 2.5×10^3 لکھا جاسکتا ہے۔ درست / غلط

(ii) لوگر تھم کی ایجاد الیرونی کی۔۔۔ درست / غلط

(iii) اسی عدد کے لوگر تھم کا صحیح عددی حصہ کہلاتا ہے۔۔۔ درست / غلط۔

(iv) کسی عدد کے لوگر تھم کا منبیا ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔۔۔ درست / غلط۔

(v) $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$ درست / غلط۔

2. خالی جگہ پُر کریں۔

(i) اساس 10 پر لوگر تھم _____ کہلاتا ہے۔

(ii) $\log 1 = \text{_____}$

(iii) لوگر تھم کا کسری حصہ _____ کہلاتا ہے۔

(iv) $\log 512 = \text{_____}$

(v) $\log_a m \times \log_m n = \text{_____}$

(vi) $x = \log_a y$ کی قوت نمائی شکل _____ ہوتی ہے۔

(vii) $a^{10} = y$ کی لوگر تھمی شکل _____ ہوتی ہے۔

(viii) $\log_a a \times \log_a b = \text{_____}$

(ix) $\log_a \left(\frac{m}{n} \right) = \text{_____}$

(x) $\log(10 \times 10) = \text{_____}$



3. درست جواب پر () کا نشان لگائیں۔

(i) اگر $\log_{10} x = 4$ ہو تو $x =$ _____

- (a) 500 (b) 100 (c) 1000 (d) 10000

(ii) $\log 54.58$ کا خاصہ _____ ہے۔

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4

(iii) عام لو گر تھم کی اساس _____ ہے۔

- (a) 5 (b) 10 (c) e (d) 100

(iv) $\log xyz =$ _____

- (a) $\log x \log y \log z$ (b) $\log x + \log y + \log z$
(c) $\log(xy)^z$ (d) $\log x - \log y - \log z$

(v) 0.00789 کی سائنسی ترقیم _____ ہے۔

- (a) 7.89×10^{-3} (b) 7.89×10^3
(c) 0.789×10^{-2} (d) 78.9×10^{-4}

(vi) اگر $x = 2$ ہو تو $x =$ _____

- (a) 200 (b) 1000 (c) 100 (d) $\frac{2}{10}$

(vii) اگر $\log_2 8 = x$ تو $x =$ _____

- (a) 64 (b) 3^2 (c) 3 (d) 2^8

(viii) قدرتی لو گر تھم کی اساس _____ ہوتی ہے۔

- (a) 10 (b) e (c) π (d) 5

(ix) $3^5 = 243$ کو لو گر تھمی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔

- (a) $\log_3 5 = 243$ (b) $\log_3 243 = 5$
(c) $\log_5 243 = 12$ (d) $\log_5 3 = 243$





خلاصہ

- ◆ اگر $a^x = y$, جبکہ x اور y ہو تو 'a' کو اساس $\log_a y = x$ پر $a > 0, y > 0$ کا لوگر تھم کہتے ہیں اور اسے $a \neq 1$ لکھتے ہیں۔
- ◆ $\log x = y \Leftrightarrow 10^y = x$
- ◆ $\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x$
- ◆ اگر لوگر تھم کی اساس 10 ہو تو اسے عام لوگر تھم یا برگرز لوگر تھم کہتے ہیں۔ اسے $\log x$ کی بجائے $\log_{10} x$ لکھا جاتا ہے۔
- ◆ قدرتی لوگر تھم کی اساس e ہوتی ہے (ایک غیر ناطق عدد) جس کی قیمت 2.7182818 ہے اور اسے $\log_e x$ کی بجائے $\ln x$ لکھا جاتا ہے۔
- ◆ کسی بھی لوگر تھم کا صحیح عددی حصہ خاصہ اور کسری حصہ منٹیا کہلاتا ہے۔
- ◆ کسی عدد کے لوگر تھم کا خاصہ جو 'a' سے بڑا ہو ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔
- ◆ کسی عدد کے لوگر تھم کا خاصہ جو 'a' سے چھوٹا ہو ہمیشہ منفی ہوتا ہے۔
- ◆ لوگر تھم کا منفی خاصہ جیسا کہ $\bar{1}$ کو $\bar{3}, \bar{2}$ کو -3 اور -1 کو 2 لکھا جاسکتا ہے۔
- ◆ ایک ہی تسلسل والے اہم ہندسوں پر مشتمل اعداد کے لوگر تھم کا منٹیا ایک ہی (کیساں ہوتا ہے)۔
- ◆ وہ عدد جس کے لوگر تھم کی قیمت معلوم ہو ضد لوگر تھم کہلاتا ہے۔
- ◆ لوگر تھم کے قوانین۔

- (i) $\log_a (mn) = \log_a m + \log_a n$
- (ii) $\log_a \left(\frac{m}{n} \right) = \log_a m - \log_a n$
- (iii) $\log_a m^n = n \log_a m$
- (iv) $\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$

قانون کو ایسے بھی لکھا جاسکتا ہے۔ $\log_b a \cdot \log_a n = \log_b n$ ۔



الجبری اظہاریے اور الجبری کلیے

3

یونٹ

ALGEBRAIC EXPRESSION AND FORMULAS

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- ان کو معلوم ہو کہ کوئی ناطق اظہاریہ طرز عمل کے لحاظ سے ناطق عدد کی طرح ہوتا ہے۔
- ناطق اظہاریے کی تعریف کر سکیں بطور دو کثیر رقمی $\frac{p(x)}{q(x)}$ حصہ $p(x)$ جہاں $q(x)$ صفر کثیر رقمی zero polyomial نہیں ہے۔
- مشاہدہ (پڑتال) کر سکیں کہ کوئی دیا گیا الجبری اظہاریہ -
- کثیر رقمی ہے یا نہیں۔
- ناطق اظہاریہ ہے یا نہیں۔
- ناطق اظہاریہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ کو مختصر ترین شکل میں تحویل کر سکیں جبکہ $p(x)$ اور $q(x)$ کے تمام ارکان کے عددی تر صحیح اعداد ہوں اور ان میں کوئی جزو ضربی مشترک نہ ہو۔
- پڑتال کر سکیں کہ کوئی دیا گیا ناطق الجبری اظہاریہ مختصر ترین شکل میں ہے یا نہیں۔
- دیے گئے ناطق اظہاریہ کو اس کی مختصر ترین شکل میں تبدیل کر سکیں۔
- ناطق اظہاریے کا مجموعہ، فرق اور حاصل ضرب معلوم کر سکیں۔
- ایک ناطق اظہاریے کو دوسرے ناطق اظہاریے سے تقسیم کر کے جواب کو مختصر ترین شکل میں لکھ سکیں۔
- کچھ خاص حقیقی اعداد پر الجبری اظہاریے کی قیمت حاصل کر سکیں۔
- درج ذیل کلیات سے واقف ہوں
- $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$ اور $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$

- 'a² + b²' اور 'ab' کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ 'a + b' اور 'a - b' کی قیمتیں دی گئی ہوں۔
- کلیہ (a + b + c)² = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca کی پہچان کر سکیں۔
- a² + b² + c² کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ a + b + c اور ab + bc + ca کی قیمتیں دی گئی ہوں۔
- a + b + c کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ a² + b² + c² اور ab + bc + ca کی قیمتیں دی گئی ہوں۔
- ab + bc + ca کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ a² + b² + c² اور a + b + c کی قیمتیں دی گئی ہوں۔
- کلیات کی پہچان کر سکیں۔

$$(a + b)^3 = a^3 + 3ab(a + b) + b^3,$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3ab(a - b) - b^3.$$

- a³ ± b³ کی معلوم کر سکیں جبکہ 'a ± b' اور 'ab' کی قیمت دی گئی ہوں۔
- x³ ± $\frac{1}{x^3}$ کی قیمت معلوم کر سکیں جبکہ x ± $\frac{1}{x}$ کی قیمت دی گئی ہو۔
- کلیہ a³ ± b³ = (a ± b)(a² ∓ ab + b²) کی پہچان کر سکیں۔
- x + $\frac{1}{x}$ اور x² + $\frac{1}{x^2}$ - 1 کا حاصل ضرب معلوم کر سکیں۔
- x - $\frac{1}{x}$ اور x² + $\frac{1}{x^2}$ + 1 کا حاصل ضرب معلوم کر سکیں۔
- (x² - xy + y²)(x² + xy + y²)(x - y)(x + y) کا متواتر (مسل) حاصل ضرب معلوم کر سکیں۔
- مقادیر اصم اور اس کے استعمال کی پہچان کر سکیں۔
- دوسرے درجے کی مقادیر اصم کی وضاحت کر سکیں۔
- دوسرے درجے کی مقادیر اصم پر بنیادی عوامل کا استعمال کر کے مخرج (نسب نما) کوناطق بنا کر ہم قیمت کسر میں تحویل کر سکیں۔
- حقیقی اعداد $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$ اور ان کے اتصال سے حاصل کردہ عدد، جبکہ x قدرتی اعداد اور a صحیح اعداد ہوں، کوناطق بنانے کے عمل کی (بالکل ٹھیک مطالعہ کے ساتھ) وضاحت کر سکیں۔



3.1 الجبری اظہاریے:

ہم پہلے ہی پچھلی جماعتوں میں الجبری اظہاریوں کے بارے میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ آئیے اس کی اقسام پر تبادلہ خیال کریں۔
الجبری اظہاریوں کی تین اقسام درج ذیل ہیں۔

(ا) کثیر رقی اظہاریہ یا کثیر رقی (ب) ناطق اظہاریہ (ج) غیر ناطق اظہاریہ

(a) کثیر رقی اظہاریہ یا کثیر رقی:

ایک متغیر x میں ایک کثیر رقی اظہاریہ (محض کثیر رقی) کو اس طرح لکھا جاتا ہے:

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} \dots + a_{n-1}x^1 + a_n$$

جہاں ' n ' ایک غیر منفی عدد اور عددی سر: $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ حقیقی اعداد ہیں۔ عام طور پر، ایک کثیر رقی کو $p(x)$

سے ظاہر کیا جاتا ہے، لہذا مذکورہ بالا کثیر رقی کو اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} \dots + a_{n-1}x^1 + a_n$$

اگر $a_0 \neq 0$ تو کثیر رقی کو ڈگری n کا کثیر رقی کہا جاتا ہے اور a_0 کو کثیر رقی کا معروف عددی صفر کہا جاتا ہے۔ کثیر رقی اور ان کی ڈگریوں کی کچھ مثالیں ذیل میں دی گئی ہیں۔

(i) $8x - 5$, ڈگری 1

(ii) $x^4 - 2x^3 + 5x^2 + 1$, ڈگری 4

(iii) $6x^{31} + 3$, ڈگری 31

(iv) $12x^4 - x^3 + \frac{2}{3}x^2 - 3x + 1$, ڈگری 4

(v) 4, ڈگری 0

(vi) $\sqrt{10}x^{12} + 2x^6 - x^5 - 18x + 1$, ڈگری 12

جملہ $x^3 - x^3y^2 + x^2y^2 - 10$ دو متغیر x اور y کے ساتھ ایک کثیر رقی ہے اور اس کی ڈگری 5 ہے۔

اسی طرح الجبری اظہاریہ $x^3y^5x^2 - x^3y^2z^3 + x^2yz - 34$ تین متغیر x, y, z اور کے ساتھ ایک کثیر رقی ہے

یاد رکھیں:

- ایسی کثیر رقی جس میں ایک رقم ہو، یک رقی (monomial) کہا جاتا ہے۔ $3x, 7xy, 6xy^2z^5$ وغیرہ
- ایسی کثیر رقی جس میں دو رقوم ہوں، دو رقی (binomial) کہا جاتا ہے $x+4, 5x+y, 7x-3$ وغیرہ
- ایسی کثیر رقی جس میں تین رقوم ہوں، تین رقی (trinomial) کہا جاتا ہے۔ مثلاً: x^2-2x+1 وغیرہ



$$\frac{1}{\sqrt{3}}x^2y^2 - 5xy + 3$$

(b) ناطق اظہاریہ:

ایسا اظہاریہ جو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کی شکل میں لکھا جاسکے جبکہ $q(x) \neq 0$ اور $p(x)$ اور $q(x)$ میں کثیر رقمیاں ہوں تو اسے ناطق اظہاریہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر $\frac{x+1}{x}$, $\frac{x^2-x+1}{x-5}$, $\frac{\sqrt{3}x^2-5x+4}{x^2+6x-5}$ وغیرہ ناطق اظہاریوں کی چند مثالیں ہیں۔

نوٹ: ہر کثیر رقمی ناطق اظہاریے ہوتے ہیں لیکن اس کی تبدیلی درست نہیں۔

(c) غیر ناطق اظہاریہ:

ایسا الجبری اظہاریہ جو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کی شکل میں لکھا نہ جاسکتا ہو جبکہ $q(x) \neq 0$ اور $p(x)$ اور $q(x)$ کثیر رقمیاں ہوں تو اسے غیر ناطق اظہاریہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر $\frac{1}{\sqrt{x}}$, $\frac{\sqrt{x}+1}{x}$, $\frac{\sqrt{x^3}+2x+3}{\sqrt{x}-9}$, $\sqrt{x} + \frac{5}{\sqrt{x}}$ کی چند مثالیں ہیں۔

3.1.1 معلوم کریں کہ کوئی ناطق اظہاریہ طرز عمل کے لحاظ سے ناطق عدد کی طرح ہوتا ہے۔

اگر p اور q دو صحیح اعداد ہوں تو ضروری نہیں کہ $\frac{p}{q}$ بھی ایک صحیح عدد ہو۔ اس لیے غیر سسٹم کو آگے بڑھانے کے

لیے $\frac{p}{q}$ کو بطور ناطق عدد متعارف کرایا گیا جبکہ $p, q \in \mathbb{Z}$ اور $q \neq 0$ صحیح اعداد ہیں

اسی طرح اگر $p(x)$ اور $q(x)$ دو کثیر رقمی اظہاریے ہوں تو ضروری نہیں کہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ جبکہ $q(x) \neq 0$ بھی ایک کثیر رقمی ہو اس لیے ناطق اعداد کی طرح ناطق اظہاریوں کے تصور کو اجاگر کیا جاتا ہے۔

3.1.2 ناطق اظہاریوں کی تعریف کریں بطور دو کثیر رقمی $\frac{p(x)}{q(x)}$ اور $p(x)$ حصہ $q(x)$ جہاں $q(x)$ صفر کثیر رقمی نہیں ہے

ایسا الجبری اظہاریہ جو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کی شکل میں لکھا نہ جاسکتا ہو جبکہ $q(x) \neq 0$ اور $p(x)$ اور $q(x)$ کثیر رقمیاں ہوں تو اسے غیر ناطق اظہاریہ کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر $\frac{x^2-5}{3x^2+4}$, $3x^2+4 \neq 0$ ناطق اظہاریے ہیں۔



3.1.3 مشاہدہ (پڑتال) کر سکیں کہ کوئی دیا گیا الجبری اظہاریہ

(i) کثیر رقمی ہے یا نہیں (ii) ناطق اظہاریہ ہے یا نہیں۔
درج ذیل مثالیں کثیر رقمی اور ناطق اظہاریوں کی پہچان کرنے میں مدد دیں گی۔

مثال 01 پڑتال کریں کہ مندرجہ ذیل کثیر رقمی ہیں یا نہیں۔

$$(i) \quad 2x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (ii) \quad 6x^3 - 4x^2 - 5x$$

$$2x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

حل (i):

یہ کثیر رقمی نہیں ہے کیونکہ دوسری رقم میں مثبت اعداد نہیں ہیں۔

$$6x^3 - 4x^2 - 5x, \quad \text{حل (ii):}$$

یہ کثیر رقمی ہے کیونکہ ہر رقم میں مثبت اعداد موجود ہیں۔

مثال 02 جانچ کریں کہ مندرجہ ذیل ناطق اظہاریے ہیں یا نہیں۔

$$(i) \quad \frac{x-2}{3x^2+1} \quad (ii) \quad 6x^3 - \frac{1}{\sqrt{x+4}}$$

$$\frac{x-2}{3x^2+1}$$

حل (i):

ہندسہ (numerator) اور مخرج (denominator) دونوں کثیر رقمی ہیں۔ تو یہ ایک ناطق اظہاریہ ہے۔

$$6x^3 - \frac{1}{\sqrt{x+4}} \quad \text{حل (ii):}$$

یہ ایک ناطق اظہاریہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری رقم کا مخرج (denominator) کثیر رقمی نہیں ہے۔



3.1.4 ناطق اظہاریہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ کو مختصر ترین شکل میں تحریر کر سکیں جبکہ $p(x)$ اور $q(x)$ کے تمام ارکان کے عددی سر صحت اعداد ہوں اور ان میں کوئی جزو ضربی مشترک نہ ہو۔

ناطق اظہاریوں $\frac{p(x)}{q(x)}$ کو اس کی مختصر ترین شکل میں کہا جاتا ہے اگر $p(x)$ اور $q(x)$ کثیر رقمی ہوں اور اس کے عددی سر صحت اعداد ہوں اور ان میں کوئی جزو ضربی مشترک نہ ہو۔

مثال کے طور پر $\frac{x+1}{x-1}$ کی مختصر ترین شکل $\frac{x^2-1}{(x-1)^2}$ ہے۔

3.1.5 جانچ کریں کہ کوئی دیا گیا ناطق الجبری اظہاریہ مختصر ترین شکل میں ہے یا نہیں۔

ناطق اظہاریہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ کی جانچ کے لیے $p(x)$ اور $q(x)$ کے جزو ضربی مشترک نکالیں اگر جزو ضربی مشترک 1 ہے، ناطق اظہاریہ مختصر ترین شکل میں ہے۔

مثال کے طور پر $\frac{x+1}{x-1}$ کی اپنی مختصر ترین شکل میں ہے کیوں کہ $(x+1)$ اور $(x-1)$ کا جزو ضربی مشترک 1 ہے۔

3.1.6 ناطق اظہاریہ کو اس کی مختصر ترین شکل میں تحریر کریں۔

فرض کریں کہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ ایک ناطق اظہاریہ ہے، جہاں $q(x) \neq 0$

قدم 1: جزو ضربی کثیر رقمی $p(x)$ اور $q(x)$ تلاش کریں، اگر مناسب ہو۔

قدم 2: $p(x)$ اور $q(x)$ کے جزو ضربی مشترک تلاش کریں۔

قدم 3: $p(x)$ اور $q(x)$ کے جزو ضربی مشترک ختم کریں۔

مثال 01 درج ذیل ناطق اظہاریہ کو اس کی مختصر ترین شکل میں تحویل کریں۔

$$(i) \frac{(x^2 - x)(x^2 - 5x + 6)}{2x(x^2 - 3x + 2)}$$

$$(ii) \frac{5(x^2 - 4)}{(3x + 6)(x - 3)}$$



$$\begin{aligned}
 & \frac{(x^2 - x)(x^2 - 5x + 6)}{2x(x^2 - 3x + 2)} \\
 &= \frac{x(x-1)}{2x} \cdot \frac{x^2 - 3x - 2x + 6}{x^2 - 2x - x + 2} \quad (\text{Provided } x \neq 0) \\
 &= \left(\frac{x-1}{2} \right) \cdot \frac{\{x(x-3) - 2(x-3)\}}{\{x(x-2) - 1(x-2)\}} \\
 &= \frac{(x-1)(x-3)(x-2)}{2(x-2)(x-1)} \quad \text{Provided } x \neq 1 \text{ and } 2. \\
 &= \frac{(x-3)}{2}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(x-3) \quad \text{جو مطلوبہ مختصر ترین شکل ہے۔}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{5(x^2 - 4)}{(3x+6)(x-3)} \\
 &= \frac{x^2 - 4}{x-3} \cdot \frac{5}{3x+6} \\
 &= \frac{x^2 - 2^2}{x-3} \cdot \frac{5}{3(x+2)} \\
 &= \frac{(x+2)(x-2)}{x-3} \cdot \frac{5}{3(x+2)} \quad (\text{جز و ضربی}) \\
 &= \frac{(x+2)(x-2)}{x-3} \cdot \frac{5}{3(x+2)} \quad x \neq -2 \\
 &= \frac{5(x-2)}{3(x-3)} \quad \text{جو مطلوبہ مختصر ترین شکل ہے۔}
 \end{aligned}$$



3.1.7 ناطق اظہاریوں کا مجموعہ، فرق اور حاصل ضرب معلوم کریں۔

ناطق اظہاریوں کا مجموعہ، فرق اور حاصل ضرب کو درج ذیل مثالوں کی مدد سے واضح کیا گیا ہے۔

مثال 01 $\frac{3}{x+1} + \frac{4x}{x^2-1}$ کو مختصر کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{x+1} + \frac{4x}{x^2-1} \\ &= \frac{3}{x+1} + \frac{4x}{(x-1)(x+1)} \quad (\text{جزو ضربی}) \\ &= \frac{3(x-1) + 4x}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{3x-3+4x}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{7x-3}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{7x-3}{x^2-1} \end{aligned}$$


لہذا مختصر ترین شکل میں حل کیا گیا۔

مثال 02 $\frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{x^3-1}$ کی حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{x^3-1} \\ &= \frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{x^3-1} \\ &= \frac{1}{(x-1)(x+1)} - \frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \frac{(x^2+x+1) - (x+1)}{(x+1)(x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \frac{x^2+x+1-x-1}{(x+1)(x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \frac{x^2}{(x+1)(x^3-1)} \end{aligned}$$

لہذا مختصر ترین شکل میں حل کیا گیا۔





مثال 03 $\frac{x^2}{x^2+x-12} \cdot \frac{x^2-9}{2x^2}$ کو حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} & \frac{x^2}{x^2+x-12} \cdot \frac{x^2-9}{2x^2} \\ &= \frac{x^2}{x^2+4x-3x-12} \cdot \frac{(x-3)(x+3)}{2x^2} \\ &= \frac{1}{x(x+4)-3(x-4)} \cdot \frac{(x-3)(x+3)}{2} \quad (\text{جزو ضربی}) \\ &= \frac{1}{(x+4)(x-3)} \cdot \frac{(x-3)(x+3)}{2} \quad (x \neq 3 \text{ دیا گیا}) \\ &= \frac{(x+3)}{2(x+4)} \\ & \text{لہذا مختصر ترین شکل میں حل کیا گیا۔} \end{aligned}$$

3.1.8 ایک ناطق اظہاریہ کو دوسرے ناطق اظہاریے سے تقسیم کر کے جواب کو مختصر ترین شکل میں لکھیں:

ایک ناطق اظہاریہ کو دوسرے سے تقسیم کرنے کی صورت میں، ہم سب سے پہلے تقسیم کو صرف میں تبدیل کرنے کے لیے لٹے ہیں اور نتیجے میں آنے والے حاصل ضرب کو مختصر ترین شکل میں حل کریں۔

مثال 01 $\frac{3x-9y}{2x+10y} \div \frac{x^2-3xy}{4x+20y}$ کو حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} & \frac{3x-9y}{2x+10y} \div \frac{x^2-3xy}{4x+20y} \\ &= \frac{3x-9y}{2x+10y} \times \frac{4x+20y}{x^2-3xy} \\ &= \frac{3(x-3y)}{2(x+5y)} \times \frac{4(x+5y)}{x(x-3y)} \\ &= \frac{6}{x} \end{aligned}$$



3.1.9 کچھ خاص حقیقی اعداد پر الجبری اظہاریوں کی قیمت حاصل کریں۔

مثال 02 $\frac{x^2 + yz}{x^3 + y^2 - 7yz^4}$ کی رقم تلاش کریں جب $x = 3, y = 2$ and $z = -1$

معلوم: $x = 3, y = 2, z = -1$

$$\begin{aligned} &= \frac{x^2 + yz}{x^3 + y^2 - 7yz^4} \\ &= \frac{(3)^2 + (2)(-1)}{(3)^3 + (2)^2 - 7(2)(-1)^4} \\ &= \frac{9 - 2}{27 + 4 - 14} \\ &= \frac{7}{17} \end{aligned}$$

مشق 3.1

1 جانچ کریں کہ درج ذیل الجبری اظہاریے کثیر رقمی ہے یا نہیں۔

(i) $2xy^2 - 3x^2 + 5y^3 - 6$
(iii) $6x^2 - 10x + 7 - \sqrt{45}$
(v) $\frac{2}{x+2}$

(ii) $3xy^{-2}$
(iv) $5\sqrt{x} - x + 5x^2$
(vi) $\frac{2}{x} + x^3 - 2$

2 مشاہدہ کریں کہ درج ذیل اظہاریے ناطق ہیں یا نہیں۔

(i) $\frac{x^2 + 2x + 3}{x - 4}$


(ii) $\frac{x^2 + 5\sqrt{x} - 2x}{3x^2 + 5x + 4}$

(iii) $\frac{13x^2 - 9x + 4}{x^2 + 5x + \sqrt{7}}$

(iv) $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$

(v) $\frac{7}{x+7}$

(vi) $5\sqrt{x} - x + 5x^2$



3. درج ذیل کوان کی مختصر ترین شکل میں تحریر کریں۔

$$(i) \frac{p^2 - 100}{p + 10}$$

$$(ii) \frac{3a^2 + 3ab}{3a^2 + 6ab + 3b^2}$$

$$(iii) \frac{(a-b)}{(a+b)} \times \frac{(a^2 + ab)}{(2a^2 - 2b^2)}$$

$$(iv) \frac{(x+y)^2 - z^2}{x+y+z}$$

$$(v) \frac{(m^2 - 6m)(3m+15)}{2m-12}$$

$$(vi) \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - x - 2}$$

4. مختصر کریں:

$$(i) \frac{4x-1}{2x-2} + \frac{4x+1}{2x+2}$$

$$(ii) \frac{1}{x+2} + \frac{2}{x+3}$$

$$(iii) \frac{xy}{xy+1} + \frac{xy+1}{xy-1}$$

$$(iv) \frac{x-2}{x+3} - \frac{x+1}{x+6}$$

$$(v) \frac{1}{a+b} - \frac{1}{a-b}$$

$$(vi) \frac{4y}{y^2-1} - \frac{y+1}{y-1}$$

5. اشارہ کیے گئے عوامل انجام دیں اور حل کریں۔

$$(i) \left(\frac{x^2}{4y^2 - x^2} + 1 \right) \div \left(1 - \frac{x}{2y} \right)$$

$$(ii) \frac{x+3}{3y-2x} \cdot \frac{4x^2 - 9y^2}{xy+3y}$$

$$(iii) \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1} \times \frac{x+1}{x-1} \right)$$

$$(iv) \frac{8(y+3)}{9} \times \frac{12(y+1)}{4(y+3)} \div \frac{8(y+1)}{5}$$

$$(v) \frac{q^2 - 25}{q^2 - 3q} \div \frac{q^2 + 5q}{q^2 - 9}$$

$$(vi) \frac{4}{z^2 - 4z - 5} \div \frac{2}{4z^2 - 4}$$

6. $t + \frac{1}{t}$ کی رقم معلوم کریں جب $t = \frac{x-y}{x+y}$



7. مندرج ذیل کی رقوم معلوم کریں۔

- (i) $\frac{5(x+y)}{3x^2\sqrt{y+6}}$, if $x = -4, y = 9$
- (ii) $\frac{42ab^2c^3}{3a^2b+1}$, if $a = 3, b = 2$ and $c = 1$
- (iii) $\frac{(x+y)^3 - z^2}{x^2y^2 + z^2}$, if $x = 2, y = -4$ and $z = 3$,
- (iv) $\frac{3x^2y}{z} - \frac{bc}{x+1}$, if $x = 2, y = -1, z = 3, b = 4, c = \frac{1}{3}$
- (v) $\frac{(ab^2 - c)}{(a + cd^2)} \times \frac{(c + d)}{(a^2b - d)}$, if $a = 1, b = 3, c = -3$ and $d = 2$.

3.2 الجبری کلیے:

ہم پہلے سے الجبری کلیے کا مطالعہ اور اس کا استعمال، پہلی جماعتوں میں کر چکے ہیں۔ اس سیکشن میں ہم مزید کچھ کلیوں اور ان کے استعمال کا مطالعہ کریں گے۔

3.2.1 کلیات کی پہچان کریں۔

$$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2) \quad (i)$$

تصدیق:


$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (a+b)^2 + (a-b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - 2ab + b^2 \\ &= 2a^2 + 2b^2 \\ &= 2(a^2 + b^2) = \text{R.H.S} \end{aligned} \quad \begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \text{ اور} \end{aligned}$$

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab \quad (ii)$$

تصدیق:

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (a+b)^2 - (a-b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - (a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - a^2 + 2ab - b^2 \\ &= 4ab = \text{R.H.S} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \therefore (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \text{ اور} \end{aligned}$$

طریقہ درج ذیل مثالوں میں بیان کیا گیا ہے۔





$a - b = 4$ اور $a + b = 6$ کی رقم معلوم کریں جب (i) $a^2 + b^2$ اور ab

مثال 02

حل: معلوم ہے کہ،

$$a + b = 6, a - b = 4.$$

$$(i) \quad a^2 + b^2 = ?$$

ہم جانتے ہیں $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$

کی قیمتیں درج کرنے پر $a + b = 6$ and $a - b = 4$

$$(6)^2 + (4)^2 = 2(a^2 + b^2),$$

$$\Rightarrow 36 + 16 = 2(a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow 52 = 2(a^2 + b^2)$$

$$\Rightarrow 26 = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow \boxed{a^2 + b^2 = 26}$$

$$(ii) \quad ab = ?$$

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$

کی قیمتیں درج کرنے پر $a + b = 6$ and $a - b = 4$

$$\therefore (6)^2 - (4)^2 = 4ab,$$

$$\Rightarrow 36 - 16 = 4ab,$$

$$\Rightarrow 20 = 4ab,$$

$$\Rightarrow 5 = ab,$$

$$\text{or } \boxed{ab = 5}$$

پس $a^2 + b^2 = 26$ and $ab = 5$.

3.3.2 کلیات کی پہچان کریں۔

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$(a + b + c)^2 = (a + b + c)(a + b + c)$$

$$= a(a + b + c) + b(a + b + c) + c(a + b + c)$$

$$= a^2 + ab + ac + ab + b^2 + bc + ac + bc + c^2$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = \text{R.H.S}$$

تصدیق:

یہ طریقہ درج ذیل مثالوں میں بیان کیا گیا ہے۔



مثال 01 $a^2 + b^2 + c^2$ کی رقم معلوم کریں، جب $a + b + c = 7$ اور $ab + bc + ca = 15$

حل: معلوم ہے کہ

$$a + b + c = 7 \text{ and } ab + bc + ca = 15$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = ?$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \text{ ہم جانتے ہیں کہ}$$

$$a + b + c = 7 \text{ and } ab + bc + ca = 15, \text{ اب قیمتیں رکھنے پر}$$

$$\therefore (7)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(15)$$

$$\Rightarrow 49 = a^2 + b^2 + c^2 + 30$$

$$\Rightarrow 49 - 30 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow 19 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\Rightarrow \boxed{a^2 + b^2 + c^2 = 19}$$

لہذا $(a^2 + b^2 + c^2)$ کی رقم 19 ہے۔

مثال 02 $(a+b+c)$ کی رقم معلوم کریں جب $a^2 + b^2 + c^2 = 38$ اور $ab + bc + ac = 31$

حل:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \text{ ہم جانتے ہیں کہ}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 38 \text{ and } ab + bc + ac = 31, \text{ اب قیمتیں رکھنے پر}$$

$$(a + b + c)^2 = 38 + 2(31)$$



$$\Rightarrow (a + b + c)^2 = 38 + 62$$

$$\Rightarrow (a + b + c)^2 = 100$$

$$\Rightarrow (a + b + c) = (\pm \sqrt{100})$$

$$\Rightarrow \boxed{(a + b + c) = \pm 10}$$

لہذا $(a + b + c)$ کی رقم ± 10 ہے۔



مثال 03 $(ab+bc+ac)$ کی رقم معلوم کریں، جب $a+b+c = 8$ اور $a^2 + b^2 + c^2 = 20$

حل: معلوم ہے کہ

$$a+b+c = 8 \text{ and } a^2 + b^2 + c^2 = 20,$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca) \text{ ہم جانتے ہیں کہ}$$

$$a+b+c = 8 \text{ and } a^2 + b^2 + c^2 = 20, \text{ قیمتیں رکھنے پر}$$

$$(8)^2 = 20 + 2(ab+bc+ac)$$

$$\Rightarrow 64 = 20 + 2(ab+bc+ac)$$

$$\Rightarrow 64 - 20 = 2(ab+bc+ac)$$

$$\Rightarrow 44 = 2(ab+bc+ac)$$

$$\Rightarrow 22 = ab+bc+ac$$

$$\Rightarrow ab+bc+ac = 22$$

لہذا $ab+bc+ac$ کی رقم 22 ہے۔


3.2.3 کیوبک کلیے کی پہچان کریں۔

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \text{تصدیق } (a+b)^3 &= (a+b)(a+b)^2 \\ &= (a+b)(a^2 + 2ab + b^2) \\ &= a^3 + 2a^2b + ab^2 + a^2b + 2ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2 \\ &= a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \end{aligned}$$

$$(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b) \quad (ii)$$

$$\begin{aligned} \text{تصدیق } (a-b)^3 &= (a-b)(a-b)^2 \\ &= (a-b)(a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - b^3 - 3a^2b + 3ab^2 \\ &= a^3 - b^3 - 3ab(a-b) \end{aligned}$$



درج ذیل مثالیں کیوبک کلیے اور اس کے استعمال کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔

مثال 01 $a^3 + b^3$ کی رقم نکالیں، جبکہ $a + b = 4$ اور $ab = 5$

حل: معلوم ہے کہ

$$a + b = 4 \text{ اور } ab = 5$$

ہمیں تلاش کرنا ہے

$$a^3 + b^3$$

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b) \text{ کیوں کہ}$$

$$a + b = 4 \text{ اور } ab = 5, \text{ رقم لگا کر}$$

$$(4)^3 = a^3 + b^3 + 3(5)(4)$$

$$\Rightarrow 64 = a^3 + b^3 + 60$$

$$\Rightarrow 64 - 60 = a^3 + b^3$$

$$\Rightarrow 4 = a^3 + b^3$$

$$\Rightarrow \boxed{a^3 + b^3 = 4}$$

لہذا $(a^3 + b^3)$ کی رقم 4 ہے۔

مثال 02 $a^3 - b^3 = 5$ کی رقم معلوم کریں، جب $a - b = 5$ اور

$$a^3 - b^3 = 5 \text{ اور } a - b = 5$$

ہمیں ab تلاش کرنا ہے

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b) \text{ کیونکہ}$$

$$a^3 - b^3 = 5 \text{ اور } a - b = 5, \text{ اب رقم لگا کر}$$

$$(5)^3 = 5 - 3ab(5)$$

$$\Rightarrow 125 = 5 - 15ab$$

$$\Rightarrow 125 - 5 = -15ab$$

$$\Rightarrow 120 = -15ab$$

$$\Rightarrow -8 = ab$$

$$\Rightarrow \boxed{ab = -8}$$

حل: معلوم ہے کہ





مثال 03 $x + \frac{1}{x} = 3$ کی رقم تلاش کریں جب

حل: معلوم ہے کہ

$$x + \frac{1}{x} = 3$$

دونوں طرف کیوب لیں، ہمارے پاس ہے۔

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = 3^3$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 27 \quad \left[(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)\right]$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(3) = 27$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} + 9 = 27$$

$$\Rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3} = 27 - 9$$

$$\Rightarrow \boxed{x^3 + \frac{1}{x^3} = 18}$$

مثال 04 $2x - \frac{1}{x} = 4$ تلاش کریں جب $8x^3 - \frac{1}{x^3}$

حل: معلوم ہے کہ

$$= 2x - \frac{1}{x} = 4$$

دونوں طرف کیوب لیں۔

$$\left(2x - \frac{1}{x}\right)^3 = (4)^3$$

$$(2x)^3 - \left(\frac{1}{x}\right)^3 - 3(2x)\left(\frac{1}{x}\right)\left(2x - \frac{1}{x}\right) = 64$$

$$8x^3 - \frac{1}{x^3} - 6(4) = 64$$

$$8x^3 - \frac{1}{x^3} - 24 = 64 \Rightarrow 8x^3 - \frac{1}{x^3} = 88$$



3.2.4 کلیہ $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \pm ab + b^2)$ کی پہچان کریں۔

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad (i)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad \text{تصدیق:}$$

$$= a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3$$

$$= a^3 + b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad (ii)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad \text{تصدیق:}$$

$$= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3$$

$$= a^3 - b^3$$

مثال 01 $\left(x + \frac{1}{x}\right)$ اور $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 1\right)$ کا حاصل ضرب معلوم کریں۔

حل: معلوم ہے کہ $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right)$

$$\therefore (a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

پس

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3}$$

مثال 02 $\left(x + \frac{1}{x}\right)$ اور $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 1\right)$ کا حاصل ضرب معلوم کریں۔

حل: معلوم ہے کہ $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right)$

$$\therefore (a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

پس

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}\right) = x^3 + \frac{1}{x^3}$$



مثال 03 حاصل ضرب معلوم کریں۔

(i) $(x+y)(x^2-xy+y^2)(x-y)(x^2+xy+y^2)$
 $(x+y)(x^2-xy+y^2)(x-y)(x^2+xy+y^2)$ حل: معلوم ہے کہ
 $= (x^3+y^3)(x^3-y^3) \quad [\because (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3]$
 $= x^6 - y^6.$



مشق 3.2

1. $a^2 + b^2$ اور ab کی رقوم معلوم کریں جبکہ $a + b = 8$ اور $a - b = 6$
2. $a^2 + b^2$ اور ab کی رقوم معلوم کریں جبکہ $a + b = 5$ اور $a - b = 3$
3. $a^2 + b^2 + c^2$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a + b + c = 9$ اور $ab + bc + ac = 13$.
4. $a^2 + b^2 + c^2$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a + b + c = \frac{1}{3}$ اور $ab + bc + ac = \frac{-2}{9}$
5. $a + b + c$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a^2 + b^2 + c^2 = 29$ اور $ab + bc + ac = 10$
6. $a + b + c$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a^2 + b^2 + c^2 = 0.9$ اور $ab + bc + ac = 0.8$.
7. $ab + bc + ac$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a + b + c = 10$ اور $a^2 + b^2 + c^2 = 20$.
8. $a^3 + b^3$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a + b = 4$ اور $a^3 - b^3 = 5$
9. ab کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a^3 - b^3 = 5$ اور $ab = 3$.
10. ab کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a^3 - b^3 = 16$ اور $a - b = 4$.
11. $a^3 - b^3$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $a - b = 5$ اور $ab = 7$.
12. $125x^3 + y^3$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $5x + y = 13$ اور $xy = 10$.
13. $216a^3 - 343b^3$ کی رقوم تلاش کریں، جبکہ $6a - 7b = 11$ اور $ab = 8$.



$$14. \quad x + \frac{1}{x} = 7 \quad \text{جب } x^3 + \frac{1}{x^3} \text{ کی رقم تلاش کریں،}$$

$$15. \quad x - \frac{1}{x} = 11 \quad \text{جب } x^3 - \frac{1}{x^3} \text{ کی رقم تلاش کریں،}$$

16. حاصل ضرب معلوم کریں۔

$$(i) \left(\frac{3}{2}b + \frac{2}{3b} \right) \left(\frac{9b^2}{4} + \frac{4}{9b^2} - 1 \right) \quad (ii) \left(\frac{7y^2}{9} + \frac{9}{7y^2} \right) \left(\frac{49y^4}{81} + \frac{81}{49y^4} - 1 \right)$$

$$(iii) \left(\frac{x^4}{12} + \frac{12}{x^4} \right) \left(\frac{x^8}{144} + \frac{144}{x^8} + 1 \right) \quad (iv) \left(c^2 - \frac{1}{c^2} \right) \left(c^4 + \frac{1}{c^4} + 1 \right)$$

17. متعلقہ حاصل ضرب معلوم کریں کیلئے استعمال کر کے

$$(i) \quad (2x^2 + 3y^2)(4x^4 - 6x^2y^2 + 9y^4)$$

$$(ii) \quad (2x^2 - 3y^2)(4x^4 + 6x^2y^2 + 9y^4)$$

$$(iii) \quad (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)(x^4 - x^2y^2 + y^4).$$

$$(iv) \quad (2x + 3y)(2x - 3y)(4x^2 + 9y^2)(16x^4 + 81y^4)$$

3.3 مقادیر اصم اور اس کے استعمال۔

3.3.1 مقادیر اصم اور اس کے استعمال کی پہچان کریں۔

مقادیر اصم: ایک جملہ جس میں کم از کم ایک علامت میں جذری علامت شامل ہو وہ بھی اپنی آسان شکل میں، مقدار اصم کہلاتی ہے۔

$$\text{مثال کے طور پر، } \sqrt{2}, \sqrt{a-4}, \sqrt[3]{\frac{5}{10}}, \left(\frac{1}{3} + \sqrt{3} \right), \left(\sqrt[3]{2} - \frac{1}{2} \right), \text{ مقادیر اصم ہیں۔}$$

تمام مقادیر اصم غیر ناطق اعداد ہوتے ہیں۔

اگر $\sqrt[n]{a}$ ایک غیر ناطق عدد ہے اور 'a' بہترین n^{th} قوت نما (power) نہیں ہے پھر یہ n^{th} درجہ $\sqrt[n]{a}$ کا مقدار اصم ہے کا نتیجہ ایک غیر ناطق عدد ہے۔ اس کو غیر ناطق جذر بھی کہا جاتا ہے ناطق مجذوز کے ساتھ۔

$$\text{مثال کے طور پر } \sqrt[5]{7}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{6}, \sqrt[5]{2}, \sqrt[7]{10} \text{ s: مقدار اصم ہیں بالترتیب درجہ } 2^{\text{nd}}, 3^{\text{rd}}, 4^{\text{th}}, 5^{\text{th}}$$

اور 7^{th} ہیں مگر $\sqrt[3]{27}, \sqrt{\frac{1}{4}}$ مقدار اصم نہیں ہیں کیونکہ یہ بالترتیب عدد 3 اور $\frac{1}{2}$ کو پیش کرتا ہے۔



3.3.2 دوسرے درجے کے مقادیر اصم پر بنیادی عوامل کا استعمال کر کے مخرج (نسب نما) کو ناطق بنا کر ہم قیمت کسر میں تبدیل کریں۔

(1) دوسرے درجے کے مقادیر اصم:

(i) ایسا مقدار اصم جس میں صرف ایک علامت ہو مونو میل (monomial) مقدار اصم کہلاتا ہے۔

مثلاً $\sqrt{53}$, $\sqrt{a-9}$, $\sqrt{\frac{4}{5}}$ وغیرہ دوسرے درجے کے مونو میل مقدار اصم ہیں۔

(ii) ایسا مقدار اصم جس میں دو مونو میل مقدار اصم کا جمع و تفریق یا مونو میل مقدار اصم اور ناطق

عدد کا مجموعہ دو طرفہ (binomial) مقدار اصم کہلاتا ہے۔

مثال کے طور پر $\sqrt{17} + \sqrt{11}$, $\sqrt{2} - 13$, $\sqrt{3} - 35$ وغیرہ دوسرے درجے کے دو طرفہ

مقدار اصم ہیں۔

(iii) دو طرفہ مقدار اصم کا جوڑ

اس قسم کے جملے

(i) $(\sqrt{a} + c\sqrt{b})$ اور $(\sqrt{a} - c\sqrt{b})$ ایک دوسرے کے زوج مقادیر اصم ہیں

(ب) $a + \sqrt{b}$ اور $a - \sqrt{b}$ ایک دوسرے کے زوج مقادیر اصم ہیں

(ب) دوسرے درجے کی مقادیر اصم پر بنیادی عوامل کا استعمال کر کے مخرج (نسب نما) کو ناطق بنا کر ہم قیمت کسر میں تحویل کریں۔

(i) مقادیر اصم کا جمع اور تفریق کرنا۔


مقادیر اصم کا جمع و تفریق درج ذیل law کے استعمال سے ہو سکتا ہے

مثال کے طور پر $a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a+b)\sqrt{c}$ اور $a\sqrt{c} - b\sqrt{c} = (a-b)\sqrt{c}$

مثال 01 $\sqrt{343} - 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7}$ کو حل کریں۔

$$\begin{aligned} & \sqrt{343} - 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} \\ &= \sqrt{7 \times 7 \times 7} - 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} \\ &= 7\sqrt{7} - 3\sqrt{7} - 2\sqrt{7} \\ &= (7 - 3 - 2)\sqrt{7} \\ &= (7 - 5)\sqrt{7} \\ &= 2\sqrt{7} \end{aligned}$$

حل:



مثال 01 $\sqrt{32} + 5\sqrt{2} + \sqrt{128} + 7\sqrt{2}$ کو حل کریں۔

01 مثال

حل:

$$\begin{aligned} & \sqrt{32} + 5\sqrt{2} + \sqrt{128} + 7\sqrt{2} \\ &= \sqrt{16 \times 2} + 5\sqrt{2} + \sqrt{64 \times 2} + 7\sqrt{2} \\ &= \sqrt{(4)^2 \times 2} + 5\sqrt{2} + \sqrt{(8)^2 \times 2} + 7\sqrt{2} \\ &= 4\sqrt{2} + 5\sqrt{2} + 8\sqrt{2} + 7\sqrt{2} \\ &= (4 + 5 + 8 + 7)\sqrt{2} \\ &= 24\sqrt{2} \end{aligned}$$

(ii) مقادیر اصم کا حاصل ضرب اور تقسیم

مقادیر اصم کا حاصل ضرب اور تقسیم درج ذیل قانون کو استعمال کر کے حل کیا جاسکتا ہے۔

(a) $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

(b) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad a > 0 \text{ اور } b > 0.$

مثال 01 $\sqrt{125} \times \sqrt{48}$ حل کریں

01 مثال

حل:


$$\begin{aligned} & \sqrt{125} \times \sqrt{48} \\ &= \sqrt{(5)^2 \times 5} \times \sqrt{(4)^2 \times 3} \\ &= 5\sqrt{5} \times 4 \times \sqrt{3} \\ &= (5 \times 4)(\sqrt{5} \times \sqrt{3}) \\ &= 20\sqrt{15} \end{aligned}$$

مثال 01 $\frac{\sqrt{162}}{\sqrt{144}}$ حل کریں

01 مثال

حل:

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{162}}{\sqrt{144}} \\ &= \frac{\sqrt{2 \times 81}}{\sqrt{12 \times 12}} \\ &= \frac{\sqrt{2 \times (9)^2}}{\sqrt{(12)^2}} = \frac{9\sqrt{2}}{12} = \frac{3\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$





مشق 3.3

1. حل کریں
- (i) $\sqrt[4]{81x^{-8}z^4}$ (ii) $\sqrt[3]{256a^6b^{12}c^9}$ (iii) $\sqrt[7]{128}$ (iv) $\sqrt{7776}$
- (v) $\frac{\sqrt[3]{(125)^2 \times 8}}{\sqrt{(2 \times 32)^2}}$ (vi) $\frac{\sqrt{21} \times \sqrt{28}}{\sqrt{121}}$ (vii) $\sqrt{\frac{(216)^{\frac{2}{3}} \times (125)^{\frac{1}{2}}}{(0.04)^{\frac{-3}{2}}}}$
- (viii) $\frac{\sqrt[6]{4} \times \sqrt[3]{27} \times \sqrt{60}}{\sqrt{180} \times \sqrt[3]{0.25} \times \sqrt[4]{9}}$
2. زوج تلاش کریں
- (i) $(8 - 4\sqrt{3})$ (ii) $(6\sqrt{6} + 2\sqrt{3})$ (iii) $(8\sqrt{12} + \sqrt{8})$
- (iv) $(2 - \sqrt{3})$
3. حل کریں
- (i) $(6\sqrt{2} + 4\sqrt{2} + 7\sqrt{128})$ (ii) $\sqrt{5} + \sqrt{125} + 7\sqrt{5}$
- (iii) $(13 + 15\sqrt{3}) + (7 - 6\sqrt{3})$ (iv) $\sqrt{250} + \sqrt{490} + 3\sqrt{10}$
- (v) $\sqrt{245} + \sqrt{625} - \sqrt{45}$ (vi) $10\sqrt{11} - \sqrt{396} - 3\sqrt{11}$
- (vii) $\sqrt{17}(10\sqrt{17} - 2\sqrt{17})$ (viii) $\frac{3}{2}(\sqrt{18} + \sqrt{32} - \sqrt{50})$
- (ix) $\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ (x) $(\sqrt{13} + \sqrt{11})(\sqrt{13} - \sqrt{11})$
- (xi) $(3\sqrt{6} - 4\sqrt{5})^2$ (xii) $(2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})^2$



3.4 ناطق بنانے کا عمل

3.4.1 حقیقی اعداد $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$ ، $\frac{1}{a + b\sqrt{x}}$ اور ان کے اتصال سے حاصل کردہ عدد، جبکہ x, y قدرتی اعداد اور a, b صحیح اعداد ہوں، کو ناطق بنانے کے عمل کی (بالکل ٹھیک مطلب کے ساتھ) وضاحت کریں

اگر دو مقادیر اصم کا حاصل ضرب ایک ناطق عدد ہے، تو ہر مقدار اصم دوسرے کا ناطقی جز و ضربی کہلائے گا۔
مثلاً: $(35 + \sqrt{31})$ اور $(35 - \sqrt{31})$ ناطق اجزاء ہیں۔

کسی دیے ہوئے مقدار اصم کو اس کے ناطقی عوامل سے ضرب دینے کے عمل کو ایک ناطق عدد حاصل کرنے کے لیے بطور حاصل ضرب دی گئی مقدار اصم کا ناطق بنانے کا عمل کہلاتی ہے۔ زوج مقدار اصم کا حاصل ضرب ناطق عدد ہوتا ہے۔

مثال 01 $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ کا حاصل ضرب معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} & (\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \\ &= (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2 \\ &= 3 - 2 = 1 \end{aligned}$$

حل:

مخرج کا ناطق بنانے کا عمل:

مذکورہ بالا بحث کا مد نظر رکھتے ہوئے، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ، $(a + b\sqrt{x})$ یا $(a - b\sqrt{x})$ عوامل کے مخرج کا ناطق بنانے کے لیے، ہم زوج جز و ضربی $(a - b\sqrt{x})$ یا $(a + b\sqrt{x})$ سے دونوں ہندسہ (numerator) اور مخرج (denominator) کو ضرب دیں۔ ایسا کرنے سے ہم جذر (radical) کو ختم کرتے ہیں اور لہذا کسی بھی مقدار اصم سے پاک مخرج حاصل ہوتا ہے۔

حقیقی اعداد کی اقسام کا ناطق بنانے کا عمل:

$$(i) \frac{1}{a + b\sqrt{x}} \quad (ii) \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$$

جملات $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$ اور $\frac{1}{a + b\sqrt{x}}$ ان کا ناطق بنانے کا عمل، جہاں $x, y \in \mathbb{N}$ اور $a, b \in \mathbb{Z}$ درج ذیل مثالیں ناطق بنانے کے تصور کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔



مثال 01 $\frac{1}{5+2\sqrt{3}}$ کو ناطق بنائیں۔
حل:

مخرج کو $5-2\sqrt{3}$ کے ساتھ ضرب اور تقسیم دیں
جو زوج ہے $5+2\sqrt{3}$ کا

$$\begin{aligned} & \frac{1}{5+2\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{5+2\sqrt{3}} \times \frac{5-2\sqrt{3}}{5-2\sqrt{3}} \\ &= \frac{5-2\sqrt{3}}{(5)^2 - (2\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{5-2\sqrt{3}}{25-12} \\ &= \frac{5-2\sqrt{3}}{13} \\ &= \frac{5}{13} - \frac{2}{13}\sqrt{3} \end{aligned}$$

مثال 01 $\frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ کو ناطق بنائیں۔
حل:

$$\begin{aligned} \frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} &= \frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \\ &= \frac{5(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{5(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{3-2} \\ &= \frac{5(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{1} \\ &= 5(\sqrt{3}-\sqrt{2}) \end{aligned}$$



مشق 3.4

1. درج ذیل کے مخرج کا ناطق بنائیں۔

(i) $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$

(ii) $\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$

(iii) $\frac{1}{4\sqrt{3}-5\sqrt{2}}$

(iv) $\frac{16}{\sqrt{12}+\sqrt{11}}$

(v) $\frac{9-\sqrt{2}}{9+\sqrt{2}}$

(vi) $\frac{\sqrt{13}+3}{\sqrt{13}-3}$

2. (i) اگر $x = 8 - 3\sqrt{7}$ ، $x + \frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کریں۔

(ii) اگر $\frac{1}{x} = 2\sqrt{28} - 11$ ، x کی قیمت معلوم کریں۔

(iii) اگر $x = 3 - 2\sqrt{2}$ مندرجہ ذیل کی قیمتیں معلوم کریں۔

$x^4 + \frac{1}{x^4}$ اور $x^2 - \frac{1}{x^2}$ ، $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ، $x - \frac{1}{x}$ ، $x + \frac{1}{x}$

3. اگر $x = \sqrt{5} + 2$ ، $x^4 + \frac{1}{x^4}$ کی قیمت معلوم کریں۔

4. اگر $\frac{1}{y} = 2 + \sqrt{3}$ ، $y^4 + \frac{1}{y^4}$ کی قیمت معلوم کریں۔

5. اگر $\frac{1}{z} = 7 - 4\sqrt{3}$ ، $z^2 - z^{-2}$ کی قیمت معلوم کریں۔

اعادہ مشق 3

1. درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں۔

(i) پرکثیر رقتی ہوتا ہے۔

(ا) غیر ناطق اظہاریہ

(ب) ناطق اظہاریہ
(د) ان میں سے کوئی نہیں۔

(ج) ایک اظہاریہ

(ii) ایسا مقدار اصرم جس میں دو مونو میل مقادیر اصرم کا مجموعہ ہوا کہلاتا ہے۔

(ا) سہ رقتی مقدار اصرم

(ج) زوج مقادیر اصرم

(iii) $3x + 2y - 3$ ایک الجبری ہے۔

(ا) تاثرات

(ب) مساوات

(ج) جملہ

(د) اندرون مساوات

(iv) $3x^2y + 5y^4 - 10$ کی ڈگری ہے۔

(ا) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 10

(v) $\sqrt{7}$ مثال ہے کی۔

(ا) مونو میل مقدار اصرم

(ج) دور رقتی مقدار اصرم



(vi) دو کثیر رقتی $\frac{p(x)}{q(x)}$ اور $p(x)$ جہاں $q(x) \neq 0$ کہلاتا ہے۔

(ا) ناطق اظہاریہ

(ج) کثیر رقتی

(ب) غیر ناطق اظہاریہ

(د) زوج

(vii) $\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x+y}$ برابر ہے۔(ا) $\frac{2x}{x^2 - y^2}$ (ب) $\frac{2y}{x^2 - y^2}$ (ج) $\frac{-2x}{x^2 - y^2}$ (د) $\frac{-2y}{x^2 - y^2}$ 

(viii) $2 - \sqrt{3}$ کا زوج ہے:

(ب) $-2 - \sqrt{3}$ (ا) $2 + \sqrt{3}$

(د) $\sqrt{3} - 4$ (ج) $\sqrt{2} + 3$

(ix) $a^3 - 3ab(a - b) - b^3$ برابر ہے۔

(ب) $(a + b)^3$ (ا) $(a - b)^3$

(د) $a^3 - b^3$ (ج) $a^3 + b^3$

(x) اگر $a + b = 5$ اور $a - b = 3$ پھر ab کی رقم معلوم کریں۔

(د) 6 (ج) 3 (ب) 5 (ا) 4

(xi) $(5 + \sqrt{15})(5 - \sqrt{15})$ برابر ہے۔

(د) 30 (ج) 25 (ب) 15 (ا) 10

(xii) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ برابر ہے۔

(ب) $(a + b + c)^2$ (ا) $(a + b - c)^2$

(د) $(a + b + c)^3$ (ج) $(a - b + c)^2$

2. خالی جگہیں پُر کریں۔

(i) _____ کسی کثیر رقمی کی ڈگری ہوتی ہے

(ii) $2 - \sqrt{3}$ مقدار اصم _____ کا زوج ہے۔



(iii) $2x^3 + x^2 - 4x^4 + 7x - 9$ کثیر رقمی کی ڈگری ہے _____

(iv) $\frac{\sqrt{x}}{3x+5}$ ایک _____ $\frac{-5}{3}$ $x \neq$ تاثر ہے۔

(v) $(x - y)(x + y)(x^2 + y^2) =$ _____

خلاصہ

- ◆ ایک متغیر x میں ایک کثیر رقتی اظہاریہ (محض کثیر رقتی) کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔
- ◆ ایک الجبری اظہاریہ جو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کے طور پر لکھا جاسکتا ہے، جہاں $q(x) \neq 0$ اور $p(x)$ ، $q(x)$ دونوں کثیر رقتی ہیں، ناطق اظہاریہ کہلاتا ہے۔
- ◆ ایک الجبری اظہاریہ جو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کے طور پر نہیں لکھا جاسکتا، جہاں $q(x) \neq 0$ اور $p(x)$ ، $q(x)$ دونوں کثیر رقتی ہیں، غیر ناطق اظہاریہ x کہلاتا ہے۔
- ◆ ایسی کثیر رقتی جس میں ایک رقم ہو، یک رقتی (Monomial) کہا جاتا ہے۔
- ◆ ایسی کثیر رقتی جس میں دو رقوم ہوں، دو رقتی (Binomial) کہا جاتا ہے۔
- ◆ ایسی کثیر رقتی جس میں تین رقوم ہوں، تین رقتی (Trinomial) کہا جاتا ہے۔
- ◆ ناطق اظہاریہ $\frac{p(x)}{q(x)}$ اپنی مختصر ترین شکل میں ہوتا ہے اگر $p(x)$ اور $q(x)$ کثیر رقتی ہوں عددی سر کے صحیح اعداد ہوں اور ان میں کوئی جزو ضربی مشترک نہ ہو۔
- ◆ $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$ and $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$.
- ◆ $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$.
- ◆ $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$ and $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$
- ◆ $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$.
- ◆ $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$.
- ◆ ایک تاثر مقدار اصم کہلاتا ہے اگر اس کی کم از کم ایک اصطلاح میں جذری علامت ہو۔
- ◆ مثلاً: $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{\frac{3}{10}}$ مقادیر اصم ہیں۔



♦ اگر $\sqrt[n]{a}$ ایک غیر ناطق عدد ہے اور 'a' بہترین n^{th} قوت نما نہیں ہے پہر یہ n^{th} درجہ کا مقدار اصم کہلائے گا۔

♦ ایک اصطلاح والے مقدار اصم کو مونو میل کہتے ہیں۔

♦ ایسا مقدار اصم جس میں دو مونو میل مقدار اصم کا جمع و تفریق یا مونو میل مقدار اصم اور ناطق عدد کا مجموعہ دو طرفہ (binomial) مقدار اصم کہلاتا ہے۔

♦ اس قسم کے جملے $(\sqrt{a} + c\sqrt{b})$ اور $(\sqrt{a} - c\sqrt{b})$ ایک دوسرے کے زوج مقادیر اصم (conjugate surds) ہیں۔

♦ ہیں۔ $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ اور $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ معلوم $a > 0$ اور $b > 0$

♦ اگر دو مقادیر اصم کا حاصل ضرب ایک ناطق عدد ہے، تو ہر مقدار اصم دوسرے کا ناطقی جزو ضربی کہلائے گا۔ کسی دیے ہوئے مقدار اصم کو اس کے ناطقی عوامل سے ضرب دینے کے عمل کو ایک ناطق عدد حاصل کرنے کے لیے بطور حاصل ضرب دی گئی مقدار اصم کا ناطق بنانے کا عمل کہلاتی ہے۔



FACTORIZATION

طلباء کے تدریسی نتائج:

اس یونٹ کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہونگے کہ:

- مندرجہ ذیل اظہاریوں کی تجزی دہرائیں سکیں گے۔
- $ka + kb + kc$ (تمام رقوم میں مشترکہ جز (عصر)
- $ac + ad + bc + bd$ (رقوم کے جوڑوں میں مشترکہ جز (عصر)
- $a^2 \pm 2ab + b^2$ (مکمل مربع)
- $a^2 - b^2$ (دو مربع رقوم میں تفریق)
- $(a^2 \pm 2ab + b^2) - c^2$
- $(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2$
- مندرجہ ذیل اقسام کے اظہاریوں کی تجزی کر سکیں گے۔
- قسم i- $a^4 + a^2b^2 + b^4$ اور $a^4 + b^4 - i$
- قسم ii- $x^2 + px + q$
- قسم iii- $ax^2 + bx + c$
- قسم iv- $(ax^2 + bx + c)(ax^2 + bx + d) + k$
- قسم v- $a^3 \pm b^3$
- قسم vi- $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ اور $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- مسئلہ باقی مثالوں سے بیان کرنا اور ثابت سیکھ جائیں گے۔
- باقی معلوم کرنا (بغیر تقسیم) جبکہ ایک کثیر رقی ایک درجہ کثیر رقی سے تقسیم ہو۔
- کثیر رقی کے (0) صفر کو بیان کرنا۔
- مسئلہ اجزاء بیان کرنا اور ثابت کرنا۔
- مصنوعی تقسیم کا طریقہ بیان کرنا۔
- مصنوعی تقسیم استعمال کرنا۔
- خارج قسمت اور باقی معلوم کرنا جب دیا ہوا کثیر رقی اظہاریہ ایک یک درجہ کثیر رقی اظہاریے سے تقسیم ہو۔
- نامعلوم کی قیمتیں معلوم کرنا اگرچہ کثیر رقی اظہاریے کا صفر دیا گیا ہو۔
- نامعلوم کی قیمتیں معلوم کرنا۔ اگر کثیر رقی اظہاریوں کا جز (عصر) دیا گیا ہو۔
- مسئلہ اجزاء استعمال کر کے کعبی کثیر رقی اظہاریے کی تجزی کرنا۔

تعارف:

ہم عمل تجزی کا مطالعہ کریں گے جو علم ریاضی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہمیں مشکل ترین اظہاریوں کو سادہ اظہاریوں میں تبدیل کرنے میں مدد کریگا۔

4.1 عمل تجزی

فرض کریں کہ $p(x), q(x)$ اور $r(x)$ تین کثیر رقمی اظہارے ہیں، اسی طرح $p(x) \times q(x) = r(x)$ یہاں پر $r(x)$ ایک نتیجہ خیز کثیر رقمی اظہارہ ہے جو $p(x)$ اور $q(x)$ کی حاصل ضرب ہے۔ اظہارہ $r(x)$ کے اجزاء ضربی $p(x)$ اور $q(x)$ ہیں۔ ذیل میں کچھ کثیر رقمی اظہاریوں کے اجزاء ضربی مثالیں ہیں۔

- (i) $6x^2y^3 = (2 \times 3)(x \times x)(y \times y \times y)$
- (ii) $ax + aby + abcz = a(x + by + bcz)$
- (iii) $5x + 15xy = 5x(1 + 3y)$
- (iv) $x - y = (\sqrt{x})^2 - (\sqrt{y})^2 = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})$

4.1.1 مندرجہ ذیل اقسام کے اظہاریوں کی عمل تجزی دہرائیں۔

- (i) $ka + kb + kc$ (تمام رقوم میں مشترکہ جز)
- (ii) $ac + ad + bc + bd$ (رقوم کے جوڑوں میں مشترکہ جز)
- (iii) $a^2 \pm 2ab + b^2$ (مکمل مربع)
- (iv) $a^2 - b^2$ (دو مربع رقوم میں تفریق)
- (v) $a^2 \pm 2ab + b^2 - c^2$
- (vi) $(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2$

(i) $ka + kb + kc$ کے اجزاء ضربی۔

مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثال 01: $10a + 15b - 20c$ کے اجزاء ضربی معلوم کریں۔

حل: $10a + 15b - 20c$

$$= 5(2a + 3b - 4c)$$

مثال 02: $\frac{4}{9}x - \frac{8}{12}xy - \frac{16}{15}xy$ کے اجزاء ضربی معلوم کریں۔

حل: $\frac{4}{9}x - \frac{8}{12}xy - \frac{16}{15}xy$

$$= \frac{4}{3 \cdot 3} - \frac{4 \cdot 2}{3 \cdot 4}x - \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5}xy$$

$$\left(\frac{4}{3} \right) \text{ کو مشترکہ جز و ضربی نکالنے سے } = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{4}x - \frac{4}{5}xy \right)$$





(ii) $ac + ad + bc + bd$ کی طرح کے اظہاریوں کی اجزاء ضربی معلوم کریں
مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں

مثال :01 کے اجزاء ضربی معلوم کریں

$$\begin{aligned} & 3a - ac - 3c + c^2 \\ &= a(3 - c) - c(3 - c) \\ &= (3 - c)(a - c) \end{aligned}$$

مثال :02 کے اجزاء ضربی معلوم کریں

$$\begin{aligned} & 9y^2z + 3xyz - 9xy^2 - 3x^2y \\ &= 3yz(3y + x) - 3xy(3y + x) \\ &= (3y + x)(3yz - 3xy) \\ &= (3y + x) \times 3y(z - x) \\ &= 3y(x + 3y)(z - x) \text{ (مطلوبہ اجزاء ضربی ہیں)} \end{aligned}$$

(iii) $a^2 \pm 2ab + b^2$ کی طرح کے اظہاریوں کے اجزاء ضربی معلوم کریں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a)^2 + 2(a)(b) + (b)^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a)^2 - 2(a)(b) + (b)^2 = (a - b)^2 \text{ اور}$$

مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں

مثال :01 $16a^2 + 40ab + 25b^2$ کی تجزی کریں

$$\begin{aligned} & 16a^2 + 40ab + 25b^2 \\ &= (4a)^2 + 2(4a)(5b) + (5b)^2 \\ &= (4a + 5b)^2 \end{aligned}$$

$$[\because a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2]$$

مثال :02 $4p^2 - 28pq + 49q^2$ کی تجزی کریں

$$\begin{aligned} & 4p^2 - 28pq + 49q^2 \\ &= (2p)^2 - 2(2p)(7q) + (7q)^2 \\ &= (2p - 7q)^2 \end{aligned}$$

$$[\because a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2]$$


(iv) $a^2 - b^2$ کی طرح کے اظہاریوں کی تجزی۔

مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں

مثال :01 $4x^2 - 1$ کی تجزی کریں

$$\begin{aligned} & 4x^2 - 1 \\ &= (2x)^2 - (1)^2 \\ &= (2x - 1)(2x + 1) \end{aligned}$$

$$[\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)]$$



مثال 02: $ab y^2 - 6z^2$ کی تجزی کریں

حل:

$$\begin{aligned} & 96y^2 - 6z^2 \\ &= 6(16y^2 - z^2) \\ &= 6[(4y)^2 - z^2] \\ &= 6(4y - z)(4y + z) \end{aligned} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)]$$

مثال 03: $9r^4 - (6s - t^2)^2$ کی تجزی کریں

حل:

$$\begin{aligned} & 9r^4 - (6s - t^2)^2 \\ &= (3r^2)^2 - (6s - t^2)^2 \\ &= [3r^2 - (6s - t^2)][3r^2 + (6s - t^2)], \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\ &= (3r^2 - 6s + t^2)(3r^2 + 6s - t^2) \end{aligned}$$

(v) $(a^2 \pm 2ab + b^2) - c^2$ کی طرح کے اظہاریوں کی تجزی۔

مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں

مثال 01: $x^2 + 4xy^2 + 4y^4 - 4z^2$ کی تجزی کریں

حل:

$$\begin{aligned} & x^2 + 4xy^2 + 4y^4 - 4z^2 \\ &= \{(x)^2 + 2(x)(2y^2) + (2y^2)^2\} - (2z)^2 \\ &= (x + 2y^2)^2 - (2z)^2 \\ &= \{(x + 2y^2) + 2z\}\{(x + 2y^2) - 2z\} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\ &= (x + 2y^2 + 2z)(x + 2y^2 - 2z) \end{aligned}$$

مثال 02: $9p^2 - 6pq + q^2 - 9r^2$ کی تجزی کریں

حل:


$$\begin{aligned} & 9p^2 - 6pq + q^2 - 9r^2 \\ &= (3p)^2 - 2(3p)(q) + q^2 - (3r)^2 \\ &= (3p - q)^2 - (3r)^2 \\ &= (3p - q + 3r)(3p - q - 3r) \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \end{aligned}$$

(vi) $(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2$ کی طرح کے اظہاریوں کی تجزی کرنا۔

مثال 01: $(\sqrt{xy})^2 - (\sqrt{z})^2$ کی تجزی کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{xy})^2 - (\sqrt{z})^2 \\ &= (\sqrt{xy} - \sqrt{z})(\sqrt{xy} + \sqrt{z}) \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \end{aligned}$$



4.1 مشق

1. مندرجہ ذیل کی تجزی کریں۔

(i) $4x + 16y + 24z$	(ii) $x^2 + 3x^2y + 4x^2y^2z$
(iii) $3pqr + 6pqt + 3pqs$	(iv) $9qr(s^2 + t^2) + 18q^2r^2(s^2 + t^2)$
(v) $\frac{z^2x}{16} - \frac{x^2z^2}{8} + \frac{x^2z^3}{12}$	(vi) $a(x-y) - a^2b(x-y) + a^2b^2(x-y)$

2. مندرجہ ذیل کی تجزی کریں

(i) $7x + xz + 7z + z^2$	(ii) $9a^2b + 18ab^2 - 6ac - 12bc$
(iii) $6t - 12p + 4tq - 8pq$	(iv) $r^2 + 9rs - 7rs - 63s^2$
(v) $\frac{y^2}{4} - \frac{y^2z}{4} - \frac{z^2t}{9} + \frac{z^3t}{9}$	(vi) $\frac{10xy}{11} + \frac{5xz}{11} - \frac{14y^2}{11} - \frac{7yz}{11}$

3. اجزاء ضربی معلوم کریں

(i) $4a^2 + 12ab + 9b^2$	(ii) $36x^4 + 12x^2 + 1$
(iii) $x^2 + 1 + \frac{1}{4x^2}$	(iv) $81y^2 + 144yz + 64z^2$
(v) $625 + 50a^2b + a^4b^2$	(vi) $a^2 + 0.4a + 0.04$
(i) $b^4 - 4b^2c^2 + 4c^4$	(ii) $\frac{9}{4}x^4 - 2 + \frac{4}{9x^4}$
(iii) $2a^3b^3 - 16a^2b^4 + 32ab^5$	(iv) $9(p+q)^2 - 6(p+q)r^2 + r^4$
(v) $x^2y^2 - 0.1xy + 0.0025$	(vi) $(a-b)^2 - 18(a-b) + 81$

4. تجزی کریں

(i) $4a^2 - 9b^2$	(ii) $16x^2 - 25y^2$	(iii) $100x^2z^2 - y^4$
(iv) $\frac{1}{100}x^4 - 100y^4$	(v) $\frac{64}{81}f^2 - \frac{81}{64}g^4$	(vi) $\frac{x^4}{121} - 121y^2$

6. اجزاء ضربی معلوم کریں

(i) $(2x+z)^2 - (2x-z)^2$	(ii) $(4a-9b)^2 - (2a+5b)^2$
(iii) $169x^4 - (3t+4)^2$	(iv) $(9x^2 - 4y^2)^2 - (4x^2 - y^2)^2$
(v) $\left(a^2 + 2 + \frac{1}{a^2}\right) - \left(b^2 - 2 + \frac{1}{b^2}\right)$	(vi) $9x^2 + \frac{1}{9x^2} - 4y^2 - \frac{1}{4y^2} + 4$

7. اجزاء ضربی معلوم کریں

(i) $(x^2 + 2xy + y^2) - 9z^4$	(ii) $(4a^2 + 8ab^2 + 4b^4) - 9c^2$
--------------------------------	-------------------------------------



$$(iii) \quad 16d^4 - (c^4 - 2c^2d + d^2)$$

$$(v) \quad x^2 - y^2 - 4x - 2y + 3$$

$$(iv) \quad 4(x^2 + 2xy^2 + y^4) - 9y^6$$

$$(vi) \quad 4x^2 - y^2 - 2y - 1$$

8. تجزی کریں

$$(i) \quad (\sqrt{ab})^2 - (\sqrt{c})^2$$

$$(iii) \quad (\sqrt{yz})^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{yz}}\right)^2$$

$$(ii) \quad (\sqrt{4x})^2 - (\sqrt{9y})^2$$

$$(iv) \quad xzt - \frac{1}{t}$$

4.1.2 مندرجہ ذیل کی طرح کے اظہاریوں کی تجزی کرنا۔

قسم 1: $a^4 + a^2b^2 + b^4$ or $a^4 + 4b^4$

اس طرح کے اظہاریوں میں وہ الجبری اظہارے شامل ہیں جو نہ مربع اظہاریے ہیں اور نہ ہی دو مربع اظہاریوں کی تفریق کی طرح ہیں۔ اس طرح کے اظہاریوں کی تجزی مندرجہ ذیل مثالوں میں واضح ہے۔

مثال 01: $a^4 + a^2b^2 + b^4$ کی تجزی کریں

حل:


$$\begin{aligned} & a^4 + a^2b^2 + b^4 \\ &= (a^4 + b^4) + a^2b^2 \quad (\text{رقوم کی ترتیب بدلنے سے}) \\ &= (a^4 + 2a^2b^2 + b^4) - 2a^2b^2 + a^2b^2 \quad (2a^2b^2 \text{ جمع اور تفریق کرنے سے}) \\ &= \{(a^2)^2 + 2(a^2)(b^2) + (b^2)^2\} - a^2b^2 \\ &= (a^2 + b^2)^2 - (ab)^2 \\ &= \{(a^2 + b^2) - ab\}\{(a^2 + b^2) + ab\} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\ &= (a^2 - ab + b^2)(a^2 + ab + b^2) \quad \text{مطلوبہ اجزاء ضربی ہیں۔} \end{aligned}$$

مثال 02: $a^4 + 4b^4$ کی تجزی کریں

حل:

$$\begin{aligned} & a^4 + 4b^4 \\ &= (a^2)^2 + (2b^2)^2 \\ &= (a^2)^2 + (2b^2)^2 + 2(a^2)(2b^2) - 2(a^2)(2b^2) \\ &= \{(a^2)^2 + 2(a^2)(2b^2) + (2b^2)^2\} - 4a^2b^2 \\ &= (a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2 \\ &= \{(a^2 + 2b^2) - 2ab\}\{(a^2 + 2b^2) + 2ab\} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\ &= (a^2 - 2ab + 2b^2)(a^2 + 2ab + 2b^2) \quad \text{مطلوبہ اجزاء ضربی ہیں۔} \end{aligned}$$

$[2(a^2)(2b^2)]$
جمع اور تفریق کرنے سے





مثال 03: $x^8 + x^4 + 1$ کی تجزی کریں

حل:

$$\begin{aligned}
 & x^8 + x^4 + 1 \\
 &= (x^8 + 1) + x^4 \\
 &= \{(x^4)^2 + (1)^2 + 2(x^4)(1)\} - 2(x^4)(1) + x^4 \quad [2(x^4)(1) \text{ جمع اور تفریق کرنے سے}] \\
 &= (x^4 + 1)^2 - x^4 \\
 &= (x^4 + 1)^2 - (x^2)^2 \\
 &= \{(x^4 + 1) - x^2\} \{(x^4 + 1) + x^2\} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\
 &= \{(x^4 + x^2 + 1)\} \{(x^4 - x^2 + 1)\} \\
 &= \{(x^2 + 1)^2 - 2x^2 + x^2\} \{(x^4 - x^2 + 1)\} \\
 &= \{(x^2 + 1)^2 - x^2\} \{(x^4 - x^2 + 1)\} \\
 &= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)(x^4 - x^2 + 1) \text{ مطلوبہ اجزاء ضربی ہیں۔}
 \end{aligned}$$

قسم ii $x^2 + px + q$

اس طرح کے اظہاریوں کی تجزی کے لیے درمیانی رقم کو دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں۔

مثال 01: $y^2 + 7y + 12$ کی تجزی کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 & y^2 + 7y + 12 \\
 &= y^2 + 3y + 4y + 12 \\
 &= y(y + 3) + 4(y + 3) \\
 &= (y + 3)(y + 4)
 \end{aligned}$$

مثال 02: $x^2 + 13xy - 30y^2$ کی تجزی کریں

حل:

$$\begin{aligned}
 & x^2 + 13xy - 30y^2 \\
 &= x^2 + 15xy - 2xy - 30y^2 \\
 &= x(x + 15) - 2y(x + 15) \\
 &= (x + 15)(x - 2y)
 \end{aligned}$$


قسم (iii) $ax^2 + bx + c, a \neq 0$

$ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کی تجزی کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدام کی ضرورت ہے۔

(i) ac کی حاصل ضرب معلوم کرنا جہاں a عددی سر ہے x^2 کا اور c ایک مستقل ہے۔

(ii) x_1 اور x_2 دو اعداد معلوم کرنا اس طرح $x_1 + x_2 = b$ اور $x_1 x_2 = ac$

مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ کار مددگار ہے۔



مثال :01 $10x^2 - 19xy + 6y^2$ کی تجزی کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} & 10x^2 - 19xy + 6y^2 \\ &= 10x^2 - 15xy - 4xy + 6y^2 \\ &= 5x(2x - 3y) - 2y(2x - 3y) \\ &= (2x - 3y)(5x - 2y) \end{aligned}$$

مثال :02 $4x^2 + 12x + 5$ کی تجزی کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} & 4x^2 + 12x + 5 \\ &= 4x^2 + 10x + 2x + 5 \\ &= 2x(2x + 5) + 1(2x + 5) \\ &= (2x + 5)(2x + 1) \end{aligned}$$

مشق 4.2

1. مندرجہ ذیل کی تجزی کریں

(i) $a^4 + a^2x^2 + x^4$

(ii) $b^4 + b^2 + 1$

(iii) $a^8 + a^4x^4 + x^8$

(iv) $z^8 + z^4 + 1$

2. تجزی کریں

(i) $x^4 + 4y^4$

(ii) $36x^4z^4 + 9y^4$

(iii) $4t^4 + 625$

(iv) $4t^4 + 1$

3. اجزاء ضربی میں حل کریں

(i) $x^2 + 3x - 10$

(ii) $a^2b^2 - 3ab - 10$

(iii) $y^2 + 7y - 98$

(iv) $x^2y^2z^2 + 2xyz - 24$

4. اجزاء ضربی میں حل کریں

(i) $9y^2 + 21yz - 8z^2$

(ii) $42x^2 - 8x - 2$

(iii) $4x^2 + 12x + 5$

(iv) $3x^2 - 38xy - 13y^2$



6. اجزاء ضربی حل کریں۔

قسم iv: $(ax^2 + bx + c)(ax^2 + bx + d) + k$

$(x+a)(x+b)(x+c)(x+d) + k$

$(x+a)(x+b)(x+c)(x+d) + kx^2$

اس طرح کے اظہاریوں کی حاصل ضرب کے طریقہ کار کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں کی مدد سے کرتے ہیں۔

مثال 01: $(x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) - 120$ کی تجزی کریں۔

حل: $(x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) - 120$

فرض کریں کہ $x^2 + 5x = t$ تو

$$(t+4)(t+6) - 120$$

$$= t^2 + 10t + 24 - 120$$

$$= t^2 + 10t - 96$$

$$= t^2 - 6t + 16t - 96$$

$$= t(t-6) + 16(t-6)$$

$$= (t-6)(t+16)$$

$$= (x^2 + 5x - 6)(x^2 + 5x + 16) \quad \because t = x^2 + 5x$$

$$= (x^2 - x + 6x - 6)(x^2 + 5x + 16)$$

$$= [x(x-1) + 6(x-1)](x^2 + 5x + 16)$$

$$= (x-1)(x+6)(x^2 + 5x + 16)$$

(بہ ذریعہ تجزی)

مثال 02: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 15$ کی تجزی کریں۔

$$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 15$$


$$\text{Here } 1+4 = 2+3 = 5$$

$$(x+1)(x+4)(x+2)(x+3) - 15$$

$$= (x+1)(x+4)(x+2)(x+3) - 15$$

حل:

یہاں پر



$$\begin{aligned}
&= (x^2+5x+4)(x^2+5x+6) - 15 \\
&= (t+4)(t+6) - 15 \quad \text{یہاں } t = x^2+5x \\
&= t^2+10t+24-15 \\
&= t^2+10t+9 \\
&= (t+1)(t+9) \\
&= (x^2+5x+1)(x^2+5x+9) \quad \therefore t = x^2+5x
\end{aligned}$$

مثال 03: $(x+2)(x-2)(x-3)(x+3)+(-2x^2)$ کی تجزی کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
&(x+2)(x-2)(x-3)(x+3)+(-2x^2) \\
&= (x+2)(x-2)(x-3)(x+3)+(-2x^2) \\
&= (x^2-2^2)(x^2-3^2)-2x^2 \quad [\because (a+b)(a-b)=a^2-b^2] \\
&= (x^2-4)(x^2-9)-2x^2 \\
&= x^4-9x^2-4x^2+36-2x^2 \\
&= x^4-15x^2+36 \\
&= x^4-3x^2-12x^2+36 \\
&= x^2(x^2-3)-12(x^2-3) \\
&= (x^2-3)(x^2-12) \\
&= [(x)^2-(\sqrt{3})^2][(x)^2-(2\sqrt{3})^2] \\
&= (x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})(x-2\sqrt{3})(x+2\sqrt{3})
\end{aligned}$$

مشق 4.3

1. مندرجہ ذیل کی تجزی کریں۔

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (i) $(x^2-4x-5)(x^2-4x-12)-144$ | (ii) $(x^2+5x+6)(x^2+5x+4)-3$ |
| (iii) $(x^2-2x+3)(x^2-2x+4)-42$ | (iv) $(x^2-8x+4)(x^2-8x-4)+15$ |
| (v) $(x^2+9x-1)(x^2+9x+5)-7$ | (vi) $(x^2-5x+4)(x^2-5x+6)-120$ |

2. تجزی کریں

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (i) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)-48$ | (ii) $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24$ |
| (iii) $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)-99$ | (iv) $(x-3)(x-5)(x-7)(x-9)+15$ |
| (v) $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)-224$ | (vi) $(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)-345$ |



3. اے ضربی معلوم کریں۔

(i) $(x-2)(x-3)(x+2)(x+3) - 2x^2$

(ii) $(x-1)(x+1)(x+3)(x-3) - 3x^2 - 23$

(iii) $(x-1)(x+1)(x-3)(x+3) + 4x^2$

(iv) $(x-2)(x+2)(x-4)(x+4) - 14x^2$

(v) $(x+5)(x+2)(x-5)(x-2) + 4x^2$

(vi) $(x^2 - x - 12)(x^2 - x - 12) - x^2$

قسم (v) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ اور $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3$



اور $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3$

مندرجہ ذیل مثالیں اس طرح کے اظہاریوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو گئی۔

مثال 01: (i) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$ (ii) $64x^3 - 12x^2 + \frac{3x}{4} - \frac{1}{64}$ کی تجزی کریں

حل: (i) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$
 $= (2x)^3 + 3(2x)^2(y) + 3(2x)(y)^2 + (y)^3$ [$\because (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3) = (a+b)^3$]
 $= (2x+y)^3$.

حل: (ii) $64x^3 - 12x^2 + \frac{3x}{4} - \frac{1}{64}$
 $= (4x)^3 - 3(4x)^2\left(\frac{1}{4}\right) + 3(4x)\left(\frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^3$ [$\because (a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3) = (a-b)^3$]
 $= \left(4x - \frac{1}{4}\right)^3$



مشق 4.4

1. مندرجہ ذیل کی تجزی کریں۔

(i) $b^3 + 3b^2c + 3bc^2 + c^3$

(ii) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$

(iii) $64x^3 + 12x^2 + 3x + \frac{1}{64}$

(iv) $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$

(v) $\frac{1}{27} + \frac{1}{3}y^2 + y^4 + y^6$

(vi) $\frac{8}{27}x^3 + 2x^2y + 3xy + \frac{27}{8}y^3$

(vii) $\frac{64}{9} + \frac{16}{3}x + 4x^2 + x^3$

(viii) $\frac{z^3}{8} + \frac{z^2y}{4} + \frac{zy^2}{6} + \frac{y^3}{27}$

2. اجزاء ضربی معلوم کریں۔

(i) $d^3 - 6d^2c + 12dc^2 - 8c^3$

(ii) $x^6 + \frac{16}{3}x^2 - 4x^4 - \frac{64}{27}$

(iii) $\frac{x^3}{125} - \frac{3}{25}x^2y + \frac{3}{5}xy^2 - y^3$

(iv) $125z^3 - 75z^2y^2 + 15zy^4 - y^6$

(v) $\frac{z^3}{27} - 2z^2y + 36zy^2 - 216y^3$

(vi) $\frac{b^6}{27} - \frac{b^4c^2}{6} + \frac{b^2c^4}{4} - \frac{c^6}{8}$

(vii) $216 + \frac{9z^2}{2} - 54z - \frac{z^3}{8}$

(viii) $\frac{8}{27}x^3 - 2x^2y + \frac{9}{2}xy^2 - \frac{27}{8}y^3$

قسم vi: $a^3 \pm b^3$

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے۔ کہ

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2),$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2) \text{ اور}$$

مندرجہ ذیل مثالیں اس طرح کے اظہاریوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔

مثال 01: $8x^3 + 27$ کی تجزی کریں

حل:

$$\begin{aligned} & 8x^3 + 27 \\ &= (2x)^3 + (3)^3 \\ &= (2x+3)[(2x)^2 - (2x)(3) + (3)^2] \quad [\because a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)] \\ &= (2x+3)(4x^2 - 6x + 9) \\ &\text{اس لیے } 8x^3 + 27 = (2x+3)(4x^2 - 6x + 9) \text{ ہے۔} \end{aligned}$$



مثال 02: $108x^4 - 256xz^3$ کی تجزی کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 & 108x^4 - 256xz^3 \\
 &= 4x(27x^3 - 64z^3) \\
 &= 4x[(3x)^3 - (4z)^3] \quad [\because a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)] \\
 &= 4x(3x-4z)[(3x)^2 + (3x)(4z) + (4z)^2] \\
 &= 4x(3x-4z)(9x^2 + 12xz + 16z^2) \\
 & 108x^3 - 256xz^3 = 4x(3x-4z)(9x^2 + 12xz + 16z^2) \text{ اس لیے}
 \end{aligned}$$

مشق 4.5

1. مندرجہ ذیل کی تجزی کریں۔

(i) $x^3 + 8y^3$ (ii) $a^{11} + a^2b^9$ (iii) $a^6 + 1$ (iv) $a^3b^3 + 512$

(v) $a^3b^3 + 27b^6$ (vi) $\frac{x^3}{125} + \frac{125}{x^3}$ (vii) $x^9 + x^3y^6z^9$ (viii) $\frac{x^6}{27} + \frac{8}{x^3}$

2. اجزاء ضربی معلوم کریں

(i) $x^3 - 8y^3$ (ii) $x^9 - 8y^9$ (iii) $1000 - \frac{x^3y^3}{125}$ (iv) $a^6 - b^6$

(v) $\frac{x^6}{64} - \frac{64}{x^{12}}$ (vi) $x^{12} - y^{12}$ (vii) $\frac{27}{x^3} - 8y^6$ (viii) $8x^6 - \frac{1}{729}$

4.2 مسئلہ باقی اور مسئلہ اجزاء ضربی۔

مسئلہ باقی اور مسئلہ اجزاء ضربی اکھرتین یا زیادہ رقوم والے کثیر رقمی اظہاریوں کے اجزاء معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔


4.2.1 مسئلہ باقی بیان کریں اور ثابت کریں اور مثالوں سے وضاحت کریں۔

بیان

جب ایک کثیر رقم $p(x)$ کا درجہ $n \geq 1$ سے تقسیم ہوتا ہو تو باقی $(x-a)$ ہوتا ہے۔

ہم $R = p(a)$ کو R کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ $p(x), p(x) = q(x)(x-a) + R$

(جسے الگوریثم تقسیم کہا جاتا ہے) جہاں پر R ایک مستقل اور درجہ $q(x)$ سے کم ہوتا ہے۔ جو $p(x)$ پر



ثبوت:

الگوریتم تقسیم کے ذریعے:

$$p(x) = q(x)(x-a) + R,$$

فرض کریں کہ $x=a$

$$p(a) = q(a) \times (a-a) + R,$$

$$p(a) = q(a) \times 0 + R$$

$$\Rightarrow p(a) = R = \text{باقی}$$

4.2.2 باقی معلوم کریں (بغیر تقسیم) جب ایک کثیر رقمی اظہاریہ ایک درجی کثیر رقمی سے تقسیم ہو۔

مندرجہ ذیل مثالیں ہمیں مسئلہ باقی استعمال کرنے میں مدد کریں گے۔

مثال 01: $x^2 - 3x + 4$ باقی معلوم کریں جبکہ $x-2$ سے تقسیم ہو۔

حل: فرض کریں کہ: $p(x) = x^2 - 3x + 4$

یہاں پر $a=2$ بریجہ مسئلہ باقی۔

$$p(2) = (2)^2 - 3(2) + 4$$

$$= 4 - 6 + 4 = 8 - 6 = 2$$

$$p(2) = R = 2 \quad \text{باقی 2 بچے}$$

مثال 02: k کی قیمت معلوم کریں اگر $x^3 + kx^2 + 3x - 4$ کثیر رقمی اظہاریہ $x+2$ سے تقسیم ہو۔ باقی 2 بچے۔

حل: یہاں پر $p(x) = x^3 + kx^2 + 3x - 4$

$$\therefore p(-2) = (-2)^3 + k(-2)^2 + 3(-2) - 4$$

$$\Rightarrow -2 = 4k - 18 \quad (\text{باقی 2 بچے})$$

$$\Rightarrow 4k = -2 + 18$$

$$\Rightarrow 4k = 16$$

$$\Rightarrow k = 4,$$

4.2.3 اظہاریہ کا صفر۔

فرض کریں کہ $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ حقیقی عدد سرے کے ساتھ ایک کثیر رقمی اظہاریہ ہے۔ $x=a$ کثیر رقمی اظہاریہ میں $p(x)$ شامل کرنے سے $p(x)$ کی قیمت صفر ہو جائے تو $p(a)=0$ پھر a کو اظہاریہ $p(x)$ کا صفر کہا جاتا ہے۔

مثال 01: اگر $p(x) = x+7$ تو پھر 7 اظہاریہ کا صفر ہے۔ $p(-7) = -7+7=0$

4.2.4 مسئلہ اجزاء ضربی بیان کریں اور ثابت کریں۔

بیان:

$x-a$ ایک درجی اظہاریہ ایک کثیر رقمی اظہاریہ کا جز ضربی ہے، اگر $p(x), p(a) = 0$ ثابتی:

$q(x)$ فرض کریں کہ R خارج قسمت ہے اور $p(x)$ باقی ہے، جب ایک کثیر رقمی اظہاریہ $x-a$ سے تقسیم ہوتا ہو۔ پھر بذریعہ الگوریثم تقسیم ہمارے پاس ہے۔

$$p(x) = (x-a)q(x) + R.$$

بذریعہ مسئلہ باقی۔

اسی طرح $R = p(a)$

$$p(x) = q(x)(x-a) + p(a)$$

اگر $p(a) = 0$ ، پھر $p(x) = q(x)(x-a)$ اس طرح $(x-a)$ کا ایک جز ضربی ہے $p(x)$ ۔ مندرجہ ذیل مثالیں ہمیں مسئلہ جز ضربی استعمال کرنے میں مدد کریں گے۔

مثال 01: بتائیں کہ $x+2$ کا جز ضربی ہے۔ $x^3 + \frac{9}{2}x^2 + 3x - 4$ یا نہیں۔

حل: فرض کریں کہ $p(x) = x^3 + \frac{9x^2}{2} + 3x - 4$

$$\therefore R = p(-2) = (-2)^3 + \frac{9}{2}(-2)^2 + 3(-2) - 4$$

$$= -8 + 18 - 6 - 4$$

$$= -18 + 18 = 0 \Rightarrow R = 0,$$

باقی 0 ہے۔

$\therefore p(x)$ کا جز ضربی ہے۔ $x+2$

مثال 02: بتائیے کہ $x+3$ کا جز ضربی ہے یا نہیں۔ $x^3 - x^2 - 8x + 12$

حل: فرض کریں کہ

$$p(x) = x^3 - x^2 - 8x + 12$$

$$R = p(-3) = (-3)^3 - (-3)^2 - 8(-3) + 12$$

$$= -27 - 9 + 24 + 12$$

$$R = p(-3) = -36 + 36 = 0$$

$x+3$ کا جز ضربی ہے۔ $x^3 - x^2 - 8x + 12$

مشق 4.6

1. مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجیے جبکہ۔

(i) $x^3 - 6x^2 + 11x - 8$ کو $(x-1)$ سے تقسیم کیا جائے۔

(ii) $x^3 + 6x^2 + 11x + 8$ کو $(x+1)$ سے تقسیم کیا جائے۔

(iii) $x^3 - x^2 + 14$ کو $(x-2)$ سے تقسیم کیا جائے۔

(iv) $x^3 - 3x^2 + 4x - 14$ کو $(x+2)$ سے تقسیم کیا جائے۔

(v) $(2y-1)^3 + 6(3+4y) - 9$ کو $(2y+1)$ سے تقسیم کیا جائے۔

(vi) $4y^3 - 4y + 3$ کو $(2y-1)$ سے تقسیم کیا جائے۔

(vii) $(2y+1)^3 - 6(3-4y) - 10$ کو $(2y-1)$ سے تقسیم کیا جائے۔

(viii) $x^4 + x^2y^2 + y^4$ کو $(x-y)$ سے تقسیم کیا جائے۔

2. m کی قیمت معلوم کریں، اگر $p(y) = my^3 + 4y^2 + 3y - 4$ اور $q(y) = y^3 - 4y + m$ کو $(y-3)$ سے تقسیم کیا جائے تو باقی مشترک نہ بنے۔

3. اگر کثیر رقمی $4x^3 - 7x^2 + 6x - 3k$ کو $(x+2)$ سے مکمل تقسیم ہوتا ہو تو k کی قیمت معلوم کریں۔

4. اگر $(y+2)$ کثیر رقمی $3y^2 - 4ry - 4r^2$ کا جز ضربی ہے تو r کی قیمت معلوم کریں۔

4.3 مصنوعی تقسیم

مصنوعی تقسیم کثیر رقمی اظہاریے کو یک درجہ کثیر رقمی اظہاریے سے تقسیم کرنے کا طریقہ ہے۔

4.3.1 مصنوعی تقسیم کا طریقہ بیان کریں۔

مصنوعی تقسیم کا طریقہ مندرجہ ذیل مثال میں بیان کیا ہے۔

مثال 01: مصنوعی تقسیم کا طریقہ استعمال کر کے $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 7$ کو $(x-1)$ سے تقسیم کریں۔

حل: یہاں پر $x=1 \Rightarrow x-1=0$ ، (جز ضربی ہے)

کثیر رقمی کے عدد سرے لکھنے پر

1	1	-3	5	7	(قطار-1)
		1	-2	3	(قطار-2)
	1	-2	3	10=R	(قطار-3)





تفصیل:

قدم i: کثیر رمتی $p(x)$ کے عدد سرے اور مستقل ترتیب نزولی سے پہلی قطار میں لکھیں۔

قدم ii: قطار 3 میں پہلا عددی سر اپنی جگہ قطار 1 کے نیچے لکھیں۔

قدم iii: جزو ضربی اور قطار 3 کے پہلے عددی سری کی حاصل ضرب قطار 2 میں قطار 1 کے سری عددی سرے کے نیچے لکھیں۔
قطار 1 اور قطار 2 کے دوسرے عددی سرے جمع کر کے نیچے قطار 3 میں لکھیں۔ یہ عمل اگلے عددی سرے کے لیے دہرائیں۔
اسی طرح $q(x) = x^2 - 2x + 3$ اور $p(1) = R = 10$

نوٹ: $q(x)$ کا درجہ $= [p(x) \text{ درجہ}] - 1 = 3 - 1 = 2$ اور قطار 3 کا آخری جزو باقی ہے۔

4.3.2 مصنوعی تقسیم استعمال کر کے۔

(a) خارج قسمت اور باقی معلوم کریں، جبکہ کثیر رمتی یک درجہ کثیر رمتی سے تقسیم ہو۔

(b) نا معلوم کی قیمت معلوم کریں، اگر کثیر رمتیوں کا صفر دیا گیا ہو۔

(c) نا معلوم کی قیمت معلوم کریں، اگر کثیر رمتیوں کے اجزاء دیے گئے ہوں

مثال 01: خارج قسمت اور باقی معلوم کریں۔

جب $p(x) = x^4 - 12x^3 + 50x^2 - 84x + 49$ کو $x - 5$ سے تقسیم کیا جائے۔

حل: معلوم ہے کہ: $p(x) = x^4 - 12x^3 + 50x^2 - 84x + 49$

اور یک درجہ کثیر رمتی 5 ، i.e., $a = x - 5$ ، جیسا کہ $5 =$ جزو ضربی ہے۔


$p(5) = R = ?$ and $q(x) = ?$

مصنوعی تقسیم کے استعمال سے خارج قسمت اور باقی معلوم کریں گے۔ ذیل مثال میں واضح ہے۔

5	1	-12	50	-84	49	قطار (1)
		5	-35	75	-45	قطار (2)
	1	-7	15	-9	4 = R	قطار (3)

اسی طرح $q(x) = x^3 - 7x^2 + 15x - 9$ خارج قیمت اور باقی $R = 4$ ہے۔

نوٹ: $R \neq 0$ اس لیے $(x - 5)$ معلوم شدہ کثیر رمتی کا جزو ضربی نہیں ہے۔



مثال 02: کی کسی قیمت کے لیے 1 کثیر رتی کا صفر ہے۔

$$p(x) = x^3 - mx^2 + x - 1$$

حل: معلوم ہے کہ $p(x) = x^3 - mx^2 + x - 1$

یہاں پر جزو ضربی $a = 1$ ہے۔

تو مصنوعی تقسیم کے طریقے مطابق

1	1	$-m$	1	-1	(قطار 1)
		1	$1 - m$	$2 - m$	(قطار 2)
	1	$1 - m$	$2 - m$	$1 - m = R,$	(قطار 3)

جیسا کہ 1 کثیر رتی کا صفر ہے اس لیے $x - 1$ $\therefore p(x)$ ایک جزو ضربی ہے۔
یہاں پر $R = 0$

$$\Rightarrow 1 - m = 0$$

$$\Rightarrow m = 1$$

تو پھر کثیر رتی کے صفر کے لیے m $p(x)$ ہے۔

مشق 4.7

1. مصنوعی تقسیم کی مدد سے مندرجہ ذیل کثیر رتی اظہاریوں کو تقسیم کریں اور خارج قسمت اور باقی بھی معلوم کریں۔

(i) $p(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ by $x - 1$

(ii) $p(x) = x^3 - x^2 - x - 1$ by $x + 1$

(iii) $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ by $x + 2$

(iv) $p(x) = x^3 + 6x^2 - 11x - 6$ by $x - 2$

(v) $p(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x - 1$ by $x + 2$

(vi) $p(x) = x^4 + x^3 - x^2 + x - 1$ by $x - 1$

(vii) $p(x) = x^5 + x^3 - 2x^2 - 3$ by $x + 3$

(viii) $p(x) = x^5 - x^4 + x^3 - 3x^2 + 6x - 6$ by $x - 3$

(ix) $p(x) = 2x^4 - 2x^3 + 100x^2 - 168x + 95$ by $x - 2$

(x) $p(x) = 6x^4 - 72x^3 + 300x^2 - 564x + 270$ by $x - 5$

2. k کی کس قیمت کے لیے کثیر رتی $p(x) = x^3 + x^2 - 14x - k$ کا صفر 2 ہے۔

3. m کی کس قیمت کے لیے $(x - 2)$ جزو ضربی ہو گا $x^3 + mx^2 - 7x - 10$ کا

4. m کی کس قیمت کے لیے $(x + 2)$ جزو ضربی ہو گا $4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ کا۔

5. m کی کس قیمت کے لیے کثیر رتی $p(x) = 2x^3 - 4mx^2 + x - 1$ کا صفر -1 ہو گا۔



4.4 تین درجی کثیر رقتی اظہاریوں کی اجزاء تجوی۔

ہم پہلے ہی یک درجی اور دو درجی کثیر رقتی اظہارے حل کرنے کا طریقہ پڑھ آئے ہیں۔ اب ہم مسئلہ اجزاء ضربی کا استعمال کر کے تین درجی کثیر رقتی اظہاریوں کے اجزاء ضربی معلوم کریں گے۔

4.4.1 مسئلہ اجزاء ضربی کی مدد سے اجزاء ضربی معلوم کرنا۔ کثیر رقتی اظہاریوں کا ایک جزو ضربی یا زیادہ صفر معلوم ہونا ضروری ہے۔

مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں۔

مثال 01: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ کے اجزاء ضربی معلوم کریں۔

حل: فرض کریں کہ $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

6 کے اجزاء ضربی $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

$$p(1) = (1)^3 - 6(1)^2 + 11(1) - 6$$

$$p(1) = 1 - 6 + 11 - 6$$

$$p(1) = 0$$

$x-1$ اس لیے $p(x)$ کا جزو ضربی ہے۔

مصنوعی تقسیم کے ذریعے۔

1	1	-6	11	-6	قطار 1:
		1	-5	6	قطار 2:
	1	-5	6	0	قطار 3:

$$p(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6)$$

$$= (x-1)\{x^2 - 2x - 3x + 6\}$$

$$= (x-1)\{x(x-2) - 3(x-2)\}$$

$$p(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$$

مثال 02: $x^3 - 4x^2 + x + 6$ کے اجزاء ضربی معلوم کریں۔

حل: 6 کے اجزاء ضربی $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

اگر $x-1$ کا جزو ضربی ہے $p(x)$

$$p(1) = (1)^3 - 4(1)^2 + 1 + 6$$

$$= 1 - 4 + 1 + 6$$

$$= 4 \neq 0$$



اس لیے $x-1$ کا جزو ضربی نہیں ہے۔ $p(x)$

اگر $x+1$ کا جزو ضربی ہے $p(x)$

$$\begin{aligned} p(-1) &= (-1)^3 - 4(-1)^2 + 1(-1) + 6 \\ &= -1 - 4 - 1 + 6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

اس لیے $x-1$ کا جزو ضربی ہے۔ $p(x)$
بذریعہ مصنوعی تقسیم

-1	1	-4	1	6	1
		-1	5	-6	2
	1	-5	6	0	3

$$\begin{aligned} p(x) &= (x+1)(x^2 - 5x + 6) \\ &= (x+1)\{x^2 - 2x - 3x + 6\} \\ &= (x+1)\{x(x-2) - 3(x-2)\} \\ p(x) &= (x+1)(x-2)(x-3) \end{aligned}$$

مشق 4.8

اجزاء تجزی کا استعمال کرتے ہوئے فیکٹر تلاش کریں۔

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $x^3 - x^2 + x - 1$ | 2. $x^3 + x^2 - x - 1$ | 3. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ |
| 4. $x^3 + 5x^2 - 4x - 20$ | 5. $x^3 - 2x^2 + 9x - 18$ | 6. $6x^3 + 7x^2 - x - 2$ |
| 7. $x^3 + 8x^2 + 19x + 12$ | 8. $2x^3 + 9x^2 + 10x + 3$ | 9. $x^3 + 12x^2 + 44x + 48$ |

جائزہ مشق 4

1. صحیح اور غلط سوال:

مندرجہ ذیل جملے غور سے پڑھیں اور صحیح کی صورت میں T اور غلط کی صورت میں F پر گول دائرہ لگائیں۔

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| (i) $x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$ | T/F |
| (ii) $a^3 + 27 = (a+3)(a^2 - 3a + 9)$ | T/F |
| (iii) $b^3 - 8 = (b-2)(b^2 + 2b + 4)$ | T/F |



- (iv) $a^4 - b^4 = (a - b)(a + b)(a + b)^2$ T/F
 (v) $a^6 + b^6 = (a^3 + b^3)(a^3 - b^3)$ T/F
 (vi) $a^5 + b^5 = (a + b)^5$ T/F

2. مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے۔

- (i) $16x^2 - y^4 = (4x - y^2)$ _____
 (ii) $x^3 - 64y^3 = (x - 4y)$ _____
 (iii) $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)$ _____
 (iv) $x^2 + y^2 = (x - y)^2$ _____
 (v) $a^3 + 27b^3 = (a + 3b)$ _____

3. درست جواب پر ٹک (✓) لگائیے۔
 (i) $a^2 + 2a - 24$ کے اجزاء ضربی ہیں:

- (a) $a + 4, a - 6$ (b) $a - 4, a + 6$
 (c) $a + 3, a - 8$ (d) $a + 8, a - 3$

(ii) $a^2 + 2ab + b^2 - c^2$ کی اجزاء ضربی ہیں:

- (a) $(a - b + c)(x - b - c)$ (b) $(a + b + c)(a - b - c)$
 (c) $(a + b + c)(a + b - c)$ (d) $(a + b + c)(a - b - c)$

(iii) $x^3 + y^3$ کے اجزاء ضربی ہیں:

- (a) $(x - y)(x^2 + xy + y^2)$ (b) $(x + y)(x^2 + xy + y^2)$
 (c) $(x + y)(x^2 + xy - y^2)$ (d) $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$

(iv) $y^3 - 27z^3$ کے اجزاء ضربی ہیں:

- (a) $y - 3z, y^2 + 3yz + 9z^2$ (b) $y - 3z, y + 3z + 9z^2$
 (c) $y - 3z, y^2 - 3yz + 9z^2$ (d) $y + 3z, y^2 - 3yz + 9z^2$

(v) $\frac{1}{x + y} + \frac{y}{x^2 - y^2}$ کی مختصر صورت ہے:

- (a) $\frac{y + 1}{x^2 - y^2}$ (b) $\frac{x}{x^2 - y^2}$
 (c) $\frac{y}{x^2 - y^2}$ (d) $\frac{y - 1}{x^2 - y^2}$

(vi) m کی قیمت کیا ہے جب $x^2 + 4x + m$ مکمل مربع ہے۔

- (a) 8 (b) -8
 (c) 4 (d) -4



خلاصہ

عمل تجربی وہ عمل ہے جس میں ہم دیئے گئے کثیر رقتی اظہارات کو دو یا زیادہ اظہارات کی حاصل ضرب کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔

ہم مندرجہ ذیل قسم کے فارمولوں کے عوامل کو سیکھیں گے اور حل کریں گے۔

- (i) $ka + kb + kc = k(a + b + c)$
- (ii) $\underline{ac + ad} + \underline{bc + bd} = a(c + d) + b(c + d) = (a + b)(c + d)$
- (iii) $a^2 + 2ab + b^2 = (a)^2 + 2(a)(b) + (b)^2 = (a + b)^2$
- (iv) $a^2 - 2ab + b^2 = (a)^2 - 2(a)(b) + (b)^2 = (a - b)^2$
- (v) $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

مسئلہ باقی اور مسئلہ اجزاء ضربی دو اہم مسائل ہیں۔ یہ اجزاء ضربی معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایسی اقسام کے کثیر رقتی اظہارات جو دیئے گئے فارمولوں سے حل نہیں ہو سکتے۔

- (i) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$
- (ii) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3$
- (iii) $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- (iv) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

کثیر رقتی اظہارات کا صفر۔

اگر کثیر رقتی 'x' میں ایک مخصوص عدد $x = a$ متغیر $p(x)$ کا متبادل ہے اسی طرح $p(a)$ کی قیمت صفر ہے، تو پھر 'a' کو کثیر رقتی $p(x)$ کا صفر کہا جاتا ہے۔


مسئلہ اجزاء ضربی بھی بیاں کر سکتے ہیں جیسے: یک درجہ کثیر رقتی $(x - a)$ کثیر رقتی $p(x)$ کا جزو ضربی ہے۔ اگر $p(a) = 0$

مصنوعی تقسیم کے طریقہ کار کا تفصیل

قدم 1: کثیر رقتی $p(x)$ کو x کی قوت نما کے لحاظ سے ترتیب نزولی میں کر کے عددی سرے اور مستقل قطار 1 میں لکھیں۔

قدم 2: قطار 3 میں پہلا عدد سر اپنی جگہ قطار 1 کے نیچے لکھیں۔

قدم 3: جزو ضربی اور قطار 3 کے پہلے عددی سرے کی حاصل ضرب قطار 2 میں قطار 1 دوسرے عددی سرے کے نیچے لکھیں۔ قطار 1 اور قطار 2 کے عددی سرے جمع کر کے نیچے قطار 3 میں لکھیں یہ عمل اگلے عددی سرے کے لیے دہرائیں۔



ALGEBRAIC MANIPULATION

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- اجزاء ضربی سے الجبر اظہارات کا مشترک عاذا عظم HCF اور ذواضعاف اقل (LCM) معلوم کر سکیں گے۔
- بذریعہ تقسیم مشترک عاذا عظم HCF اور ذواضعاف اقل (LCM) معلوم کر سکیں گے۔
- عاذا عظم وارذواضعاف اقل کے بیچ میں تعلق جان پائیں گے۔
- عاذا عظم اور ذواضعاف اقل سے متعلق حقیقی زندگی کے مسائل (حساب) حل کریں گے۔
- عاذا عظم اور ذواضعاف اقل کو استعمال کر کے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم پر مشتمل کسوری اظہار مختصر کریں گے۔
- بذریعہ اجزاء ضربی اور بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کر پائیں گے۔

تعارف:

الجبری توڑ پھوڑ کا تعلق الجبری اظہارات کی ہیرا پھیری سے ہے۔ اکثر مختصر صورت میں یا ایسی صورت جو زیادہ آسانی سے سمجھا جاسکے۔ یہ الجبری اظہار کے مسئلے (حساب) حل کرنے میں ایک بنیادی، ضروری اور اہم مہارت ہے۔ اس یونٹ میں ہم الجبری اظہارات کی بذریعہ اجزاء ضربی اور تقسیم عادا (HCF) اور ذواضعاف اقل (LCM) معلوم کرنے اور روزمرہ زندگی میں استعمال پر بحث کریں گے۔

5.1 عادا عظم HCF اور ذواضعاف اقل LCM۔

5.1.1 بذریعہ اجزاء ضربی عادا عظم اور ذواضعاف اقل معلوم کرنا۔
(a) بذریعہ اجزاء ضربی عادا عظم معلوم کرنا۔ دیئے گئے اظہارات کا عادا عظم HCF کرنے کے لیے، پہلے ہم کثیر رقصی اظہارات کئے اجزاء ضربی معلوم کریں گے۔ پھر ہم ان کے عام (مشترکہ) اجزاء کو صنب کریں گے۔ مشترکہ اجزاء کی اس حاصل ضرب کو بذریعہ اجزاء ضربی عادا عظم HCF کی طرح جانا جاتا ہے۔

نوٹ: مشترکہ جزو ضربی نہ ہونے کی حالت میں عادا عظم HCF 1 ہوگا۔

مثال 01: اجزاء ضربی کے استعمال سے مندرجہ ذیل کا عادا عظم HCF معلوم کریں۔

(i) $x^2 + x - 20$ اور $x^2 + 12x + 35$

(ii) $(x + 1)^2, x^2 - 1$ اور $x^2 + 4x + 3$


حل (i): ہم دیئے گئے اظہارات $x^2 + x - 20$ اور $x^2 + 12x + 35$ کے اجزاء معلوم کریں گے جو اس طرح ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + x - 20 &= x^2 + 5x - 4x - 20 \\ &= x(x + 5) - 4(x + 5) \\ &= (x + 5)(x - 4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 + 12x + 35 &= x^2 + 7x + 5x + 35 \\ &= x(x + 7) + 5(x + 7) \\ &= (x + 5)(x + 7) \end{aligned}$$

دونوں اظہارات میں $(x + 5)$ مشترکہ جزو ضربی ہے۔

اس لیے عادا عظم HCF = $x + 5$ ہے۔





حل (ii): ہم دیے گئے اظہار کے اجزاء ضربی معلوم کریں گے۔

$$(x+1)^2 = (x+1)(x+1) \quad \text{جو ہیں۔}$$

$$x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$$

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + 3 &= x^2 + 3x + x + 3 \quad \text{اور} \\ &= x(x+3) + 1(x+3) \\ &= (x+3)(x+1) \end{aligned}$$

تینوں اظہارات میں مشترکہ جزو ضربی $(x+1)$ ہے۔

اس لیے $x+1$ عدا اعظم HCF ہے۔

مثال 02: اجزاء ضربی کا طریقہ استعمال کر کے مندرجہ ذیل اظہارات کا عدا اعظم معلوم کریں۔

$$a^3 - b^3, a^6 - b^6$$

حل:

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^6 - b^6 = (a^2)^3 - (b^2)^3$$

$$= (a^2 - b^2)\{(a^2)^2 + a^2b^2 + (b^2)^2\}$$

$$= (a-b)(a+b)\{(a^2)^2 + 2a^2b^2 + (b^2)^2 - a^2b^2\}$$

$$= (a-b)(a+b)\{a^4 + b^4 + 2a^2b^2 - a^2b^2\}$$

$$= (a-b)(a+b)(a^2 + b^2 - ab)(a^2 + b^2 + ab)$$

عدا اعظم $HCF = (a-b)(a^2 + b^2 + ab) = a^3 - b^3$ ہے۔

(b) بذریعہ اجزاء ضربی ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

دو یا زیادہ کثیر رقی اظہارات کی ذواضعاف اقل LCM وہ چھوٹے سے چھوٹے درجے کا اظہار ہے جو دیے گئے کثیر رقی اظہارات

سے تقسیم ہوتا ہو۔ بذریعہ اجزاء ضربی ذواضعاف اقل LCM معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل فارمولا استعمال کریں گے۔

ذواضعاف اقل (مشترک اجزاء ضربی کا حاصل ضرب) $\times$ (غیر مشترک اجزاء۔)

مثال 01: $x^2 + x - 6$ اور $x^3 - 8$ کا ذواضعاف اقل معلوم کریں۔ ضربی کا حاصل ضرب

حل: اب $x^2 + x - 6$ اور $x^3 - 8$ اجزاء ضربی معلوم کریں۔

$$\therefore x^3 - 8 = (x)^3 - (2)^3 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$$

$$x^2 + x - 6 = x^2 + 3x - 2x - 6 = x(x+3) - 2(x+3)$$

$$= (x+3)(x-2)$$

مشترک جزو ضربی $(x-2)$ ہے۔

غیر مشترک جزو ضربی $(x^2 + 2x + 4)(x+3)$ ہے۔

ذواضعاف اقل LCM (مشترک اجزاء ضربی) $\times$ (غیر مشترک اجزاء ضربی)

$$\therefore LCM = (x-2)(x^2 + 2x + 4)(x+3) = (x^3 - 8)(x+3)$$



مثال 02: x^3-1, x^3-2x^2+x کا ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

اب x^3-2x^2+x اور x^3-1 کے اجزاء ضربی معلوم کریں۔

$$\therefore x^3-1=(x)^3-(1)^3=(x-1)(x^2+x+1)$$

$$x^3-2x^2+x=x(x^2-2x+1)=x(x-1)^2 \quad \text{اور}$$

∴ ذواضعاف اقل = مشترک اجزاء x غیر مشترک اجزاء

$$\therefore x(x-1)(x+x+1) = \text{ذواضعاف اقل}$$

5.1.2 عاذا عظم HCF اور ذواضعاف اقل کے درمیان تعلق جاننا۔

دو کثیر رقمی اظہار $p(x)$ اور $q(x)$ کا عاذا عظم HCF اور ذواضعاف اقل LCM کے تعلق کو ذیل کی طرح ظاہر کرتے ہیں۔

$$\boxed{\text{عاذا عظم} \times (\text{ذواضعاف اقل}) = (\text{پہلی کثیر رقم}) \times (\text{دوسری کثیر رقم})}$$

$$p(x) = x^2 - 5x + 6 \text{ and } q(x) = x^2 - 9$$

مثال 01: مندرجہ ذیل دیے گئے کثیر رقمی اظہار $p(x)$ اور $q(x)$ کے عاذا عظم اور ذواضعاف اقل معلوم کریں اور تعلق کی تصدیق کریں۔

$$p(x) = x^2 - 5x + 6$$

$$= x^2 - 3x - 2x + 6$$

$$= x(x-3) - 2(x-3)$$

$$= (x-3)(x-2)$$

$$q(x) = x^2 - 9 = (x-3)(x+3) \quad \text{اور}$$

$$\text{اس طرح عاذا عظم H.C.F} = (x-3) \text{ ہے۔}$$

$$\text{اور ذواضعاف اقل L.C.M} = (x-2)(x-3)(x+3) = (x-2)(x^2-9) \text{ ہے۔}$$

اب $p(x)$ اور $q(x)$ کی حاصل ضرب معلوم کریں

$$p(x) \times q(x) = (x^2-5x+6) \times (x^2-9) \quad \dots (i) \quad \text{اس لیے۔}$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = (x-2)(x-3)(x+3) \times (x-3)$$

$$\Rightarrow = (x^2-5x+6) \times (x^2-9) \quad \dots (ii)$$

نتیجہ (i) اور (ii) سے ثابت ہوا کہ

$$\text{ذواضعاف اقل} \times \text{عاذا عظم} = p(x) \times q(x) \quad \text{LCM} \times \text{HCF}$$



مثال 02: مندرجہ ذیل کثیر رقمیوں کا فارمولا کی مدد سے ذواضعاف اقل LCM معلوم کریں۔

$$p(x) = x^2 + 14x + 48 \text{ اور } q(x) = x^2 + 8x + 12$$

حل: اب پہلی ہم $p(x)$ اور $q(x)$ عاذا عظم معلوم کریں گی۔

$$p(x) = x^2 + 14x + 48$$

$$= x^2 + 8x + 6x + 48$$

$$= x(x+8) + 6(x+8)$$

$$= (x+6)(x+8)$$

$$q(x) = x^2 + 8x + 12 \quad \text{اور}$$

$$= x^2 + 6x + 2x + 12$$

$$= x(x+6) + 2(x+6)$$

$$= (x+2)(x+6)$$

اس لیے عاذا عظم HCF $(x+6)$ is $p(x)$ and $q(x)$ ہے۔

$$\therefore \text{LCM} = \frac{p(x) \times q(x)}{\text{HCF}}$$

$$\therefore \text{LCM} = \frac{(x^2 + 14x + 48) \times (x^2 + 8x + 12)}{(x+6)}$$

$$\Rightarrow \text{LCM} = \frac{(x+6)(x+8)(x+2)(x+6)}{(x+6)}$$

اس لیے ذواضعاف اقل $\boxed{\text{LCM} = (x+2)(x+6)(x+8)}$ ہے۔



5.1.3 جزاء ضربی یا تقسیم کے طریقے سے عاذا عظم اور ذواضعاف اقل معلوم کرنا۔

دو یا زیادہ الجبری اظہاریوں کا بذریعہ تقسیم عاذا عظم HCF معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مثالی طریقہ سمجھنے میں مدد کریں گے۔

مثال 01: مندرجہ ذیل اظہاریوں کا بذریعہ تقسیم عاذا عظم HCF معلوم کریں۔

$$2x^3 + 7x^2 + 4x - 4 \text{ and } 2x^3 + 9x^2 + 11x + 2.$$

حل: اصل تقسیم سے ہمیں ملے گا۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2x^3 + 7x^2 + 4x - 4 \overline{) 2x^3 + 9x^2 + 11x + 2} \\ \underline{-2x^3 + 7x^2 + 4x - 4} \\ 2x^2 + 7x + 6 \end{array}$$

دوبارہ،

$$\begin{array}{r} x \\ 2x^2 + 7x + 6 \overline{) 2x^3 + 7x^2 + 4x - 4} \\ \underline{-2x^3 + 7x^2 + 6x + 0} \\ -2x - 4 \end{array}$$

$-2x - 4$ میں سے مشترک 2- خارج کرنے سے

$$\begin{array}{r} 2x+3 \\ x+2 \overline{) 2x^2 + 7x + 6} \\ \underline{-2x^2 + 4x + 0} \\ 3x + 6 \\ \underline{-3x + 6} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

مطلوبہ عاذا عظم HCF $x + 2$ ہے۔

مثال 02: مندرجہ ذیل اظہارات کا بذریعہ تقسیم عاذا عظم معلوم کریں۔


$$x^2 + 2x + 1, x^2 - 1 \text{ اور } x^2 + 4x + 3$$

حل: پہلے ہم دو اظہارات کا عاذا عظم معلوم کریں گے پھر ان کے عاذا عظم سے تیسرے اظہار کا عاذا عظم معلوم کریں گے۔

اب اصل تقسیم سے ہمیں ملے گا۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ x^2 + 2x + 1 \overline{) x^2 + 4x + 3} \\ \underline{x^2 + 2x + 1} \\ 2x + 2 \end{array}$$

$2x + 2$ میں سے مشترک 2+ خارج کرنے سے





دوبارہ

$$\begin{array}{r}
 x+1 \\
 x+1 \overline{) x^2 + 2x + 1} \\
 \underline{-x^2 \pm x + 0} \\
 x+1 \\
 \underline{-x \pm 1} \\
 0 \quad 0
 \end{array}$$

تو $x^2 + 2x + 1$ اور $x^2 + 4x + 3$ کا عدا عظم $x+1$ ہے۔
اب ہم $x+1$ اور $x^2 - 1$ کا عدا عظم معلوم کریں گے۔

$$\begin{array}{r}
 x-1 \\
 x+1 \overline{) x^2 - 1} \\
 \underline{-x^2 \pm x} \\
 -x-1 \\
 \underline{x+1} \\
 0 \quad 0
 \end{array}$$

تینوں کثیر رقمی اظہاریوں کا عدا عظم _____ ہے۔

اب ہم بذریعہ تقسیم ذواضعاف اقل معلوم کریں گی۔

مندرجہ ذیل فارمولا کی مدد سے دو یا زیادہ کثیر رقمیوں کا ذواضعاف اقل معلوم کریں گے۔

$$\frac{\text{کثیر رقمیوں کا حاصل ضرب}}{\text{ذواضعاف اقل کثیر رقمیوں کا عدا عظم}}$$

مثال 03 $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ اور $x^3 - 4x + 3$ کا ذواضعاف اقل LCM معلوم کریں۔

حل: $x^3 - 4x + 3$ اور $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$


$$\begin{array}{r}
 1 \\
 x^3 - 4x + 3 \overline{) x^3 - 6x^2 + 11x - 6} \\
 \underline{-x^3 \quad \quad \quad \mp 4x \pm 3} \\
 -6x^2 + 15x - 9
 \end{array}$$

$$-6x^2 + 15x - 9$$

omit میں سے 3- خارج کرنے سے، $-6x^2 + 15x - 9 = -3(2x^2 - 5x + 3)$

کو 2 سے ضرب دینے $x^3 - 4x + 3$

$$\begin{array}{r}
 x+5 \\
 2x^2 - 5x + 3 \overline{) 2x^3 - 8x + 6} \\
 \underline{-2x^3 \pm 3x \mp 5x^2} \\
 5x^2 - 11x + 6
 \end{array}$$



کو 2 سے ضرب دینے سے، $10x^2 - 22x + 12$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 2x^2 - 5x + 3 \overline{) 10x^2 - 22x + 12} \\ \underline{-10x^2 + 25x + 15} \end{array}$$

$$3x - 3 = 3 \text{ میں سے } 3 \text{ خارج کرنے سے } (x-1)$$

$$\begin{array}{r} 2x-3 \\ x-1 \overline{) 2x^2 - 5x + 3} \\ \underline{-2x^2 + 2x} \\ -3x + 3 \\ \underline{3x + 3} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

تو $HCF = x-1$ ہے عاذا عظم ہے۔


$$\frac{p(x).q(x)}{HCF} = \text{اب ہمیں معلوم ہے کہ}$$

$$\therefore LCM = \frac{(x^3 - 6x^2 + 11x - 6)(x^2 - 4x + 3)}{x-1}$$

اب $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ کو $x-1$ سے تقسیم کریں۔

$$\begin{array}{r} x^2-5x+6 \\ x-1 \overline{) x^3 - 6x^2 + 11x - 6} \\ \underline{-x^3 + x^2} \\ -5x^2 + 11x \\ \underline{-5x^2 + 5x} \\ 6x - 6 \\ \underline{-6x + 6} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

اسی طرح $LCM = (x^3 - 4x + 3)(x^2 - 5x + 6)$ ذواضعاف اقل ہے۔



5.1.4 حقیقی زندگی کے مسائل (حساب) جو عدا عظم HCF اور ذواضعاف اقل LCM سے وابستہ ہیں۔

مثال 01: ردا کے پاس دو کپڑے کے ٹکڑے ہیں۔ ایک 45 انچ چوڑا اور دوسرا 90 انچ چوڑا ہے۔ وہ دونوں پٹیوں کو برابر چوڑائی میں کاٹنا چاہتے ہیں، تو وہ کتنے چوڑائی کی پٹیاں کاٹے گی۔

حل: یہ مسئلہ (حساب) عدا عظم سے حل ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ وہ بڑی سے بڑی ممکنہ پٹیوں کے لیے کپڑا کاٹ رہی ہے یا تقسیم کر رہی ہے۔

اس لیے 45 اور 90 کا عدا عظم

$$\text{HCF of 45 and 90}$$

$$45 = 3 \times 3 \times 5$$

$$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

$$\text{HCF} = \text{مشترک اجزاء کی حاصل ضرب}$$

$$\text{HCF} = 3 \times 3 \times 5$$

$$\text{عدا عظم (HCF) 45 ہے۔}$$

اس لیے ردا کو 45 انچ چوڑا ٹکڑا کاٹنا چاہئے۔

مثال 02: سرفراز ہر 8 دن بعد ورزش کرتا ہے اور عمران ہر 4 دن بعد ورزش کرتا ہے۔ اگر دونوں نے آج ورزش کی ہو تو پھر کتنے دن بعد ایک ساتھ ورزش کریں گے۔


حل: یہ حساب ذواضعاف اقل LCM سے حل ہوگا۔ کیوں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس وقت ایک ساتھ ورزش کریں گے، وہ وقت جو ایک ساتھ ہو۔ 8 اور 4 کی ذواضعاف اقل ہے۔

ذواضعاف اقل۔ مشترکہ اجزاء ضربی x غیر مشترکہ اجزاء ضربی

$$\text{ذواضعاف اقل} = 2 \times 2 \times 2 =$$

$$\text{ذواضعاف اقل} = 8$$

اس لیے، وہ 8 دن بعد ایک ساتھ ورزش کریں گے



مشق 5.1

1. بذریعہ اجزاء ضربی مندرجہ ذیل کا عاذا عظم معلوم کریں۔

- (i) $72x^4y^5z^2$ اور $120x^3y^6z^8$ (ii) $18r^3s^4t^5$, $120r^4s^3t^8$ اور $210r^7s^7t^3$
 (iii) $x^2-3x-18$ اور x^2+5x+6 (iv) $4x^2-9$ اور $2x^2-5x+3$
 (v) $(2a^2-8b^2)$, $(4a^2+4ab-24b^2)$ اور $(2a^2-12ab+16b^2)$
 (vi) x^3+x^2+x+1 اور x^3+3x^2+3x+1

2. مندرجہ ذیل کا عاذا عظم HCF بذریعہ تقسیم معلوم کریں۔

- (i) x^2+3x+2 اور $3x^2-3x-6$
 (ii) $2x^3+15x^2+31x+12$ اور $6x^3+46x^2+100x+48$
 (iii) $x^3-5x^2+10x-8$ اور x^3-4x^2+7x-6
 (iv) $x^4+3x^3+2x^2+3x+1$ اور x^3+4x^2+4x+1 اور x^3+5x^2+7x+2

3. مندرجہ ذیل کا ذواضعاف اقل LCM بذریعہ اجزاء ضربی معلوم کریں۔

- (i) $27a^4b^5c^2$ اور $81ab^2c^8$ (ii) $24p^2q^3r^4$, $100p^5q^4r^5$ اور $300p^3qr^8$
 (iii) $21x^2-14x$ اور $3x^2-5x+2$ (iv) $x^2+11x+28$ اور x^2+x-12
 (v) $6x^2+11x+3$, $3x^2-2x-1$ اور $3x^2-11x-4$
 (vi) x^2-y^2 , x^3-y^3 اور $x^4+x^2y^2+y^4$

4. بذریعہ تقسیم ذواضعاف اقل معلوم کریں۔

- (i) $x^2-25x+100$ اور x^2-x-20
 (ii) $3x^2+14x+8$ اور $6x^2+x-2$
 (iii) $x^2-y^2-z^2-2yz$ اور $y^2-z^2-x^2-2xz$
 (iv) $3x^3+9x^2-84x$ اور $4x^4-24x^3+32x^2$


5. اگر x^2-6x+9 اور $x^2-11x+24$ کا عاذا عظم HCF $(x-3)$ ہے تو ذواضعاف اقل LCM معلوم کریں۔

6. دو اظہارات کا عاذا عظم $(x+3)$ ہے اور ذواضعاف اقل $(x^3+7x^2+7x-15)$ ہے۔ اگر ایک اظہار $x^2+8x+15$ ہے تو دوسرا معلوم کریں۔

7. دو دودرجی کثیررقمی اظہاریوں کا عاذا عظم اور ذواضعاف اقل بالترتیب $3x-2$ اور $3x^3+7x^2-4$ ہے تو دونوں کثیررقموں کا حاصل ضرب معلوم کریں۔

8. عاذا عظم اور ذواضعاف اقل کے بیچ تعلق کی تصدیق کریں یعنی $q(x) = p(x)$ کثیررقمی اظہارات کے لیے

ہے۔ $p(x) = x^2 - 8x - 20$ اور $q(x) = x^2 - 15x + 50$



9. ایک بڑھے کو کچھ لکڑی کے تختے مفت دیئے گئے کچھ 12cm لمبے اور کچھ 18cm لمبے ہیں۔ وہ ان کو کاٹنا چاہتا ہے تاکہ ان کے استعمال کو آسان بنانے کے لیے اس کے پاس برابر سائز کے تختے ہوں۔

10. ٹرین A اور ٹرین B صبح 10 بجے حیدر آباد رکتی ہیں۔ ٹرین A ہر 12 منٹ کے بعد اور ٹرین B ہر 14 منٹ کے بعد رکتی ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ کب رکیں گی۔

5.2 الجبری کسور پر بنیاد عوامل


اگر $p(x)$ اور $q(x)$ الجبری اظہار یہ ہیں اور $q(x) \neq 0$ تو $\frac{p(x)}{q(x)}$ کو الجبری کسور کہا جاتا ہے۔
 الجبری کسور کی مختصر ترین صورت ایک ایسی کسور ہے جس میں شمار کنندہ اور مخروج میں 1 کے علاوہ کوئی مشترک جز و ضربی نہ ہو۔
 الجبری کسور میں بنیادی عوامل $(+, -, \div, \times)$ عام کسور کی طرح دیے جاتے ہیں۔
 مندرجہ ذیل مثالوں میں ہم عادی اعظم اور ذواضعاف اقل کے استعمال کی وضاحت کریں گے، کسوری اظہارات مختصر ترین صورت میں کرنے کے لیے جن میں بنیادی عوامل شامل ہوں۔

5.2.1 عادی اعظم اور ذواضعاف اقل استعمال کریں۔ الجبری کسور جن میں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم شامل ہوں ان کو مختصر کریں۔

مثال 01: $\frac{x^2 - x - 6}{2x^2 - 5x - 3} + \frac{1}{4x^2 - 1}$ مختصر کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x - 6}{2x^2 - 5x - 3} + \frac{1}{4x^2 - 1} &= \frac{x^2 - 3x + 2x - 6}{2x^2 - 6x + x - 3} + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} \\ &= \frac{x(x-3) + 2(x-3)}{2x(x-3) + 1(x-3)} + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} \\ &= \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(2x+1)} + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} \quad \text{where, } x \neq 3 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{(x+2)}{(2x+1)} + \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} \\
 &= \frac{(x+2)(2x-1)+1}{(2x-1)(2x+1)} \\
 &= \frac{2x^2 - x + 4x - 2 + 1}{(2x-1)(2x+1)} = \frac{2x^2 + 3x - 1}{4x^2 - 1}
 \end{aligned}$$

مثال 02: مختصر کریں۔

$$\begin{aligned}
 &\frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{2x^2+x-6} \\
 &\frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{2x^2+x-6} \\
 &= \frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{2x^2+4x-3x-6} \\
 &= \frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{2x(x+2)-3(x+2)} \\
 &= \frac{2}{x+2} - \frac{x-4}{(x+2)(2x-3)} \\
 &= \frac{2(2x-3)-(x-4)}{(x+2)(2x-3)} \\
 &= \frac{4x-6-x+4}{(x+2)(2x-3)} \\
 &= \frac{3x-2}{2x^2+x-6}
 \end{aligned}$$


حل:

$$\frac{ab^2+2a}{ab-6+2b-3a} \times \frac{b^2-6b+9}{b^3+2b}$$

مثال 03: مختصر کریں۔

$$\begin{aligned}
 &\frac{ab^2+2a}{ab-6+2b-3a} \times \frac{b^2-6b+9}{b^3+2b} \\
 &\frac{ab^2+2a}{ab-6+2b-3a} \times \frac{b^2-6b+9}{b^3+2b} = \frac{a(b^2+2)}{b(a+2)-3(a+2)} \times \frac{b^2-3b-3b+9}{b(b^2+2)} \\
 &= \frac{a}{(a+2)(b-3)} \times \frac{b(b-3)-3(b-3)}{b}
 \end{aligned}$$

حل:





$$\begin{aligned}
 &= \frac{a}{(a+2)(b-3)} \times \frac{(b-3)(b-3)}{b} \\
 &= \frac{a}{(a+2)(b-3)} \times \frac{(b-3)(b-3)}{b} \\
 &= \frac{a(b-3)}{b(a+2)}
 \end{aligned}$$

جب کہ
اور

$$\frac{p^2 - q^2}{r^2 + 2rs + s^2} \div \frac{2(p+q)}{3(r+s)s}$$

مثال 04: مختصر کریں۔

$$\frac{p^2 - q^2}{r^2 + 2rs + s^2} \div \frac{2(p+q)}{3(r+s)s}$$

حل:

$$= \frac{(p+q)(p-q)}{(r+s)^2} \div \frac{2(p+q)}{3(r+s)s}$$

$$= \frac{(p+q)(p-q)}{(r+s)^2} \times \frac{3(r+s)s}{2(p+q)}$$

جب کہ $p+q \neq 0$
اور $r+s \neq 0$

$$= \frac{3s(p-q)}{2(r+s)},$$

مشق 5.2

درج ذیل کو مختصر کریں۔

$$(i) \frac{4x}{x^2 + 2x + 1} + \frac{3}{x+1}$$

$$(ii) \frac{3}{x(2x+1)} + \frac{6x+7}{3x(x+1)}$$

$$(iii) \frac{3x-1}{x^2+2x+1} - \frac{4x^2-1}{x^2-2x-3}$$

$$(iv) \frac{1}{x+1} - \frac{2}{x+2} + \frac{3}{x+3}$$

$$(v) \frac{x^2+4x+3}{5} \times \frac{10}{x+1}$$


$$(vi) \frac{x^2-4x-21}{x^2-6x-7} \div \frac{x+9}{x+1}$$

$$(vii) \left[\frac{3}{x+1} + \frac{1}{x+2} \right] \div \left[\frac{2}{x+3} - 1 \right]$$

$$(viii) \left(\frac{1}{x^2-9} \right) \div \left(\frac{1}{x+3} \right) - \frac{3}{x-2}$$

$$(ix) \frac{1}{x^2+8x+15} + \frac{1}{x^2+7x+12} - \frac{1}{x^2+x-12}$$

$$(x) 2 \left(\frac{x^2+7x+12}{x^2-16} + \frac{x^2+x-2}{x^2+4x+4} \right) \times \frac{x^2-2x-8}{8x^2+2x+4}.$$



5.3 الجبری اظہارات کا جذر المربع

5.3.1 بذریعہ اجزاء ضربی اور تقسیم جذر المربع معلوم کرنا۔

الجبری اظہارات کا جذر المربع معلوم کرنے کے دو طریقوں پر بحث کریں گے۔

(a) بذریعہ اجزاء ضربی (b) بذریعہ تقسیم۔

(a) بذریعہ اجزاء ضربی جذر المربع کا طریقہ

مثال 01: $49x^2 + 126xy + 81y^2$ کا جذر المربع بذریعہ اجزاء ضربی معلوم کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 & 49x^2 + 126xy + 81y^2 \\
 &= (7x)^2 + 2(7x)(9y) + (9y)^2, \\
 &= (7x + 9y)^2, \\
 &= \sqrt{49x^2 + 126xy + 81y^2} \quad \text{اس لیے} \\
 &= \sqrt{(7x + 9y)^2} = 7x + 9y
 \end{aligned}$$

(b) بذریعہ تقسیم جذر المربع۔

مثال 01: $4x^4 + 12x^3 - 19x^2 - 42x + 49$ کا جذر المربع بذریعہ تقسیم معلوم کریں۔

حل: طریقہ ذیل میں واضح ہے۔

	$2x^2 + 3x - 7$
$2x^2$	$4x^4 + 12x^3 - 19x^2 - 42x + 49$
$+2x^2$	$\pm 4x^4$
$4x^2 + 3x$	$12x^3 - 19x^2 - 42x + 49$
$+3x$	$\pm 12x^3 \pm 9x^2$
$4x^2 + 6x - 7$	$-28x^2 - 42x + 49$
-7	$\mp 28x^2 \mp 42x \pm 49$
$4x^2 + 6x - 14$	$0 \quad 0 \quad 0$

اس لیے $\sqrt{4x^4 + 12x^3 - 19x^2 - 42x + 49} = 2x^2 + 3x - 7$



مثال 02: a کی کس قیمت کے لیے $36x^4 + 36x^3 + 57x^2 + 24x + a$ مکمل مربع ہوگا۔
حل: بذریعہ تقسیم:

$6x^2$	$6x^2 + 3x + 4$
$+6x^2$	$36x^4 + 36x^3 + 57x^2 + 24x + a$
$12x^2 + 3x$	$\pm 36x^4$
$+3x$	$36x^3 + 57x^2 + 24x + a$
$12x^2 + 6x + 4$	$\pm 36x^3 \pm 9x^2$
$+4$	$48x^2 + 24x + a$
$12x^2 + 6x + 8$	$\pm 48x^2 \pm 24x \pm 16$
	$a - 16$

مکمل مربع ہونے کے لیے جذالمربع کے عمل میں باقی صفر ہونا چاہیے

$$a - 16 = 0 \Rightarrow a = 16,$$

A کی قیمت 16 رکھنے سے دیا گیا اظہار یہ مکمل مربع ہوگا۔

مثال 03: $x^4 + 4x^3 + 10x^2 + 5$ میں کیا جمع کیا جائے کہ یہ مکمل مربع بن جائے؟

حل: بذریعہ تقسیم:

x^2	$x^2 + 2x + 3$
x^2	$x^4 + 4x^3 + 10x^2 + 5$
$2x^2 + 2x$	$\pm x^4$
$+2x$	$4x^3 + 10x^2 + 5$
$2x^2 + 4x + 3$	$\pm 4x^3 \pm 4x^2$
$+3$	$6x^2 + 5$
$2x^2 + 4x + 6$	$\pm 6x^2 \pm 12x \pm 9$
	$-12x - 4$

یا $-(12x + 4)$

یعنی باقی بچا۔ گویا $12x + 4$ جمع کرنے پر دیا ہوا اظہار یہ مکمل مربع بن جائے گا۔



مشق 5.3

1. مندرجہ ذیل کا جذر المربع بذریعہ اجزاء ضربی معلوم کریں۔

(i) $36x^2 - 60xy + 25y^2$

(ii) $9x^2 + \frac{1}{x^2} + 6$

(iii) $4x^4y^4 - \frac{12x^3y^3}{z^2} + \frac{9x^2y^2}{z^4}$

(iv) $36(3-2x)^2 - 48(3-2x)y + 16y^2$

(v) $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 2\left(x + \frac{1}{x}\right) + 3$

(vi) $(4x^2 - 4x + 1)(9x^2 - 54x + 81)$

(vii) $(x^2 - 2x + 1)(x^2 - 6x + 9)$

(viii) $(x^2 + 8x + 15)(x^2 + 7x + 10)(x^2 + 5x + 6)$

2. مندرجہ ذیل کا جذر المربع بذریعہ تقسیم معلوم کریں۔

(i) $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$

(ii) $25x^4 + 40x^3 + 26x^2 + 8x + 1$

(iii) $4x^4 + 8x^3 + 20x^2 + 16x + 16$

(iv) $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 47 - \frac{14y}{x} + \frac{14x}{y}$

(v) $x^2 - 2x + 3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}$

(vi) $x^2 + \frac{y^2}{9} + 9z^2 + \frac{2xy}{3} + 2yz + 6xz$

(vii) $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 8\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 16$

(viii) $x^6 + \frac{1}{x^6} - 4\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) + 6, x \neq 0$

3. $4x^4 + 4x^3 + 17x^2 + 8x + 9$ میں کیا جمع کیا جائے کہ یہ مکمل مربع بن جائے؟

4. $9x^6 - 12x^5 + 4x^4 - 18x^3 - 12x^2 + 18x$ میں سے کیا تفریق کیا جائے کہ یہ مکمل مربع بن جائے؟

5. 'm' کی کس قیمت کے لیے $9x^4 + 12x^3 + 34x^2 + mx + 25$ مکمل مربع ہوگا؟

6. 'p' اور 'q' کی کس قیمت کے لیے $x^4 + 8x^3 + 30x^2 + px + q$ مکمل مربع ہے؟

7. 'a' اور 'b' کی کس قیمت کے لیے $x^4 + 4x^3 + 10x^2 + ax + b$ مکمل مربع ہے؟

جائزہ مشق 5

1. صحیح اور غلط سوال۔

مندرجہ ذیل جملے غور سے پڑھیں اور صحیح بیان کی صورت میں 'T' اور غلط بیان کی صورت میں 'F' پر گول دائرہ لگائیں۔

- (i) HCF of $y^2 - 4$ اور $y - 2$ is $y - 2$. T/F
(ii) HCF of $a^3 - 1$ اور $a^2 - 1$ is $a + 1$. T/F
(iii) LCM of $x^3 + 1$ اور $x + 1$ is $x^3 + 1$. T/F
(iv) LCM of $x^4 - y^4$ اور $x^2 - y^2$ is $x^2 + y^2$. T/F
(v) HCF of $a^2 + 4a + 3$ اور $a^2 + 5a + 6$ is $a + 3$. T/F

2. خالی جگہیں پر کریں۔

- (i) آلجبری اظہار کا عاذا عظم معلوم کرنے کے طریقے ہیں۔
(ii) دو کثیر رقمیوں کے عاذا عظم X کا ذواضعاف اقل ہے۔
(iii) $y - 2$ اور $y + 6$ اور $y^2 - 5y$ کا عاذا عظم ہے۔
(iv) $y^2 + 5y + 6$ اور $y^2 + 3y + 2$ کا ذواضعاف اقل ہے۔
(v) $y + \frac{1}{y}$ اور $y^2 - \frac{1}{y^2}$ کا عاذا عظم ہے۔

3. درست جوابات پر ٹک (✓) لگائیں۔

(i) $x^3 - 8y^3$ اور $x^2 - 4xy + 4y^2$ کا عاذا عظم ہے

- (a) $x - 4y$ (b) $x^2 + 2xy + y^2$
(c) $x + 2y$ (d) $x - 2y$

(ii) $(2y + 3z)^3$ اور $(2y + 3z)^5$ کا ذواضعاف اقل ہے:

- (a) $2y + 3z$ (b) $(2y + 3z)^3$
(c) $(2y + 3z)^2$ (d) $(2y + 3z)^5$

(iii) $x^3 - y^3$ اور $x^2 + xy + y^2$ کا عاذا عظم ہے۔

- (a) $x + y$ (b) $x^2 + xy + y^2$
(c) $x - y$ (d) $(x - y)^2$

(iv) $(x - y)^4$ اور $(x - y)^3$ کا ذواضعاف اقل ہے۔

- (a) $(x - y)$ (b) $(x - y)^3$
(c) $(x - y)^4$ (d) $(x - y)^7$

کی مختصر صورت ہے: $\frac{1}{x+y} + \frac{y}{x^2-y^2}$ (v)

(a) $\frac{y+1}{x^2-y^2}$

(b) $\frac{x}{x^2-y^2}$

(c) $\frac{y}{x^2-y^2}$

(d) $\frac{x+y}{x^2-y^2}$

کی مختصر صورت ہے: $\frac{y}{25x^2-y^2} - \frac{1}{5x-y}$ (vi)

(a) $\frac{5x}{25x^2-y^2}$

(b) $\frac{5x}{5x-y}$

(c) $\frac{-5x}{5x+y}$

(d) $\frac{-5x}{25x^2-y^2}$

_____ = $\frac{a^3x^3 + a^3y^3}{a^2(x+y)}$ (vii)

(a) $\frac{ax^2+ay^2}{a(x^2-xy+y^2)}$

(b) $\frac{x^2+y^2}{a(x^2+xy+y^2)}$

(c) $\frac{a(x^2-xy+y^2)}{a(x^2+xy+y^2)}$

(d) $\frac{a(x^2+xy+y^2)}{a(x^2-xy+y^2)}$

_____ = $\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b}$ (viii)

(a) $\frac{a^2+b^2}{a-b}$

(b) $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$

(c) $\frac{a+b}{a^2-b^2}$

(d) $\frac{a-b}{a^2-b^2}$

_____ = ذواضعاف اقل (ix)

(a) $\frac{\text{HCF}}{p \times q}$

(b) $\frac{p \times q}{\text{HCF}}$

(c) $\frac{p}{\text{HCF}}$

(d) $\frac{q}{\text{HCF}}$

_____ کا ذواضعاف اقل ہے x^3+1 اور x^2-x+1 (x)

(a) $x+1$

(b) x^2-x+1

(c) x^3+1

(d) x^2+x+1



خلاصہ

- ♦ الجبری اظہاریوں کا عاذا عظم اور ذواضعاف اقل معلوم کرنے کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں۔
 - (i) بذریعہ اجزاء ضربی
 - (ii) بذریعہ تقسیم۔
- ♦ کثیر رقی اظہاریوں کا ذواضعاف اقل $\times$ عاذا عظم = دو کثیر رقی اظہاریوں کی حاصل ضرب۔
- ♦ ذواضعاف اقل اور عاذا عظم کی مدد سے الجبری اظہاریوں کی جمع، ضرب، تفریق اور تقسیم مل سکتی ہے۔
- ♦ الجبری اظہاریوں کا جذر المربع معلوم کرنے کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں۔
 - (i) جذر المربع بذریعہ اجزاء ضربی۔
 - (ii) جذر المربع بذریعہ تقسیم۔



یک درجی مساواتیں اور غیر مساواتیں

6

یونٹ

LINEAR EQUATIONS AND INEQUALITIES

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- ایک متغیر یک درجی مساوات کا اعادہ کر سکیں۔
- ایسی یک درجی مساوات کو حل کر سکیں جس میں متغیر کے عددی سرناطقی اعداد ہوں۔
- جذری مساواتوں کو یک درجی شکل میں تبدیل کر کے حل کر سکیں۔
- کسی حقیقی عدد ___ کسی مطلق قیمت ___ کی تعریف کر سکیں۔
- ایک متغیر میں مطلق قیمت کی مساوات کو حل کر سکیں۔
- ایسی غیر مساواتوں کی تعریف کر سکیں جن میں علامات $(\geq, \leq)$ اور $(>, <)$ استعمال کی گئی ہوں۔
- غیر مساواتوں کی درج ذیل خصوصیات کو سمجھ اور ان کی شناخت کر سکیں۔
- ثلاثی خاصیت، خاصیت تعدیت، جمعی خاصیت، ضری خاصیت کو جان سکیں۔
- ایسی یک درجی غیر مساواتوں کو حل کر سکیں جن میں متغیر کے عددی سرناطقی اعداد ہوں۔



6.1 ایک درجی مساواتیں Linear Equations

6.1.1: ایک متغیر میں ایک درجی مساوات کا اعادہ کریں۔

اگر ایک کھلے جملے میں " = " نشانی شامل ہو تو پھر ایسے جملے کو مساوات کہا جاتا ہے۔ ایک متغیر میں ایک درجی مساوات۔
یعنی $ax + b = 0$, $a \neq 0$ مساواتیں ہیں جہاں پر متغیر Variable کی قوت نما "1" ہے۔ جو عام طور پر ظاہر نہیں کی جاتی۔

6.1.2: ایسی ایک درجی مساوات حل کریں۔ جس میں متغیر کے عددی سرناطقی اعداد ہوں

غیر معلوم شدہ متغیر Variable جو مساوات میں دیا گیا ہے اس کی قیمت کے لیے مساوات درست ہو جائے تو اس کو مساوات کا اصل Root کہا جاتا ہے۔

مثال 01: $3x - 1 = 5$ حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} 3x - 1 &= 5 \\ \Rightarrow 3x &= 5 + 1 \\ \Rightarrow x &= \frac{6}{3} \\ \Rightarrow x &= 2 \end{aligned}$$

اس طرح {2} حل سیٹ ہے۔

مثال 02: $\frac{2}{3}(x+3) = 3 + \frac{5x}{9}$

حل:

$$\frac{2}{3}(x+3) = 3 + \frac{5x}{9}$$

عرضیں کو سب مخرو جوں کی ذواضعاف اقل 9 سے ضرب دینے سے۔

$$9 \times \frac{2}{3}(x+3) = 9 \times 3 + 9 \times \frac{5x}{9}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 3 \times 2(x+3) &= 27 + 5x \\ \Rightarrow 6(x+3) &= 27 + 5x \\ \Rightarrow 6x + 18 &= 27 + 5x \\ \Rightarrow 6x - 5x &= 27 - 18 \\ \Rightarrow x &= 9 \end{aligned}$$

اس طرح {9} حل سیٹ ہے۔

مثال 03: باپ کی عمر بیٹے کی عمر سے 13 گنا ہے۔ چار سال بعد 5 گنا ہو جاتی ہے تو دونوں کی موجودہ عمریں معلوم کریں۔

حل: فرض کریں کہ بیٹے کی موجودہ عمر 21 سال ہے۔ اور باپ کی عمر $13x$ ہے

دی گئی شرط کے مطابق

$$\therefore 13x + 4 = 5(x + 4)$$



$$\begin{aligned}
&\Rightarrow 13x + 4 = 5x + 20 \\
&\Rightarrow 13x - 5x + 4 = 5x - 5x + 20 \quad (\text{طرفین } 5x \text{ تفریق کرنے سے}) \\
&\Rightarrow 8x + 4 = 20 \\
&\Rightarrow 8x + 4 - 4 = 20 - 4 \quad (\text{طرفین } 4 \text{ تفریق کرنے سے}) \\
&\Rightarrow 8x = 16 \\
&\Rightarrow \frac{8x}{8} = \frac{16}{8} \quad (\text{عرضین 8 سے تقسیم کرنے سے}) \\
&\Rightarrow x = 2
\end{aligned}$$

لہذا باپ کی موجودہ عمر $13 \times 2 = 26$ سال ہے۔
اور بیٹے کی موجودہ عمر 2 سال ہے۔

مثال 04: کسی عدد کے $\frac{1}{3}$ گنا میں 16 جمع کرنے سے نتیجہ اصل عدد کا $2\frac{1}{3}$ ہے تو عدد معلوم کریں۔


حل: فرض کریں کہ عدد x ہے دیے گئے شرط کے مطابق

$$\begin{aligned}
16 + \frac{1}{3}x &= 2\frac{1}{3}x \\
\Rightarrow 16 + \frac{1}{3}x &= \frac{7}{3}x \\
\Rightarrow 16 &= \frac{7}{3}x - \frac{1}{3}x \\
\Rightarrow 16 &= \left(\frac{7}{3} - \frac{1}{3}\right)x \\
\Rightarrow 16 &= \left(\frac{7-1}{3}\right)x \\
\Rightarrow 16 &= \frac{6}{3}x \\
\Rightarrow 16 \times 3 &= 6x \\
\Rightarrow \frac{48}{6} &= x \quad \Rightarrow x = 8
\end{aligned}$$

6.1.3: ایسی مساوات جس میں متغیر پر جذری علامت ہو۔ ان کو یک درجی مساوات میں تبدیل کریں اور حل معلوم کریں۔

ایسی مساوات جس میں کوئی جذری علامت میں متغیر ہو جذری مساوات کہلاتی ہے۔

مثلاً: $\sqrt{x} = 8$ اور $(3\sqrt{t} - \sqrt{t+1} = 2)$ جذری مساواتیں ہیں۔





جذری مساوات کا حل مندرجہ ذیل مثالوں میں واضح ہے۔

مثال 01: $\sqrt{2x+11} = \sqrt{3x+7}$

حل: $\sqrt{2x+11} = \sqrt{3x+7}$

(عرضیں مربع لینے سے)

$\therefore (\sqrt{2x+11})^2 = (\sqrt{3x+7})^2$

$\Rightarrow 2x+11 = 3x+7$

$\Rightarrow 2x-3x = 7-11$

$\Rightarrow -x = -4$

$\Rightarrow x = 4$

پڑتال: دی گئی مساوات میں $x = 4$ درج کرنے سے۔

$\sqrt{2(4)+11} = \sqrt{3(4)+7}$

$\sqrt{8+11} = \sqrt{12+7}$ یا

$\sqrt{19} = \sqrt{19}$ یا

لہذا دی گئی مساوات کا حل سیٹ {4} ہے۔

نوٹ: بعض اوقات جذری مساوات سے حاصل شدہ اصل مساوات کو پورا نہیں کرتی اور اس کو اضافی اصل کہتے ہیں۔

مشق 6.1

1. مندرجہ ذیل مساواتیں حل کریں۔

(i) $\frac{1}{4}x = 5$

(ii) $\frac{x}{4} = -3$

(iii) $-5 = \frac{-x}{6}$

(iv) $\frac{-x}{8} = -5$

(v) $y - \frac{2}{5} = -\frac{1}{3}$

(vi) $2y - \frac{3}{5} = \frac{1}{2}$

(vii) $\frac{2x-4}{5} = \frac{5x-12}{4}$

(viii) $\frac{3x}{5} + 7 = \frac{2x}{3}$

(ix) $\frac{3x}{5} + 7 = \frac{2x}{3} + \frac{4x}{5}$

(x) $\frac{6}{2x-5} - \frac{4}{x-3} = 0$

(xi) $\frac{7x-4}{15} = \frac{7x+4}{10}$

(xii) $\frac{3x-2}{10} = \frac{7x-3}{15} - 2$

(xiii) $\frac{12x-3}{12} = \frac{12x+3}{8}$

(xiv) $\frac{1}{4}x + x = -3 + \frac{1}{2}x$

(xv) $\frac{1}{3} + 2m = m - \frac{3}{2}$



2. جب کسی عدد میں 25 جمع کر کے نتیجے کو آدہ کیا جائے، جواب اصل عدد کا 3 گنا ہو تو عدد کیا ہے۔

3. کوئی عدد 4 میں جمع کیا جائے، نتیجہ اصل عدد کے 3 گنا میں سے 10 تفریق کرنے کے برابر ہو تو عدد کیا ہے۔

4. بلال علی سے 6 سال بڑا ہے۔ 5 سال کے بعد دونوں کی عمر کا مجموعہ 40 ہو تو دونوں کی عمریں کیا ہیں۔

5. مندرجہ ذیل مساواتیں حل کریں اور جواب کی چکاس بھی کریں۔

(i) $6 + \sqrt{x} = 7$

(ii) $\sqrt{x-9} = 1$

(iii) $\sqrt{\frac{y}{4}} - 2 = 3$

(iv) $\sqrt{4x+5} = \sqrt{3x-7}$

(v) $\frac{\sqrt{3y+12}}{7} = 3$

(vi) $\sqrt{x} + 9 = 7$

(vii) $\sqrt{25y-50} = \sqrt{y-2}$

(viii) $\sqrt{x} - 8 = 1$

(ix) $10\sqrt{x+20} = 100$

6.2 مطلق قیمت میں مساوات۔

6.2.1: مطلق قیمت کی وضاحت کریں۔

کسی حقیقی عدد x کی مطلق قیمت کو $|x|$ سے ظاہر کرتے ہیں جو کہ x صفر سے عدد تک کا فاصلہ ہے، صفر کے بائیں طرف سے ہو یا دائیں جانب سے ہو۔ اس لیے مطلق قیمت کبھی بھی منفی نہیں ہوتی۔ اگر x ایک حقیقی عدد ہے تو پھر x کی مطلق قیمت $|x|$ ظاہر کرتے ہیں۔

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{جہاں پر } x > 0 \\ 0, & \text{جہاں پر } x = 0 \\ -x, & \text{جہاں پر } x < 0 \end{cases}$$

مثال $|-5| = 5, |7| = 7, \left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}, |0| = 0$

نوٹ: ایک عدد کی مطلق قیمت ہمیشہ غیر منفی ہوتی ہے۔



6.2.2 ایک متغیر کی مساوات مطلق قیمت میں حل کریں۔

مندرجہ ذیل مثالیں مطلق قیمت میں مساواتیں حل کرنے میں مددگار ہوں گی۔

مثال 01: $|5x - 3| - 2 = 3$ کا حل سیٹ معلوم کریں۔

حل معلوم ہے کہ

$$|5x - 3| - 2 = 3$$

$$\Rightarrow |5x - 3| = 5$$

مطلق قیمت کی تعریف کے مطابق

$$5x - 3 = 5 \quad \text{یا} \quad 5x - 3 = -5$$

$$\Rightarrow 5x = 5 + 3 \quad \text{یا} \quad 5x = -5 + 3$$

$$\Rightarrow 5x = 8 \quad \text{یا} \quad 5x = -2$$

$$\Rightarrow x = \frac{8}{5} \quad \text{یا} \quad x = -\frac{2}{5}$$

لہذا حل سیٹ ہے۔ $\left\{ \frac{8}{5}, -\frac{2}{5} \right\}$

مثال 02: $|5x - 3| + 7 = 3$ کا حل سیٹ معلوم کریں۔

حل، معلوم:

$$|5x - 3| + 7 = 3$$

$$\Rightarrow |5x - 3| = -4$$

مطلق قیمت کی تعریف کے مطابق۔ مطلق قیمت کبھی بھی منفی نہیں ہوتی۔
تو اس لیے حل سیٹ $\{ \} = \emptyset$ ہو گا۔

مثال 03: $|5x - 3| - 2 = 3$ حل کریں جبکہ $x \in W$

حل، معلوم:

$$|5x - 3| - 2 = 3$$

$$\Rightarrow |5x - 3| = 5$$

مطلق قیمت کی تعریف کے مطابق

$$5x - 3 = 5 \quad \text{یا} \quad 5x - 3 = -5$$


$$\Rightarrow 5x = 5 + 3 \quad \text{یا} \quad 5x = -5 + 3$$

$$\Rightarrow 5x = 8 \quad \text{یا} \quad 5x = -2$$

$$\Rightarrow x = \frac{8}{5} \quad \text{یا} \quad x = -\frac{2}{5}$$

لہذا $\{ \}$ حل سیٹ ہے۔

اور $-\frac{2}{5}$ اور $\frac{8}{5} \notin W$



مثال 04: $|2y - 5| + 2 = 7$ حل کریں

حل معلوم $|2y - 5| + 2 = 7$

$$\Rightarrow |2y - 5| = 7 - 2$$

$$\Rightarrow |2y - 5| = 5$$

مطلق قیمت کی تعریف کے مطابق

$$2y - 5 = 5 \quad \text{یا} \quad 2y - 5 = -5$$

$$\Rightarrow 2y = 5 + 5 \quad \text{یا} \quad 2y = -5 + 5$$

$$\Rightarrow 2y = 10 \quad \text{یا} \quad 2y = 0$$

$$\Rightarrow y = \frac{10}{2} \quad \text{یا} \quad y = \frac{0}{2}$$

$$\Rightarrow y = 5 \quad \text{یا} \quad y = 0$$

لہذا $\{5, 0\}$ حل سیٹ ہے۔

مشق 6.2

مندرجہ ذیل مساواتوں کا حل سیٹ معلوم کریں۔

1. $|2x + 1| = 6$

2. $|5x - 12| = 7, \forall x \in W$

3. $\left|\frac{2x}{7}\right| = 12$

4. $\left|\frac{2x+1}{3}\right| = 8$

5. $|5x - 3| - 8 = 4, \forall x \in N$

6. $\left|\frac{5x+1}{7}\right| - 3 = 8$

7. $\left|\frac{2x+3}{4}\right| + 2 = 7$

8. $\left|\frac{3x+6}{12}\right| + 1 = 3, \forall x \in Z$

9. $\frac{3}{2} = |7x + 8|$

10. $\left|\frac{2x-3}{5}\right| - 12 = 5$

11. $|3x+1| + 1 = \frac{3}{4}$

12. $\left|\frac{2x+1}{7}\right| = 1$

6.3 ایک درجی غیر مساواتیں۔

ایک درجی الجبری اظہاریہ جس میں _____ یا _____ نشانیاں موجود ہوں تو غیر مساوات کہلاتی ہے۔

6.3.1: $(>, <)$ اور $(\geq, \leq)$ کی وضاحت کریں۔

مندرجہ ذیل ناطق عوامل کو غیر مساوی کہا جاتا ہے۔

'<' مطلب چھوٹا ہے۔


'>' مطلب بڑا ہے۔

'≤' مطلب چھوٹا ہے یا برابر ہے۔

'≥' مطلب بڑا ہے یا برابر ہے۔



$$x < 3$$




مثال :01

$$x > -3$$




مثال :02

$$x \leq 4$$



مثال :03

$$x \geq -2$$



مثال :04

نوٹ: خالی گول دائرہ 'O' عدد کے شامل نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور گہرا کا لادائرہ 'O' شامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

6.3.2: غیر مساوات کو پہچاننا۔

مندرجہ ذیل کچھ اہم غیر مساواتوں کی خاصیتیں ہیں۔

(i) ثلاثی خاصیت (Trichotomy Property)


اگر a اور b حقیقی اعداد ہیں تو درج ذیل بیانات میں سے ایک اور صرف بیان درست ہے۔

$$a < b, a = b \text{ or } a > b$$

(ii) خاصیت متعدیت (Transitive Property)

تین حقیقی اعداد کے لیے، اگر $a < b$ اور $b < c \Rightarrow a < c$

$$a > b \text{ اور } b > c \Rightarrow a > c$$



(iii) جمعی خاصیت (Additive Property)

تین حقیقی اعداد کے لیے اگر

$$a > b \quad \text{تو} \quad a + c > b + c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{اگر}$$

$$a < b \quad \text{تو} \quad a + c < b + c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{یا اگر}$$

(iv) ضربی خاصیت (Multiplicative Property)

$$\text{If } a > b \quad \text{تو} \quad ac > bc, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{اور } c > 0 \quad \text{(a) اگر}$$

$$\text{If } a < b \quad \text{تو} \quad ac < bc, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{اور } c > 0 \quad \text{یا اگر}$$

$$\text{If } a > b \quad \text{تو} \quad ac < bc, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{اور } c < 0 \quad \text{(b) اگر}$$

$$\text{If } a < b \quad \text{تو} \quad ac > bc, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{اور } c < 0 \quad \text{یا اگر}$$

6.4 ایک درجی غیر مساواتیں حل کرنا۔

6.4.1: ایک متغیر میں غیر مساواتوں کا حل معلوم کرنا۔

مندرجہ ذیل مثالیں حل سمجھنے اور اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرنے میں مددگار ہوں گے۔

مثال 01: $3x + 1 < 7 \quad \forall x \in W$ کا حل سیٹ معلوم کریں اور عددی خط پر ظاہر کریں۔

حل:

$$3x + 1 < 7 \quad \forall x \in W \quad \text{معلوم}$$

$$(3x + 1) - 1 < 7 - 1$$


$$3x < 6$$

$$x < \frac{6}{3}$$

$$x < 2$$

$$\text{لہذا حل سیٹ پر۔ } \{x | x \in W \wedge x < 2\} = \{0, 1\}$$

حل سیٹ کو عددی خط پر اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔





مثال :02 $x - 11 \leq 9 - 4x \quad \forall x \in \mathbb{Z}$ کا حل سیٹ معلوم کریں اور عددی خط پر ظاہر کریں۔

حل: معلوم $x - 11 \leq 9 - 4x \quad \forall x \in \mathbb{Z}$

$$x - 11 \leq 9 - 4x$$

$$x + 4x \leq 9 + 11$$

$$5x \leq 20$$

$$x \leq \frac{20}{5}$$

$$x \leq 4$$

لہذا $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ اور } x \leq 4\} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ حل سیٹ ہے۔



مثال :03 $2x + 5 > 7 \quad x \in \mathbb{R}$ کا حل سیٹ معلوم کریں اور عددی خط پر ظاہر کریں۔

حل: معلوم $2x + 5 > 7 \quad x \in \mathbb{R}$


$$2x > 7 - 5$$

$$2x > 2 \quad \text{یا}$$

$$x > 1 \quad \text{یا}$$

یہ غیر مساوات اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

لہذا $\{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x > 1\}$ حل سیٹ ہے۔




مثال :03 $-6 < 2x + 1 < 11, \quad \forall x \in \mathbb{Z}$


حل: معلوم $-6 < 2x + 1 < 11, \quad \forall x \in \mathbb{Z}$

$$-6 < (2x + 1) \quad \text{اور} \quad 2x + 1 < 11$$

$$-6 - 1 < 2x \quad \text{اور} \quad 2x + 1 < 11 - 1 \quad \text{یا}$$

$$-7 < 2x \quad \text{اور} \quad 2x < 10 \quad \text{یا}$$





مثال 04: عائشہ نے چار ٹیسٹوں میں سے پہلے تین ٹیسٹوں میں 78، 72 اور 86 اسکور کیا۔ 80 کی سراسری کے لیے

اسکو چوتھے ٹیسٹ میں کتنا اسکور کرنا ہوگا۔

حل: فرض کریں کہ چوتھے ٹیسٹ میں x اسکور کیا تو۔

$$\frac{78 + 72 + 86 + x}{4} \geq 80$$

$$78 + 72 + 86 + x \geq 320$$

$$236 + x \geq 320$$

$$x \geq 320 - 236$$

$$x \geq 84$$

عائشہ کو چوتھے ٹیسٹ میں 84 اسکور کرنا چاہیے 80 کی سراسری قائم رکھنے کے لیے۔

مشق 6.3

1. مندرجہ ذیل غیر مساواتوں کا حل سیٹ معلوم کریں اور عددی خط پر ظاہر کریں۔

(i) $2x - 7 > 6 + x \quad \forall x \in \mathbb{N}$

(ii) $7x - 6 > 3x + 10, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

(iii) $\frac{y + 5}{20} < \frac{25 - 4y}{10}, \quad \forall y \in \mathbb{N}$

(iv) $|2x + 3| < x + 2, \quad \forall x \in \mathbb{Z}$

(v) $|2y + 8| < 11, \quad \forall y \in \mathbb{R}$

(vi) $5(2y - 3) > 6(y - 8), \quad \forall y \in \mathbb{R}$

2. علی نے اپنے دو ٹیسٹوں میں بالترتیب 66 اور 72 مارکس اسکور کیے۔ اگر اسکویونس انعام کے قابل ہونے کے لیے کم از کم 75 کی

اوسط درکار ہے تو اسے اپنے تیسرے ٹیسٹ میں کتنے مارکس لینے ہوں گے۔

3. 7 چھوٹا ہے ایک عدد کے مجموعے سے اور 5 کم از کم 10 ہے تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے سارے اعداد معلوم کریں۔



جائزہ مشق 6

1. صحیح اور غلط سوالات۔

مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں اور صحیح کی صورت میں T پر اور غلط کی صورت میں F پر گول دائر لگائیں۔

(i) $ay + b = 0$ جبکہ $a = 0$ ایک درجی مساوات ہے۔ T/F

(ii) $3y - 2 < 7 \wedge y \in \mathbb{N}$ کا حل سیٹ $\{4, 5, 6, \dots\}$ T/F

(iii) $\sqrt{y} + 1 = 3$ کا حل سیٹ $\{4\}$ ہے۔ T/F

(iv) $|4y| = 8$ کا حل سیٹ $\{2, -2\}$ ہے۔ T/F

(v) $-2 \leq x \leq 2, x \in \mathbb{V}$ کا حل سیٹ $\{-2, 0, 2\}$ ہے۔ T/F

2. خالی جگہیں پر کریں۔

(i) $2y = -y$ کا حل سیٹ _____ ہے

(ii) $\sqrt{y+5} = 5$ کا حل سیٹ _____ ہے

(iii) $|x| - 4 = 0$ کا حل سیٹ _____ ہے۔

(iv) $\sqrt{x+5} + 2 = 4$ کا حل سیٹ _____ ہے۔

(v) $0 < y + 2 < 5$ جبکہ $y \in \mathbb{R}$ کا حل سیٹ _____ ہے۔

3. درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

(i) ایک درجی مساوات ایک متغیر میں حل سیٹ ہے۔

(a) ایک عنصر (b) دو عناصر

(c) تین عناصر (d) ایک سے زیادہ عناصر۔

(ii) $|-20|$

(a) $= 20$

(b) < 20

(c) $= -20$

(d) > 20

(iii) $x \leq 4$ کا مطلب ہے۔

(a) $x < 4$

(b) $x = 4$

(c) $x < 4$ or $x = 4$

(d) $x > 4$ or $x = 4$



$$\sqrt{y} = 10 \text{ (iv) کا حل سیٹ ہے۔}$$

$$(a) \{100\}$$

$$(b) \{10\}$$

$$(c) \{-10\}$$

$$(d) \{-10, 10\}$$

$$\sqrt{y+4} + 2 = 8 \text{ (v) ؟}$$

$$(b) \text{ جذری مساوات}$$

$$(a) \text{ یک درجی مساوات}$$

$$(d) \text{ دو درجی مساوات}$$

$$(c) \text{ سہ درجی مساوات}$$

$$5 - 3y = -7 \text{ (vi) کا حل سیٹ ہے۔}$$

$$(a) \{-4\}$$

$$(b) \{1, 4\}$$

$$(c) \{4\}$$

$$(d) \{12\}$$

$$\sqrt{5y+5} + 5 = 10 \text{ (vii) کا حل سیٹ ہے۔}$$

$$(a) \{\pm 4\}$$

$$(b) \{5\}$$

$$(c) \{4\}$$

$$(d) \{-4\}$$

$$\left| \frac{5y}{3} \right| = 5 \text{ (viii) کا حل سیٹ ہے۔}$$

$$(a) \{3\}$$

$$(b) \{-5, 5\}$$

$$(c) \{3, -3\}$$

$$(d) \{-3\}$$

$$|-y| = 0 \text{ (ix) کا حل سیٹ ہے۔}$$

$$(a) \{1\}$$

$$(b) \{-1\}$$

$$(c) \{0\}$$

$$(d) \{\}$$

$$(x) \text{ اگر } x > 0, y > 0 \text{ اور } x - y < 0 \text{ تو}$$

$$(a) x < y$$

$$(b) x + y < 0$$

$$(c) x > y$$

$$(d) y - x < 0$$



خلاصہ

♦ ایک مساوات $ax + b = 0$ جہاں $a, b \in \mathbb{R}$ اور $a \neq 0$ ایک درجی مساوات کہلاتی ہے۔

♦ ایسی مساوات جس میں جذری علامت ہو اسے جذری مساوات کہا جاتا ہے۔ اگر جذری مساوات اضافی اصل ہو، تو حل کی تصدیق ضروری ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \quad \text{اگر } x \in \mathbb{R} \text{ تو پھر}$$

♦ اگر $x, y \in \mathbb{R}$ تو پھر

$$(i) |x| \geq 0 \quad (ii) |-x| = |x| \quad (iii) |xy| = |x| \cdot |y|$$

$$(iv) \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \quad (v) |x| = b \text{ تو پھر } x = b \text{ یا } x = -b$$

♦ غیر مساواتوں کیلئے ہم $<, >, \leq, \geq$ استعمال کرتے ہیں۔

♦ ایک لکیری الجبری اظہار جس میں غیر مساوات کی علامت ہوتی ہے اسے لکیری غیر مساوات یا غیر مساوات کہا جاتا ہے۔

♦ غیر مساوات کی خاصیتیں

- (i) $a < b$ یا $a = b$ یا $a > b$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$ (ثلاثی خاصیت)
(ii) $a > b$ اور $b > c \Rightarrow a > c$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ (خاصیت متعدیت)
(i) $a > b, c > 0 \Rightarrow ac > bc$ اور $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ (جمع اور ضربی خاصیت)



خطی یلائن (لینئر) گراف اور اس کے مستعملات

LINEAR GRAPH AND THEIR APPLICATION

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- دو حقیقی نمبرز کے جوڑے کی بطور مرتب جوڑا (ordered pair) پہچان کر سکیں۔
- مرتب جوڑوں کی مختلف مثالوں کے ذریعے شناخت کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتب جوڑا (2, 3) ہے جو امتحانی ہال میں موجود ایک نشست کو ظاہر کرتا ہے، جو دوسری قطار اور تیسرے کالم کے چوراہے پر ہے۔
- مستطیلی / کارٹیس پلین بیان کریں جو دو عددی خطوط پر مشتمل ہو اور ایک دوسرے کو مشترک نقطہ 0 پر موجود دائیں زاویہ پر کاٹی ہوں۔
- مستطیلی پلین میں مشترک نقطہ 0 اور کو آرڈینیٹ ایکسز (بالترتیب افقی اور عمودی ایکسز یا z ایکسز کی شناخت کریں۔
- مرتب جوڑے کی مناسبت سے مستوی میں نقطہ (a, b) کی نشاندہی کریں جس میں:
 - 'a' کو بطور x کو آرڈینیٹ (abscissa)
 - 'b' کو بطور y کو آرڈینیٹ (ordinate)
- معلوم نقاط کے سیٹ کو ملا کر مختلف جیومیٹرکل اشکال (مثلاً، قطعہ خط، مثلث اور مستطیل وغیرہ) بنائیں۔
- دو متغیرات میں خطی مساوات کو مطمئن کرنے والے رقموں کے جوڑوں کا جدول بنائیں۔
- دیے گئے جملوں کا گراف حاصل کرنے کے لیے نقاط کے جوڑے پلاٹ کریں۔
- گراف کھینچنے کے لیے مناسب پہانے کا انتخاب کریں۔

- گراف بنائیں:
- قسم کی مساوات کا $y = c$.
- قسم کی مساوات کا $x = a$.
- قسم کی مساوات کا $y = mx$.
- قسم کی مساوات کا $y = mx + c$.
- x اور y کی رقوم کے دیے گئے جدول سے گراف کھینچیں۔
- عملی زندگی سے وابستہ مسائل کو حل کرنے کا شعور حاصل کر سکیں۔
- کنورشن گراف کو دو مقداروں سے متعلق خطی گراف سے تعبیر کریں جو براہ راست تناسب میں ہیں۔
- ایک دن کئی گراف کو پڑھیں تاکہ ایک مقدار دوسری سے ملتی ہو۔
- اس قسم کے تبدلولوں کے لیے گراف پڑھیں:
- میل اور کلومیٹر
- ایکٹر اور ہیکٹر
- ڈگری سیلسیئس اور فارن ہائیٹ
- پاکستانی کرنسی اور دوسری کرنسی وغیرہ
- دو متغیرات میں دو خطی لینیر مساواتوں کو گراف کی مدد سے حل کرنا۔

7.1 کار تہیسی مستوی اور خطی گراف

7.1.1: حقیقی اعداد کے مترتب جوڑے کی شناخت کریں۔

دو حقیقی نمبرز کا ایک جوڑا مترتب جوڑا کہلاتا ہے۔ جس میں اس کے ارکان کو ایک مقررہ خاص ترتیب یا اصول کے مطابق درج کیا گیا ہو۔

7.1.2: مترتب جوڑوں کی مختلف مثالوں کے ذریعے شناخت کریں۔ مثال کے طور پر ایک مترتب جوڑا (2,3) ہے جو امتحانی ہال میں موجود ایک نشست کو ظاہر کرتا ہے۔ جو دوسری قطار اور تیسرے کالم کے چوراہے پر ہے۔


آئیے اپنے گرد نواح کی درج ذیل مثالیں دیکھیں۔ ان مثالوں کی وجہ سے ہم قطاروں اور کالموں کے ذریعے کسی شے کی پوزیشن کو پہچان سکتے ہیں یعنی مترتب جوڑے بناتے ہیں۔ مترتب جوڑا کسی شے یا جگہ کی پوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔

مثال 01

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1	(1,1)	(1,2)	(1,3)
Row 2	(2,1)	(2,2)	(2,3)
Row 3	(3,1)	(3,2)	(3,3)

مترتب جوڑا (2,3) امتحانی ہال میں طالب علم کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے دوسری قطار اور تیسرے کالم کے طور پر اسی طرح ہال میں موجود ہر طالب علم ایک منفرد مترتب جوڑے کے ساتھ ہے۔

مثال 02



اگر ایک کسان نے برابر فاصلے پر باغ میں درختوں کی منصوبہ بندی کی ہے، تو (2,6) درخت کی نمائندگی کرتا ہے جو باغ میں دوسری قطار اور چھٹے کالم پر واقع ہے۔






7.1.3: مستطیلی / کارتیسی پلین بیان کریں جو دو عددی خطوط پر مشتمل ہو اور ایک دوسرے کو مشترک نقطہ O پر موجود دائیں


زاویہ پر کاٹی ہوں۔

کارتیسی (مستطیلی) کو آرڈینیٹ سسٹم دو حقیقی عددی خطوط پر مشتمل ہوتا ہے جو مشترک نقطہ O پر موجود دائیں زاویہ پر ایک دوسرے کو کاٹی ہیں۔ یہ دو عددی خطوط ہموار سطح کو بیان کرتی ہیں یہ کارتیسی مستوی کہلاتا ہے۔



7.1.4: مستطیل پلین میں مشترک نقطہ O اور کو آرڈینیٹ ایکسز (بالترتیب افقی اور عمودی یا ایکسز، ایکسز کی شناخت

کریں۔



کارتیسی کو آرڈینیٹ سسٹم میں، افقی عددی خط کو x ایکسز اور عمودی عددی خط کو y ایکسز کہا جاتا ہے۔ وہ نقطہ جہاں دونوں خطوط آپس میں ملتے ہیں اور اصل (origin) کہلاتا ہے اور اسے 0 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

دی گئی شکل میں افقی خط x ایکسز اور عمودی خط y ایکسز کہلاتا ہے۔ کارتیسی مستوی کا وہ نقطہ جہاں دونوں خطوط ملتے ہیں پلین کا اور اصل (origin) ہے جو کہ 'O' ہے۔




7.1.5: مترتب جوڑے a, b کی مناسبت سے مستوی میں نقطہ کی نشاندہی کریں جس میں

• 'a' کو بطور x کو آرڈینیٹ (abscissa)

• 'b' کو بطور y کو آرڈینیٹ (ordinate)

عام طور پر، کارتیسی مستوی کے کسی بھی نقطہ کی نمائندگی مترتب جوڑے (a, b) کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ جہاں 'a' کو



آرڈینیٹ (abscissa) ہے اور b کو y کو آرڈینیٹ (ordinate) کہتے ہیں۔

مستوی میں ایک نقطہ تلاش کرنے کے لیے، ہمیں اس کے x کو آرڈینیٹ

کا پتہ ہونا چاہیے، جو اس کا y ایکسز اور y کو آرڈینیٹ سے افقی فاصلہ ہے

اور x ایکسز سے اس کا عمودی فاصلہ ہے۔

x ایکسز اور y ایکسز کارتیسی مستوی کو چار کوآرڈینیٹس میں تقسیم کرتے

ہیں جن کو رومن عدد I, II, III, IV نام دیا گیا ہے۔ کارتیسی مستوی کو xy

مستوی بھی کہا جاتا ہے۔

• کوآرڈینیٹ I میں، دونوں x اور y کوآرڈینیٹس مثبت ہوتے ہیں

$$x > 0 \text{ اور } y > 0$$

• کوآرڈینیٹ II میں x کوآرڈینیٹ منفی اور y کوآرڈینیٹ مثبت ہوتا ہے اور $x < 0$ اور $y > 0$

• کوآرڈینیٹ III میں x اور y کوآرڈینیٹ منفی ہوتے ہیں اور $x < 0$ اور $y < 0$

• کوآرڈینیٹ IV میں x کوآرڈینیٹ مثبت اور y کوآرڈینیٹ منفی ہوتا ہے اور $x > 0$ اور $y < 0$

• اور جن (origin) پر $x = y = 0$ ہوتا ہے تو اور یکن کے کوآرڈینیٹس $(0, 0)$ ہوتے ہیں۔


کارتیسی مستوی (x, y) میں نقطہ کو گراف میں لگانے کا طریقہ:


آئیے ہم مثالوں کے ذریعے پڑھیں گے کارتیسی مستوی میں نقطہ کو کس طرح پلاٹ کیا جاتا ہے۔

$(2, 3)$ مستوی میں نقطہ (x, y) کو پلاٹ کرنے کے لیے اور یکن سے شروع کریں y ایکسز

کی دائیں طرف 2 یونٹ پر پہنچیں اور پھر x ایکسز سے 3 یونٹ اوپر کی طرف جائیں

جس طرح شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ہم نقطہ x پر پہنچ جائیں گے جو P کو ظاہر کرتا ہے۔






مثال 01 درج ذیل نقاط کا بیسا اور آرڈینیٹ کا تعین کریں اس میں رلیج کا ذکر بھی کریں جس میں نقطہ واقع ہے۔

نقاط کا مقام تلاش کریں۔

D (0, -3) (iv) C (3, 0) (iii) B (-2, 3) (ii) A (1, 2) (i)

مل: پیمانہ (Escale) 5 چھوٹے مربع 1 یونٹ



A (1, 2) (i)

یہاں ایسیسا 1 یونٹ اور ڈینیٹ 2 یونٹ ہیں۔ کیونکہ $x > 0$ اور $y > 0$ تو

معلوم نقاط ربع I (Quadrant) میں واقع ہیں۔

B (-2, 3) (ii)

یہاں ایسیسا 2 اور ڈینیٹ 3 ہے۔ $x < 0$ اور $y > 0$ تو دیے گئے نقاط

ربع II میں واقع ہیں۔


C (3, 0) (iii)

یہاں ایسیسا 3 یونٹ اور ڈینیٹ 0 یونٹ ہے، اسی لیے نقطہ x ایکسز پر موجود ہے، i.e. اور یجن (origin) کے دائیں طرف۔

D(0, -3) (iv)

یہاں، ایسیسا 0 یونٹ اور ڈینیٹ 3 یونٹ ہے اسی لیے نقطہ y ایکسز پر موجود ہے، i.e. اور یجن کے نیچے۔

7.1.6: مختلف جیومیٹرکل اشکال (قطعہ خط، مثلث اور مستطیل وغیرہ) بنائیں۔




پچھلی جماعتوں میں ہم نے کئی جیومیٹرکل اشکال کے مواد کے بارے میں مطالعہ کیا ہے اور یہ بھی مطالعہ کیا ہے کہ دی گئی معلومات کے مطابق انہیں کس طرح بنایا جائے۔ اب ہم دیے گئے نقاط کا استعمال کرتے ہوئے گراف پیپر پر مختلف جیومیٹرکل اشکال بنائیں گے۔

مثال 01 ایک قطعہ خط AB کھینچیں جس کے اختتامی نقاط A(1,1) اور B(6,5) ہیں۔


اور B(6,5) ہیں۔

طریقہ: پیمانہ: 5 چھوٹے مربع 1 یونٹ۔

پہلے ہم گراف پیپر پر خط کے نقاط ڈھونڈتے ہیں پھر ان کو ملا کر ہمیں قطعہ خط AB حاصل ہوتا ہے جیسا تصویر میں دکھایا گیا ہے۔




مثال 02 مثلث ABC بنائیں جس کے راس $A(-2,1)$, $B(1,5)$ اور $C(4,2)$ ہے۔



طریقہ: پیماہ: 5 چھوٹے مربع - 1 یونٹ

پہلے، ہم نقاط A , B , and C کو گراف پیپر پر پلاٹ کریں گے۔
پھر ہم $\triangle ABC$ بنانے کے لیے ان کو ملائیں گے جس طرح تصویر میں دکھایا گیا ہے۔

مثال 03 ایک مستطیل ABCD بنائیں جس کے راس



$A(-5, 1)$, $B(-5, 4)$, $C(5, 4)$ and $D(5, 1)$ ہیں۔

طریقہ: پیماہ: 5 چھوٹے مربع - 1 یونٹ۔

نقاط $A(-5, 1)$, $B(-5, 4)$, $C(5, 4)$ and $D(5, 1)$ کو گراف پیپر پر پلاٹ کریں۔

گراف پیپر پر نقاط A to B , B to C , C to D and D to A سے ملائیں جس کا نتیجہ مستطیل ABCD ہے۔

7.1.7: دو متغیرات میں خطی مساوات کو مطمئن کرنے والی رقوموں کے جوڑوں کا جدول بنائیں۔


یہ نیچے دی گئی مثالوں کی مدد سے بیان کیا جاسکتا ہے:

مثال 03 فرض کریں $x+y=5$ ایک خطی مساوات ہے بالترتیب دو متغیر x and y میں۔

حل: معلوم ہے کہ $x+y=5$ جس کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے: $y=5-x$

اب جدول تیار کریں x کی رقوم لکھیں اور ان سے متعلقہ y کی رقوم حاصل کریں۔

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	8	7	6	5	4	3	2	...



مشق 7.1

1. درج ذیل میں سے x اور y کو آرڈینیٹ کی پہچان کریں۔

- | | | |
|---------------|--------------|----------------|
| i. A(-2, 2) | ii. B(5, -1) | iii. C(4, 0) |
| iv. D(-5, -6) | v. E(3, 4) | vi. F(-√8, √8) |

2. ربع (Quadrant) کی نشاندہی کریں جس میں درج ذیل نقاط موجود ہیں۔

- | | | |
|---------------|--------------|-------------------|
| i. A(2, -1) | ii. B(-3, 3) | iii. C(2√2, -2√2) |
| iv. D(-2, -4) | v. E(5, 4) | vi. F(3/2, 5/2) |

3. درج ذیل نقاط A, B, C and D کو xy مستوی میں لگائیں۔

- | |
|---|
| i. A(2, 1), B(3, 2), C(-3, 4), D(-4, -5) |
| ii. A(2, 0), B(0, 2), C(3, -3), D(-3, 3) |
| iii. A(0, 0), B(-3, -3), C(5, -6), D(-6, 5) |

4. نقاط AB کو ملا کر قطعہ خط A(4, 6) اور B(-6, 8) کھینچیں۔

5. نقاط ABC کو ملا کر مثلث A(-1, 4), B(-3, -6) اور C(3, -2) کھینچیں۔

6. نقاط ABCD کو ملا کر مستطیل A(0, -1), B(0, 5), C(7, -1) اور D(7, 5) کھینچیں۔

7. نقاط OABC کو ملا کر مربع O(0, 0), A(5, 0), B(5, 5) اور C(0, 5) بنائیں۔

8. نقاط OABC کو ملا کر متوازی الاضلاع O(0, 0), A(2, 4), B(5, 0) اور C(6, 4) بنائیں۔

9. درج ذیل خطی مساوات کا x and y کی چند رقوم کا جدول بنائیں۔

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| i. $x + y - 2 = 0$ | ii. $2x - y - 2 = 4$ |
| iii. $\frac{1}{2}(x + 2y) - 6 = 0$ | iv. $\frac{2}{3}(x - 2y) = -2$ |

7.1.8: دیے گئے جملوں کا گراف حاصل کرنے کے لیے نقاط کے جوڑے پلاٹ کریں۔

فرض کریں کہ خطی مساوات $y = 2x$ دو متغیرات پر مشتمل ہے۔ یہاں x کو آزاد متغیر (independent variable) اور y کو منحصر متغیر (dependent variable) کہا جاتا ہے۔ کیونکہ y کی رقم x کی رقم پر منحصر ہے۔ دی گئی مساوات کا گراف بنانے کے لیے ہم x اور y کے لیے رقوم کا جدول بناتے ہیں، اور پھر ان مترتب جوڑوں کو آرڈینیٹ مستوی پر پلاٹ کرتے ہیں۔ ایک خط کا تعین کرنے کے لیے دو نقاط کافی ہیں۔ تاہم ممکنہ غلطیوں سے بچنے کے لیے دو

7.1.10: گراف بنائیں۔

* $y=c$ قسم کی مساوات کا۔

* $x=a$ قسم کی مساوات کا۔

* $y=mx$ قسم کی مساوات کا۔

* $y=mx + c$ قسم کی مساوات کا۔

(i): 7.1.10

$y=4$ قسم کی مساوات کا گراف بنائیں۔

مثال 01 کا گراف بنائیں۔ پیمانہ 5 چھوٹے مربع 1 یونٹ
حل: گراف بنانے کے لیے جدول بنائیں۔

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	4	4	4	4	4	4	4	...

$y=4$ کا گراف تصویر میں دکھایا گیا ہے۔

نوٹ:

$y=c$ کا گراف x-axis ایکسز کے متوازی ہے۔

(ii): 7.1.10

مثال 01 $x=-3$ قسم کی مساوات کا گراف بنائیں، پیمانہ 5 چھوٹے مربع 1 یونٹ

طریقہ: گراف بنانے کے لیے جدول بنائیں۔

x	-3	-3	-3	-3	-3	...
y	-2	-1	0	1	2	...

مساوات کا گراف تصویر میں دکھایا گیا ہے۔


نوٹ:

$x=a$ کا گراف y-axis ایکسز کے متوازی ہوتا ہے۔



x	0	1	2	3	4	...
y	0	2	4	6	8	...


مسلل مترتب جوڑے (x, y) کو گراف میں جمع کرتے ہوئے جہاں y کی رقم x کی رقم سے دوگنا ہے۔ پہر ہم نقاط کے ذریعے ایک کھینچتے ہے تاکہ خط پر موجود تمام نقاط کو دکھایا جاسکے۔ گراف کے ہر سرے پر موجود تیرا اشارہ کرتے ہیں کہ خط دونوں سمتوں میں لاتناہی جاری ہے۔ نتیجہ خیز گراف اس طرح نظر آئے گا جیسا کہ دی گئی تصویر میں دکھایا گیا ہے۔



7.1.9: گراف کھینچنے کے لیے مناسب پیمانے کا انتخاب کریں۔

پیمانے کو اس طرح منتخب کیا جانا چاہیے کہ ڈیٹا (data) کی منصوبہ بندی کرنا آسان ہو اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ گرڈ پونٹ کے لیے عددی رقم کا تعین کرنے کے لیے جو ہر متغیر کی حد کے لیے بہترین ہے۔

مساوات کا گراف کھینچنے کے لیے ہم ایک پیمانہ منتخب کرتے ہیں جیسے ایک چھوٹا مربع کی لمبائی 1 یونٹ کی نمائندگی کرتی ہے یا دو چھوٹے مربع 1 یونٹ کی نمائندگی کرتے ہیں وغیرہ۔ یہ کاغذ کے سائز کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات x and y دونوں کو آرڈینیٹ کے لیے ایک ہی پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات کو آرڈینیٹ کی رقم کو مد نظر رکھتے ہوئے x and y کو آرڈینیٹ کے لیے مختلف پیمانے کا استعمال کیا جاتا ہے۔



7.1.10 (iii): $y=mx$ قسم کی مساوات کا گراف بنائیں۔

مساوات $y=mx$ کی رقم (یا اس کا y کو آرڈینیٹ) x کا ایک سے زیادہ اور کی رقم ہے۔ جہاں مسلسل حقیقی سے عدد ہے۔



مثال 01 اگر $y=2x$ کی رقم معلوم کریں اور اس کا گراف بنائیں۔


حل: بیانہ: 5 چھوٹے مربع-1 یونٹ
گراف بنانے کے لیے جدول بنائیں۔

x	-2	-1	0	1	2	...
y	-4	-2	0	2	4	...

نوٹ: $y = mx$ کا گراف ہمیشہ مشترکہ نقطہ (origin) سے گزرتا کرتا ہے۔

7.1.10 (iv): $y=mx+c$ میں جہاں m اور c کوئی حقیقی اعداد ہیں۔

مثال 01 مساوات $y = -2x+3$ کا گراف بنائیں بیانہ: 3 چھوٹے مربع-1 یونٹ



گراف بنانے کے لیے جدول بنائیں۔

x	-2	-1	0	1	2	3	...
y	7	5	3	1	-1	-3	...

7.1.11 دیے گئے (مجرد) رقموں کے جدول سے گراف کھینچیں۔

(مجرد) رقم کے دیے گئے جدول سے گراف کھینچنے کے لیے، x اور y کی رقم کو نقاط کی شکل جوڑا جاتا ہے جسے پھر گراف پیپر پر

پلات کیا جاتا ہے۔

نوٹ: $y = mx + c$ کا گراف ہمیشہ y -axis پر $y=c$ ایکسز کو کاٹتا ہے۔





مثال 01 نیچے جدول میں دیے گئے نقاط کی رقوم سے گراف بنائیں

x	1	2	3	4	...
y	-1	2	5	8	...

مل: دیے گئے جدول سے، ہمارے پاس ہے، $A(1, -1)$, $B(2, 2)$, $C(3, 5)$ and $D(4, 8)$ تو ہم گراف پیپر پر گراف

پلاٹ کرتے ہیں۔


پیمانہ: 5 چھوٹے مربع-1 یونٹ



7.1.12: لاگو حقیقی زندگی کے مسائل کو حل کریں۔

خطی مساوات کو حقیقی زندگی کے متعدد مسائل کے نمونے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ آپ ایک وقت میں کتنا پیسہ کماتے ہیں، یا ایک سائیکل سوار جو فاصلہ طے کرے گا جس میں پیڈلنگ کی مستحکم شرح دی جائے گی۔ ان رشتوں کو ایک کوآرڈینیٹ مستوی پر گراف کرنے سے اکھر آپ کو مسئلہ اور ان کے حل کے بارے میں سوچنے میں مدد مل سکتی ہے۔

مثال وزن (y) کلو میں اور ایک شخص کی عمر (x) سالوں میں جو اس مساوات، $y=2x+3$ سے ظاہر کیا جا رہا ہے،



x(age)	1	2	3	4	5	...
y(weight)	5	7	9	11	13	...

مساوات کا عمر وزن گراف کھینچیں۔



مشق 7.2

1. نیچے دی گئی مساوات کا جدول بنائیں جو رقوم کے جوڑے کے مطمئن کرے: $x + y = 6$
2. مناسب پیمانے کا استعمال کرتے ہو، نیچے دیے گئے جدول سے گراف بنائیں۔

x	0	-1	4	-4
y	2	4	5	-5

3. گراف پلاٹ کریں۔

i. $y = 3$

ii. $x = 3$

iii. $y = 0$

iv. $y = 2x + y$


v. $x = 3.5$

vi. $-y = 2x$

4. نیچے دیے گئے جدول میں نامعلوم کو آرڈینیٹس تلاش کریں۔

S.No	مساوات	$-x$ کو آرڈینیٹ	$-y$ کو آرڈینیٹ
(i)	$y = \frac{1}{2}x$	0	
		4	
(ii)	$x = \frac{2}{3}y$	1	
			$\frac{3}{2}$
(iii)	$2x + 4y = 8$	0	?
			$\frac{1}{4}$
(iv)	$2x + y = 6$	1	
			0
(v)	$x - y = 2$		0
		1	?
(vi)	$x - 3y = 6$	3	?
			-1

5. وزن ___ کلو میں اور کسی شخص کی عمر ___ سالوں میں جو مساوات ___ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل جدول سے عمر و وزن گراف کھینچیں۔





6. عائشہ مسلسل 20 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دو پہیا گاڑی چلا سکتی ہے اس صورت کے لیے فاصلہ وقت کا گراف بنائیں، خطی گراف کے ذریعے حساب لگائیں:

(ا) عائشہ نے 100 کلو میٹر کی سواری میں جو وقت لیا۔

(ب) کل فاصلہ جو عائشہ نے 3 گھنٹوں میں طے کیا۔

7.2 کنورشن گراف

7.2.1: کنورشن گراف کو دو مقداروں سے متعلق خطی گراف سے تعبیر کریں جو براہ راست تناسب میں ہیں۔

یہاں ہم ایک کنورشن گراف لیں گے جو دو مقداروں سے متعلق خطی گراف سے تعبیر ہے اور براہ راست تناسب میں ہے۔

ہم مترتب جوڑوں کا مظاہر کرتے ہیں جو مساوات $y = x - 5$ کے گراف پر واقع ہیں جو جدول کے نیچے دی گئی حسابی اقدار ہیں۔

x	0	1	2	3	4	5
y	-5	-4	-3	-2	-1	0
(x, y)	(0, -5)	(1, -4)	(2, -3)	(3, -2)	(4, -1)	(5, 0)


دی گئی خطی مساوات کے گراف پر نقاط تلاش کریں جس میں x کو آرڈینیٹ کی رقم میں ہر یونٹ کی تبدیلی کے لیے y کو آرڈینیٹ کی رقم میں متناسب تبدیلی ہوتی ہے۔



7.2.2: ایک دی گئی گراف کو پڑھیں تاکہ ایک مقدار دوسری سے ملتی ہو۔

خطی مساوات $y = x - 5$ لیں۔

x کی دی گئی رقم سے ہم y کی متعلقہ رقم پڑھ سکتے ہیں $y = x - 5$ کی مدد سے، x کی دی گئی رقم سے y کی متعلقہ رقم پڑھ سکتے ہیں،



مساوات $y = x - 5$ کو مساوات $x = y + 5$ میں تبدیل کر کے اور متعلقہ کنورشن گراف بنا کر۔ کنورشن گراف میں ہم x و y کی اصطلاح میں ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے: $x = y + 5$

y	-5	-4	-3	-2	-1	0
x	0	1	2	3	4	5
(y, x)	(-5, 0)	(-4, 1)	(-3, 2)	(-2, 3)	(-1, 4)	(0, 5)

x کے حوالے سے y کا تبادلوں کا گراف پیپر پر کھینچا گیا ہے۔



7.2.3: اس قسم کے تبادلوں کے لیے گراف پڑھیں۔

میل اور کلو میٹر

ایکڑ اور ہیکٹر


ڈگری سیلسیئس اور فارن ہائیٹ

پاکستانی کرنسی اور دوسری کرنسی وغیرہ۔

اگر دونوں مقداریں متعلقہ ہیں یا تو بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، تو تعلق کا گراف سیدھی خط ہو گا جس میں دونوں مقداروں کی سطح کو آرڈینیٹ ایکسز سے ظاہر ہوتی ہے۔

(i) میل اور کلو میٹر کے تبادلوں کے لیے گراف پڑھیں۔

آئیے میل اور کلو میٹر کی قسم کے گراف پر بات کریں، دونوں فاصلہ کے یونٹ ہیں، اگر میل میں فاصلہ x محور (axis) کے ساتھ اور کلو میٹر میں فاصلہ y محور کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ آئیے درج ذیل مثالیں دیکھیں۔





مثال 03 میل اور کلو میٹر کے درمیان درج ذیل تبادلوں کے گراف کو تقریباً تبدیل کرنے کے لیے پڑھیں تبدیل کریں:

(i) 2 میل کو کلو میٹر میں

(ii) 5 میل کو کلو میٹر میں

(iii) 3 کلو میٹر کو میل میں

(iv) 7 کلو میٹر کو میل میں

دیے گئے پیمانے کے استعمال سے۔

میل اور کلو میٹر کے درمیان تبادلوں کا گراف۔

پیمانہ: 5 چھوٹے مربع - 1 میل x محور کے ساتھ

5 چھوٹے مربع - 1 کلو میٹر y محور کے ساتھ۔



حل:

(i) 2 میل کو کلو میٹر میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 3.20 کلو میٹر _____ 2 میل۔

(ii) 5 میل کو کلو میٹر میں۔

اوپر دیئے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 8 کلو میٹر - 5 میل

(iii) 3 کلو میٹر کو میل میں۔

اوپر دیئے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 1.8 میل ---- 3 کلو میٹر۔

(iv) 7 کلو میٹر کو میل میں۔

اوپر دیئے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 4.20 میل - 7 کلو میٹر



(ii) ایکڑ اور ہیکٹر کے تبادلوں کے لیے گراف پڑھیں۔

آئیے ہم ہیکٹر اور ایکٹر کی شکل کے گراف پر تبادلہ خیال کریں، دونوں زمین کے رقبے کی اکائی پر اگر ہیکٹر میں فاصلہ ___ محور کے ساتھ اور ایکٹر میں فاصلہ ___ محور کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ آئیے درج ذیل مثالیں دیکھیں۔

مثال: ایکڑ اور ہیکٹر کے درمیان درج ذیل تبادلوں کا گراف پڑھیں۔ تبدیل کریں:

(i) 2 ہیکٹر کو ایکٹر میں۔

(ii) 6 ہیکٹر کو ایکٹر میں۔

(iii) 10 ایکٹر کو ہیکٹر میں۔


(iv) 8 ایکٹر کو ہیکٹر میں۔

دیے گئے پیمانے کے استعمال سے

ایکڑ اور ہیکٹر کے درمیان تبادلوں کا گراف۔

پیمانہ: 5 چھوٹے مربع - 1 ہیکٹر x محور کے ساتھ۔

2 چھوٹے مربع - 1 ایکٹر y محور کے ساتھ۔



حل:

(i) 2 ہیکٹر کو ایکٹر میں۔


اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 5 ایکٹر - 2 ہیکٹر

(ii) 6 ہیکٹر کو ایکٹر میں۔

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 15 ایکٹر - 6 ہیکٹر

(iii) 10 ایکٹر کو ہیکٹر میں۔

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 4 ہیکٹر - 10 ایکٹر





(iv) 8 ایکڑ کو ہیکٹرس میں:

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 3.20 ہیکٹرس - 8 ایکڑ۔

(iii) ڈگری سیلسیئس اور ڈگری فارن ہائیٹ کا تبادلہ کا گراف پڑھیں۔

آئیے سیلسیئس اور فارن ہائیٹ کی شکل کے گراف پر بات کریں، دونوں درجہ حرارت کے اکائی ہیں اگر سیلسیئس میں درجہ حرارت x محور کے ساتھ اور فارن ہائیٹ میں درجہ حرارت y محور کی ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ آئیے درج ذیل مثالیں دیکھیں۔

مثال سیلسیئس اور فارن ہائیٹ کے درمیان درج ذیل تبدیلیوں کا گراف پڑھیں اور تبدیل کریں:

(i) 1 سیلسیئس کو فارن ہائیٹ میں

(ii) 3 سیلسیئس کو فارن ہائیٹ میں

(iii) 36 فارن ہائیٹ کو سیلسیئس میں


(iv) 37 فارن ہائیٹ کو سیلسیئس میں

دیے گئے پیمانے کی استعمال سے۔

سیلسیئس اور فارن ہائیٹ کے درمیان تبدیلیوں کا گراف

پیمانہ: 5 چھوٹے مربع - 1 سیلسیئس x محور کے ساتھ


5 چھوٹے مربع - 1 سیلسیئس y محور کے ساتھ۔



حل:

(i) 1 سیلسیئس کو فارن ہائیٹ میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 33.8 فارن ہائیٹ 1° Celsius $\cong$ سیلسیئس



(ii) 3 سیلیسٹس کو فارن ہائیٹ میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دے سکتے ہیں کہ: 37.4 فارن ہائیٹ = 3 سیلیسٹس

(iii) 36 فارن ہائیٹ کو سیلیسٹس میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 2.2 سیلیسٹس = 36 فارن ہائیٹ

(iv) 37 فارن ہائیٹ کو سیلیسٹس میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 2.8 سیلیسٹس = 37 فارن ہائیٹ

(iv) کرنسی کا تبادلوں کا گراف پڑھیں:

مثال 1: ڈالر (\$) اور پاکستانی روپے (Rs) کے درمیان درج ذیل تبادلوں کا گراف پڑھیں اور تبدیل کریں:

(i) \$2 کو روپے میں

(ii) \$5 کو روپے میں

(iii) 360 روپے کو (\$) میں


(iv) 720 روپے کو (\$) میں

دیے گئے پیمانے کے استعمال سے۔

ڈالر اور پاکستانی روپے کے درمیان تبادلوں کا گراف

پیمانہ: 5 چھوٹے مربع -x محور کے ساتھ


5 چھوٹے مربع -y محور کے ساتھ



حل:

(i) \$2 کو روپے میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: \$2 = 240 روپے





(ii) \$5 کو روپے میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: \$5 = 600 روپے

(iii) 360 روپے کو \$ میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 360 روپے = \$3

(iv) 720 روپے کو \$ میں

اوپر دیے گئے گراف کو پڑھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ: 720 روپے = \$6

7.3 دو متغیر میں مساوات کا گرافک حل:

7.3.1: دو متغیرات میں دو خطی لینیئر مساواتوں کو گراف کی مدد سے حل کرنا۔

ہم نے پہلے ہی دو متغیرات کے ساتھ دو خطی مساوات کی کھوج کا مطالعہ کیا ہے۔ اب اس سیکشن میں دو خطی مساوات کا حل دو متغیرات میں گرافک طور پر تلاش کریں گے۔ ان دو سیدھی خطوں کے درمیان کا نقطہ ان مساوات کا حل ہے۔

مثال 03 دی گئی مساوات کے لیے گرافک طور پر حل سیٹ تلاش کریں۔ $x + y = 3$ and $x - y = 5$

حل: دی گئی مساوات مندرجہ ذیل ہیں:

$$x + y = 3 \dots (1)$$

$$\text{and } x - y = 5 \dots (2)$$

مساوات (1) اور (2) سے، ہم ان کو y کے طور پر لکھ سکتے ہیں جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے:

$$y = 3 - x \dots (3)$$


$$\text{and } y = x - 5 \dots (4)$$


اب ہر خطی مساوات کے لیے جدول بنائیں، مساوات (3) کے لیے جدول مندرجہ ذیل ہے:

x	-1	0	1	2	3	4	...
y	4	3	2	1	0	-1	...

مساوات (4) کے لیے جدول مندرجہ ذیل ہے:

x	-1	0	1	2	3	4	...
y	-6	-5	-4	-3	-2	-1	...





دونوں جدول کے نقاط کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیدھے خط کھینچیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ دی گئی مساوات کا گراف سیدھی خط 4 اور
 l_1 and l_2 ہے، جو نقطہ $(4, -1)$ پر ملتی ہے۔
مثال کے طور پر l_1 intersect l_2 کو نقطہ $(4, -1)$ پر کاٹتی ہے۔
لہذا حل سیٹ $\{(4, -1)\}$ ہے۔

مثال 02 $y=2x+4$ and $y=2x-2$
دی گئی مساوات کا گرافک طور پر حل سیٹ لاش کریں

حل: دی گئی مساوات درج ذیل ہیں:

$$\begin{aligned} y &= 2x + 4 & \dots & (1) \\ \text{and } y &= 2x - 2 & \dots & (2) \end{aligned}$$

اب ہر خطی مساوات کے لیے الگ سیٹ بنائیں۔

مساوات (i) کے لیے جدول درج ذیل ہے:

x	-1	0	1	2	3	4
y	2	4	6	8	10	12


مساوات (ii) کے لیے جدول درج ذیل ہے:

x	-1	0	1	2	3	4
y	-4	-2	0	2	4	6

اب ایک ہی گراف پر دونوں مساوات کے لیے ان نقاط کو تلاش کریں اور پھر دونوں مساوات کے نقاط کو جوڑ کر دو خطوط بنائیں۔
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھی خطوط ان مساوات سے حاصل ہوتی ہیں جن کا کوئی مشترک نقطہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطوط


کسی بھی مقام پر آپس میں نہیں ملتے ہیں۔ لہذا اس کا حل سیٹ خالی ہے۔

اس طرح، حل سیٹ _____ ہے۔





مشق 7.3



1. میل اور کلو میٹر کے درمیان تبادلوں کا گراف پڑھیں اور تبدیل کریں۔

(i) 1 میل کو کلو میٹر میں (ii) 2 کلو میٹر کو میل میں

(iii) 3 میل کو کلو میٹر میں (iv) 8 کلو میٹر کو میل میں

دیے گئے پیمانے کے استعمال سے۔

میل اور کلو میٹر کے درمیان تبادلوں کا گراف:

پیمانہ: 5 چھوٹے مربع 1 میل x محور کے ساتھ

5 چھوٹے مربع 1 کلو میٹر y محور کے ساتھ

2. دیے گئے ہیکٹس اور ایکڑ کے درمیان تبادلوں کا گراف پڑھیں اور تبدیل کریں۔

(i) 2 ہیکٹس کو ایکڑ میں (ii) 5 ایکڑ کو ہیکٹس میں


(iii) 5 ہیکٹس کو ایکڑ میں (iv) 15 ایکڑ کو ہیکٹس میں

دیے گئے پیمانے کے استعمال سے۔

ہیکٹس اور ایکڑ کے درمیان تبادلوں کا گراف

پیمانہ: 5 چھوٹے مربع 1 ہیکٹس x محور کے ساتھ

5 چھوٹے مربع 1 ایکڑ y محور کے ساتھ۔



3. سیلسیئس اور فارن ہائیٹ کے درمیان تبادلوں کا گراف پڑھیں اور تبدیل کریں:

(i) 2 سیلسیئس کو فارن ہائیٹ میں (ii) 32 فارن ہائیٹ کو سیلسیئس میں

(iii) 1.80 سیلسیئس کو فارن ہائیٹ میں (iv) 36.4 فارن ہائیٹ کو سیلسیئس میں

دیے گئے پیمانے کے استعمال سے۔


سیلسیئس اور فارن ہائیٹ کے درمیان تبادلوں کا گراف:

پیمانہ: 5 چھوٹے مربع 1 سیلسیئس x محور کے ساتھ

5 چھوٹے مربع 1 فارن ہائیٹ y محور کے ساتھ۔



4. دیے گئے سعودی ریال اور پاکستانی روپے (Rs) کے درمیان تبادلوں کا گراف پڑھیں اور تبدیل کریں۔



(i) 3 سعودی ریال کے روپے میں

(ii) 5.2 سعودی ریال کو روپے میں۔

(iii) 150 روپے کو سعودی ریال میں

(iv) 78 روپے کو سعودی ریال میں۔

دیے گئے پیمانے کے استعمال سے۔

سعودی ریال اور پاکستانی روپے (Rs) کے درمیان تبادلوں کا گراف:

پیمانہ: 5 چھوٹے مربع - 1 سعودی ریال x محور کے ساتھ

5 چھوٹے مربع - 30 روپے y محور کے ساتھ۔

5. گراف کیل طریقہ سے مندرجہ ذیل مساوات کو حل کریں

i. $3x - 11 = y; x - 3y = 9$

ii. $x + y = 4; 2x - 1 = 5y$

iii. $2x = y + 5; x = 2y + 1$

iv. $y = 3x - 5; x + y = 11$

v. $2x + y = 3; x - y = 0$

vi. $2x + 2 = y; y = x - 1$

vii. $5 = x + 4y; 2x + 3y = 0$

viii. $3x = 5y - 2; 3x + 5y = 8$

ix. $\frac{x+2}{5} + y = 6; y = 2x - 12$

x. $3x - 2y = 13; 2x + 3y = 13$



Review Exercise 7

1. صحیح اور غلط سوالات۔

درج ذیل جملوں کو دھیان سے پڑھیں اور 'دیا' یا 'جو بھی' ہو اس پر دائرہ لگائیں۔

(i) کار تیسری مستوی کو xy مستوی بھی کہا جاتا ہے۔ (د/غ)

(ii) دوسرے ربع میں x and y دونوں مثبت ہوتے ہیں۔ (د/غ)

(iii) نقطہ $(1, -2)$ پہلے ربع میں موجود ہوتا ہے۔ (د/غ)

(iv) $(-3, -4)$ چوتھے ربع میں واقع ہوتا ہے۔ (د/غ)

2. درج ذیل میں سے درست جواب پر () لگائیں:

(i) نقطہ $(-3, -4)$ واقع ہے _____ میں۔

(ا) پہلا ربع (ب) دوسرا ربع (ج) تیسرا ربع (د) چوتھا ربع۔

(ii) دو کو آرڈینیٹ محور ایک دوسری کو زاویہ _____ پر کاٹتے ہیں۔

(ا) 45° (ب) 90° (ج) 180° (د) 270°

(iii) خط $y = 4$ متوازی ہے _____ کے:

(ا) x محور (ب) y محور (ج) دونوں محور (د) ان میں سے کوئی نہیں۔

(iv) خط $x = -5$ متوازی ہے _____ کے

(ا) x محور (ب) y محور (ج) دونوں محور (د) کوئی نہیں۔

(v) خط $x = -5$ محور پر نقاط ہیں:



(ا) $(-5, 5)$ (ب) $(0, -5)$ (ج) $(-5, 0)$ (د) $(5, 0)$

(vi) خط $x = 2$ and $x = 5$ کا حل سیٹ ہے:

(ا) $\{(2, 5)\}$ (ب) $\{2, 5\}$ (ج) $\{(0, 5)\}$ (د) $\{ \}$

(vii) کو آرڈینیٹ محور باہمی طور پر ہیں:


(ا) متوازی الاضلاع (ب) متوازی (ج) 30° پر کاٹنا (د) 45° پر کاٹنا۔





خلاصہ

- مترتب جوڑے کارتیسی مستوی میں نقاط کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔
- 2 جہتی کارتیسی کو آرڈینیٹ سسٹم سے مراد دو متوازی الاضلاع خطوط ہیں۔ مثال کے طور پر x محور اور y محور۔ دونوں محور ایک دوسرے کو ایک خاص نقطہ پر کاٹتے ہیں i.e. اور یجن (origin) $(0,0)$ کہلاتا ہے۔
- مستوی محور سے چار ربع میں تقسیم ہوتا ہے۔
- کارتیسی مستوی کو xy مستوی بھی کہا جاتا ہے۔
- ربع I میں دونوں x اور y کو آرڈینیٹ مثبت ہیں $x > 0$ $y > 0$ ۔
- ربع II میں x کو آرڈینیٹ منفی اور y کو آرڈینیٹ مثبت ہوتا ہے $x < 0$ and $y > 0$ ۔
- ربع III میں دونوں xy کو آرڈینیٹ منفی ہوتے ہیں $x < 0$ and $y < 0$ ۔
- ربع IV میں x کو آرڈینیٹ مثبت اور y کو آرڈینیٹ منفی ہوتا ہے $x > 0$ and $y < 0$ ۔
- مشترکہ نقطہ (origin) پر $x = y = 0$ تو مشترکہ نقطہ (origin) کے نقطہ $(0,0)$ ہوتا ہے۔
- عام طور پر، مترتب جوڑے (a, b) کی مناسبت سے مستوی میں نقطہ کی نشاندہی کریں جس میں a کو آرڈینیٹ (abscissa) اور b کو آرڈینیٹ (ordinate) ہے۔
- $x = a$ کا گراف y محور کے متوازی ہے۔
- $y = c$ کا گراف x کے محور کے متوازی ہے۔
- $y = mx$ کا گراف ہمیشہ مشترکہ نقطہ (origin) سے گذرتا ہے۔
- $y = mx + c$ کا گراف $y = c$ پر محور کو کاٹتا ہے۔



دو درجی مساوات

8

یونٹ

QUADRATIC EQUATION

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

♦ ایک متغیر میں دو درجی مساوات کو حل کرنا بذریعہ

♦ تجزیہ

♦ تکمیل مربع

♦ بذریعہ تکمیل مربع، دو درجی فارمولا اخذ کرنا۔

♦ دو درجی فارمولا سے دو درجی مساوات کو حل کرنا۔

♦ $ax^4 + bx^2 + c = 0$ قسم کی مساواتوں کو دو درجی مساواتوں میں تبدیل کر کے حل کرنا۔

♦ $ap(x) + \frac{c}{p(x)} = b$ قسم کی مساواتوں کو حل کریں جہاں a, b and c ناطق اعداد ہیں۔

♦ $a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$ قسم کی معکوس مساواتوں کو حل کرنا جہاں a, b and c ناطق اعداد ہیں۔

♦ قوت نمائی مساواتوں جن کے متغیر قوت نماؤں میں ہوں، حل کرنا۔

♦ $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = k$ قسم کی مساواتوں کو جبکہ $a + b = c + d$ $k \neq 0$ حل کرنا۔

♦ اس قسم کی مساواتوں کو حل کرنا۔

$$\sqrt{(ax + b)} = cx + d.$$

$$\sqrt{(x + a)} + \sqrt{(x + b)} = \sqrt{(x + c)}$$

$$\sqrt{(x^2 + px + m)} + \sqrt{(x^2 + px + n)} = q$$

8.1 دو درجی مساوات اور ان کا حل

8.1.1: واضح کریں، پھر دو درجی مساوات کو اس کی معیاری فارم (شکل) میں بیان کریں۔

ایک کثیر رشتی مساوات جس کی درجہ 2 ہو دو درجی مساوات کہلاتی ہے۔

$ax^2+bx+c=0$ ، دو درجی مساوات کی معیاری فارم (شکل) ہے، جہاں $a, b, c \in \mathbb{R}$ and $a \neq 0$ حقیقی اعداد ہیں۔ یہاں

a ، x^2 کا عددی سر، b ، x کا عددی سر اور c مستقل مقدار ہے۔ $ax^2+bx+c=0$ میں، اگر $a=0$

تو یہ یک درجی مساوات $bx+c=0$ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اگر $b=0$ پھر یہ خالص (pure) دو درجی مساوات $ax^2+c=0$ میں تبدیل ہو جاتی ہے

درج ذیل دو درجی مساوات کی مثالیں ہیں۔

$$4x^2+4x+1=0, \quad (i) \quad (\text{دو درجی مساوات معیاری شکل میں})$$

$$x^2-4=0, \quad (ii) \quad (\text{خالص دو درجی مساوات})$$

8.1.2: ایک متغیر میں دو درجی مساوات کو حل کریں بذریعہ

• تجزی

• تکمیل مربع

یہاں ہم دو طریقوں پر غور کرتے ہیں، دو درجی مساوات کے حل کے لیے۔

(1) طریقہ تجزی (2) طریقہ تکمیل مربع

(a) طریقہ تجزی:

$$(i) \quad x^2 + 2x - 15 = 0 \quad (ii) \quad 2x^2 - 5x = 12 \quad \text{مثال 02} \quad \text{حل کریں۔}$$

حل 1:

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 5x - 3x - 15 = 0$$

$$\Rightarrow x(x+5) - 3(x+5) = 0$$

$$\Rightarrow (x-3)(x+5) = 0$$

$$\Rightarrow x-3=0 \quad \text{or} \quad x+5=0$$

$$\Rightarrow x=3 \quad \text{or} \quad x=-5$$

لہذا، حل سیٹ $\{-5, 3\}$ ہے۔



حل 2:

$$\begin{aligned}
 2x^2 - 5x &= 12 \\
 \Rightarrow 2x^2 - 5x - 12 &= 0 \\
 \Rightarrow 2x^2 - 8x + 3x - 12 &= 0 \\
 \Rightarrow 2x(x - 4) + 3(x - 4) &= 0 \\
 \Rightarrow (x - 4)(2x + 3) &= 0 \\
 \Rightarrow x - 4 = 0 \quad \text{یا} \quad 2x + 3 = 0 \\
 \Rightarrow x = 4 \quad \text{یا} \quad x = -\frac{3}{2} \\
 \text{لہذا، حل سیٹ } \left\{ -\frac{3}{2}, 4 \right\} &\text{ ہے۔}
 \end{aligned}$$

مثال 02 خالص دودرجی مساوات $4m^2 - 1 = 0$ کو تجزی طریقہ سے حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned}
 4m^2 - 1 &= 0 \\
 \Rightarrow (2m)^2 - (1)^2 &= 0 \\
 \Rightarrow (2m - 1)(2m + 1) &= 0 \quad [a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\
 \Rightarrow 2m - 1 = 0 \quad \text{یا} \quad 2m + 1 &= 0 \\
 \text{i.e. } \Rightarrow 2m = 1 \quad \text{یا} \quad 2m &= -1 \\
 \Rightarrow m = \frac{1}{2} \quad \text{یا} \quad m &= -\frac{1}{2} \\
 \text{لہذا، حل سیٹ } \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\} &= \text{ ہے۔}
 \end{aligned}$$

(b) طریقہ تکمیل مربع:

طریقہ نیچے بیان کیا گیا ہے۔

(i) مساوات کو معیاری شکل میں لکھیں $ax^2 + bx + c = 0$ (ii) مساوات کی دونوں اطراف کو معروف عددی سر x^2 سے تقسیم کریں اگر یہ 1 نہیں ہے۔

(iii) مستقل مقدار کو دائیں ہاتھ پر منتقل کریں۔

(iv) جمع کریں $\left(\frac{x \text{ کا عددی سرا}}{2} \right)^2$ کا عددی سے

(v) بائیں ہاتھ والی مساوات کو کامل مربع کے طور پر لکھیں اور پھر دائیں ہاتھ کو حل کریں۔



(vi) معلوم مساوات کی دونوں طرف جذر (square root) لیں، مساوات کا حل تلاش کرنے کے لیے نتیجے میں آنے والی مساوات کو حل کریں اور پھر حل سیٹ لکھیں۔
 $2x^2 + 8x - 1 = 0$ کو حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 8x - 1 &= 0 \\ \Rightarrow 2x^2 + 8x &= 1 \quad \dots (i) \\ \Rightarrow x^2 + 4x &= \frac{1}{2} \quad \dots (ii) \quad (\text{مساوات (1) کو 2 سے تقسیم دیں}) \end{aligned}$$

مساوات (ii) کی دونوں اطراف پر $\left[\frac{1}{2} \times 4\right]^2 = 4$ کو جمع کریں۔
 ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$x^2 + 4x + 4 = \frac{1}{2} + 4$$

$$\Rightarrow x^2 + 2(2)x + (2)^2 = \frac{1}{2} + (2)^2$$

$$\Rightarrow (x+2)^2 = \frac{1}{2} + 4$$

$$\Rightarrow (x+2)^2 = \frac{9}{2}$$

$$\Rightarrow x+2 = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l|l} x+2 = \frac{3}{\sqrt{2}} & x+2 = -\frac{3}{\sqrt{2}} \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l|l} x+2 = \frac{3\sqrt{2}}{2} & x+2 = \frac{-3\sqrt{2}}{2} \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l|l} x = -2 + \frac{3\sqrt{2}}{2} & x = -2 - \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l|l} x = \frac{-4 + 3\sqrt{2}}{2} & x = \frac{-4 - 3\sqrt{2}}{2} \end{array}$$

لہذا، حل سیٹ $\left\{ \frac{-4 + 3\sqrt{2}}{2}, \frac{-4 - 3\sqrt{2}}{2} \right\}$ ہے۔

مشق 8.1

1. درج ذیل دو درجی مساوات کو تجزی طریقے سے حل کریں

(i) $x^2 + 5x + 6 = 0$ (ii) $6x^2 - x - 1 = 0$ (iii) $x^2 - 11x + 30 = 0$
 (iv) $x^2 - 2x = 0$ (v) $x^2 - 2x - 15 = 0$ (vi) $12x^2 - 41x + 24 = 0$
 (vii) $(x - 5)^2 - 9 = 0$ (viii) $(3x + 4)^2 - 16 = 0$

2. درج ذیل میں سے ہر ایک کو مکمل مربع طریقے سے حل کریں۔

(i) $x^2 + 6x + 1 = 0$ (ii) $(3x + 2)(x + 2) = 6 - 2(x + 1)$ (iii) $3x^2 - 8x = -1$
 (iv) $24x^2 = -10x + 21$ (v) $2(x^2 - 3) - 3x = 2(x + 3)$ (vi) $2x^2 + 4x - 1 = 0$

3. مساوات $x^2 + bx - 8 = 0$ کا ایک جذر (root) 2 ہے۔

(i) b کی رقم کیا ہے؟

(ii) مساوات کا دوسرا جذر کیا ہے؟

8.2 دو درجی فارمولا:

مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ کو حل کرنے کے لیے ہم درج ذیل دو درجی فارمولا استعمال کرتے ہیں۔

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

دو درجی فارمولا کہلاتا ہے۔

8.2.1: بذریعہ مکمل مربع، دو درجی فارمولا اخذ کریں۔

دو درجی مساوات کو معیاری شکل میں لکھیں۔ (i) $ax^2 + bx + c = 0$. . .

کو مساوات (i) کی دونوں اطراف پر تقسیم دیں، ہمیں حاصل ہوتا ہے۔


$$\frac{ax^2}{a} + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = \frac{0}{a}$$

$$\therefore x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = 0$$

مستقل مقدار $\frac{c}{a}$ کو دائیں ہاتھ پر منتقل کریں

$$\therefore x^2 + \frac{bx}{a} = -\frac{c}{a} \quad \text{. . . (ii)}$$

کو مساوات (ii) کی دونوں اطراف پر جمع کریں۔

$$\left(\frac{b}{2a}\right)^2$$


$$\begin{aligned}
\therefore x^2 + \frac{bx}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\
\Rightarrow x^2 + 2(x)\left(\frac{b}{2a}\right) + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2} \\
\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{-4ac + b^2}{4a^2} \\
\Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\
\Rightarrow x + \frac{b}{2a} &= \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
\Rightarrow x &= -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
\Rightarrow x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
\end{aligned}$$

8.2.2: دودرجی فارمولا سے دودرجی مساوات کو حل کریں۔

مثال 01 دودرجی فارمولا سے حل کریں

(i) $2x^2 - 5x - 3 = 0$ (ii) $x^2 + x + 1 = 0$

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

یہاں $a = 2, b = -5$ and $c = -3$

دودرجی فارمولا کو حل کرتے ہوئے۔

حل 1:

$$\begin{aligned}
\therefore x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
\therefore x &= \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(2)(-3)}}{4} \\
\Rightarrow x &= \frac{5 \pm \sqrt{25 - (-24)}}{4} \\
\Rightarrow x &= \frac{5 \pm \sqrt{49}}{4} \\
\Rightarrow x &= \frac{5 \pm 7}{4}
\end{aligned}$$



$$\begin{array}{l|l} \Rightarrow x = \frac{5+7}{4} & x = \frac{5-7}{4} \\ \Rightarrow x = \frac{12}{4} & x = \frac{-2}{4} \\ \Rightarrow x = 3 & x = -\frac{1}{2} \end{array}$$

تو جذر 3 and $-\frac{1}{2}$ (roots) ہیں

لہذا، حل سیٹ $\left\{3, -\frac{1}{2}\right\}$ ہے۔

$$x^2 + x + 1 = 0$$

یہاں $a = 1, b = 1$ اور $c = 1$

دو درجی فارمولا استعمال کرتے ہوئے۔

$$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{(1)^2 - 4(1)}}{2(1)}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{لہذا، حل سیٹ } \left\{ \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right\} \text{ ہے۔}$$

مشق 8.2

درج ذیل مساوات کو دو درجی فارمولا سے حل کریں۔

(i) $x^2 - 2x = 15$

(ii) $10x^2 + 19x - 15 = 0$ (iii) $x^2 = -x + 1$

(iv) $2x = 9 - 3x^2$

(v) $9x^2 = 12x - 49$

(vi) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - 1 = 0$

(vii) $3x^2 - 2x + 2 = 0$

(viii) $6x^2 - x - 1 = 0$

(ix) $4x^2 - 10x = 0$

(x) $x^2 - 1 = 0$

(xi) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(xii) $\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x-4} = 4$



8.3 مساواتوں کو دو درجی فارم میں تبدیل کریں۔

متلف قسم کی مساوات ہیں جو دو درجی نہیں ہیں مگر انہیں دو درجی مساوات میں مناسب طریقے سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

8.3.1: $ax^4 + bx^2 + c = 0, a \neq 0$ قسم کی مساواتوں کو دو درجی مساواتوں میں تبدیل کر کے حل کریں جہاں چورجی

(quartic) دو درجی مساوات

مساوات $ax^4 + bx^2 + c = 0$ لیں، یہ چورجی یا دو درجی مساوات ہے اور اس کو دو درجی مساوات میں تبدیل کیا جاسکتا ہے

جہاں $y = x^2$ طریقہ درج ذیل مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ $ay^2 + by + c = 0$

مثال چورجی مساوات $4x^4 - 25x^2 + 36 = 0$ کو حل کریں۔

$$4x^4 - 25x^2 + 36 = 0 \quad \dots (i) \quad \text{مل:}$$

اس مساوات کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے۔

$$4(x^2)^2 - 25x^2 + 36 = 0 \quad \dots (ii)$$

مساوات (ii) میں $y = x^2$ لگائیں

ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$y^2 - 25y + 36 = 0$$

یہاں $a = 4, b = -25$ and $c = 36$

$$\therefore y = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$$\therefore y = \frac{-(-25) \pm \sqrt{(-25)^2 - 4(4)(36)}}{2(4)}$$

$$y = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 576}}{2(4)} = \frac{25 \pm \sqrt{49}}{8} = \frac{25 \pm 7}{8}$$

$$\text{i.e., } y = \frac{25 + 7}{8}$$

$$y = \frac{32}{8} = 4$$


$$\text{لیکن, } y = x^2, \text{ پھر}$$

$$x^2 = 4$$

$$y = \frac{25 - 7}{8}$$

$$y = \frac{18}{8} = \frac{9}{4}$$

$$x^2 = \frac{9}{4}$$





$$x = \pm 2 \quad \left| \quad x = \pm \frac{3}{2} \right.$$

لہذا، حل سیٹ $\left\{ \pm 2, \pm \frac{3}{2} \right\}$ ہے۔

8.3.2 $ap(x) + \frac{c}{p(x)} = b$ قسم کی مساواتوں کو حل کریں جہاں a, b and c ناطق اعداد ہیں۔

مثال 02 $8\sqrt{x+3} - \frac{1}{\sqrt{x+3}} = 2$ کو حل کریں۔

$$8\sqrt{x+3} - \frac{1}{\sqrt{x+3}} = 2 \quad \dots (i)$$

فرض کریں $y = \sqrt{x+3} \Rightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$ اس رقم کو مساوات (i) میں لگائیں، ہمارے پاس ہے،

$$\Rightarrow 8y - \frac{1}{y} = 2$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 1 = 2y$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 2y - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 8y^2 - 4y + 2y - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 4y(2y-1) + 1(2y-1) = 0$$

$$\Rightarrow (4y+1)(2y-1) = 0$$

$$\Rightarrow 4y+1=0$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{4}$$

$$y = -\frac{1}{4},$$

$$\sqrt{x+3} = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow x+3 = \frac{1}{16}$$

$$2y-1=0$$


$$y = \frac{1}{2},$$

$$y = \frac{1}{2}, \text{ پھر },$$

$$\sqrt{x+3} = \frac{1}{2}$$

دونوں طرف قوت نما 2 ہیں۔

$$x+3 = \frac{1}{4}$$



$$\Rightarrow x = \frac{1}{16} - 3$$

$$\Rightarrow x = \frac{1-48}{16}$$

$$\Rightarrow x = -\frac{47}{16}$$

$$x = \frac{1}{4} - 3$$

$$x = \frac{1-12}{4}$$

$$x = -\frac{11}{4}$$

تصدیق:

$$8\sqrt{x+3} - \frac{1}{\sqrt{x+3}} = 2$$

$x = -\frac{11}{4}$ کو مندرجہ بالا مساوات میں لگائیں۔
 $x = -\frac{47}{16}$ کو مندرجہ بالا مساوات میں لگائیں۔

$$8\sqrt{\frac{-47}{16} + 3} - \frac{1}{\sqrt{\frac{-47}{16} + 3}} = 2$$

$$8\sqrt{\frac{-47+48}{16}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{-47+48}{16}}} = 2$$

$$8\sqrt{\frac{1}{16}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{16}}} = 2$$

$$8\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{\left(\frac{1}{4}\right)} = 2$$

$$2 - 4 = 2$$

$$-2 \neq 2$$

غیر تصدیق شدہ

$$8\sqrt{\frac{-11}{4} + 3} - \frac{1}{\sqrt{\frac{-11}{4} + 3}} = 2$$

$$8\sqrt{\frac{-11+12}{4}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{-11+12}{4}}} = 2$$

$$8\sqrt{\frac{1}{4}} - \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = 2$$


$$8\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)} = 2$$

$$4 - 2 = 2$$

$$2 = 2$$

تصدیق شدہ

لہذا، حل سیٹ $\left\{-\frac{11}{4}\right\}$ ہے۔



8.3.3: $a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$ ، قسم کی معکوس مساواتوں کو حل کریں، جہاں a, b, c ناطق اعداد ہیں۔

کثیر رقتی مساوات معکوس مساوات کہلاتی ہے اگر یہ x کی جگہ $\frac{1}{x}$ درج کرنے سے تبدیل نہ ہو۔

$$a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0, \text{ ناطق اعداد ہیں } a, b, c$$

کو نیچے مثال سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 9\left(x + \frac{1}{x}\right) + 14 = 0 \quad \text{مثال 01}$$

حل:

$$(i) \quad 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 9\left(x + \frac{1}{x}\right) + 14 = 0. \dots (i) \text{ تو مساوات (i) ہو جائے گی۔}$$

$$\text{لہذا، حل سیٹ } x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2 \text{ پھر } x + \frac{1}{x} = y \text{ ہے۔}$$

$$2(y^2 - 2) - 9y + 14 = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 9y + 10 = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 4y - 5y + 10 = 0$$

$$\Rightarrow 2y(y - 2) - 5(y - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (y - 2)(2y - 5) = 0$$

$$\text{i.e. } y - 2 = 0$$

$$\Rightarrow y = 2$$

$$y = x + \frac{1}{x}, \text{ پھر}$$

$$x + \frac{1}{x} = 2$$

$$\Rightarrow x^2 + 1 = 2x$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$2y - 5 = 0$$

$$y = \frac{5}{2}$$

$$y = x + \frac{1}{x}, \text{ پھر}$$

$$x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 1}{x} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2 = 5x$$



$$\begin{aligned}\Rightarrow (x-1)^2 &= 0 \\ \Rightarrow x-1 &= 0 \\ \Rightarrow x &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2x^2 - 5x + 2 &= 0 \\ \Rightarrow 2x^2 - 4x - x + 2 &= 0 \\ \Rightarrow 2x(x-2) - 1(x-2) &= 0 \\ \Rightarrow (x-2)(2x-1) &= 0 \\ \Rightarrow x-2 &= 0 \\ \Rightarrow x &= 2 \\ \Rightarrow 2x-1 &= 0 \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\left\{ \frac{1}{2}, 2, 1 \right\} = \text{حل سیٹ}$$

8.3.4: قوت نمائی مساواتوں جن کے متغیر قوت ماؤں میں ہوں، حل کریں۔

ایسی مساواتیں جن میں متغیر قوت نماؤں میں ہو، قوت نمائی مساواتیں کہلاتی ہیں۔ اس قسم کی مساواتوں کا حل نیچے دی گئی مثال سے واضح کیا گیا ہے۔


مثال 02 $7^{1+x} + 7^{1-x} = 50$ کو حل کریں۔

$$\begin{aligned}7^{1+x} + 7^{1-x} &= 50 \quad \dots (i) \\ 7 \cdot 7^x + 7 \cdot 7^{-x} - 50 &= 0 \quad (\text{قوت نماؤں کو تقسیم کریں}) \\ \Rightarrow 7 \cdot 7^x + \frac{7}{7^x} &= 50 \quad \dots (ii)\end{aligned}$$

$y = 7^x$ فرض کریں
 $\therefore$ مندرجہ ذیل بالا مساوات (ii) درج ذیل میں تبدیل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned}7y + \frac{7}{y} - 50 &= 0, \\ \Rightarrow 7y^2 + 7 - 50y &= 0 \\ \Rightarrow 7y^2 - 50y + 7 &= 0 \\ \Rightarrow 7y^2 - 49y - y + 7 &= 0 \\ \Rightarrow 7y(y-7) - 1(y-7) &= 0 \\ \Rightarrow (7y-1)(y-7) &= 0\end{aligned}$$

حل





$$\begin{array}{lcl}
 \Rightarrow & 7y - 1 = 0 & | \quad y - 7 = 0 \\
 \Rightarrow & y = \frac{1}{7} & \Rightarrow y = 7 \\
 \text{then } 7^x = 7^{-1} & & y = 7 \text{ then } 7^x = 7^1 \\
 \Rightarrow x = -1 & & x = 1
 \end{array}$$

لہذا، حل سیٹ $\{-1, 1\}$ ہے۔

8.3.5: $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=k$, قسم کی مساواتوں کو جبکہ $a+b=c+d$ اور مستقل مقدار $k \neq 0$ کو حل کریں۔

مثال 01

$$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 48$$

$$(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 48$$

دوبارہ ترتیب دے کر۔

$$(x+1)(x+4)(x+2)(x+3) = 48$$

$$(x^2 + 4x + x + 4)(x^2 + 2x + 3x + 6) = 48$$

$$(x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) = 48 \dots (i)$$

$$x^2 + 5x = t \text{ فرض کریں}$$

(i) مساوات میں لگا کر۔

$$\Rightarrow (t+4)(t+6) = 48$$

$$\Rightarrow t^2 + 4t + 6t + 24 = 48$$

$$\Rightarrow t^2 + 10t - 24 = 0$$

$$\Rightarrow t^2 + 12t - 2t - 24 = 0$$

$$\Rightarrow t(t+12) - 2(t+12) = 0$$

$$\Rightarrow (t+12)(t-2) = 0$$

$$\Rightarrow t + 12 = 0$$

$$\Rightarrow t = -12$$

$$t - 2 = 0$$

$$t = 2$$

مساوات (ii) میں رکھنے سے

$$\Rightarrow x^2 + 5x = -12$$

$$\Rightarrow x^2 + 5x + 12 = 0$$

مساوات (ii) میں رکھنے سے

$$x^2 + 5x = 2$$

$$x^2 + 5x - 2 = 0$$



Here: $a=1, b=5$ and $c=12$,

$$\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 48}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{-23}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm i\sqrt{23}}{2}$$

$$\text{لہذا، حل سیٹ } \left\{ \frac{-5 \pm i\sqrt{23}}{2}, \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2} \right\}$$

Here: $a=1, b=5$ and $c=-2$,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 8}}{2}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$$

مشق 8.3

درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

1. $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

3. $12x^4 - 11x^2 + 2 = 0$

5. $\sqrt{\frac{2x^2+1}{x^2+1}} + 6\sqrt{\frac{x^2+1}{2x^2+1}} = 5$

7. $2^x + \frac{16}{2^x} = 8$

9. $4\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 - 4\left(\frac{x}{x-1}\right) + 1 = 0$

11. $2^2 + 2^{-x+6} - 20 = 0$

13. $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 120$

2. $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$

4. $\frac{2x+3}{x+1} + 6\left(\frac{x+1}{2x+3}\right) = 7$

6. $5^{x+1} + 5^{2-x} = 5^3 + 1$

8. $2\left(\frac{x}{x+1}\right)^2 - 5\left(\frac{x}{x+1}\right) + 2 = 0$

10. $9^{x+2} - 6 \cdot 3^{x+1} + 1 = 0$

12. $(x-1)(x+5)(x+8)(x+2) = 880$

14. $(x-2)(x+1)(x+3)(x-4) = 24$



8.4 جذری مساواتیں

مساوات جس میں متغیر کے جذری جملے شامل ہوں جذری مساواتیں کہلاتی ہیں
جذری مساواتوں کے حل کی تصدیق ہونے چاہیے کیونکہ اس کے جذر خارجی ہو سکتے ہیں۔

8.4.1: اس قسم کی مساواتوں کا حل:

Type (i) $\sqrt{ax + b} = cx + d$ Type (ii) $\sqrt{x + a} + \sqrt{x + b} = \sqrt{x + c}$

Type (iii) $\sqrt{x^2 + px + m} + \sqrt{x^2 + px + n} = q$

(i) قسم $\sqrt{ax + b} = cx + d$

Solve $\sqrt{217 - x} = x - 7$

$\sqrt{217 - x} = x - 7$

دونوں اطراف پر قوت نما 2 لیں

$(\sqrt{217 - x})^2 = (x - 7)^2$

$\Rightarrow 217 - x = (x - 7)^2$

$\Rightarrow 217 - x = x^2 - 14x + 49$

$\Rightarrow x^2 - 13x - 168 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 21x + 8x - 168 = 0$

$\Rightarrow x(x - 21) + 8(x - 21) = 0$

$\Rightarrow (x - 21)(x + 8) = 0$

i.e. $x = 21$ or $x = -8$

تصدیق $x = 21$

$\sqrt{217 - x} = x - 7$

$\therefore \sqrt{217 - 21} = 21 - 7$

$\Rightarrow \sqrt{196} = 14$

$\Rightarrow 14 = 14$

تصدیق

لہذا، حل سیٹ $\{21\}$

تصدیق $x = -8$

$\sqrt{217 - x} = x - 7$

$\therefore \sqrt{217 - (-8)} = -8 - 7$

$\Rightarrow \sqrt{225} = 15$

$\Rightarrow 15 \neq -15$

غیر تصدیق شدہ

مثال

حل



(ii) قسم $\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b} = \sqrt{x+c}$

Solve: $\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$

مثال

حل

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$$

دونوں اطراف پر قوت نما 2 لگائیں، ہم حاصل ہوتا ہے۔

$$(\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2})^2 = (\sqrt{6x+13})^2$$

$$\Rightarrow (\sqrt{x+7})^2 + 2(\sqrt{x+7})(\sqrt{x+2}) + (\sqrt{x+2})^2 = 6x+13$$

$$\Rightarrow x+7 + 2\sqrt{(x+7)(x+2)} + x+2 = 6x+13,$$

$$\Rightarrow 2x+9 + 2\sqrt{x^2+7x+2x+14} = 6x+13$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{x^2+9x+14} = 4x+4$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2+9x+14} = 2x+2$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2+9x+14} = 2(x+1)$$

دوبارہ دونوں اطراف پر قوت نما لیں

$$(\sqrt{x^2+9x+14})^2 = [2(x+1)]^2$$

$$\Rightarrow x^2+9x+14 = 4(x+1)^2$$

$$\Rightarrow x^2+9x+14 = 4(x^2+2x+1)$$

$$\Rightarrow x^2+9x+14 = 4x^2+8x+4$$

$$\Rightarrow 3x^2-x-10 = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2+5x-6x-10 = 0$$

$$\Rightarrow x(3x+5)-2(3x+5) = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)(3x+5) = 0$$

$$3x+5 = 0$$

i.e. $x = -\frac{5}{3}$

تصدیق:

$$x = -\frac{5}{3}$$

جب

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$$

$$x-2 = 0$$

$$x=2$$

تصدیق:

$$x=2$$

جب

$$\sqrt{x+7} + \sqrt{x+2} = \sqrt{6x+13}$$



$$\sqrt{-\frac{5}{3}+7} + \sqrt{-\frac{5}{3}+2} = \sqrt{6\left(-\frac{5}{3}\right)+13}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{16}{3}} + \sqrt{\frac{1}{3}} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{\sqrt{3}} \neq \sqrt{3}$$

غیر تصدیق شدہ

$$\sqrt{2+7} + \sqrt{2+2} = \sqrt{6(2)+13},$$

$$\Rightarrow \sqrt{9} + \sqrt{4} = \sqrt{25}$$

$$\Rightarrow 3+2=5$$

$$\Rightarrow 5=5$$

تصدیق شدہ

کیوں: $-\frac{5}{3}$ خارجی جذر ہے اس لیے حل $x=2$ لہذا، حل سیٹ $=\{2\}$ ہے۔

(iii) قسم: $\sqrt{x^2+px+m} + \sqrt{x^2+px+n} = q$

Solve: $\sqrt{x^2-3x+21} - \sqrt{x^2-3x+5} = 2$

Put $y=x^2-3x$ لکھیں، معلوم مساوات میں، ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\sqrt{x^2-3x+21} - \sqrt{x^2-3x+5} = 2$$

$$\sqrt{y+21} - \sqrt{y+5} = 2$$

$$\sqrt{y+21} = 2 + \sqrt{y+5}$$

دونوں اطراف پر قوت نما 2 لیں

$$y+21 = (2)^2 + 4\sqrt{y+5} + (\sqrt{y+5})^2$$

$$\Rightarrow y+21 = (2)^2 + 4\sqrt{y+5} + (\sqrt{y+5})^2$$

$$\Rightarrow y+21 = 4 + 4\sqrt{y+5} + y+5$$

$$\Rightarrow 4\sqrt{y+5} = y+21-4-y-5$$

$$\Rightarrow 4\sqrt{y+5} = 12$$

$$\Rightarrow \sqrt{y+5} = 3$$

دوبارہ دونوں اطراف پر قوت نما 2 لیں، ہمیں حاصل ہوتا ہے۔



$$\Rightarrow y+5 = 9$$

$$\Rightarrow y=4,$$

$y=4$ لیں $y=x^2-3x$ کی جگہ پر ہمارے پاس ہے۔

مثال 01

حل:



$$x + 1 = 0$$

$$x = -1,$$

تصدیق:

جب $x = -1$

$$\sqrt{x^2 - 3x + 21} - \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 2$$

$$\sqrt{(-1)^2 - 3(-1) + 21} - \sqrt{(-1)^2 - 3(-1) + 5} = 2$$

$$\sqrt{1 + 3 + 21} - \sqrt{1 + 3 + 5} = 2$$

$$\sqrt{25} - \sqrt{9} = 2$$

$$5 - 3 = 2$$

$$2 = 2$$

$$4 = x^2 - 3x,$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0,$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + x - 4 = 0,$$

$$\Rightarrow x(x - 4) + 1(x - 4) = 0,$$

$$\Rightarrow (x - 4)(x + 1) = 0,$$

$$\text{i.e., } x - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x = 4,$$

تصدیق:

جب $x = 4$

$$\sqrt{x^2 - 3x + 21} - \sqrt{x^2 - 3x + 5} = 2$$

$$\sqrt{(4)^2 - 3(4) + 21} - \sqrt{(4)^2 - 3(4) + 5} = 2$$

$$\sqrt{16 - 12 + 21} - \sqrt{16 - 12 + 5} = 2$$

$$\sqrt{25} - \sqrt{9} = 2$$

$$5 - 3 = 2$$

$$2 = 2$$

لہذا دونوں جذر معلوم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں، لہذا حل سیٹ $\{-1, 4\}$ ہے۔

مشق 8.4

درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

$$1. \quad x + \sqrt{x+5} = 7$$

$$2. \quad \sqrt{x-2} = 8 - x$$

$$3. \quad \sqrt{7-5x} + \sqrt{13-5x} = 3\sqrt{4-2x}$$

$$4. \quad \sqrt{x+2} + \sqrt{x+7} = \sqrt{6x+13}$$

$$5. \quad \sqrt{2x^2 + 3x + 4} + \sqrt{2x^2 + 3x + 9} = 5$$

$$6. \quad \sqrt{y^2 - 3y + 9} - \sqrt{y^2 - 3y + 36} + 3 = 0$$



1. خالی جگہ پُر کریں۔

(i) کثیر رقتی مساوات جس میں متغیر کی ڈگری _____ ہو دو درجی مساوات کہلاتی ہے۔

(ii) دو درجی مساوات کی معیاری شکل _____ ہوتی ہے۔

(iii) $3^x + 3^{2x} = 1$ _____ مساوات کہلاتی ہے۔

(iv) $3^x = 9$ کا حل ہے۔

(v) $ax^2 + bx + c = 0$ کا حل ہے _____

2. درست جواب پر (✓) لگائیں۔

(i) دو درجی مساوات کی ڈگری ہے:

(i) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

(ii) دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے:

(i) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ (ب) $ax^2 + c = 0, a \neq 0$

(ج) $ax^2 + bx = 0, a \neq 0$ (د) $ax^3 + bx^2 + c = 0, a \neq 0$

(iii) $ax^2 + bx + c = 0$ کے لیے دو درجی فارمولا ہے۔

(i) $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$ (ب) $\frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

(ج) $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (د) $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$

(iv) $x^2 + 10x + 24 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

(i) $\{-6, -4\}$ (ب) $\{-6, 4\}$ (ج) $\{6, 4\}$ (د) $\{6, -4\}$

(v) دو درجی مساوات میں رقبوں کی تعداد ہے:

(i) 2 (ب) 3 (ج) 1 (د) 4


(vi) $x^2 - 15x + 56$ کے دو یک درجی فیکٹر ہیں:

(i) $(x-7)$ and $(x+8)$ (ب) $(x+7)$ and $(x-8)$

(ج) $(x-7)$ and $(x-8)$ (د) $(x+7)$ and $(x+8)$

(vii) کثیر رقتی مساوات جو $\frac{1}{x}$ کی جگہ $a/$ an درج کرنے سے تبدیل نہ ہوں کہلاتی ہے۔

(i) قوت نہائی مساوات (ب) معکوس مساوات
(ج) جذری مساوات (د) ان میں سے کوئی نہیں



(viii) کثیر رتی مساوات جو $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ کی جگہ a/an درج کرنے سے تبدیل نہ ہوں کہلاتی ہے۔

(ا) قوت نمائی مساوات (ب) معکوس مساوات

(ج) جذری مساوات (د) ان میں سے کوئی نہیں

(ix) $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

(ا) $\{ \pm 4 \}$ (ب) $\{ 4 \}$ (ج) $\{ \pm 2 \}$ (د)

(x) $2x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 3x + 2 = 0$ قسم کی مساوات کہلاتی ہے:

(ا) معکوس مساوات (ب) جذری مساوات

(ج) قوت نمائی مساوات (د) ان میں سے کوئی نہیں

3. درست اور غلط سوالات:

درج ذیل جملوں کو دہیان سے پڑھیں اور درست کی صورت میں 'د' پر اور غلط کی صورت میں 'غ' پر دائرہ لگائیں۔

(i) ہم دو درجی مساوات تجزی طریقے سے حل ہو سکتی ہے۔ (د/غ)

(ii) ہر چودرجی مساوات کے 2 جذر ہوتے ہیں۔ (د/غ)

(iii) ہر کیوبک مساوات کے 3 جذر ہوتے ہیں۔ (د/غ)

(iv) $ax^2 + bx + c = 0$ میں دو درجی مساوات ہے اگر x, c, b, a حقیقی اعداد ہیں۔ (د/غ)

(v) خارجی جذر مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ (د/غ)

(vi) خارجی جذر مساوات کو مطمئن نہیں کرتا۔ (د/غ)

(vii) دو درجی مساوات کا سب سے بڑا قوت نما متغیر کا 2 ہے۔ (د/غ)



خلاصہ

- ایک کثیر رتی مساوات جس کا متغیر 2 ہو دو درجی مساوات کہلاتی ہے۔
- $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0, a, b, c$ حقیقی اعداد ہوں تو یہ دو درجی مساوات کا معیاری شکل کہلاتی ہے۔
- دو درجی مساوات $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ کا فارمولا ہے $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $\neq 0$ is
- قوت نمائی مساوات میں، متغیر قوت نمایاں ہوتے ہیں۔
- ایسی مساوات جس میں جذری علامت کے اندر کوئی جملہ ہو جذری مساوات کہلاتی ہے۔

متماثل مثلثان

CONGRUENT TRIANGLES


حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- ♦ مندرجہ ذیل نظریات کو ان کے نتائج کے ساتھ سمجھیں اور ان کو متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں۔
- ♦ دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کا ایک ضلع اور دوسرا یہ دوسری مثلث کے متناظرہ ضلع اور زاویوں کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔
- ♦ اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے مخالف اضلاع بھی متماثل ہوتے ہیں۔
- ♦ دو مثلثوں کی مطابقت میں اگر ایک مثلث کے تینوں اضلاع دوسری مثلث کے متناظرہ تین اضلاع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔
- ♦ اگر دو قائمہ الزاویہ مثلثوں کی مطابقت میں ایک مثلث کا وتر اور ایک ضلع دوسری مثلث کے وتر اور متناظرہ ضلع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔

تعارف:

ایک مثلث میں چھ عناصر ہیں، تین اضلاع اور تین زاویے۔ اگر ہمیں دو مثلثیں ABC اور PQR دیے جائیں تو ہم ان مثلث کے اطراف اور زاویوں کے درمیان چھ مختلف طریقوں سے (1-1) خط و کتابت قائم کرنے کے لیے ان کی چوٹیوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے:



خط و کتابت (correspondence) میں $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle PQR$ اس کا مطلب ہے:

- (i) $\angle A \leftrightarrow \angle P$ اور $\angle P$ باہم مطابق زاویے ہیں
- (ii) $\angle B \leftrightarrow \angle Q$ اور $\angle Q$ باہم مطابق زاویے ہیں
- (iii) $\angle C \leftrightarrow \angle R$ اور $\angle R$ باہم مطابق زاویے ہیں
- (iv) $\overline{AB} \leftrightarrow \overline{PQ}$ اور $\overline{PQ}$ باہم مطابق اضلاع ہیں
- (v) $\overline{BC} \leftrightarrow \overline{QR}$ اور $\overline{QR}$ باہم مطابق اضلاع ہیں
- (vi) $\overline{CA} \leftrightarrow \overline{RP}$ اور $\overline{RP}$ باہم مطابق اضلاع ہیں

9.1 متماثل مثلثان

ریاضی میں "سائز اور شکل کی ہم آہنگی" کو متماثل کہتے ہیں۔




دو کاروں کے رنگ مختلف ہیں اور دی گئی شکل میں ان کی پوزیشن مختلف ہے، لیکن ان کا سائز اور شکل ایک جیسی ہے۔ یہ دونوں کاریں متماثل کہلائیں گی اگر ہم ایک کار کی تصویر دوسری گاڑی پر رکھتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اوور لپ (overlap) کریں گی۔

سرگرمی




تلاش

کیا آپ اپنے کلاس روم یا اسکول میں کسی بھی طرح کی متماثل اشکال یا اشیاء کی شناخت کر سکتے ہیں؟
ڈرائنگ یا تصویریں کھینچ کر ان متماثل اشکال کی فہرست بنائیں۔





دو مثلثیں متماثل کہلاتی ہیں اگر ان کے متعلقہ زاویے اور اضلاع متماثل ہیں۔ آئیے اشکال دیکھیں۔



یہ دو مثلثیں ABC اور DEF متماثل ہیں اور اس طرح لکھی جاتی ہیں:

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

$\triangle ABC$ اور $\triangle DEF$ کے متعلقہ اضلاع اور زاویے برابر ہیں، پیمائش میں

نوٹ: درج ذیل نتائج مفید ہیں۔


(i) ہم آہنگی کے شناخت: $\triangle ABC \cong \triangle ABC$

(ii) تناسب پر اپرٹی $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ پھر $\triangle PQR \cong \triangle ABC$

(iii) ترسیلی پر اپرٹی ہم آہنگی کی اگر $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ اور $\triangle PQR \cong \triangle DEF$ پھر $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

مسئلہ 9.1.1 (ز-ض-ز $\cong$ ز-ض-ز)

دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کا ایک ضلع اور دو زاویے دوسری مثلث کے متناظرہ ضلع اور زاویوں کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔



معلوم:

$$\triangle ABC \leftrightarrow \triangle PQR$$

$$\angle A \cong \angle P \text{ اور } \angle B \cong \angle Q, m\overline{BC} \cong m\overline{QR}$$

مطلوبہ:

$$\triangle ABC \cong \triangle PQR$$




عمل:

فرض کریں $\overline{AB} \cong \overline{PQ}$ لیں P' نقطہ PQ پر اس طرح کہ $\overline{AB} \cong \overline{P'Q}$ کو R سے ملائیں

ثبوت:


بیانات	دلائل
$\Delta ABC \leftrightarrow \Delta PQR$ میں $\angle A \cong \angle P$ (i) $\angle B \cong \angle Q$ (ii) $\therefore \angle C \cong \angle R$ اگر $\overline{QP}$ لیں P' نقطہ $\overline{BA}$ پر $\overline{QP'} \cong \overline{BA}$ اس طرح کہ: $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta P'QR$ $\overline{BC} \cong \overline{QR}$ $\angle B \cong \angle Q$ $\overline{BA} \cong \overline{QP'}$ $\therefore \Delta ABC \cong \Delta P'QR$ $\therefore \angle C \cong \angle QRP'$ مگر $\angle C \cong \angle QRP$ $\therefore \angle QRP' \cong \angle QRP$ یہ تب ممکن ہے جب نقاط P' ایک ہوں اور $\overline{RP'} \cong \overline{RP}$ لہذا $\overline{BA} \cong \overline{QP}$ $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta PQR$ میں $\overline{BC} \cong \overline{QR}$ (i) $\angle B \cong \angle Q$ (ii) $\overline{BA} \cong \overline{QP}$ (iii) $\therefore \Delta ABC \cong \Delta PQR$	(i) معلوم (ii) معلوم دونوں مثلثوں کے دو زاویے متماثل ہیں مفروضہ (i) معلوم (ii) معلوم (iii) قیاس۔ ض۔ ز۔ ض کا موضوعہ Δ s کے مطابقت سے 2 میں ثابت کیا گیا (اوپر) مطابقت کی ترسیلی پر اپرٹی زاویہ عمل موضوعہ کے ذریعے جیسا کہ P اور P' اتفاق کرتے ہیں (i) معلوم (ii) معلوم (iii) اوپر ثابت کیا گیا۔ ض۔ ز۔ ض کا موضوعہ

Q.E.D.







مشق 9.1




1. دی گئی شکل میں $m\overline{AB} = m\overline{CB}$ اور $\angle A \cong \angle C$ ثابت کریں کہ
 $\triangle ABD \cong \triangle CBE$





2. ایک زاویہ کے خط کے ناصف پر ایک نقطہ سے زاویوں کے بازوؤں پر متوازی الاضلاع کھینچے جاتے ہیں۔ ثابت کریں کہ یہ متوازی الاضلاع پیمائش میں برابر ہیں۔



3. دی گئی شکل میں ہمارے پاس ہے $\triangle ACE \cong \triangle BDE$ ، اس طرح کہ
 $\angle A = (3x + 1)^\circ$, $m\angle E = (3y - 2)^\circ$, $m\overline{AC} = m\overline{BD} = 3\text{ cm}$,
 $m\angle B = (x + 35)$ اور x کی رقوم معلوم کریں۔




4. دی گئی شکل میں ہمارے پاس ہے $\triangle DEF \cong \triangle PQR$ ، اس طرح کہ
 $m\overline{RQ} = m\overline{DE} = (6x + 1)\text{ cm}$, $m\overline{EF} = 8\text{ cm}$,
 $m\overline{PQ} = (10x - 19)\text{ cm}$ اور x کی رقوم معلوم کریں۔



مسئلہ 9.1.2

اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے مخالف اضلاع بھی متماثل ہوتے ہیں۔
معلوم:



ΔABC میں، ہمارے پاس ہے $m\angle B \cong m\angle C$

مطلوبہ:

$$\overline{AC} \cong \overline{AB}$$

عمل: $\overline{AD}$ کا نصف $\angle A$ کھینچیں جو $\overline{BC}$ سے نقطہ D پر ملتا ہے۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\Delta ADB \leftrightarrow \Delta ADC$	
$m\angle B \cong m\angle C$ (i)	(i) معلوم
$\angle 1 \cong \angle 2$ (ii)	(ii) عمل
$\overline{AD} \cong \overline{AD}$ (iii)	(iii) مشترک (شناخت کی مطابقت)
$\therefore \Delta ABD \cong \Delta ADC$	ض-ز-ض موضوعہ
$\therefore \overline{AC} \cong \overline{AB}$	Δ s کی مطابقت سے

Q.E.D

مشق 9.2

1. ABC ایک مثلث ہے جس میں $m\angle A = 35^\circ$ اور $\overline{BD} \perp \overline{AC}$ ، ثابت کریں کہ ΔBDC مساوی الساقین مثلث ہے۔


2. اگر ایک مثلث کے زاویے کا نصف اس کے مخالف اضلاع کے عمود پر ہے، تو مثلث ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔

3. ABC ایک مثلث ہے جس میں $m\angle B = 45^\circ$ ، ثابت کریں کہ $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ، ΔDBC ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔



مسئلہ 9.1.3

دو مثلثوں کی مطابقت میں اگر ایک مثلث کے تینوں اضلاع دوسری مثلث کے متناظرہ تین اضلاع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔



معلوم:

میں $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$

$\overline{CA} \cong \overline{FD}$ اور $\overline{AB} \cong \overline{DE}$, $\overline{BC} \cong \overline{EF}$

مطلوبہ: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

عمل: فرض کریں کہ $\triangle ABC$ کی تینوں اضلاع میں سب سے بڑا $\overline{BC}$ ہے $\triangle GEF$ بنائیں اس طرح کہ:


(i) نقطہ G

(ii) $\angle FEG \cong \angle B$

(iii) $\overline{EG} \cong \overline{BA}$ اور D اور G کو ملائیں۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\triangle ABC \leftrightarrow \triangle GEF$	(i) معلوم
$\overline{BC} \cong \overline{EF}$ (i)	(ii) عمل
$\angle B \cong \angle GEF$ (ii)	(iii) عمل
$\overline{BA} \cong \overline{GE}$ (iii)	ض-ز-ض موضوعہ
$\therefore \triangle ABC \cong \triangle GEF$	مثلث کی مطابقت سے
$\angle A \cong \angle G$ اور $\overline{AC} \cong \overline{GF}$	معلوم
مگر $\overline{DF} \cong \overline{AC}$	ترسیلی پراپرٹی
$\therefore \overline{GF} \cong \overline{DF}$	



مخالف اضلاع کے مطابقت

$$\overline{EG} \cong \overline{BA} \cong \overline{ED}$$

$$\overline{DF} \cong \overline{GF}$$

مساوات کی جمع کی پراپرٹی

$$m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle D$$

$$m\angle 3 + m\angle 4 = m\angle G$$

پر ثابت کیا گیا۔

ترسیلی پراپرٹی

(i) معلوم

(ii) اوپر ثابت کیا گیا

(iii) معلوم

ض—ض کا موضوع

$$m\angle 1 = m\angle 3 \text{ میں } \triangle DEG$$

$$m\angle 2 = m\angle 4 \text{ میں } \triangle GFE \text{ اسی طرح}$$

$$\therefore m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 3 + m\angle 4$$

$$\text{یا } m\angle D = m\angle G$$

$$m\angle G = m\angle A \text{ مگر}$$

$$m\angle A = m\angle D \therefore$$

$$\text{میں } \triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$$

$$\overline{AB} \cong \overline{DE} \text{ (i)}$$

$$\angle A \cong \angle D \text{ (ii)}$$

$$\overline{AC} \cong \overline{DF} \text{ (iii)}$$

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF \therefore$$

Q.E.D

نتیجہ: مساوی الاضلاع مثلث کے زاویے پیکائش میں برابر ہوتے ہیں۔

مشق 9.3

1. ABC ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔ $\overline{BC}$ بنیاد D کادر میانی نقطہ ہے۔ ثابت کریں کہ $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ اور $\angle A$ کو کاٹتا ہے اور $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ ۔

2. ABC اور DBC دو مساوی الساقین مثلثیں ہیں ایک مشترک بنیاد $\overline{BC}$ کے ضلع پر ثابت کریں کہ $\overline{AD}$ ، $\overline{BC}$ کا دائیں ناصف ہے۔

3. PQRS ایک مربع ہے X, Y اور Z بالترتیب $\overline{QR}$ ، $\overline{PQ}$ اور $\overline{RS}$ کے درمیانی نقاط ہیں۔ ثابت کریں کہ $\triangle PXY \cong \triangle SZY$ ۔

4. ثابت کریں کہ، مساوی الاضلاع مثلث میں کوئی سے دو وسطانیے متماثل ہوتے ہیں۔



مسئلہ 9.1.4

اگر دو قائمہ الزاویہ مثلثوں کی کسی مطابقت میں ایک مثلث کا وتر اور ایک ضلع دوسری مثلث کے وتر اور متناظرہ ضلع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔ وتر ض $\cong$ وتر ض۔



معلوم: مطابقت میں

$$\Delta ABC \leftrightarrow \Delta DEF$$

(وتر) $\overline{AC} \cong \overline{DF}$ اور $\angle B \cong \angle E$ (rt $\angle$ s) $\overline{BC} \cong \overline{EF}$

$$\Delta ABC \cong \Delta DEF$$

مطلوبہ:

عمل: نقطہ G پر $\overline{DE}$ بنائیں اس طرح کہ $\overline{EG} \cong \overline{AB}$ پھر F اور G ملائیں۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
$m\angle DEF + m\angle GEF = 180^\circ$	ضمیمہ موضوعہ
$m\angle DEF = 90^\circ$ مگر	معلوم
$m\angle GEF = 90^\circ \therefore$	$180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$
$\Delta GEF \leftrightarrow \Delta ABC$	عمل
$\overline{GE} \cong \overline{AB}$.i	ہر ایک قائمہ الزاویہ ہے۔
$\angle GEF \cong \angle ABC$.ii	معلوم
$\overline{EF} \cong \overline{BC}$.iii	ض-ز-ص $\cong$ ض-ز-ض
$\Delta GEF \cong \Delta ABC \therefore$	Δ s کے مطابقت سے
$\overline{FG} \cong \overline{AC}$ and $\angle G \cong \angle A \therefore$	$\overline{AC} \cong \overline{DF}$ (معلوم)
$\overline{FG} \cong \overline{DF} \therefore$	مخالف اضلاع کے مطابقت
$\angle D \cong \angle G$ میں ΔDFG	ہر ایک ΔG کے متماثل ہے۔
$\angle D \cong \angle A \therefore$	
میں $\Delta ABC \leftrightarrow \Delta DEF$	
$\angle A \cong \angle D$ i.	(i) ثابت شدہ
$\angle ABC \cong \angle DEF$ ii.	(ii) قائمہ الزاویہ
$\overline{AC} \cong \overline{DF}$ iii.	(iii) معلوم
$\Delta ABC \cong \Delta DEF \therefore$	ز-ز-ض $\cong$ ز-ز-ض

Q.E.D



مشق 9.4

1. ثابت کریں کہ: بنیاد کے راس کے عمود متساوی الساقین مثلث کے مخالف اضلاع کے متماثل ہیں۔
2. ثابت کریں کہ اگر ایک مثلث کے زاویے کے نصف اس کے مخالف اضلاع کو کاٹیں، تو مثلث ایک متساوی الساقین مثلث ہوگا۔
3. ثابت کریں کہ ایک متساوی الساقین مہلث کی بنیاد کو وسطیہ کاٹتے ہیں وہ عمودی زاویے کو کاٹتی ہے اور بنیاد کے عمود پر ہوتی ہے۔
4. ثابت کریں کہ اگر مثلث کے تین ارتفاع متماثل ہوں، تو مثلث مساوی الاضلاع ہے۔

اعادہ مشق 9

1. اگر $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ، $m\angle F = 90^\circ$ (ا)
 60° (ب)
 30° (ج)
 20° (د)

2. درج ذیل میں صحیح اور غلط بیانات کی شناخت کریں:

- (i) ایک چوکور میں تمام زاویوں کا مجموعہ 360 ہوتا ہے۔ (د/غ)
- (ii) ایک مثلث میں تمام زاویوں کا مجموعہ 270 ہوتا ہے۔ (د/غ)
- (iii) مساوی الاضلاع مثلث میں، زاویے ایک ہی پیمائش کے ہوتے ہیں۔ (د/غ)
- (iv) ایک مثلث میں دو قائمہ الزاویہ ہوتے ہیں۔ (د/غ)
- (v) مساوی الساقین مثلث میں، متعلقہ زاویے اور متعلقہ اضلاع پیمائش میں برابر ہوتے ہیں۔ (د/غ)

3. جملوں کو درست بنانے کے لیے خالی جگہ پُر کریں۔

- (i) $\triangle ABC \leftrightarrow \triangle DEF$ میں، تو پھر $\overline{AC}$ مطابقت رکھتا ہے۔
- (ii) $\triangle KLM \leftrightarrow \triangle PQR$ میں، پھر $\angle MKL$ مطابقت رکھتا ہے۔
- (iii) مساوی الساقین مثلث میں بنیادی زاویہ ہوتا ہے۔
- (iv) اگر مثلث کے پر زاویہ کے پیمائش 60° ہے، تو پھر مثلث ہے۔
- (v) ایک قائمہ الزاویہ مثلث میں، قائمہ الزاویہ کے مخالف ضلع کہلاتا ہے۔
- (vi) دائیں مثلث میں حادہ الزاویہ کے مجموعہ کی پیمائش ہے۔



4. متعلقہ حروف اب، ج یا د پر دائرہ لگائیں درست جواب کے لیے:

(i) مندرجہ ذیل میں سے کون دو مثلثوں کے متماثل ہونے کے لیے کافی شرط نہیں ہے؟

(i) $\angle Z - \angle X \cong \angle Z - \angle Y$ (ب) $\angle X - \angle Y \cong \angle X - \angle Z$

(ج) $\angle X - \angle Z \cong \angle X - \angle Y$ (د) $\angle Z - \angle X \cong \angle Z - \angle Y$

(ii) a, b, c میں اگر ΔABC تو $\angle A \cong \angle B$ زاویہ کا نصف مثلث کو متماثل مثلث میں تقسیم کرے گا۔

(i) $\angle A$ (ب) $\angle B$ (ج) $\angle C$ (د) کوئی بھی ایک سائیڈ

(iii) کا وتر اسے دو متماثل مثلثوں میں تقسیم نہیں کرتا:

(i) مستطیل (ب) زوزلقہ (trapezium)

(ج) متوازی الاضلاع (د) مربع

(iv) حادثہ زاویہ مثلث میں کتنے حادثہ الزاویہ ہوتے ہیں۔


(i) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 2 سے زیادہ



خلاصہ

اس یونٹ میں ہم نے درج ذیل مسئلے بیان اور ثابت کیے:

- ◆ دو مثلثوں کی کسی مطابقت میں اگر ایک مثلث کا ایک ضلع اور دوسرے مثلث کے متناظرہ ضلع اور زاویوں کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔ ($\angle Z - \angle X \cong \angle Z - \angle Y$)
- ◆ اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے مخالف اضلاع بھی متماثل ہوتے ہیں۔
- ◆ دو مثلثوں کی مطابقت میں اگر ایک مثلث کے تینوں اضلاع دوسرے مثلث کے متناظرہ تین اضلاع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوتی ہیں۔ ($\angle X - \angle Z \cong \angle X - \angle Y$)
- ◆ اگر دو قائمہ الزاویہ مثلثوں کی کسی مطابقت میں ایک مثلث کا وتر اور ایک ضلع دوسرے مثلث کے وتر اور متناظرہ ضلع کے متماثل ہوں تو وہ مثلثیں متماثل ہوں گی۔
- ◆ دو مثلثیں متماثل کہلاتی ہیں اگر ان کے درمیان کوئی مطابقت ہو اس طرح کہ تمام متعلقہ اضلاع اور مثلثیں متماثل ہوں۔ ($\angle X - \angle Z \cong \angle X - \angle Y$)



متوازی الاضلاع اور مثلث

PARALLELOGRAM AND TRIANGLES

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

مندرجہ ذیل مسائل کو ان کے نتائج کے ساتھ سمجھیں اور ان سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے لاگو کریں۔

(a) ثابت کر سکیں کہ ایک متوازی الاضلاع میں:

◆ مخالف اضلاع متماثل ہوتے ہیں۔

◆ مخالف زاویے متماثل ہوتے ہیں۔

◆ دونوں وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں۔

(b) اگر کسی چوکور کے دو مخالف اضلاع متماثل اور متوازی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔

(c) اگر کسی مثلث کے دو اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والا قطعہ خط تیسرے اضلاع کے متوازی اور لمبائی

میں اس سے نصف ہوتا ہے۔

(d) مثلث کے تینوں وسطانیے ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں اور یہ نقطہ ہر ایک وسطانیے کا نقطہ تثلیث

ہوتا ہے۔

(e) اگر تین یا تین سے زیادہ متوازی خطوط ایک خط قاطعہ پر متماثل قطعات بنائیں تو وہ کسی دوسرے خط قاطعہ

پر بھی متماثل قطعات بنائیں گی۔



تعارف:


پچھلی جماعتوں میں طلبانے بہت سے طرح کے متوازی الاضلاع، مثلث، مستطیل، مربع، معین اور ذوزنقہ وغیرہ کے بارے میں پڑھا اور ان کو بنایا۔ کثیر الاضلاع اشکال کے اضلاع اور زاویے سے متعلق اصطلاحات کو پڑھا۔ اس سبق میں بالخصوص مثلثوں اور ان کی مماثلت کے بارے میں اپنی معلومات کو بڑھائیں گے اور مسائل کو سمجھیں گی

10.1 متوازی الاضلاع اور مثلث

مسئلہ 10.1.1

ایک متوازی الاضلاع میں

- مخالف اضلاع باہم متماثل ہوتے ہیں
- مخالف زاویے باہم متماثل ہوتے ہیں۔
- دونوں وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں



معلوم: $^m PQRS$

مطلوب:


$$\overline{PQ} \cong \overline{RS}; \quad \overline{PS} \cong \overline{QR} \quad .1$$

$$\angle P \cong \angle R; \quad \angle S \cong \angle Q \quad .2$$

.3 وتر $\overline{PR}$ اور $\overline{SQ}$ ایک دوسرے کو نقطہ O منقطع کرتے ہیں۔ (شکل ii)

عمل:

شکل (i) میں نقطہ S کو Q سے ملائیں۔



ثبوت:

بیانات	دلائل
شکل (i) میں (1) $\overline{SR} \parallel \overline{PQ}, \overline{SQ}$ قطعہ خط ہے $m\angle 1 = m\angle 4$ اسی طرح $m\angle 2 = m\angle 3$ $\therefore m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 3 + m\angle 4$ یا $\angle S \cong \angle Q$ اسی طرح $\angle P \cong \angle R$ لہذا مخالف زاویے متماثل ہیں۔ (2) $\Delta SPQ \leftrightarrow \Delta QRS$ $\angle 2 \cong \angle 3$ اور $\angle 1 \cong \angle 4$ $\overline{SQ} \cong \overline{SQ}$ $\Delta SPQ \cong \Delta QRS \quad \therefore$ $\overline{PS} \cong \overline{QR}$ اور $\overline{PQ} \cong \overline{RS} \quad \therefore$ لہذا شکل (ii) میں مخالف اضلاع متماثل ہیں (3) $\Delta POQ \leftrightarrow \Delta ROS$ $\angle 1 \cong \angle 4$ $\angle POQ \cong \angle ROS$ $\overline{PQ} \cong \overline{RS}$ $\Delta POQ \cong \Delta ROS \quad \therefore$ $\overline{OQ} \cong \overline{OS}$ اور $\overline{PO} \cong \overline{OR} \quad \therefore$ $\overline{RS}$ اور $\overline{PR}$ و تریک دوسرے کی تنصیف کرتی ہیں۔	خط کے متبادل زاویے $\overline{SR} \parallel \overline{PQ}$ جمع کا موضوعہ زاویوں کی جمع کا موضوعہ اوپر والے طریقے کے مطابق اوپر (1) میں ثابت شدہ مشترک ز-ض-ز $\cong$ ز-ض-ز متماثل مثلثوں کی وجہ سے اوپر (1) میں ثابت شدہ مخالف راسی زاویے اوپر (2) میں ثابت شدہ ز-ض-ز $\cong$ ز-ض-ز متماثل مثلثوں کی بنا پر

Q.E.D






مشق 10.1

1. ایک خط جو متوازی الاضلاع کے مخالف اضلاع کو وسطی نقاط سے جوڑے وہ متوازی الاضلاع کی دوسری اضلاع کے متوازی ہوں گے۔
2. متوازی الاضلاع کے کسی بھی اضلاع کو اندرونی زاویے سپلیمنٹری ہوتے ہیں۔
3. ثابت کریں متوازی الاضلاع کی ایک ہی اضلاع کے دو زاویوں کے ناصف قائمہ زاویہ پر ملتے ہیں۔
4. چوکور کے وتر باہم تنصیف ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوگا۔
5. متوازی الاضلاع کے کسی بھی اضلاع کے مخالف زاویے برابر ہوتے ہیں۔

مسئلہ 10.1.2



اگر کسی چوکور کے دو مخالف اضلاع متماثل اور متوازی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔

معلوم: چوکور ABCD میں $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ اور $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ہے۔

مطلوب: ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے۔

عمل: نقطہ B کو نقطہ D سے ملائیں۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{BD}$ قاطع خط ہے۔ $\angle ABD \cong \angle CBD$ $\therefore$ $\triangle ADB \leftrightarrow \triangle CBD$ میں $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ i. $\angle ABD \cong \angle CDB$ ii. $\overline{BD} \cong \overline{BD}$ iii. $\triangle ADB \cong \triangle CBD$ $\therefore$ $\angle 1 \cong \angle 2$ $\therefore$ لیکن یہ متبادل مثلث ہیں $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے۔	خط کے متبادل زاویے (i) معلوم (ii) ثابت شدہ (iii) مشترک ض-ز-ض $\cong$ ض-ز-ض متماثل مثلثوں کی بنا پر متبادل زاویوں کی تعریف سے متبادل زاویے متماثل ہیں معلوم مخالف اضلاع متوازی ہیں۔




مشق 10.2

1. ثابت کریں کہ چوکور کے مخالف زاویے اگر متماثل ہیں تو وہ متوازی الاضلاع ہوگی۔
2. ثابت کریں کہ چوکور متوازی الاضلاع ہے اگر اس کے وتر باہم تنصیف کریں۔
3. اگر چوکور متوازی الاضلاع ہے، تو اس کے وتر دو متماثل مثلث بنائیں گے۔
4. اگر کسی چوکور کی ہر اضلاع کے زاویے سپلیمنٹری ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوگی۔

مسئلہ 10.1.3

مثلث کے دو اضلاع کے واسطی نقاط کو ملانے والا قطعہ خط تیسرے ضلاع کے متوازی اور لمبائی میں اس سے نصف ہوتا ہے۔

معلوم:



P میں Q کا واسطی نقطہ $\overline{AB}$ ہے اور $\overline{AC}$ کا واسطی نقطہ ΔABC ہے،
 $\overline{PQ}$ قطعہ خط ہے جو ان کو جوڑتا ہے۔

مطلوب:

$$m\overline{PQ} = \frac{1}{2} m\overline{BC} \text{ اور } \overline{PQ} \parallel \overline{BC}$$

عمل:

PQ کو نقطہ D تک اس طرح بنائیں کہ $\overline{QD} \cong \overline{PQ}$ اور C کو آپس میں ملائیں۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\Delta APQ \leftrightarrow \Delta CDQ$ میں	عمل
i. $\overline{PQ} \cong \overline{QD}$	راستی زاویے
ii. $\angle 1 \cong \angle 2$	معلوم
iii. $\overline{AQ} \cong \overline{QC}$	ض-ز-ض کا موضوعہ
$\therefore \Delta APQ \cong \Delta CDQ$	متماثل مثلث کی بنا پر
$\therefore \overline{AP} \cong \overline{CD}$ اور $\angle 3 \cong \angle 4$	





معلوم

ہر ایک $\overline{AP}$ کے متماثل ہے۔

متبادل زاویوں کی تعریف کے مطابق۔

متبادل زاویے متماثل ہوتے ہیں۔

مخالف اضلاع $\parallel$ اور $\cong$ ہیں۔

متوازی الاضلاع کی مخالف اضلاع متوازی اور

متماثل ہیں۔

$\overline{PD}$ اور $\overline{PQ}$ ایک ہی خط ہے۔

$$m\overline{PQ} = m\overline{QD} = \frac{1}{2} m\overline{PD}$$

لیکن $\overline{PB} \cong \overline{AP}$

$$\therefore \overline{PB} \cong \overline{CD}$$

$\angle 3$ اور $\angle 4$ متبادل زاویے ہیں

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$$

لہذا $\overline{PB} \parallel \overline{CD}$

PBCD ایک متوازی الاضلاع ہے

$$\therefore \overline{PD} \parallel \overline{BC} \text{ اور } \overline{PD} \cong \overline{BC}$$

$$\therefore \overline{PQ} \parallel \overline{BC}$$

$$\text{اور } m\overline{PQ} = \frac{1}{2} m\overline{BC}$$

Q.E.D


مشق 10.3



1. اگر ایک قطعہ خط مثلث کی دو اضلاع کے واسطی نقاط کو آپس میں جوڑتا ہے اور وہ تیسری اضلاع کے متوازی ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 4cm ہے تو تیسری ضلاع کی لمبائی کیا ہوگی؟
2. ثابت کیجئے کہ کسی چوکور کے مخالف اضلاع کے واسطی نقاط کو ملانے والے قطعات خط باہم تنصیف کرتے ہیں۔
3. قطعات خط جو کہ کسی چوکور کے اضلاع کے واسطی نقاط کو آپس میں ملاتے ہیں ایک متوازی الاضلاع بنا سکتے ہیں، ثابت کیجئے۔
4. ثابت کیجئے کہ مثلث کے کسی اضلاع کے واسطی نقطہ میں سے گزرنے والا قطعہ خط جو کہ دوسرے ضلاع کے متوازی ہو وہ تیسرے اضلاع کو بھی تنصیف کرتا ہے۔
5. ثابت کیجئے کہ کسی مثلث کے تین اضلاع کو ان کے واسطی نقاط سے ملانے کے بعد جو چار مثلث بنیں گی وہ آپس میں متماثل ہوں گی۔



مسئلہ 10.1.4



مثالث کے تینوں وسطانیے ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں اور یہ نقطہ ہر ایک وسطانیے کا نقطہ تثلیث ہوتا ہے۔

معلوم: $\triangle ABC$ جس میں وسطانیے $\overline{BE}$ اور $\overline{CF}$ نقطہ G پر ملتے ہیں۔

مطلوب: (i) $\overline{AG}$ بڑھ کر نقطہ D پر $\overline{BC}$ کو تنصیف کرے گا۔

(ii) G ہر وسطانیے کا نقطہ تثلیث ہے۔


عمل: $\overline{CH}$ اور $\overline{EB}$ کو ایک دوسرے کا متوازی بنائیں جو کہ بڑھ کر $\overline{AD}$ پر نقطہ H

پر ملیں۔ اب نقطہ B اور H کو آپس میں ملائیں۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\triangle ACH$, $\overline{AE} \cong \overline{EC}$ $\overline{EG} \parallel \overline{CH}$ $\overline{AG} \cong \overline{GH}$ $\therefore$ اسی طرح $\triangle ABH$ میں $\overline{AG} \cong \overline{GH}$ $\overline{AF} \cong \overline{FB}$ $\overline{FG} \parallel \overline{BH}$ لہذا $BGCH$ ایک متوازی الاضلاع ہے۔ وتر $\overline{BC}$ اور $\overline{GH}$ ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں لہذا $\overline{BD} \cong \overline{DC}$, $\overline{GD} \cong \overline{DH}$ $\triangle ABC$, کا وسطانیہ ہے $\overline{AD}$ اسی طرح $m\overline{AG} = m\overline{GH} = 2m\overline{GD}$ $\overline{AD}$, G کا نقطہ تثلیث ہے اسی طرح ثابت کیا جاسکتا ہے کہ $\overline{BE}$ اور $\overline{CF}$ کا نقطہ تثلیث بھی G ہے۔	معلوم عمل عکس مسئلہ 10.1.3 کے مطابق ثابت شدہ معلوم مسئلہ 10.1.3 کے مطابق مخالف اضلاع متوازی ہیں۔ مسئلہ 10.1.1 کے مطابق $\overline{BD} \cong \overline{DC}$ (اوپر ثابت شدہ) $\overline{GD} \cong \overline{DH} \Rightarrow m\overline{GH} = 2m\overline{GD}$ $\overline{GD}$, $\overline{AG}$ کا دو گنا ہے۔ اوپر کے نتائج سے ثابت شدہ۔


Q.E.D



مشق 10.4



1. اگر ایک مثلث کے تین وسطانے متماثل ہوں تو ثابت کریں کہ وہ مثلث ایک مساوی مثلث ہے۔
2. $\overline{PQ}$ کا مثلث $\overline{RA}$ اور $\overline{PB}$ ، $\overline{QC}$ کے وسطانے ہیں جو کہ نقطہ G پر ملتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ نقطہ G مثلث PQR کا مرکز ہندسی (centroid) ہے۔
3. دی گئی شکل میں $\overline{GD}$ کی لمبائی 2cm ہے معلوم کریں تو $\overline{AD}$ کی لمبائی معلوم کریں۔



مسئلہ 10.1.5

اگر تین یا تین سے زیادہ متوازی خطوط ایک خط قاطع پر متماثل قطعات بنائیں تو وہ کسی دوسرے خط قاطع پر بھی متماثل قطعات بنائیں گے۔

معلوم:

$\overline{GH}$ جو کہ $\overline{AB}$ ، $\overline{EF}$ ، $\overline{CD}$ کو بالترتیب نقطہ P ، Q ، R پر قطع کرتا ہے اس طرح کہ $\overline{PQ} \cong \overline{QR}$ اسی طرح XY جو کہ $\overline{AB}$ ، $\overline{EF}$ ، $\overline{CD}$ کو بالترتیب نقطہ M ، N ، O پر قطع کرتا ہے۔


مطلوب: $\overline{NM} \cong \overline{NO}$

عمل:

$\overline{MJ}$ اور $\overline{NK}$ کو $\overline{GH}$ کے متوازی بنائیں جو $\overline{CD}$ اور $\overline{EF}$ دونوں کو بالترتیب نقطہ J اور K پر ملے۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\overline{PM} \parallel \overline{QJ}$ $\overline{PQ} \parallel \overline{MJ}$ اور $\overline{PMJQ}$ ایک متوازی الاضلاع ہے۔	$\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ (معلوم) عمل مخالف اضلاع متوازی ہیں۔
$\overline{PQ} \cong \overline{MJ}$ $\therefore$	متوازی الاضلاع کی مخالف اضلاع۔
اسی طرح $\overline{QRKN}$ بھی ایک متوازی الاضلاع ہے۔	$\overline{QN} \parallel \overline{RK}$ اور $\overline{QR} \parallel \overline{NK}$
$\overline{QR} \cong \overline{NK}$ $\therefore$	اوپر ثابت شدہ۔
لیکن $\overline{PQ} \cong \overline{QR}$	معلوم



مساوات کی متعینیت خاصیت
دونوں $\overline{GH}$ کے متوازی ہیں۔
اضلاع کے متناظرہ زاویے۔

i. اوپر ثابت شدہ
ii. اضلاع کے متناظرہ زاویے۔
iii. اوپر ثابت شدہ۔
ز-ز $\cong$ ز-ز ض
مثالث کے متماثل ہونے کی بنا پر

$$\overline{MJ} \cong \overline{NK}$$

$$\overline{MJ} \parallel \overline{NK}$$

$$\angle 1 \cong \angle 2 \quad \therefore$$

$$\Delta MNJ \leftrightarrow \Delta NOK \text{ میں}$$

$$\angle 1 \cong \angle 2 \quad \therefore$$

$$\angle 3 \cong \angle 4 \quad \therefore$$

$$\overline{MJ} \cong \overline{NK} \quad \therefore$$

$$\Delta MNJ \cong \Delta NOK \quad \therefore$$

$$\overline{MN} \cong \overline{NO} \quad \therefore$$

Q.E.D


مشق 10.5

1. مشق مثلث کے اضلاع کے واسطی نقاط کو ملانے سے جو مثلث بنتی ہے وہ اصل مثلث کے برابر ہوتی ہے۔
2. وہ قطعہ خط جو ذوزنقہ کے دو غیر متوازی اضلاع کے واسطی نقاط کو آپس میں ملاتا ہے وہ متوازی اضلاع کے متوازی اور ان کی جمع رقم کا نصف ہوتا ہے۔
3. ہر قطعہ خط جو مثلث کی بنیاد کی راس سے بنایا جائے وہ اس خط کی تنصیف کرے گا جو باقی دو اضلاع کے واسطی نقاط کو آپس میں جوڑے۔

اعادہ مشق 10


1. خالی جگہ پُر کریں:

- (i) متوازی الاضلاع میں، مخالف اضلاع _____ ہوتے ہیں۔
- (ii) متوازی الاضلاع میں، مخالف زاویے _____ ہوتے ہیں۔
- (iii) مثلث میں وسطیے _____ ہوتے ہیں۔
- (iv) متوازی الاضلاع میں، وتر ایک دوسرے کو _____ کرتے ہیں۔
- (v) متوازی الاضلاع کے متناظرہ زاویے _____ ہوتے ہیں۔
- (vi) مثلث کے وسطیے _____ ہوتے ہیں۔
- (vii) چوکور کے اندرونی زاویوں کی جمع کی رقم _____ ہوتی ہے۔




2. درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

- (i) مربع کے وتر ایک دوسرے کے _____ ہوتے ہیں۔
 (ا) عمود (ب) غیر متناظرہ (ج) متناظرہ (د) (ا) اور (ج) دونوں
- (ii) چوکور کے اندرونی زاویوں کی جمع کی رقم _____ برابر ہوتی ہے۔
 (ا) 2 قائمہ زاویہ (ب) 4 قائمہ زاویہ (ج) 3 قائمہ زاویہ (د) کوئی بھی نہیں
- (iii) ایک قطعہ خط جو ΔABC کے خط $\overline{AB}$ اور $\overline{AC}$ کے وسطی نقاط کو جوڑتا ہے اس کی لمبائی 3.5cm ہے تو $m\overline{BC}$ ہوگی۔
 (ا) 4.5cm (ب) 5.5cm (ج) 6cm (د) 7cm
- (iv) مثلث ABC کے دو وسطیہ $\overline{BE}$ اور $\overline{AD}$ نقطہ G پر ملتے ہیں۔ اگر $m\overline{GD} = 1.7\text{cm}$ ہے تو $m\overline{AG}$ کیا ہوگا۔
 (ا) 2.5 cm (ب) 8.85cm (ج) 3.4cm (د) 5.1cm
- (v) متوازی الاضلاع ABCD کے دو زاویے $\angle A$ اور $\angle C$ کی جمع 130° ہے تو $m\angle B$ کیا ہوگا؟
 (ا) 25° (ب) 115° (ج) 65° (د) کوئی بھی نہیں
- (vi) اگر چوکور کے مخالف زاویے آپس میں برابر ہیں اور کوئی بھی قائمہ زاویہ نہیں ہے تو چوکور ہوگا۔
 (ا) مربع (ب) متوازی الاضلاع (ج) ذوزنقہ (د) مستطیل
- (vii) مرکز ہندسی کس کے میلاپ کا مشترکہ نقطہ ہوگا۔
 (ا) مثلث کے وسطیہ (ب) متوازی الاضلاع کے وتر
 (ج) مثلث کے زاویوں کے ناصف (د) مثلث کا عمودی ناصف
- (viii) مثلث کے وسطیہ پر نقطہ ہوتا ہے۔
 (ا) اس کے کونیوں سے مساوی الفاصلہ (ب) اس کے اضلاع کے وسطیوں سے مساوی الفاصلہ
 (ج) مثلث کی ارتفاع سے مساوی الفاصلہ (د) کوئی بھی نہیں



خلاصہ

- ♦ متوازی الاضلاع کی مخالف اضلاع متماثل ہوتی ہیں۔
- ♦ متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے متماثل ہوتے ہیں۔
- ♦ سپلیمنٹری زاویوں کی خاصیت مسلسل زاویوں کے لیے بھی ہوگی۔
- ♦ متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کو باہم تنصیف کریں گے اور ہر وتر اس کو دو متماثل مثلث میں تقسیم کر دے گا۔
- ♦ اگر متوازی الاضلاع کا زاویہ قائمہ زاویہ ہو گا تو اس کا ہر زاویہ قائمہ زاویہ ہو گا۔
- ♦ متوازی الاضلاع کے وتر اس کو چار متماثل مثلث میں تقسیم کرتے ہیں۔
- ♦ متوازی الاضلاع کے زاویوں کی جمع 360 ہوتی ہے۔
- ♦ مثلث کے اندرونی زاویوں کی جمع 180 ہوتی ہے۔
- ♦ مثلث کے بیرونی زاویوں کی جمع 360 ہوتی ہے۔
- ♦ اگر تین یا تین سے زائد متوازی خط متماثل حصوں کو تشکیل دیتے ہیں تو اس کے برعکس وہ متماثل حصوں کو دوسرے خطوں پر کاٹتے ہیں۔
- ♦ مثلث کے وسطانیہ ہم نقطہ ہوتے ہیں اور ان کا میلاپ کا نقطہ ہر وسطانیہ کی مثلث کے نقطے کے برابر ہوتا ہے۔
- ♦ وہ قطعہ خط جو مثلث کے دو اضلاع کے نقطہ وسطانیہ کو ملاتا ہے وہ تیسرے اضلاع کے متوازی ہوتا ہے اور اس کی لمبائی تیسرے اضلاع کی لمبائی کا نصف ہوتا ہے۔



خط اور زاویے کے ناصف

11

یونٹ

LINE BISECTORS AND ANGLE BISECTORS

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ


- مندرجہ ذیل مسائل کو سمجھ سکیں اور ان کے نتائج کو استعمال کر کے مشکلات کا حل نکال سکیں۔
- اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔
- اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔
- کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔
- اگر کسی زاویے کے اندرون میں ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔
- کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

تعارف:

اس سبق میں ہم خط ناصف اور زاویے کے ناصف کے مسائل زیر بحث لائیں گے۔

تعریفیں:

i. قطعہ کا ناصف




ایک خط جو کسی قطعہ خط کو دو برابر حصوں میں کاٹے، ناصف کہلاتا ہے۔

مثال کے طور پر: دی گئی شکل میں قطعہ خط AB کا ناصف خط 'L' ہے جو کہ قطعہ خط 'O' کے وسطی نقطہ AB سے گزرتا ہے۔

ii. قطعہ خط کا عمودی ناصف:


کوئی بھی خط، کسی قطعہ خط کا عمودی ناصف تب ہو گا جب وہ اس قطعہ خط کے ساتھ 90 کا زاویہ بنائے۔



مثال کے طور پر: دی گئی شکل میں $\overline{CD}$ قطعہ خط AB پر عمود ہے اور یہ وسطی نقطہ 'O' سے گزرتی ہے، تو $\overline{AB}$ کا عمودی ناصف ہے۔

iii. زاویے کا ناصف

کوئی خط یا قطعہ خط، زاویے کا ناصف تب کہلائے گا اگر وہ ایک زاویے کو دو برابر زاویوں میں تقسیم کر دے۔



دی گئی شکل میں $\overrightarrow{BD}$ زاویے $\angle CBA$ کا ناصف ہے۔ $\overrightarrow{BD}$ زاویے $\angle CBA$ کو لہذا دو برابر زاویے $\angle 1$ اور $\angle 2$ میں تقسیم کرتا ہے


لہذا $\angle 1 \cong \angle 2$.



مسئلہ 11.1.1

ثابت کریں:

اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو گا۔



معلوم:

$\overline{CD}$ عمودی ناصف ہے جو کہ $\overline{AB}$ کا نقطہ جو کہ P.O پر قطعہ کرایا ہے۔ P کوئی بھی نقطہ ہے

مطلوب:

$$\overline{AP} \cong \overline{BP}$$

ثبوت: لہذا P مساوی الفاصلہ ہے۔ A اور B کے

بیانات	دلائل
$\Delta AOP \leftrightarrow \Delta BOP$ i. $\overline{AO} \cong \overline{OB}$ ii. $\angle 1 \cong \angle 2$ iii. $\overline{PO} \cong \overline{PO}$ $\therefore \Delta AOP \leftrightarrow \Delta BOP$ $\therefore \overline{AP} \cong \overline{BP}$ لیکن $\overline{CD}$ پر اختیاری نقطہ ہے اسی طرح کوئی بھی اور نقطہ $\overline{CD}$ پر A اور B سے مساوی الفاصلہ پر ہو گا۔	i. معلوم (O وسطی نقطہ ہے) ii. معلوم (نقطہ O پر $\overline{CD} \perp \overline{AB}$) iii. مشترک ض-ز-ض کا موضوعہ متماثل مثلث کی بنا پر فرض کردہ اوپر کے نتائج کی رو سے

Q.E.D



مسئلہ 11.1.2

ثابت کریں:

اگر کوئی نقطہ کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔ (عکس مسئلہ 11.1.1)

معلوم:


A اور B دو مقررہ نقطے ہیں اور نقطہ P حرکت پذیر نقطہ ہے اس طرح کے $\overline{PA} \cong \overline{PB}$

مطلوب:

P نقطہ $\overline{AB}$ کے عمودی ناصف پر موجود ہے۔

عمل:


$\overline{AB}$ کو O نقطہ پر تنصیف کریں۔ نقطہ P اور O کو آپس میں ملائیں۔



ثبوت:

بیانات	دلائل
$\Delta POA \leftrightarrow \Delta POB$	i- عمل
i. $\overline{AO} \cong \overline{OB}$	ii- معلوم
ii. $\overline{PA} \cong \overline{PB}$	iii- مشترک
iii. $\overline{PO} \cong \overline{PO}$	ض-ض-ض-ض-ض-ض
$\Delta POA \cong \Delta POB$	متماثل مثال کی بنا پر Δs ایک خط ہے (سپلیمینٹری موضوع)
$\angle 1 \cong \angle 2$	اگر دو سپلیمینٹری زاوے آپس میں برابر ہوں تو دونوں قائمہ زاوے ہیں۔
لیکن $\angle 1$ اور $\angle 2$ سپلیمینٹری زاوے ہیں۔	
$\angle 1$ اور $\angle 2$ دونوں قائمہ زاوے ہیں۔	
پس $\overline{PO}$ عمودی ناصف ہے۔ $\overline{AB}$ کا	
پس ہر وہ نقطہ جو نقطہ A اور نقطہ B سے مساوی الفاصلہ ہوگا وہ $\overline{AB}$ کا عمودی ناصف ہوگا۔	
	$\overline{PO} \perp \overline{AB}$ اور $\overline{AO} \cong \overline{BO}$
	اوپر کے نتائج سے ثابت شدہ

Q.E.D





مشق 11.1

- 1- ثابت کریں کہ مثلث کے کوئی بھی دو اضلاع کے عمودی ناصف کا نقطہ قاطع اس مثلث کے تمام سروں سے مساوی الفاصلہ ہوگا۔
- 2- ثابت کیجئے کہ کسی دائرہ کا مرکز اس کے ہر ایک قطر کے عمودی ناصف پر ہوتا ہے۔
- 3- تین نمبر ہم خط نقاط میں سے گزرنے والے دائرہ کا مرکز کہاں ہوگا اور کیوں؟
- 4- اگر دو دائرے ایک دوسرے کو نقطہ A اور B پر کاٹتے ہیں تو ثابت کریں کہ وہ خط جو دائروں کے مرکز سے گزرے گا وہ خط $\overline{AB}$ ہوگی۔
- 5- تین بازار A، B اور C ایک سیرھ میں نہیں ہیں ان بازار کے تاجر ایک مقام پر مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ جس کا فاصلہ ان تینوں بازاروں سے یکساں ہو۔ مسجد کے مقام کو متعین کر کے ثابت کریں کہ یہ مقام تینوں بازاروں سے مساوی الفاصلہ ہے۔

مسئلہ 11.1.3

ثابت کریں:


کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

معلوم: مثلث

مطلوب: مثلث کی اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں۔

عمل

$\overline{MO}$ اور $\overline{NO}$ کے عمودی ناصف $\overline{AB}$ اور $\overline{AC}$ بنائیں جو کہ ایک دوسرے کو نقطہ O پر ملیں
 $\overline{BC}$ کو نقطہ P پر تنصیف کریں۔ $\overline{OA}$ ، $\overline{OB}$ ، $\overline{OC}$ بنائیں۔



ثبوت:

بیانات	دلائل
$\overline{NO}$ عمودی ناصف ہے $\overline{AB}$ کا $\overline{AB}$ کا عمودی ناصف ہے $\therefore \overline{AO} \cong \overline{OB}$ اسی طرح $\overline{AO} \cong \overline{OC}$ $\therefore \overline{OB} \cong \overline{OC}$ نقطہ P، $\overline{BC}$ کا وسطی نقطہ ہے۔ $\therefore \overline{BC}$، $\overline{OP}$ کا عمودی ناصف ہے۔ پس مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں۔	عمل $\overline{AC}$، $\overline{MO}$ کا عمودی ناصف ہے۔ ہر ایک $\overline{AO}$ سے متماثل ہے۔ عمل مسئلہ 11.1.2 مطابق ہر کوئی ایک ہی نقطہ پر مل رہا ہے۔

مشق 11.2

1. ثابت کریں کہ حادہ مثلث کا محیطی مرکز اس مثلث کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔
2. ثابت کریں مساوی الساقین ذوزنقہ کے چار اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔
3. ثابت کیجئے کہ مثلث کے ارتفاع ہم نقطہ ہوتے ہیں۔



مسئلہ 11.1.4

ثابت کریں:

کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔

معلوم:

$\vec{BD}$ ، $\angle ABC$ کا ناصف ہے۔ P ، $\vec{BD}$ پر کوئی نقطہ ہے

$\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ ، $\vec{BA}$ اور $\vec{BC}$ بالترتیب عمود ہیں


مطلوب:

$\vec{PQ} \cong \vec{PR}$ (یعنی نقطہ P ، $\vec{BA}$ اور $\vec{BC}$ سے ہم فاصلہ ہیں)

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\Delta PQB \leftrightarrow \Delta PRB$ میں i. $\angle 3 \cong \angle 4$ ii. $\angle 1 \cong \angle 2$ iii. $\vec{BP} \cong \vec{BP}$ $\Delta PQB \cong \Delta PRB$ $\vec{PQ} \cong \vec{PR}$ لہذا P ، $\vec{BA}$ اور $\vec{BC}$ سے مساوی الفاصلہ ہے۔	i. دونوں قائمہ زاویہ ہیں۔ ii. $\vec{BD}$ ناصف ہے (معلوم) iii. مشترک ز-ز-ض $\cong$ ز-ز-ض متماثل مثال کی بنا پر

Q.E.D




مسئلہ 11.1.5

ثابت کریں:

اگر کسی زاویے کے اندرون میں کوئی ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے
(عکس مسئلہ 11.4)

معلوم:

P کے اندرون میں کوئی بھی نقطہ $\vec{BD}$ ایسے لیا گیا ہے کہ وہ اس کے بازوؤں $\vec{BA}$ اور $\vec{BC}$ سے مساوی، $\angle ABC$ الفاصلہ ہے۔ لہذا $\vec{PQ} \perp \vec{BA}$ اور $\vec{PQ} \cong \vec{PR}$ اور $\vec{PR} \perp \vec{BC}$




مطلوب:


$\vec{BD}$ جو کہ $\angle ABC$ کا ناصف ہے۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
میں $\Delta PQB \leftrightarrow \Delta PRB$ i. $\angle 3 \cong \angle 4$ ii. $\vec{PQ} \cong \vec{PR}$ iii. $\vec{BP} \cong \vec{BP}$ $\Delta PQB \cong \Delta PRB$ $\angle 1 \cong \angle 2$, لہذا $\vec{BD}$ ، $\angle ABC$ کا ناصف ہے۔	قائمہ زاویہ مثلث کے متنا i. دونوں قائمہ زاویہ ہیں۔ ii. معلوم iii. مشترکہ وتر قائمہ زاویہ مثلث میں وتر-ضلع $\cong$ وتر-ضلع متماثل مثلث کی بنا پر ہر کوئی ایک ہی نقطہ پر مل رہا ہے۔

Q.E.D





مسئلہ 11.1.6

ثابت کریں:

کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

معلوم:

مثلث $\triangle ABC$ میں $\overline{BE}$ اور $\overline{CF}$ ، $\angle B$ اور $\angle C$ بالترتیب، ناصف ہیں جو کہ ایک دوسرے کو نقطہ 'O' پر کاٹتی ہیں۔

مطلوب:

$\angle A$ ، $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف ہم نقطہ ہوں گے۔


عمل:

$\overline{OD} \perp \overline{BC}$ اور $\overline{OF} \perp \overline{AB}$ کھینچیں۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
تساظرہ طور پر ... (i) $\overline{OD} \cong \overline{OF}$	کسی زاویے کے ناصف پر ہر نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔
اسی طرح ... (ii) $\overline{OD} \cong \overline{OE}$	(i) اور (ii) سے ثابت شدہ۔
$\overline{OE} \cong \overline{OF}$	مسئلہ 11.1.5 معلوم
تو نقطہ O، $\angle A$ کے ناصف پر ہے اور نقطہ O، $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف پر بھی ہے۔	
ناصف پر بھی ہے۔	
پس $\angle A$ ، $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف نقطہ O پر ہم نقطہ ہیں۔	

Q.E.D



مشق 11.3

1. دو مساوی الساقین مثلث اگر مشترکہ قاعدے پر ہیں تو ثابت کریں کہ وہ خط جو ان کے سروں کو آپس میں ملاتا ہے وہ مشترکہ قاعدے کو قائمہ زاویہ پر تنصیف کرتی ہے۔
2. اگر کسی مثلث کے زاویے کا ناصف مخالف ضلع کو تنصیف کرتا ہو تو ثابت کریں کہ وہ مثلث مساوی الساقین ہے۔
3. ایک مساوی الساقین مثلث $\triangle ABC$ میں $m\overline{AB} = m\overline{AC}$ ہے ثابت کریں کہ کونے B اور C کے عمود مخالف اضلاع کے برابر ہیں۔

اعادہ مشق 11


1. ثابت کریں کہ اگر مثلث کے دو ارتفاع ہم نقطہ ہوں تو وہ مثلث مساوی الساقین مثلث ہوگی۔
2. ثابت کریں کہ ایک مثلث کے اندر لیا گیا نقطہ اس کی تینوں اضلاع سے مساوی الفاصلہ ہو۔ تو وہ مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔
3. نیچے دیئے گئے جملوں کے سامنے صحیح کے لیے 'T' اور غلط کے لیے 'F' سے نشاندہی کریں۔
 - (i) ضلع کی تنصیف کرنے کا مطلب اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔
 - (ii) قائمہ زاویہ مساوی الساقین مثلث کے قاعدے پر ہر زاویہ 45 کا ہوتا ہے۔
 - (iii) متماثل اضلاع کی مثلث کے زاویے متماثل ہوتے ہیں۔
4. درست جواب کی نشاندہی کریں۔
 - (i) حادہ زاویہ مثلث میں _____ حادہ زاویے ہوتے ہیں۔

- a) ایک b) دو c) تین d) کوئی بھی نہیں
- (ii) وہ نقطہ جو قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو وہ قطعہ خط کا _____ ہوتا ہے۔

- a) عمودی ناصف b) عمود c) درمیان d) وسطی نقطہ
- (iii) حادہ زاویہ مثلث کی اضلاع کا _____ مثلث کے اندر ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔

- a) عمود b) عمودی ناصف c) منفرجہ d) حادہ
- (iv) مثلث کے زاویوں کے ناصف _____ ہوتے ہیں۔

- a) ہم نقطہ b) ہم خط c) نہیں ملتے d) نابرابر





خلاصہ

1. قطعہ خط کا نصف قطعہ خط کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔
2. عمودی ناصف قطعہ خط کو دو برابر حصوں میں 90 پر کاٹتا ہے۔
3. قطعہ خط کے عمودی ناصف پر کوئی بھی نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔
4. کوئی بھی نقطہ اگر قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ قطعہ خط کے عمودی ناصف پر ہوتا ہے۔
5. مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔
6. کوئی بھی نقطہ اگر زاویے کے ناصف پر ہو تو وہ زاویے کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔
7. کوئی بھی نقطہ اگر زاویے کے اندر ہو اور زاویے کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ زاویے کے ناصف پر ہوتا ہے۔
8. زاویے کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔



مثلث کے اضلاع اور زاویے

SIDES AND ANGLES OF A TRIANGLE

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے طلباء درج ذیل تصورات پر دسترس حاصل کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ ثابت کر سکیں کہ:

- اگر کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں برابر نہ ہوں تو زیادہ لمبے ضلع کے سامنے والے زاویے کی مقدار (چھوٹے ضلع کے سامنے والے زاویے کی مقدار سے) زیادہ ہوگی۔
- اگر کسی مثلث کے زاویے مقدار میں برابر نہ ہوں تو مقدار میں بڑے زاویے کے سامنے والا ضلع چھوٹے زاویے کے سامنے والے ضلع سے زیادہ لمبا ہوگا۔
- کسی بھی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔
- کسی بھی خط کے بیرونی نقطہ سے خط تک کا عمودی فاصلہ، نقطہ اور خط کے درمیان تمام فاصلوں سے چھوٹا ہوگا۔



تعارف:


اس یونٹ میں ہم مثلث کے اضلاع اور زاویے کے مسائل پڑھیں گے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔

12.1 مثلث کے اضلاع اور زاویے۔

مسئلہ 12.1.1

ثابت کریں:

اگر کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں برابر نہ ہوں تو زیادہ لمبے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار سے (زیادہ) ہوگی۔



$$m\overline{BC} > m\overline{AC} \text{ میں } \triangle ABC$$

مطلوب:

$$m\angle A > m\angle B$$


عمل:

BC پر نقطہ AD اس طرح لیا کہ AC اور BD ہم آہنگ ہوں
نقطہ A کو D سے ملایا۔

ثبوت:

بیانات	دلائل
(i) $\overline{AC} \cong \overline{CD}$ میں $\triangle ACD$	(i) عمل
(ii) $m\angle CAD = m\angle CDA$ $\therefore$	(ii) مخالف اطراف ہم آہنگ ہیں
(iii) $\angle CDA$ بیرونی زاویہ ہے - $\triangle ABD$	(iii) بیرونی زاویے کی تعریف کے مطابق۔
(iv) $m\angle CDA > m\angle B$ $\therefore$	(iv) مثلث کا بیرونی زاویہ سامنے والے غیر متصل اندرونی زاویے سے بڑا ہوگا۔
(v) لیکن $m\angle A > m\angle CAD$	(v) $m\angle A = m\angle CAD + m\angle DAB$ $\therefore$
(vi) $m\angle A > m\angle CDA$ $\therefore$	(vi) $m\angle CDA = m\angle CAD$ $\therefore$
(vii) $m\angle A > m\angle B$ $\therefore$	(vii) اوپر (iv) اور (vi) میں نا برابری کی خاصیت متعدیت

Q.E.D




مندرجہ ذیل مثال اوپر دیئے گئے نظریے کو سمجھنے میں مدد دے گی۔

مثال 01:

ثابت کریں

کہ کسی مختلف الاضلاع مثلث میں سب سے بڑی لمبائی والے ضلع کے سامنے والے زاویے کی مقدار 60° سے زیادہ ہوگی۔

معلوم:



$$m\overline{AC} > m\overline{BC} \therefore m\overline{AC} > m\overline{AB} \text{ میں } \triangle ABC$$

مطلوب:

$$m\angle B > 60^\circ$$

ثبوت:

بیانات	دلائل
ABC لیکن: $m\angle B > m\angle C$ $m\angle B > m\angle A$ لہذا: $m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$ $m\angle B + m\angle B + m\angle B > 180^\circ$ $3 m\angle B > 180^\circ$ لہذا: $= m\angle B > \frac{180^\circ}{3}$ $m\angle B > 60^\circ$	(معلوم) $m\overline{AC} > m\overline{AB}, m\overline{AC} > m\overline{BC}$ (معلوم) $\angle A, \angle B, \angle C$ اندرونی زاویے ہیں ABC $m\angle B > m\angle C$ and $m\angle B > m\angle A \therefore$ (ثابت شدہ) جمع کردہ دونوں اطراف کو 3 سے تقسیم کیا۔


Q.E.D



مسئلہ: 12.1.2

اگر کسی مثلث کے دو زاویے مقدار میں برابر نہ ہوں تو مقدار میں بڑے زاویے کے سامنے والا ضلع جھوٹے زاویے کے سامنے والے ضلع سے زیادہ لمبا ہو گا۔

معلوم: مثلث ABC میں، $m\angle B > m\angle C$



مطلوب: $m\overline{AC} > m\overline{AB}$

عمل: $\angle ABM$ بنائیں اور $\angle C$ جو کہ $\angle MBC$ ،
 $m\angle 1 = m\angle 2$ لہذا اس کو بنائیں لہذا $\overline{BN}$ ،

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\therefore \triangle CBN$ کا بیرونی زاویہ ہے $\angle ANB$ $m\angle ANB = m\angle C + m\angle 2$ $= m\angle C + m\angle 1$ $= m\angle ABM + m\angle 1$ $= m\angle ABN$ $\therefore \overline{AB} \cong \overline{AN}$ لہذا: $m\overline{AC} > m\overline{AB}$	بیرونی زاویہ کی تعریف کے مطابق $m\angle 2 = m\angle 1$ (عمل) $m\angle C = m\angle ABM$ (عمل) زاویے کے اضافے کے مفروضے کے تحت $m\angle ANB = m\angle ABN$ (ثابت شدہ) $m\overline{AC} > m\overline{AN}$

Q.E.D

نتائج صریح:

(i) کسی قائمہ الزاویہ مثلث میں وتر کی لمبائی باقی ہر دو اضلاع کی لمبائیوں سے بڑی ہوتی ہے۔

(ii) کسی منفرجہ الزاویہ مثلث میں منفرجہ زاویے کے سامنے والا ضلع لمبائی میں ہر دیگر دو اضلاع سے لمبائی میں بڑا ہوتا ہے۔



مسئلہ: 12.1.3

کسی بھی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔

معلوم: مثلث ABC



$$m\overline{AB} + m\overline{AC} > m\overline{BC} \quad \text{i)}$$

$$m\overline{AB} + m\overline{BC} > m\overline{CA} \quad \text{ii)}$$

$$m\overline{AC} + m\overline{BC} > m\overline{AB} \quad \text{iii)}$$

مطلوب:

عمل:

BA کو نقطہ D تک اس بڑھائیں کہ نقطہ D کو C سے ملا دیں۔ $\overline{AD} \cong \overline{AC}$ اور $\overline{DC}$ بنائیں

ثبوت:

بیانات	دلائل
$\overline{AD} \cong \overline{AC}$ میں $\triangle ADC$ $m\angle 1 = m\angle 2$ $m\angle BCD > m\angle 1$ $m\angle BCD > m\angle 2$ $m\overline{BD} > m\overline{BC}$ میں $\triangle BDC$ $m\overline{BD} = m\overline{AB} + m\overline{AD}$ $= m\overline{AB} + m\overline{AC}$ $m\overline{AB} = m\overline{AC} > m\overline{BC}$ اس طرح ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں $m\overline{AB} + m\overline{BC} > m\overline{AC}$ $m\overline{BC} + m\overline{AC} > m\overline{AB}$	عمل مثال اضلاع کے مخالف اطراف کے زاویہ $m\angle BCD = m\angle BCA + m\angle 1$ اعداد کی نابرابری کی خاصیت متعدیت بڑے زاویے کی مخالف اضلاع بڑی ہے۔ $m\overline{AD} = m\overline{AC}$ عمل $\overline{BD}$ کی مقدار رکھنے پر اوپر دیئے گئے عمل کے مطابق

Q.E.D

مندرجہ ذیل مثالیں اوپر دیئے گئے نظریے کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔

مثال 01: مندرجہ ذیل مثلث کے اضلاع کی لمبائیوں کے سیٹ ہیں۔ ان میں کس سیٹ سے مثلث بنائی جاسکتی ہے؟

(i) 3cm, 4cm, 5cm,

(ii) 4cm, 5cm 4.5cm

(iii) 60mm, 80mm, 10cm

(iv) 3cm, 4cm, 10cm



حل:

(i) 3cm, 4cm, 5cm

چونکہ: $4 + 5 > 3$, $3 + 5 > 4$, $3 + 4 > 5$

دو اضلاع کی جمع کی قیمت تیسرے ضلع کی لمبائی سے زیادہ ہے اس لیے دی گئی لمبائیوں کا سیٹ کسی مثلث کے اضلاع ہو سکتے ہیں۔

(ii) 4cm, 5cm 4.5cm

چونکہ: $4.5 + 3 > 4$, $5 + 4.5 > 4$, $4 + 5 > 4.5$

اس لیے دی گئی لمبائیوں کا سیٹ کسی مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہو سکتی ہیں۔

(iii) 60mm, 80mm, 10cm

چونکہ: $10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$ so, $60 \text{ mm} = 6 \text{ cm}$ and $80 \text{ mm} = 8 \text{ cm}$

اب: $6 + 8 > 10$, $6 + 10 > 8$ اور $8 + 10 > 6$

اس لیے دی گئی لمبائیوں کا سیٹ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہو سکتی ہیں اور یہ لمبائیاں کوئی مثلث تشکیل دے سکتی ہیں۔

مثال 02:

اوپر دیئے گئے نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ کونسی لمبائیوں کے سیٹ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہو سکتی ہیں اور کسی مثلث کو تشکیل دے سکتی ہیں۔

(i) 2cm, 4cm, 7cm

(ii) 5.5cm, 5cm, 9.5cm

حل:

(i) 2cm, 4cm, 7cm

چونکہ: $7 + 2 > 4$, $4 + 7 > 2$, $2 + 4 < 7$

اس طرح یہ لمبائیاں کسی مثلث کو تشکیل نہیں دے سکتیں۔

(ii) 5.5cm, 5cm, 9.5cm

چونکہ: $9.5 + 5.5 > 5$, $5 + 9.5 > 5.5$, $5.5 + 5 > 9.5$

اس طرح دی گئی لمبائیاں کسی مثلث کو تشکیل دے سکتی ہیں۔



سرگرمی:


a = 3 cm

اگر

b = 4 cm

c = 5 cm


تو بتائیے کہ ΔABC بن سکتی ہے یا نہیں۔



مسئلہ 12.1.4

ثابت کریں
معلوم:

کہ کسی بھی خط کے بیرونی نقطہ سے خط تک کا عمودی فاصلہ نقطہ اور خط کے درمیان تمام فاصلوں سے کم ہوگا۔
خط $\overline{AB}$ پر نقطہ C سے ایک عمود جو کہ خط $\overline{AB}$ پر نقطہ D پر ملتا ہے اور قطعہ خط ہے جو خط $\overline{AB}$ پر نقطہ E پر ملتا ہے۔



مطلوب:


$$m\overline{CD} < m\overline{CE}$$

ثبوت:

بیانات	دلائل
مثالث $\triangle CDE$ کا بیرونی زاویہ ہے $m\angle 1 > m\angle 3$ ∴ $m\angle 2 > m\angle 3$ ∴ $m\overline{CE} > m\overline{CD}$ ∴ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ $m\overline{CD}$ نقطہ C سے $\overline{AB}$ تک کا سب سے کم فاصلہ ہے۔	بیرونی زاویہ کی تعریف کے مطابق مثالث کا بیرونی زاویہ، ہر غیر متصلہ اندرونی زاویہ سے بڑا ہوتا ہے۔ $m\angle 1 = m\angle 2$ (قائمہ زاویہ) بڑے زاویہ کے سامنے بڑا ضلع ہوتا ہے

Q.E.D

نوٹ: کسی خط اور ایک نقطہ (جو اس خط پر واقع ہو) کے درمیان کا فاصلہ صفر ہے۔





مشق: 12.1

1. نقطہ O مثلث ABC کا ایک اندرونی نقطہ ہے ثابت کریں:

$$m\overline{OA} + m\overline{OB} + m\overline{OC} > \frac{1}{2} (m\overline{AB} + m\overline{BC} + m\overline{CA}).$$

2. مثلث ABC میں اگر $m\angle B = 70^\circ$ اور $m\angle C = 45^\circ$ ہو تو کون سا ضلع لمبائی میں سب سے بڑا ہوگا؟

3. اگر مثلث ABC میں $m\angle A = 55^\circ$ اور $m\angle B = 65^\circ$ ہو تو کون سا ضلع لمبائی میں سب سے چھوٹا ہوگا؟

اعادہ مشق 12

1. مندرجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی () لگا کر کریں۔

(i) کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔ (درست / غلط)

(ii) کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کے درمیان کا فرق تیسرے ضلع کی لمبائی سے زیادہ ہوتا ہے۔ (درست / غلط)

(iii) خط کا کوئی بیرونی نقطہ اس خط کا ہم خط نقطہ ہوگا۔ (درست / غلط)

(iv) قائمہ الزاویہ مثلث میں سب سے بڑا زاویہ 100° کا ہوتا ہے۔ (درست / غلط)

(v) کسی خط پر عمود 90° کا زاویہ بناتا ہے۔ (درست / غلط)

2. خالی جگہ پر کریں:

1. کسی بھی قائمہ الزاویہ مثلث میں _____ مثلث کا سب سے لمبا ضلع ہوگا۔

2. قائمہ الزاویہ مثلث میں قائمہ زاویہ رکھنے والی اضلاع کی لمبائیوں کی جمع وتر کی لمبائی سے _____ ہوتی ہے۔

3. مثلث ABC میں $m\angle A = 50^\circ$ اور $m\angle B = 30^\circ$ ہو تو ضلع _____ باقی اضلاع سے لمبا ہوگا۔

4. کسی بھی چکور کے وتر کی لمبائی اس کے ملحقہ اطراف کی لمبائی کی جمع سے ہوتی ہے۔

3. درست جواب پر () کا نشان لگائیں۔

1. مساوی مثلث کے ایک ضلع کی لمبائی 6cm ہے تو اس کے اوسط کی لمبائی 9cm سے _____ ہوگی۔

(ا) زیادہ (ب) برابر


(ج) کم (د) ان میں سے کوئی نہیں۔





خلاصہ

- ◆ اگر کسی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں برابر نہ ہوں تو زیادہ لمبے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار (چھوٹے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار سے) زیادہ ہوگی۔
- ◆ اگر کسی مثلث کے دو زاویے مقدار میں برابر نہ ہوں تو مقدار میں بڑے زاویے کے سامنے والا ضلع چھوٹے زاویے کے سامنے والے ضلع سے زیادہ لمبا ہوگا۔
- ◆ کسی بھی مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔
- ◆ کسی بھی خط کے بیرونی نقطہ سے خط تک کا عمودی فاصلہ، نقطہ اور خط کے درمیان تمام فاصلوں سے چھوٹا ہوگا۔



PRACTICAL GEOMETRY –
TRIANGLES

حاصلات تعلیم:

اس یونٹ کی مکمل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- ایک مثلث بنا سکیں جس کہ:
- دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ معلوم ہو،
- ایک ضلع اور دو زاویے معلوم ہوں،
- جس کے دو اضلاع اور ان میں سے ایک ضلع کے متقابلہ زاویہ معلوم ہوں، (تینوں ممکن صورتیں)
- بنا سکیں:
- ایک معلوم مثلث کے زاویوں کے ناصف،
- عمود،
- اضلاع کے عمودی ناصف،
- مثلث کے وسطیہ ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کر سکیں
- ایک مثلث بنا سکیں جس کا رقبہ ایک معلوم چوکور کے رقبہ کے برابر ہو
- ایک مستطیل بنا سکیں جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے برابر ہو
- ایک مربع بنا سکیں جس کا رقبہ ایک معلوم مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو
- ایک مثلث بنا سکیں جس کے قاعدے کی مقدار معلوم ہو اور جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے مساوی ہو۔


13.1 مثلثوں کی بناوٹ / ساخت:

13.1.1: ایک مثلث بنائیں جس میں معلوم ہو:

- دو اضلاع اور درمیانی زاویہ
 - ایک ضلع اور دو زاویے
 - دو اضلاع اور ان میں سے ایک ضلع کے متقابلہ زاویہ (تینوں ممکن صورتیں)
- جب دو اضلاع اور درمیانی زاویہ معلوم ہو۔

مثال 01 ایک مثلث ABC بنائیں جس میں $m\angle B = 70^\circ$ اور $m\overline{AB} = 4.8 \text{ cm}$, $m\overline{AC} = 3.2 \text{ cm}$

عمل:



(i) $\overline{AB}$ کا قطعہ خط 4.8 cm بنائیں۔

(ii) نقطہ A پر $\overline{XAB}$ کا زاویہ 75° بنائیں

(iii) $\overline{AC}$ پر 3.2 cm $\overrightarrow{AX}$ قطع کریں


(iv) $\overline{BC}$ کھینچیں

لہذا $\triangle ABC$ مطلوبہ مثلث ہے۔

جب ایک ضلع اور دو زاویے معلوم ہوں

مثال 01 ایک مثلث $\triangle XYZ$ بنائیں جس میں $m\angle A = 75^\circ$ اور $m\angle B = 40^\circ$ اور $m\overline{AB} = 5.5 \text{ cm}$

عمل:





(i) ایک مثلث $\overline{AB}$ بنائیں جس میں 5.5 cm

(ii) نقطہ A پر $\overline{XAB}$ کا زاویہ 75° بنائیں

(iii) نقطہ B پر $\overline{YBA}$ زاویہ 40° بنائیں، اس طرح کہ $\overline{AX}$ قطع کرے C کو نقطہ پر

لہذا $\triangle ABC$ مطلوبہ مثلث ہے۔





مثال 02 ایک مثلث $\triangle XYZ$ بنائیں جس میں $m\angle A = 65^\circ$, $m\angle B = 40^\circ$ اور $m\overline{BC} = 5.8 \text{ cm}$

عمل: ہم جاننے ہیں کہ میں $\triangle ABC$

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180^\circ$$

$$m\angle A = 65^\circ \text{ and } m\angle B = 40^\circ \quad \text{یہاں}$$

$$m\angle C = 180^\circ - (m\angle A + m\angle B) \quad \text{اسلئے}$$

$$= 180^\circ - (65^\circ + 40^\circ)$$

$$= 180^\circ - 105^\circ$$

$$= 75^\circ$$

اب ہم مشترک بنائیں گے جس میں

$$m\overline{BC} = 5.8 \text{ cm}, m\angle B = 40^\circ \text{ اور } m\angle C = 75^\circ$$

(i) $\overline{BC} = 5.8 \text{ cm}$ کھینچیں

(ii) نقطہ B کا زاویہ بنائیں $\angle XBC = 40^\circ$

(iii) نقطہ C کا زاویہ بنائیں $\angle YCB = 75^\circ$

(iv) غیر مستک بازو BX اور CY پر کاٹتے ہیں لہذا A مطلوبہ مثلث ہے۔

جب دو اضلاع اور ان میں سے ایک ضلع کے متقابلہ زاویہ معلوم ہوں (تینوں ممکن صورتیں)

صورت I:

مثال 01 ایک مثل $\triangle ABC$ بنائیں جس میں $m\angle A = 40^\circ$, $m\overline{BC} = 3.7 \text{ cm}$ اور $m\overline{AB} = 5.3 \text{ cm}$

عمل:

(i) $\overline{AB} = 5.3 \text{ cm}$ کھینچیں



(ii) نقطہ A کا زاویہ بنائیں $\angle BAX$

(iii) نقطہ B کو مرکز کر کے 3.7 cm کا قوس بنائیں

جو $\angle AX = 40^\circ$ اور C کو نقطہ پر قطع کرتا ہے۔

(iv) $\overline{BC}$ اور $\overline{BC'}$ کھینچیں

$\triangle ABC$ اور $\triangle ABC'$ مطلوبہ مثلثیں ہیں۔



صورت II:

مثال 02 ایک مثلث DEF بنائیں جب $m\angle E = 30^\circ$ اور $m\overline{DE} = 5.6 \text{ cm}$, $m\overline{DF} = 2.5 \text{ cm}$

عمل:

(i) $\overline{DE}$ کا قطعہ خط 5.6 cm بنائیں۔(ii) نقطہ E 40° بنائیں۔

(iii) نقطہ D کو مرکز مان کر داس 2.5 cm کا قوس بنائیں جو EX کو

کسی بھی نقطہ پر قطع نہ کرتا ہو۔ اس صورت میں کوئی مثلث نہیں بن سکتا جو معلوم شدہ کی تصدیق کرے۔

صورت III:

مثال 03 ایک مثلث PQR بنائیں جب $m\angle P = 55^\circ$ اور $m\overline{PR} = m\overline{QR} = 4.7 \text{ cm}$

عمل:

(i) $\overline{PR}$ کا قطعہ خط 4.7 cm بنائیں۔(ii) نقطہ P کا زاویہ $\angle XPR = 55^\circ$ بنائیں "

(iii) نقطہ R کو مرکز مان کر داس 4.7 cm کا قوس بنائیں

جو EX کو نقطہ Q پر قطع کرتا ہے۔

(iv) نقطہ R اور Q کو ملائیں۔

 $\triangle PQR$ مطلوبہ مثلث ہے۔

نوٹ: مندرجہ بالا صورت i، صورت ii، اور صورت iii مبہم صورتیں کہلاتی ہیں۔

مشق 13.1

1. $\triangle PQR$ بنائیں جب کہ $m\angle Q = 35^\circ$ اور $m\overline{PQ} = m\overline{QR} = 4.6 \text{ cm}$ 2. $\triangle ABC$ بنائیں جب کہ $m\angle A = 65^\circ$ اور $m\overline{AB} = m\overline{AC} = 5.1 \text{ cm}$ 3. $\triangle LMN$ بنائیں جب کہ $\angle M = 50^\circ$ اور $m\overline{LM} = 3.7 \text{ cm}$, $m\overline{MN} = 2.5 \text{ cm}$ 4. $\triangle ABC$ بنائیں جب کہ $\angle B = 110^\circ$ اور $m\overline{AB} = 3.5 \text{ cm}$, $m\overline{BC} = 2.7 \text{ cm}$ 5. $\triangle XYZ$ بنائیں جب کہ $\angle Z = 80^\circ$ اور $m\overline{XY} = 4.1 \text{ cm}$, $m\overline{YZ} = 5 \text{ cm}$



6. درج ذیل میں $\triangle ABC$ اور $\triangle LMN$ بنائیں۔

- (i) $m\overline{DE} = 5\text{cm}$, $m\angle D = 45^\circ$ اور $m\angle E = 60^\circ$
- (ii) $m\overline{LM} = 6\text{cm}$, $m\angle L = 75^\circ$ اور $m\angle M = 45^\circ$
- (iii) $m\overline{BC} = 5.8\text{cm}$, $m\angle A = 30^\circ$ اور $m\angle B = 45^\circ$

7. $\triangle ABC$ بنائیں جب اس کے دو اضلاع کی لمبائی اور اس میں سے ایک ضلع کے متقابلہ زاویہ معلوم ہو، جیسے کہ:

- (i) $m\overline{AC} = 4.5\text{cm}$, $m\overline{BC} = 4.1\text{cm}$ اور $m\angle B = 75^\circ$
- (ii) $m\overline{BC} = 5\text{cm}$, $m\overline{AB} = 5.5\text{cm}$ اور $m\angle C = 70^\circ$
- (iii) $m\overline{AB} = 5\text{cm}$, $m\overline{BC} = 5.5\text{cm}$ اور $m\angle A = 45^\circ$

13.1.2: بنائیں

• زاویوں کے ناصف

• عمود

• اضلاع کے عمودی ناصف

• وسطانیے


(i) معلوم مثلث کے زاویوں کے ناصف بنائیں۔

مثال 01 $\triangle ABC$ کے زاویوں کے ناصف بنائیں۔

معلوم: ABC ایک مثلث ہے۔ $\angle A$, $\angle B$ اور $\angle C$ اس کے زاویے ہیں۔

مطلوبہ: $\angle A$, $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف بنائیں۔

عمل:



(i) مثلث ABC بنائیں

(ii) نقطہ B کا مرکز مان کر کسی بھی داس کی قوس بنائیں، جو اضلاع $\overline{BA}$ اور $\overline{BC}$

پر M اور L کاٹتا ہے۔

(iii) نقطہ L کو مرکز مان کر کسی بھی داس کی قوس بنائیں۔

(iv) نقطہ M کو مرکز مان کر اور اسی داس سے دوسری قوس بنائیں جو پہلی قوس کو

نقطہ P پر کاٹتا ہے۔

(v) نقطہ P سے B تک ملائیں اور بنائیں BP $\angle B$ کا ناصف ہے۔

(vi) AR اور CQ بنانے کے لیے قدم (iii) سے (v) دہرائیں جو کہ $\angle A$ اور $\angle C$ کے ناصف ہیں، بالترتیب



(ii) معلوم مثلث کے عمود بنائیں۔

مثال 01 کوئی بھی مثلث ABC لیں اور اس کے عمود بنائیں

معلوم: ایک $\triangle ABC$

مطلوبہ: $\triangle ABC$ کے عمود بنائیں۔

عمل:

(i) مثلث ABC بنائیں۔

(ii) نقطہ A کو مرکز مان کر مناسب رداس کا قوس بنائیں جو $\overline{BC}$ کو نقطہ E اور D پر کاٹتا ہے۔

(iii) نقطہ D کو مرکز مان کر $\frac{1}{2} m\overline{DE}$ سے زیادہ کے رداس کا قوس بنائیں۔

(iv) دوبارہ نقطہ E سے اسی رداس کا قوس بنائیں جو پہلی قوس کو نقطہ F کاٹے۔

(v) A اور F کو ملائیں۔ اس طرح $\overline{AF}$ کہ قطع کرے $\overline{BC}$ کو نقطہ P پر۔ تب $\overline{AP}$ عمود ہو گا مثلث $\triangle ABC$ پر A سے (vi) قدم (ii) سے (v) دہرائیں اور $\overline{CR}$ اور $\overline{BQ}$ بنائیں، جو کہ راس $\triangle ABC$ کا عمود ہے۔ لہذا B اور C وہ ان عمود کے سرے ہیں۔

پس $\overline{AP}$, $\overline{BQ}$ اور $\overline{CR}$ ان عمود کے سرے ہیں

(iii) معلوم مثلث کے عمودی ناصف بنائیں

مثال 01 مثلث ABC کے اضلاع کے عمودی ناصف بنائیں۔


معلوم: ایک مثلث ABC

مطلوبہ: اضلاع $\overline{CA}$, $\overline{BC}$ اور $\overline{AB}$ کے عمودی ناصف بنائیں۔

عمل:

(i) مثلث ABC بنائیں۔

(ii) $\overline{AB}$ کے عمودی ناصف بنائیں، نقطہ B کو مرکز مان کر آدھے $\overline{AB}$ سے زیادہ کا رداس لیں اور $\overline{AB}$ کے دوسری طرف قوس بنائیں۔






(iii) اب A کو مرکز مان کر $\overline{AB}$ کی دوسری طرف اسی رداس کا قوس بنائیں جو پہلی قوس کو Q اور P پر کاٹتا ہے۔
(iv) Q اور P کا عمودی ناصف ہے۔

$\overline{AB}, \overline{PQ}$ کے عمودی ناصف ہے

(v) قدم (ii) سے (iv) دہرائیں اور $\overline{AC}$ اور $\overline{BC}$ بنائیں جو بالترتیب $\overline{LM}$ اور $\overline{ST}$ کے عمودی ناصف ہیں۔
لہذا $\overline{LM}$ اور $\overline{ST}$ بالترتیب $\overline{PQ}$ اور $\overline{AC}$ اور $\overline{BC}$ کے مطلوبہ عمودی ناصف ہیں ΔABC کے
(IV) معلوم مثلث کے وسطانیے بنائیں۔

مثال 01 کوئی بھی مثلث ABC لیں اور اس مثلث کے وسطانیے بنائیں۔



معلوم: ایک ΔABC
مطلوبہ: ΔABC کے وسطانیے بنائیں۔

عمل:
(i) مثلث ABC بنائیں۔

(ii) $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ اور $\overline{AC}$ کو بالترتیب نقطہ F, E اور D پر کاٹیں۔

(iii) A کو B سے، E کو F سے اور C کو D کو ملائیں۔

لہذا $\overline{CD}$ اور $\overline{AE}$ کے مطلوبہ وسطانیے ہیں جو نقطہ ΔABC پر ملتے ہیں یہ نوٹ کیا جاسکتا ہے
کہ ہر مثلث کے وسطانیے ہم آہنگ ہوتے

ہیں (G ایک نقطہ پر ملتے ہیں) اور ان کا نقطہ ہم آہنگی centroid کہلاتا ہے جو ان میں سے ہر ایک کو 1:2 پر تقسیم کرتا ہے۔
اصل بیانیہ سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ

$$\frac{m\overline{AG}}{m\overline{GE}} = \frac{m\overline{BG}}{m\overline{GF}} = \frac{m\overline{CG}}{m\overline{GD}} = \frac{2}{1}$$



مشق 13.2

1. ایک Δ لیں اور اس کے وسطانیے بنائیں اور ثابت کریں کہ یہ ہم آہنگ ہیں

2. ایک Δ لیں اور اس کے عمود بنائیں اور ثابت کریں کہ یہ ہم آہنگ ہیں۔

3. ایک Δ لیں اور اس کے زاویوں کے اندرونی ناصف بنائیں اور ثابت کریں کہ یہ ہم آہنگ ہیں۔

4. ایک مثلث ABC بنائیں جس میں $m\overline{AB} = 5\text{ cm}$, $m\overline{CA} = 4\text{ cm}$ اور $m\overline{BC} = 6\text{ cm}$ کے ناصف کھینچیں اور B

5. ایک مثلث PQR بنائیں جس میں $m\overline{PR} = 4.4\text{ cm}$ اور $m\overline{QR} = 6.4\text{ cm}$ اور $m\overline{PQ} = 5.7\text{ cm}$ اور R سے عمود بنائیں۔

6. مثلث STU بنائیں جس میں $m\overline{TU} = 7\text{ cm}$ اور $\angle U = 30^\circ$, $\angle T = 60^\circ$ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف تلاش کریں اور ثابت کریں کہ یہ ہم آہنگ ہیں۔

7. دائیں مثلث ABC بنائیں جس میں $m\overline{CB} = 5\text{ cm}$ اور $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ مثلث کے وسطانیے کھینچیں۔

8. ΔXYZ بنائیں اس کے تین وسطانیے کھینچیں اور ثابت کریں کہ یہ ہم آہنگ ہیں۔

(i) $m\overline{YZ} = 4.4\text{ cm}$, $m\angle Y = 45^\circ$ and $m\angle Z = 75^\circ$

(ii) $m\overline{XY} = 4.6\text{ cm}$, $m\overline{XZ} = 4.6\text{ cm}$ and $m\angle Y = 60^\circ$

9. ΔKLM بنائیں جس میں $m\overline{MK} = 4.5\text{ cm}$ اور $m\overline{LM} = 5.2\text{ cm}$ اور $m\overline{KL} = 4.8\text{ cm}$ اس کے عمود بنائیں

اور تصدیق کریں کہ یہ ہم آہنگ ہیں۔

10. ΔPQR بنائیں جس میں $m\overline{PR} = 5.8\text{ cm}$, $m\overline{QR} = 6.5\text{ cm}$ اور $m\overline{PQ} = 7\text{ cm}$ اس کے عمودی ناصف تلاش کریں

اور کہ یہ ہم آہنگ ہیں۔

13.2: برابر قے والی اشکال

13.2.1: ایک مثلث بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم جو کور کے رقبہ کے برابر ہو۔



مثلاً: ایک مثلث بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم جو کور ABCD کے برابر ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ، تمام مثلث کا رقبہ جو ایک جیسے قاعدے پر ہوں اور ان کا اس برابر ہو وہ اس خط پر ہوتی ہے جو قاعدے کے عمود پر ہو۔

1. ABCD معلوم جو کور ہے۔

2. A کو C سے ملائیں


3. D بنائیں جو AC کو DE کے متوازی ہو اور نقطہ E BC پر سے ملتا ہو۔

4. A کو E سے ملائیں، پھر ABE مطلوبہ مثلث ہے۔





13.2.2: ایک مستطیل بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے برابر ہو۔



مثلاً: ایک مستطیل بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم $\triangle ABC$ کے برابر ہو۔

1. ایک مثل ABC بنائیں۔


2. $\overline{PD}$ پر عمودی ناصف $\overline{BC}$ بنائیں۔

3. A سے ایک خط PQ بنائیں جو $\overline{BC}$ کے متوازی ہے۔

4. $m\overline{PQ} = m\overline{DC}$ لیں۔

5. پھر $CDPQ$ مطلوبہ مستطیل ہے۔

13.2.3: ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو۔



مثلاً: ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم مستطیل $ABCD$ کے برابر ہو۔

تعمیر کے مراحل درج ذیل ہیں

1. $ABCD$ معلوم مستطیل ہے۔


2. $m\overline{DE} = m\overline{CD}$ بناتے ہوئے E سے $\overline{AD}$ بنائیں

3. $\overline{AE}$ کو M پر کاٹیں

4. مرکز M اور رداس $m\overline{AM}$ سے نیم دائرہ (semicircle) بنائیں۔

5. $\overline{CD}$ بنائیں تاکہ ہم دائرہ (semi-circle) نقطہ F پر ملے۔

6. $\overline{DF}$ پر ایک ضلع کے طور پر ایک مربع $DFQP$ بنائیں یہ مطلوبہ مربع ہو سکتا ہے۔



13.2.4: ایک مثلث بنائیں جس کے قاعدے کی مقدار معلوم ہو اور جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبے کے مساوی ہو۔

تغیر کے مراحل درج ذیل ہیں

1. ABC معلوم مثلث ہے۔

2. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ بنائیں

3. B کو مرکز مان کر اور رداس x ، اس طرح کے $m\overline{BC} = x$ ایک قوس بنائیں

جو $\overline{AD}$ at P کاٹی ہے۔

4. $\overline{CP}$ اور $\overline{BP}$ کو ملائیں۔

5. پھر $\triangle BCP$ مطلوبہ مثلث ہے برابر قاعدی $\overline{BP} = x$ کے ساتھ اور رقبہ مساوی ہے $\triangle ABC$

مشق 13.3

1. ایک مستطیل بنائیں جس کے علیحدہ اضلاع بالترتیب 5cm اور 2.5cm ہوں۔ ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ معلوم مستطیل کے برابر ہو۔

2. ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ اس مستطیل کے برابر ہو جس کے ملحقہ اضلاع بالترتیب 4.5cm اور 2.2cm ہوں۔ مربع کے اضلاع کی پیمائش کریں اور اس کا رقبہ تلاش کریں اور مستطیل کے رقبہ سے موازنہ کریں۔ اور پیمائش سے ثابت کریں کہ مربع کا احاطہ مستطیل کے احاطے سے چھوٹا ہے۔

3. ایک مثلث بنائیں جس کا قاعدہ 4cm ہو اور اگلے دو اضلاع 3.8cm اور 3.6cm ہوں۔ اس کو ایک برابر رقبہ کے مستطیل میں منتقل کریں۔

4. ایک مثلث بنائیں جس کا قاعدہ 6cm ہو اور اگلے دو اضلاع 6cm اور 5cm ہوں ایک مستطیل بنائیں جس کا رقبہ معلوم کے برابر ہو۔ $\triangle$

اعادہ مشق 13

1. خالی جگہ پُر کریں۔

(i) ایک مثلث کا ضلع جو سب سے بڑے زاویے کے متقابل ہو _____


(ii) قطعہ خط جو ایک مثلث کے راس سے ملتا ہو اور اس کے متقابل ضلع کے عمودیہ ہو کہلاتا ہے _____

(iii) ایک قطعہ خط جو ایک مثلث کے راس سے کھینچا ہو اور اس کے متقابل ضلع کے درمیان نقطہ پر ملتا ہو کہلاتا ہے _____




(iv) ایک مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔
 (v) دو یا دو سے زیادہ مثلثیں ہم آہنگ کہلاتی ہیں اگر وہ مساوی الزاویہ ہوں اور ان کے متعلقہ اضلاع کی پیمائش ہو۔
 2. درست جواب پر (✓) لگائیں۔

- (i) ایک مثلث جس کے تمام تینوں اضلاع ہم آہنگ ہوں۔ مثلث کہلاتا ہے۔
 (i) سکلیس (scalene) (ب) قائمہ الزاویہ (ج) مساوی الاضلاع (د) متساوی الساقین۔
 (ii) ایک چوکور جس کا ہر زاویہ 90 کے برابر ہو اور تمام اضلاع ہم آہنگ ہو کہلاتا ہے۔
 (i) متوازی الاضلاع (ب) مستطیل (ج) ذوزنق (trapezium) (د) مربع
 (iii) مثلث کے وسطانیے ہوتے ہیں۔
 (i) شریک لکیری (collinear) (ب) متماثل (ج) ہم آہنگ (د) متوازی۔
 (iv) ایک مساوی الاضلاع مثلث کے _____ عمود ہم آہنگ ہوتے ہیں۔
 (i) دو (ب) تین (ج) چار (د) کوئی بھی نہیں
 (v) مستطیل کے اخترن (diagonals) ایک دوسرے کو _____ کرتے ہیں۔
 (i) کاٹے (bisect) (ب) سہ رخ (trisect) (ج) قائمہ الزاویہ پر کاٹنا (د) ان میں سے کوئی نہیں۔
 (vi) مثلث کے _____ ایک دوسرے کو 1:2 کے تناسب پر کاٹتے ہیں۔
 (i) عمود (ب) زاویوں کے ناصف (ج) دائیں ناصف (د) وسطانیے
 (vii) متساوی الساقین کے قاعدے کا ہر زاویہ _____ ہے، پھر راسی الزاویہ _____ ہوگا۔
 30 (i) 60 (ب) 90 (ج) 120 (د)
 (viii) اگر مثلث کے تین وسطانیے ہم آہنگ ہیں تو مثلث _____ ہوگا۔
 (i) قائمہ الزاویہ (ب) مساوی الاضلاع (ج) متساوی الساقین (د) حادہ الزاویہ۔
 (ix) اگر مثلث کے دو _____ ہم آہنگ ہوں تو مثلث متساوی الساقین ہوگا۔
 (i) عمود (ب) وسطانیے (ج) دائیں ناصف (د) اضلاع



خلاصہ

- ◆ اس یونٹ میں ہم نے اشکال کی تعمیر اور متعلقہ تصورات پڑھے۔
- ◆ ایک مثلث بنائیں جس کے دو اضلاع اور درمیانی زاویہ معلوم ہو۔
- ◆ ایک مثلث بنائیں جس کا ایک ضلع اور دو زاویے معلوم ہوں۔
- ◆ ایک مثلث بنائیں جس کے دو اضلاع اور ان میں سے ایک ضلع کے متقابلہ زاویہ معلوم ہو۔
- ◆ معلوم مثلث کے زاویوں کے ناصف بنائیں اور ان کی ہم آہنگی کی تصدیق کریں۔
- ◆ معلوم مثلث کے عمود بنائیں اور ان کی ہم آہنگی کی تصدیق کریں۔
- ◆ معلوم مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف بنائیں اور ان کی ہم آہنگی کی تصدیق کریں۔
- ◆ معلوم مثلث کے وسطانیے بنائیں اور ان کی ہم آہنگی کی تصدیق کریں۔
- ◆ ایک مثلث بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم چوکور کے رقبہ کے برابر ہو۔
- ◆ ایک مستطیل بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے برابر ہو۔
- ◆ ایک مربع بنائیں جس کا رقبہ ایک معلوم مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو۔
- ◆ ایک مثلث بنائیں جس کے قاعدے کی مقدار معلوم ہو اور جس کا رقبہ ایک معلوم مثلث کے رقبہ کے مساوی ہو
- ◆ دو یا دو سے زیادہ خط ہم آہنگ کہلاتے ہیں اگر یہ کسی مشترکہ نقطہ سے گزریں ہوں اور یہ نقطہ نقطہ ہم آہنگی (point of concurrency) کہلاتا ہے۔
- ◆ وہ نقطہ جہاں پر مثلث کے زاویوں کے اندرونی ناصف ایک دوسرے کو کاٹیں مثلث کا اندرونی مرکز (incentre) کہلاتا ہے۔
- ◆ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف کے نقطہ ہم آہنگی محاصرہ مرک (circum center) کہلاتا ہے۔
- ◆ مثلث کے وسطانیے سے مراد ایک قطعہ خط ہے جو مثلث کے راس کو متقابل ضلع کے درمیانی نقطہ سے ملاتا ہے۔
- ◆ عمودی مرکز (orthocenter) سے مراد مثلث کے تینوں عمود کا نقطہ ہم آہنگی ہے۔



رقبہ سے متعلق مسئلے

14

یونٹ

THEOREMS RELATED WITH AREA

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکھنے کے اہم وسیع ترماحصل / نتائج (SIOs)

اس یونٹ کا مطالعہ کر کے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ:


- مندرجہ ذیل نظریات Theorems کو ان کے نتائج کے ساتھ سمجھیں اور ان کو متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں۔
- ایک ہی قاعدہ پر واقع اور ایک جیسے متوازی خط کے درمیان میں واقع متوازی الاضلاع (یا ان کا ارتفاع برابر ہو) رقبہ میں برابر ہوں گی۔
- برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔
- ایسی مثلثیں جو ایک قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔
- ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

تعارف:

ہم رقبہ سے متعلق مسئلے پڑھیں گے۔

14.1 رقبہ سے متعلق مسئلے۔

مسئلہ 14.1.1: ایک ہی قاعدہ پر متوازی الاضلاع اشکال جو قاعدہ خط اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع برابر ہوں) وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔



معلوم:

دو متوازی الاضلاع اشکال ABCD اور ABEF کا مشترکہ ہم اعدہ $\overline{AB}$ ہے اور وہ دو متوازی قطعات خط $\overline{DE}$ اور $\overline{AB}$ کے درمیان واقع ہیں۔

مطلوب:

متوازی الاضلاع ABCD اور ABEF رقبہ میں برابر ہیں

$$\bullet \blacksquare ABCD = \blacksquare ABEF$$


ثبوت:


بیانات	دلائل
میں	$\Delta ADF \leftrightarrow \Delta BCE$
... (i)	$m\overline{BC} = m\overline{AD}$
... (ii)	$m\angle BCE = m\angle ADF$
... (iii)	$\angle E \cong \angle F$
	$\Delta BCE \cong \Delta ADE$
	$\triangle BCE \cong \triangle ADF$
	$\blacksquare ABED + \triangle BCE = \blacksquare ABED + \triangle ADF$
لہذا	$\blacksquare ABCD = \blacksquare ABEF.$

Q.E.D

نتیجہ:


(i) ایک جیسے قاعدہ پر واقع متوازی الاضلاع اشکال اور مستطیل جن کا ارتفاع برابر ہو وہ رقبہ میں برابر ہوں گے۔





مسئلہ 14.1.2:

برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔



متوازی الاضلاع اشکال ABCD اور EFGH
برابر قاعدوں $\overline{BC}$ اور $\overline{FG}$ پر واقع ہیں اور ان
کے ارتفاع بھی برابر ہیں۔


مطلوب: $\blacksquare ABCD = \blacksquare EFGH$

عمل: معلوم متوازی الاضلاع اشکال ABCD اور EFGH
کو اس طرح رکھیں کہ ان کے برابر قاعدے $\overline{BC}$ اور $\overline{FG}$
ایک ہی خط پر واقع ہوں۔ B to E اور C to H

ثبوت:


بیانات	دلائل
ABCD اور EFGH ایک جیسے متوازی خطوط $\overline{AH}$ اور $\overline{BG}$ کے درمیان میں واقع ہیں۔ لہذا A, D, E اور H ایک خط مستقیم ہیں اور $\overline{BC}$ کے متوازی ہیں۔ $m \overline{BC} = m \overline{FG}$ $m \overline{BC} = m \overline{EH}$ اب $m \overline{BC} = m \overline{EH}$ متوازی ہیں لہذا EBCH ایک متوازی الاضلاع ہے اب $\blacksquare ABCD = \blacksquare EBCH$ لیکن $\blacksquare EBCH = \blacksquare EFGH$ لہذا $\blacksquare ABCD = \blacksquare EFGH$	ان کے ارتفاع برابر ہیں (معلوم) معلوم EFGH ایک متوازی الاضلاع ہے متوازی خطوط کے قطعات متوازی خطوط ہی ہوتے ہیں کسی چوکور کے دو ضلع متوازی اور برابر ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔ مسئلہ 14.1.1 مسئلہ 14.1.1 (i) اور (ii) کی رو سے

Q.E.D.



مسئلہ 14.1.3:

ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔



معلوم: $\triangle ABC$ اور $\triangle DBC$ ایک ہی قاعدہ $\overline{BC}$ پر واقع ہیں اور

ایک جیسی متوازی خطوط کے درمیان میں واقع ہیں۔ $\overline{AD}$ اور $\overline{BC}$

مطلوب: $\triangle ABC = \triangle DBC$

عمل: کھینچیں جو $\overline{CA}$ ، $\overline{BE}$ پر ملتے ہیں جو $\overline{AD}$ پر بنا۔ E

پھر $\overline{BD}$ ، $\overline{CF}$ کھینچیں جو $\overline{AD}$ پر ملتے ہیں جو F پر بنا۔


ثبوت:

بیانات	دلائل
BCAE ایک متوازی الاضلاع ہے	عمل کی رو سے
$\triangle ABC = \frac{1}{2} (\square BC AE) \dots (i)$	متوازی الاضلاع $\overline{AD}$ کا وتر BC AE اسے دو
اسی طرح BC FD ایک متوازی الاضلاع ہے	برابر رقبہ کے مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔
$\triangle DBC = \frac{1}{2} (\square BC FD) \dots (ii)$	عمل کی رو سے
$\square BC AE = \square BC FD \dots (iii)$	متوازی الاضلاع $\overline{CD}$ کا وتر BC FD سے دو
$\triangle ABC = \triangle DBC$	برابر رقبہ کے مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔

Q.E.D

مسئلہ 14.1.4:

ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گے۔



معلوم: $\triangle ABC$ اور $\triangle DEF$ کو اس طرح رکھیں


کہ ان کے برابر قاعدے $\overline{BC}$ اور $\overline{EF}$

ایک جیسی خط پر موجود ہوں

مطلوب: $\triangle ABC = \triangle DEF$

عمل: $\overline{AD}$ اور $\overline{BF}$ کھینچیں اس طرح کے نقطہ B, C, E اور F, E, C پر موجود ہوں۔ کھینچیں $\overline{CA}$ اور $\overline{BX}$ اور $\overline{ED}$ اور $\overline{FY}$

تا کے نقطے X اور Y پر موجود ہوں۔






ثبوت:

بیانات	دلائل
$\triangle ABC$ اور $\triangle DEF$ ایک جیسی متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں $\overline{BF} \parallel \overline{XY}$	ارتفاع برابر ہیں (معلوم)
$\therefore \square BCAX = \square EFYD \quad \dots (i)$	مسئلہ 14.1.2
$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} (\square BCAX) \quad \dots (ii)$	متوازی الاضلاع کے وتر اسے دو مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔
$\text{اور } \triangle DEF = \frac{1}{2} (\square EFYD) \quad \dots (iii)$	پچھلی دلائل کسی رو سے
$\therefore \triangle ABC = \triangle DBC$	(iii)، (ii)، (i) کی رو سے


Q.E.D

نتیجہ:

ایسی مثلثیں جن کی راس (vertex) مشترکہ ہو اور ایک جیسی خط پر قاعدے بھی برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔




مشق 14.1




1. معلوم شکل میں ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے اور EFCD ایک مستطیل ہے، اور $\overline{AL} \perp \overline{DC}$ ثابت کریں کہ

(i) $\text{Area } ABCD = \text{Area } EFCB$

(ii) $\text{Area } ABCD = m\overline{DC} \times m\overline{AL}$.



2. معلوم شکل میں، اگرچو کور کے وتر اسے چار برابر رقبہ کے مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے تو ثابت کریں کہ یہ متوازی الاضلاع اشکال ہے۔



3. معلوم شکل $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ میں قائمہ الزاویہ ہے اس B پر جس میں $m\overline{AC} = 11 \text{ cm}$ اور $m\overline{BC} = 7 \text{ cm}$ اور $\triangle ABC$ اور $\triangle BCD$ ایک ہی قاعدہ $\overline{BC}$ پر واقع ہیں $\triangle BCD$ کا رقبہ تلاش کریں۔

4. ثابت کریں کہ ایک مثلث کا وسطانیہ اسے دو برابر رقبہ کے مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔

5. ثابت کریں کہ قطعہ خط جو مستطیل کے بالمقابل اضلاع کے درمیانی نقطے پر ملتا ہے، اسے دو برابر مستطیل میں تقسیم کرتا ہے۔

6. اگر دو متوازی الاضلاع جن کا رقبہ برابر ہو اور ان کے قاعدے ایک جیسے یا برابر ہو تو ان کے ارتفاع برابر ہوں گی۔

7. ثابت کریں کہ مساوی الاضلاع مثلث کے زاویوں کے ناصف اسے دو برابر رقبہ کے مثلث میں تقسیم کرتا ہے۔



8. ثابت کریں کہ معین (rhombus) کے وتر اسے چار برابر رقبہ کے مثلث میں تقسیم کرتے ہیں۔



اعادہ مشق 14

1. درست کے لیے 'د' اور غلط کے لیے 'غ' لگائیں درج ذیل میں ہر کسی کے آگے۔
 - (i) بند اشکال کے رقبہ سے مراد اشکال کے حد خطوط سے بند کیا ہوا علاقہ ہے۔ (د/غ)
 - (ii) مستطیل کا وتر اسے دو متماثل مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔ (د/غ)
 - (iii) متماثل اشکال رقبہ میں برابر نہیں ہوتیں۔ (د/غ)
 - (iv) متوازی الاضلاع کا رقبہ قاعدہ اور اونچائی کے ضرب کے برابر ہے۔ (د/غ)
 - (v) مثلث کے وسطیہ سے مراد اس سے بالمقابل ضلع (قاعدہ) کے عمود ہے۔ (د/غ)
 - (vi) دو متوازی خطوط کے درمیان عمودی فاصلہ کبھی مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ (د/غ)
 - (vii) راس سے کھینچا ہوا ارتفاع ہمیشہ بالمقابل ضلع کو کاٹتا ہے۔ (د/غ)
 - (viii) دو مثلثیں رقبہ میں برابر ہوں گی اگر ان کے قاعدے اور ارتفاع ایک جیسے ہوں۔ (د/غ)
2. درست جواب پر (✓) لگائیں۔

- (i) اگر دو خط کے درمیان عمودی فاصلہ برابر ہو تو خط _____ ہوں گی۔
 - (ا) ایک دوسرے کے عمود پر
 - (ب) ایک دوسرے کے متوازی
 - (ج) ایک دوسرے کو کاٹتی۔
 - (د) ان میں سے کوئی نہیں
- (ii) اگر دو مثلثیں رقبہ میں برابر ہیں تو وہ _____ طور پر متماثل ہوں گی۔
 - (ا) غیر لازمی
 - (ب) لازمی
 - (ج) یقیناً
 - (د) ان میں سے کوئی نہیں
- (iii) مثلث کا بالمقابل راس سے ضلع کے عمود پر ہو کہلاتا ہے _____
 - (ا) وسطیہ
 - (ب) عمودی ناصف
 - (ج) ارتفاع
 - (د) زاویوں کے ناصف
- (iv) متوازی الاضلاع جس کے قاعدے اور ارتفاع ایک جیسے ہوں ہوتا ہے _____
 - (ا) متماثل
 - (ب) رقبہ میں برابر
 - (ج) مساوی
 - (د) یہ تمام



- (v) دو متوازی الاضلاع قاعدے میں برابر ہیں ان کا رقبہ برابر ہوگا اگر _____
 (ا) ان کے ارتفاع برابر ہوں (ب) ان کے ارتفاع ایک جیسے ہوں
 (ج) وہ ایک جیسی متوازی خطوط کے درمیان واقع ہوں (د) یہ تمام
 (vi) _____ اور _____ قاعدہ اور ارتفاع میں برابر ہیں تو مثلثیں _____ ہوں گی۔
 (ا) رقبہ میں برابر (ب) متماثل (ج) مساوی (د) ان میں سے کوئی نہیں۔



خلاصہ

- ◆ اس یونٹ میں ہم نے کچھ ضروری ترجیحات کا ذکر کیا، بیان کیا اور درج ذیل نظریات کو ان کے نتائج (اگر کوئی) کے ساتھ ثابت کیا۔
- ◆ ایک ہی قاعدہ پر متوازی الاضلاع اشکال جو قاعدہ خط اور اس کے متوازی کسی خط کے درمیان واقع ہوں (یا ان کے ارتفاع برابر ہوں) وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔
- ◆ برابر قاعدوں پر واقع اور ایک جیسی (یا برابر) ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔
- ◆ ایسی مثلثیں جو ایک قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع ایک جیسے (برابر) ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔
- ◆ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔
- ◆ اشکال کے رقبہ سے مراد بند اشکال کے حد خطوط سے بند کیا ہوا علاقہ ہے۔
- ◆ سی رخی علاقہ سے مراد مثلث اور اس کے اندرونی حصے کا اتحاد ہے۔
- ◆ مثلث کے رقبہ سے مراد سی رخی علاقہ (triangular region) کا رقبہ ہے۔
- ◆ مثلث کے ارتفاع اور اونچائی سے مراد قاعدہ کا اس کے متقابل راس سے عمودی فاصلہ ہے۔



مثالث کے اضلاع کا عکس / تخمینہ

15

یونٹ

PROJECTION OF A SIDE OF A TRIANGLE

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکنے کے اہم وسیع ترماصل / نتائج (SLOs)

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- زاویہ منفرجہ مثالث (obtuse angled triangle) میں، زاویہ منفرجہ کے بالمقابل اضلاع پر موجود مربع اس اضلاع پر جہاں زاویہ منفرجہ ہو برابر ہوتا ہے مربع کے مجموعہ کے ایک ضلع پر دوبار مستطیل کے ساتھ، اور دوسرے کا اس پر عکس۔
- کسی مثالث میں، حادہ الزاویہ کے بالمقابل اضلاع پر موجود مربع اس اضلاع پر جہاں حادہ الزاویہ ہو برابر ہوتا ہے مربع کے مجموعہ کے ایک ضلع پر دوبار مستطیل کے ساتھ اور دوسرے کا اس پر عکس۔
- کسی مثالث میں، کسی دو اضلاع پر موجود مربع کا مجموعہ تیسری طرف کے آدھے حصے کے دو گنا مربع کے برابر ہوتا ہے اور وسطانیے پر دو گنا مربع ہوتا ہے جو تیسری ضلع کو کاٹتا ہے۔ (اپولو نیس مسئلہ)

15.1 مثلث کے اضلاع کا عکس

متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے درج ذیل نظریات کو ان کے نتائج اور ان کے استعمالات کے ساتھ سمجھیں۔

مسئلہ 15.1.1:

زاویہ منفرجہ مثلث (obtuse angled triangle) میں، زاویہ منفرجہ کے بالمقابل اضلاع پر موجود مربع اس اضلاع پر جہاں زاویہ منفرجہ ہو برابر ہوتا ہے مربع کے مجموعہ کے ایک ضلع پر دوبار مستطیل کے ساتھ، اور دوسرے کا اس پر عکس۔

معلوم: $\triangle ABC$ جس کے راس پر زاویہ منفرجہ ہے۔ A


$$a^2 = b^2 + c^2 + 2cx \quad \text{مطلوب:}$$

عمل: نقطہ CD پر ملنے والے BA پر عمود D کھینچیں،

تو پھر AD پر BA پر AC کا عکس ہے۔



$$m\overline{BC} = a, \quad m\overline{CA} = b \text{ اور } m\overline{AB} = c, \quad m\overline{AD} = x, \quad m\overline{CD} = h$$

ثبوت:



بیانات	دلائل
قائمہ الزاویہ $\triangle CDA$ میں $m\angle CDA = 90^\circ$ تو $(m\overline{AC})^2 = (m\overline{AD})^2 + (m\overline{DC})^2$ $b^2 = x^2 + h^2 \dots (i),$ قائمہ الزاویہ $\triangle CDB$ میں $m\angle CDB = 90^\circ$ تو $(m\overline{BC})^2 = (m\overline{BD})^2 + (m\overline{CD})^2$ $a^2 = (c+x)^2 + h^2$ یا $a^2 = c^2 + 2cx + x^2 + h^2 \dots (ii)$ $a^2 = c^2 + 2cx + b^2$ لہذا $(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD}) + (m\overline{AC})^2$	عمل مسئلہ فیثاغورث سے قیاس سے عمل مسئلہ فیثاغورث سے $m\overline{BD} = m\overline{BA} + m\overline{AD}$ $b^2 = x^2 + h^2$

Q.E.D



مثال: $\triangle ABC$ میں جس کے راس A پر زاویہ منفرجہ ہے، اگر $\overline{CD}$ پر ایک ارتفاع ہے، جو نقطہ D سے ملتا ہے اور


$$m\overline{AC} = m\overline{AB} \quad \overline{BA}$$

$$(m\overline{BC})^2 = 2(m\overline{AB})(m\overline{BD}) \quad \text{پھر}$$

معلوم: ایک $\triangle ABC$ میں، $m\angle A$ منفرجہ ہے، $m\overline{AC} = m\overline{AB}$ اور $\overline{CD}$ پر بنایا ہوا ایک ارتفاع ہے، جو نقطہ D پر ملتا ہے۔

$$(m\overline{BC})^2 = 2(m\overline{AB})(m\overline{BD}) \quad \text{مطلوب:}$$

ثبوت:



دلائل	بیانات
مسئلہ 15.1.1	میں $\triangle ABC$
معلوم ہے کہ $m\overline{AC} = m\overline{AB}$	$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD}) + (m\overline{AC})^2$
$2m\overline{AB}$ و مشترک لیں گے	$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD}) + (m\overline{AB})^2$
$m\overline{BD} = m\overline{AD} + m\overline{AB}$	$(m\overline{BC})^2 = 2(m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$
	$(m\overline{BC})^2 = 2m\overline{AB}(m\overline{AB} + m\overline{AD})$
	$(m\overline{BC})^2 = 2(m\overline{AB})(m\overline{BD})$

Q.E.D



مشق 15.1

1. $\overline{AB}$ کی لمبائی معلوم کریں اور مثلث ABC کا رقبہ معلوم کریں، جب

(i) $m\overline{AC} = 3cm$, $m\overline{BC} = 6cm$ and $m\angle C = 120^\circ$

$$m\overline{CD} = m\overline{BC} \cos (180^\circ - m\angle C)$$

(ii) $m\overline{AC} = 40mm$, $m\overline{BC} = 80mm$ and $m\angle C = 120^\circ$

$$m\overline{CD} = m\overline{BC} \cos (180^\circ - m\angle C)$$


اشارہ: $(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AC})^2 + (m\overline{AB})^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$

2. $m\overline{AC} = 6cm$, $m\overline{AB} = 4\sqrt{2} cm$ اور $m\angle ABC = 135^\circ$ جب $\triangle ABC$ کی لمبائی معلوم کریں
اگر ممکن ہو تو $\triangle ABC$ کا رقبہ معلوم کریں۔

3. $m\overline{AC} = 6\sqrt{2} cm$, $m\overline{AB} = 8 cm$ اور $m\angle ABC = 135^\circ$ جب $\triangle ABC$ کی لمبائی معلوم کریں
اگر ممکن ہو تو $\triangle ABC$ کا رقبہ معلوم کریں۔

مسئلہ 15.1.2:

کسی مثلث میں، حادہ الزاویہ کے بالمقابل اضلاع پر موجود مربع اس اضلاع پر جہاں حادہ الزاویہ ہو برابر ہوتا ہے مربع کے مجموعہ کے ایک ضلع پر دو، ہر مستطیل کے ساتھ اور دوسرے کا اس پر پروجیکشن۔



معلوم: $\triangle ABC$ جس کے راس $\angle CAB$ پر حادہ A ہو۔

$$m\overline{BC} = a, m\overline{AC} = b \text{ and } m\overline{AB} = c$$

عمل: $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ بنائیں تو پھر $\overline{AD}$ پر $\overline{AC}$ on $\overline{AB}$

کا پروجیکشن ہے اور $m\overline{CD} = h$ اور $m\overline{AD} = x$

مطلوب:

$$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AC})^2 + (m\overline{AB})^2 - 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$$

$$\text{i.e. } a^2 = b^2 + c^2 - 2cx$$



ثبوت:

دلائل	بیانات
عمل	قائمہ الزاویہ ΔCDA میں
مسئلہ فیثاغورث سے	$m\angle CDA = 90^\circ$,
قیاس سے	تو $(m\overline{AC})^2 = (m\overline{AD})^2 + (m\overline{CD})^2$
عمل	i.e. $b^2 = x^2 + h^2 \dots (i)$
مسئلہ فیثاغورث سے	قائمہ الزاویہ ΔCDB میں
بناوٹ سے	$m\angle CDB = 90^\circ$
	تو $(m\overline{BC})^2 = (m\overline{BD})^2 + (m\overline{CD})^2$
	i.e. $a^2 = (c-x)^2 + h^2$
	$a^2 = c^2 - 2cx + x^2 + h^2$
	$a^2 = c^2 - 2cx + b^2 \dots (ii)$ یا
	$a^2 = c^2 + b^2 - 2cx$
	لہذا
	$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AC})^2 + (m\overline{AB})^2 - 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$

Q.E.D

اپولو نیس اور اپولو نیس کا مسئلہ

اپولو نیس ایک عظیم ماہر ارضیات اور ماہر فلکیات تھا۔


اب ہم بیان کرتے ہیں اور اس کے ایک معروف مسئلے کو ثابت کرتے ہیں "اپولو نیس مسئلہ"

مسئلہ 15.1.3 (اپولو نیس مسئلہ)

کسی مثلث میں، کسی دو اضلاع پر موجود مربع کا مجموعہ تیسرے ضلع کے آدھے حصے کے دگنا مربع کے برابر ہوتا ہے اور وسطانیے پر دگنا مربع ہوتا ہے جو تیسرے ضلع کو کاٹتا ہے۔ (اپولو نیس مسئلہ)

معلوم: ΔABC میں، وسطانیہ $\overline{AD}$ نقطہ D پر $\overline{BC}$ کو کاٹتا ہے

اس طرح کہ $m\overline{BD} = m\overline{CD}$ ۔



مطلوب:

$$(m\overline{AB})^2 + (m\overline{AC})^2 = 2(m\overline{BD})^2 + 2(m\overline{AD})^2$$


عمل:

کھینچیں۔ $\overline{AF} \perp \overline{BC}$

ثبوت:

بیانات	دلائل
میں $\triangle ADB$ کیونکہ $\angle ADB$ حادث ہے تو، $(m\overline{AB})^2 = (m\overline{BD})^2 + (m\overline{AD})^2 - 2(m\overline{BD})(m\overline{FD}) \dots (i)$ اب $\triangle ADC$ میں ہم $\angle ADC$ نقطہ D پر زاویہ منفرجہ ہے۔ تو $m\overline{AC}^2 = (m\overline{CD})^2 + (m\overline{AD})^2 + 2(m\overline{CD})(m\overline{FD})$ $(m\overline{AC})^2 = (m\overline{BD})^2 + (m\overline{AD})^2 + 2(m\overline{BD})(m\overline{FD}) \dots (ii)$ لہذا $(m\overline{AB})^2 + (m\overline{AC})^2 = 2(m\overline{BD})^2 + 2(m\overline{AD})^2$	$\triangle ADF$ قائمہ الزاویہ مثلث ہے اور قائمہ الزاویہ F پر ہے (عمل) مسئلہ 15.1.2 کے استعمال سے $\angle ADB$ میں ضمیمہ مسئلہ 15.1.1 $m\overline{CD} = m\overline{BD}$ مساوات (i) اور (ii) کو جمع کریں

Q.E.D





مشق 15.2

1. ΔABC میں $m\angle A = 30^\circ$ ثابت کریں۔

$$(m\overline{BC})^2 = (m\overline{AC})^2 + (m\overline{AB})^2 - \sqrt{3}(m\overline{AB})(m\overline{AC})$$

2. ΔABC میں، تخمینہ لگائیں $m\overline{BC}$ جب $m\angle A = 60^\circ$ اور $m\overline{AC} = 5\text{cm}$, $m\overline{AB} = 6\text{cm}$

3. اضلاع 3cm , 4cm اور 5cm والی مثلث حادث ہے، منفرد ہے یا قائمہ الزاویہ ہے۔

4. ΔABC میں اضلاع $m\overline{BC}$ کے وسطانیے کی لمبائی معلوم کریں جبکہ $m\overline{AC} = 3\text{cm}$, $m\overline{AB} = 4\text{cm}$ اور $m\overline{BC} = 6\text{cm}$

اعادہ مشق 15

1. خالی جگہ پُر کریں۔

(i) قائمہ المثلث ΔABC میں $(m\overline{AB})^2 + (m\overline{AC})^2 = \text{_____}$


(ii) ΔABC میں دو اضلاع 4cm کے برابر ہیں یہ _____ مثلث کہلائے گی۔

(iii) ΔABC میں، جب $m\angle B = 90^\circ$ اور $m\angle A = 90^\circ$ پھر $(m\overline{AB})^2 + (m\overline{BC})^2 = \text{_____}$

(iv) 8cm , 15cm اور 17cm کے اضلاع ہیں۔

2. ΔABC میں $m\angle C = 120^\circ$ اور $m\overline{BC} = 6\text{cm}$, $m\overline{AC} = 3\text{cm}$ نکالیں۔


3. ΔABC میں اضلاع $m\overline{BC}$ کے وسطانیے کی لمبائی معلوم کریں جبکہ $m\overline{AC} = 3\text{cm}$, $m\overline{AB} = 4\text{cm}$ اور $m\overline{BC} = 6\text{cm}$





خلاصہ

- ♦ زاویہ منفرجہ مثلث میں، زاویہ منفرجہ کے بالمقابل اضلاع پر موجود مربع اس اضلاع پر جہاں زاویہ منفرجہ ہو برابر ہوتا ہے مربع کے مجموعہ کے ایک ضلع پر دو بار مستطیل کے ساتھ، اور دوسرے کا اس پر عکس۔
- ♦ کسی مثلث میں، حادہ الزاویہ کے بالمقابل اضلاع پر موجود مربع اس اضلاع پر جہاں حادہ الزاویہ ہو برابر ہوتا ہے مربع کے مجموعہ کے ایک ضلع پر دو بار مستطیل کے ساتھ اور دوسرے کا اس پر عکس۔
- ♦ کسی مثلث میں، کسی دو اضلاع پر موجود مربع کا مجموعہ تیسری طرف کے آدھے حصے کے دو گنا مربع کے برابر ہوتا ہے اور اوسطانینے پر دو گنا مربع ہوتا ہے جو تیسری ضلع کو کاٹتا ہے۔ (اپوزیشن مسئلہ)



کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا تعارف / تجزیاتی جیومیٹری

INTRODUCTION TO COORDINATE GEOMETRY / ANALYTICAL

یونٹ میں طلباء کے لیے سیکنے کے اہم وسیع ترماحصل / نتائج

اس یونٹ کی تکمیل کے بعد، طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ

- ◆ کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی وضاحت اور تعریف کر سکیں۔
- ◆ فاصلے کے فارمولا کا ثبوت دے سکیں اور اس کی مدد سے کارٹینیسی مستوی کے دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کر سکے۔
- ◆ فاصلے کے فارمولا کی مدد سے دو نقاط کے درمیان فاصلہ ماپ سکیں۔
- ◆ ہم خط نقاط کی تعریف کر سکیں اور ہم خط اور غیر ہم خط کے درمیان فرق کر سکیں۔
- ◆ فاصلے کا فارمولا استعمال کر کے ثابت کر سکیں کہ تین (یا اس سے زیادہ) معلوم نقاط ہم خط ہیں۔
- ◆ فاصلے کا فارمولا استعمال کر کے ثابت کر سکیں کہ تین معلوم غیر ہم خط نقاط بنا سکتے ہیں۔
- (i) متساوی الاضلاع مثلث (Equilateral Triangle)
- (ii) متساوی الساقین مثلث (Isosceles Triangle)
- (iii) قائمہ الزاویہ مثلث (Right Angled Triangle)
- (iv) الاضلاع مثلث (Scalene Triangle)
- ◆ فاصلے کا فارمولا استعمال کر کے ثابت کر سکیں کہ چار معلوم غیر ہم خط نقاط بنا سکتے ہیں:
- ◆ ایک مربع (A square)
- ◆ ایک مستطیل (A rectangle)
- ◆ ایک متوازی الاضلاع (A Parallelogram)
- ◆ فارمولا کی پہچان کریں جو دو معلوم نقاط کو ملانے والے خط کا درمیانی نقطہ ظاہر کر سکیں۔
- ◆ فاصلہ اور درمیانی نقطہ کا فارمولا لگا کر جیومیٹری سے متعلق مختلف معیاری نتائج کی تصدیق کر سکیں۔

تعارف:

کار تیسویں کو آرڈینیٹ جو سترھویں صدی میں رین ڈسکارٹس (لاطینی نام کارٹیسس) نے ایجاد کیا ریاضی میں یوکلیدین جیومیٹری اور الجبرا کے مابین پہلا منظم ربط فراہم کر کے انقلاب لایا۔ کار تیسویں کو آرڈینیٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے، ہندسی اشکال (جیسے خط اور منحنی خطوط) مساوات کے ذریعے بیان کیے جاسکتے ہیں۔

16.1 فاصلہ کا فارمولا:

16.1.1: کو آرڈینیٹ جیومیٹری کی وضاحت اور تعریف کریں۔

کو آرڈینیٹ جیومیٹری ریاضی کی سب سے اہم اور دلچسپ شاخ ہے۔ خاص طور پر یہ ریاضی کے طلباء کے اسکول میں ملنے کا مرکزی مقام ہے۔ یہ لائنوں اور منحنی خطوط کے گراف کے ذریعے الجبرا اور جیومیٹری کے مابین رابطہ فراہم کرتا ہے۔ کو آرڈینیٹ سسٹم کی مدد سے جیومیٹری کے الجبرا مطالعہ کو کو آرڈینیٹ جیومیٹری / تجزیاتی جیومیٹری کہا جاتا ہے یہ ہندسی مسائل کو الجبرا کے مطابق حل کرنے کے قابل بناتا ہے اور الجبرا میں ہندسی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہ جیومیٹری کا ایک حصہ ہے جس میں نمبروں کے ترتیبی جوڑے طیارے (Plane) پر کسی نقطہ کی پوزیشن کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں:

کو آرڈینیٹ جیومیٹری کا تصور (جسے کار تیسویں جیومیٹری بھی کہا جاتا ہے) اور اس کے فارمولے اور ان کے اخذ کی وضاحت کی جائے۔

16.1.2: فاصلہ کے فارمولا کا ثبوت دیں اور اس کی مدد سے کار تیسویں مستوی کے دو نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔



بیان:

کسی بھی دو نقاط $P_1(x_1, y_1)$ اور $P_2(x_2, y_2)$ کے درمیان فاصلہ $|P_1P_2|$ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور اس کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے:

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

فاصلہ کے فارمولا کا ماخوذ:

فرض کریں $P_1(x_1, y_1)$ اور $P_2(x_2, y_2)$ طیارے (Plane) کے دو نقاط ہیں۔





P_1P_2 اور $\overline{P_1C}$ سے x ایکسز پر عمود $\overline{P_1A}$ کھینچیں اور $\overline{P_2A}$ کھینچیں جو x ایکسز کے متوازی ہے۔

$$|\overline{P_1C}| = |\overline{AB}| = |\overline{OB}| - |\overline{OA}| = |x_2 - x_1|$$

$$|\overline{P_2C}| = |\overline{P_2B}| - |\overline{BC}| = |y_2 - y_1| \text{ اور}$$

قائمہ الزاویہ ΔP_1CP_2 فرض کریں اور مسئلہ فیثاغورث (Pythagoras theorem) لگائیں، ہمارے پاس ہے۔

$$\therefore |\overline{P_1P_2}|^2 = |\overline{P_1C}|^2 + |\overline{P_2C}|^2$$

$$\Rightarrow |\overline{P_1P_2}|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$\Rightarrow |\overline{P_1P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

نوٹ: درمیانی نقطہ (origin) کا نقطہ $P(x, y)$ سے فاصلہ ہے: $d = \sqrt{x^2 + y^2}$

16.1.3: فاصلہ کا فارمولا کی مدد سے دو نقاط کے درمیان فاصلہ ماپیں

درج ذیل مثالیں فاصلہ کے فارمولا کے استعمال کو سمجھنے میں مدد دیں گی،

مثال 01: نقاط $P(2, 3)$ اور $Q(-4, 5)$ کے درمیان فاصلہ تلاش کریں۔


حل: فاصلہ کا فارمولا کے استعمال سے $|\overline{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ یہاں

$$(x_1, y_1) = (2, 3), (x_2, y_2) = (-4, 5)$$

$$\therefore |\overline{PQ}| = \sqrt{(-4 - 2)^2 + (5 - 3)^2}$$

$$\Rightarrow |\overline{PQ}| = \sqrt{(-6)^2 + (2)^2} = \sqrt{36 + 4}$$

$$\Rightarrow |\overline{PQ}| = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$



مثال 02: دائرہ جس کا رداس 5 یونٹ ہے درمیانی نقطہ $C(2,3)$ سے کھینچا جاتا ہے اور نقاط $N(-2,-3)$ اور $L(6,6), M(0,-1)$ معلوم ہیں۔ تلاش کریں کہ کون سا نقطہ دائرہ پر موجود نہیں ہے (دلائل دیں)

حل: $(3,2)$ اس دائرے کا درمیانی نقطہ ہے جس کا رداس 5 یونٹ ہے۔ اور $N(-2,-3), M(0,-1), L(6,6)$ تین معلوم نقاط ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ،

ہمیں بالترتیب N اور M اور L کی لمبائی (فاصلہ) معلوم کرنا ہے۔ فاصلہ کے فارمولا کی مدد سے، پھر۔

$$\therefore |CL| = \sqrt{(6-3)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \text{ یونٹ}$$

$$|CM| = \sqrt{(0-3)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \text{ یونٹ}$$

$$|CN| = \sqrt{(-2-3)^2 + (-3-2)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \text{ یونٹ}$$

$$|CL| = 5 \text{ یونٹ دائرے کا رداس}$$

$$|CM| = 3\sqrt{2} < 5 \text{ یونٹ}$$

$$|CN| = 5\sqrt{2} > 5 \text{ یونٹ}$$

تو، M اور N دائرے پر نہیں ہیں۔ $(-2,-3)$

مشق 16.1

1. فاصلہ کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ تلاش کریں۔

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (i) $(-4,5)$ and $(6,6)$ | (ii) $(2,2)$ and $(2,3)$ |
| (iii) $(0,1)$ and $(2,3)$ | (iv) $(0,1)$ and $(2,3)$ |

2. فرض کریں $B(0,b)$ اور $A(a,0)$ ایکسر پر موجود دو نقاط ہیں اور A کے درمیان فاصلہ تلاش کریں، جب

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| (i) $a = -3, b = -4$ | (ii) $a = -9, b = 6$ |
| (iii) $a = 3, b = 4$ | (iv) $a = \sqrt{2}, b = -2\sqrt{2}$ |

3. نقاط $A(0,0), B(4,0)$ اور $C(2,2\sqrt{3})$ سے تشکیل شدہ مثلث کا احاطہ (Perimeter) بنائیں۔



16.2: ہم خط نقاط:

16.2.1: ہم خط نقاط کی تعریف کریں اور ہم خط اور غیر ہم خط نقاط کے درمیان فرق کریں۔

ہم خط نقاط:

ایک ہی خط پر موجود نقاط ہم خط نقاط کہلاتے ہیں



مثلاً:

$$|AC| = |AB| + |BC| \quad \text{A, B اور C ہم خط نقاط ہیں درج ذیل شکل میں:}$$


غیر ہم خط نقاط:

تین یا اس سے زیادہ نقاط غیر ہم خط نقاط کہلاتے ہیں اگر وہ ایک خط پر موجود نہ ہوں۔

درج ذیل شکل میں:



نوٹ: تین غیر ہم خط نقاط مثلث بناتے ہیں چار غیر ہم خط نقاط چوکور بناتے ہیں۔



16.2.2: فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے ثابت کریں کہ تین (یا اس سے زیادہ) معلوم نقاط ہم خط ہیں۔

مثال 01: ثابت کریں کہ نقاط $A(3, -2)$, $B(1, 4)$ اور $C(-3, 16)$ ہم خط نقاط ہیں۔

حل: $A(3, -2)$, $B(1, 4)$ اور $C(-3, 16)$ تین معلوم نقاط ہیں۔

اب ہم فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے $|\overline{AC}|$ اور $|\overline{BC}|$, $|\overline{AB}|$ کا فاصلہ تلاش کریں گے۔

$$\therefore |\overline{AB}| = \sqrt{(1-3)^2 + (4+2)^2} = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \text{ یونٹ}$$

$$|\overline{BC}| = \sqrt{(-3-1)^2 + (16-4)^2} = \sqrt{16+144} = \sqrt{160} = 4\sqrt{10} \text{ یونٹ}$$

$$|\overline{AC}| = \sqrt{(-3-3)^2 + (16+2)^2} = \sqrt{36+324} = \sqrt{360} = 6\sqrt{10} \text{ یونٹ}$$

$$|\overline{AB}| + |\overline{BC}| = 2\sqrt{10} + 4\sqrt{10} = 6\sqrt{10} = |\overline{AC}| = d_3, \text{ یہاں،}$$

اسلئے نقاط A , B اور C ہم خط نقاط ہیں۔ (دکھایا گیا)

مثال 02: فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے ثابت کریں کہ نقاط $A(-2, -3)$, $B(4, 7)$ اور $C(9, -5)$ غیر ہم خط ہیں۔

حل: $A(-2, -3)$, $B(4, 7)$ اور $C(9, -5)$ تین معلوم نقاط ہیں۔

اب فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے $|\overline{AC}|$ اور $|\overline{BC}|$, $|\overline{AB}|$ کا فاصلہ نکالیں۔

$$\therefore |\overline{AB}| = \sqrt{(4+2)^2 + (7+3)^2} = \sqrt{36+100} = \sqrt{136} = 2\sqrt{34} \text{ یونٹ}$$

$$\Rightarrow |\overline{BC}| = \sqrt{(9-4)^2 + (-5-7)^2} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13 \text{ یونٹ}$$

$$\Rightarrow |\overline{AC}| = \sqrt{(9+2)^2 + (-5+3)^2} = \sqrt{121+4} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \text{ یونٹ}$$

$$|\overline{AC}| \neq |\overline{AB}| + |\overline{BC}|, \text{ چونکہ،}$$

لہذا تین معلوم نقاط A , B اور C غیر ہم خط ہیں۔



16.2.3: فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے ثابت کریں کہ تین معلوم غیر ہم خط نقاط بناتے ہیں۔


(i) ایک متساوی الاضلاع مثلث

(ii) ایک متساوی الساقین مثلث

(iii) ایک قائمہ الزاویہ مثلث

(iv) ایک الاضلاع مثلث

مثال 01: ثابت کریں کہ تین نقاط $A(1,1)$, $B(-1,-1)$ اور $C(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ ایک متساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں۔



حل: $A(1,1)$, $B(-1,-1)$ اور $C(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ تین معلوم نقاط ہیں۔

اب فاصلہ کا فارمولا کی مدد سے $|AB|$, $|BC|$ اور $|AC|$ کے اضلاع $\triangle ABC$ کا فاصلہ تلاش کریں۔


$$|AB| = \sqrt{(-1-1)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} \text{ یونٹ}$$

$$|BC| = \sqrt{(-\sqrt{3}+1)^2 + (\sqrt{3}+1)^2} = \sqrt{3-2\sqrt{3}+1+3+2\sqrt{3}+1} = \sqrt{8} \text{ یونٹ}$$


$$\text{اور } |AC| = \sqrt{(-\sqrt{3}-1)^2 + (\sqrt{3}-1)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} \text{ یونٹ}$$

$$\text{چونکہ } |AB| = |BC| = |AC| = 2\sqrt{2} \text{ یونٹ}$$

لہذا یہ ایک متساوی الاضلاع مثلث ہے۔ ABC



مثال 01: ثابت کریں کہ نقاط $A(3, 2)$, $B(9, 10)$ اور $C(1, 16)$ متساوی الساقین مثلث بناتے ہیں۔



حل: فرض کریں کہ نقاط $A(3, 2)$, $B(9, 10)$ اور $C(1, 16)$ معلوم نقاط ہیں فاصلہ کے فارمولا کی مدد سے:

$$|AB| = \sqrt{(9-3)^2 + (10-2)^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10 \text{ یونٹ}$$

$$|AC| = \sqrt{(1-3)^2 + (16-2)^2} = \sqrt{4+196} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \text{ یونٹ}$$

$$|BC| = \sqrt{(1-9)^2 + (16-10)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10 \text{ یونٹ}$$


$$\text{یونٹ } |AB| = |BC| = 10 \text{ چونکہ}$$

دو اضلاع لمبائی میں برابر ہیں۔

لہذا ABC ایک متساوی الساقین مثلث ہیں۔

مثال 03: ثابت کریں کہ $A(2, 1)$, $B(5, 1)$ اور $C(2, 6)$ قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہیں۔

حل: فرض کریں کہ $A(2, 1)$, $B(5, 1)$ اور $C(2, 6)$ کے راس ہیں $\triangle ABC$ ، فاصلہ کا فارمولا کے استعمال سے۔



$$|AB|^2 = (5-2)^2 + (1-1)^2 = 9+0 = 9$$

$$|BC|^2 = (2-5)^2 + (6-1)^2 = 9+25 = 34$$

$$\text{اور } |AC|^2 = (2-2)^2 + (6-1)^2 = 0+25 = 25$$

یہاں

$$|AB|^2 + |AC|^2 = 9+25 = 34$$

$$\Rightarrow |AB|^2 + |AC|^2 = |BC|^2$$


مسئلہ فیثاغورث کی تبدیلی سے معلوم راس قائمہ الزاویہ مثلث بناتے ہیں۔



مثال 04: ثابت کریں کہ نقاط $A(3, 4)$, $B(1, 2)$ اور $C(0, 4)$ اضلاع مثلث بناتے ہیں۔

حل: فرض کریں کہ $A(3, 4)$, $B(1, 2)$ اور $C(0, 4)$ معلوم نقاط ہیں۔

اب، فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے ہر اضلاع کی لمبائی معلوم کریں۔



$$\therefore |AB| = \sqrt{(1-3)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} \text{ یونٹ}$$

$$|BC| = \sqrt{(0-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \text{ یونٹ}$$

$$\text{اور } |AC| = \sqrt{(0-3)^2 + (4-4)^2} = \sqrt{9+0} = \sqrt{9} = 3 \text{ یونٹ}$$

چونکہ، $|AB| \neq |BC| \neq |AC|$ اور نقاط غیر ہم خط ہیں۔

i.e. تینوں اضلاع کی لمبائی برابر نہیں ہے۔

لہذا ABC اضلاع مثلث ہے۔

16.2.4: فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے ثابت کریں کہ چار غیر ہم خط نقاط بناتے ہیں:


(i) ایک متوازی الاضلاع

(ii) ایک مستطیل

(iii) ایک مربع

مثال 01: ثابت کریں کہ $A(-8, -3)$, $B(-2, 6)$, $C(8, 5)$ اور $D(2, -4)$ ایک متوازی الاضلاع کے

مسلل راس ہیں۔



حل: فرض کریں کہ $A(-8, -3)$, $B(-2, 6)$, $C(8, 5)$ اور $D(2, -4)$

ABCD ایک چوکور کے چار مسلل راس ہیں۔

فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے،

ہمارے پاس ہے،

$$|AB| = \sqrt{(-2+8)^2 + (6+3)^2} = \sqrt{36+81} = \sqrt{117} \text{ یونٹ}$$

$$|BC| = \sqrt{(8+2)^2 + (5-6)^2} = \sqrt{100+1} = \sqrt{101} \text{ یونٹ}$$



$$|DC| = \sqrt{(2-8)^2 + (-4-5)^2} = \sqrt{36+81} = \sqrt{117} \text{ یونٹ}$$

$$\text{اور } |AD| = \sqrt{(2+8)^2 + (-4+3)^2} = \sqrt{100+1} = \sqrt{101} \text{ یونٹ}$$

$$\text{اب } |AB| = |CD| = \sqrt{117}$$

$$\text{اور } |BC| = |AD| = \sqrt{101}$$

∴ A, B, C اور D متوازی الاضلاع کے راس ہیں۔

مثال 02: ثابت کریں چار نقاط D(4,7), C(8,5), B(4,-3) اور A(0,-1) ایک مستطیل کے مسلسل راس ہیں۔

ہیں۔

حل: فرض کریں کہ D(4,7), C(8,5), B(4,-3) اور A(0,-1)

ایک چوکور ABCD کے چار مسلسل نقاط ہیں۔
فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے،



$$\text{i.e., } d = |P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \text{ یونٹ}$$

ہمارے پاس ہے،

$$\therefore |AB| = \sqrt{(4-0)^2 + (-3+1)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \text{ یونٹ}$$

$$|BC| = \sqrt{(8-4)^2 + (5+3)^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} \text{ یونٹ}$$

$$|DC| = \sqrt{(4-8)^2 + (7-5)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \text{ یونٹ}$$

$$|AD| = \sqrt{(4-0)^2 + (7+1)^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} \text{ یونٹ}$$

$$|AC| = \sqrt{(8-0)^2 + (5+1)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} \text{ یونٹ}$$


$$|BD| = \sqrt{(4-4)^2 + (7+3)^2} = \sqrt{0+100} = \sqrt{100} \text{ یونٹ}$$

$$\therefore |AB| = |CD| = \sqrt{20}$$

$$|BC| = |AD| = \sqrt{80}$$


$$|AC| = |BD|$$

A, B, C اور D چوکور کے چار نقطے ہیں۔





مثال 03: ثابت کریں کہ چار مسلسل نقاط $A(1,6)$, $B(3,4)$, $C(1,2)$ اور $D(-1,4)$ ایک مربع بناتے ہیں۔



حل: معلوم ہے کہ $A(1,6)$, $B(3,4)$, $C(1,2)$ اور $D(-1,4)$

چونکہ ABCD کے چار مسلسل نقاط ہیں۔

فاصلہ کا فارمولا استعمال کر کے،

$$\therefore |AB| = \sqrt{(3-1)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \quad \text{یونٹ}$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \quad \text{یونٹ}$$

$$|DC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \quad \text{یونٹ}$$

$$\text{اور } |AD| = \sqrt{(-1-1)^2 + (4-6)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \quad \text{یونٹ}$$

$$\text{چونکہ } |AB| = |BC| = |DC| = |AD| = 2\sqrt{2} \quad \text{یونٹ}$$

ابھی وتر AC اور BD کی لمبائی معلوم کریں گے

$$\therefore |AC| = \sqrt{(1-1)^2 + (2-6)^2} = \sqrt{0+16} = 4 \quad \text{یونٹ}$$

$$\text{اور } |BD| = \sqrt{(-1-3)^2 + (4-4)^2} = \sqrt{16+0} = 4 \quad \text{یونٹ}$$

جیسا کہ وتر کی لمبائی برابر ہے تو ABCD ایک مربع ہے




مشق 16.2

1. ثابت کریں کہ نقاط $Q(2, 6)$ and $R(0, 2)$ and $(-3, -4)$ ہم خط ہیں۔
2. ثابت کریں کہ نقاط $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ and $C(0, \sqrt{3})$ غیر ہم خط ہیں۔
3. ثابت کریں کہ $L(0, \sqrt{3})$, $M(-1, 0)$ and $N(1, 0)$ متساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں۔
4. نقاط $A(2, 3)$, $B(8, 11)$ and $C(0, 17)$ متساوی الساقین مثلث بناتے ہیں یا نہیں۔
5. کیا نقاط $A(-1, 2)$, $B(7, 5)$ and $C(2, -6)$ قائمہ الزاویہ مثلث بناتے ہیں
6. اگر نقاط $A(3, 1)$, $B(9, 1)$ and $C(6, k)$ ایک متساوی الاضلاع مثلث بناتے ہیں تو k رقم معلوم کریں۔
7. ثابت کریں کہ نقاط $P(1, 2)$, $Q(3, 4)$ and $R(0, -1)$ ایک الاضلاع مثلث کے راس ہیں۔
8. ثابت کریں کہ نقاط $A(2, 3)$, $B(8, 11)$, $C(0, 17)$ and $D(-6, 9)$ ایک مربع کے راس ہیں۔
9. ثابت کریں کہ کیوں نقاط $A(-2, 0)$, $B(0, -3)$, $C(2, 0)$ and $D(0, 3)$ ایک مربع بناتے ہیں۔
10. ثابت کریں کہ نقاط $A(3, 2)$, $B(4, 1)$, $C(5, 4)$ and $D(6, 3)$ ایک مستطیل کے راس ہیں۔
11. فاصلہ کا فارمولا استعمال کریں اور ثابت کریں کہ نقاط $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(5, 2)$ and $C(2, 2)$ ایک متوازی الاضلاع اشکال کے راس ہیں۔


16.3 درمیانی نقطہ کا فارمولا

16.3.1 فارمولا کی پہچان کریں جو دو معلوم نقاط کو ملانے والے خط کا درمیانی نقطہ ظاہر کر سکے۔



فرض کریں کہ $A(x_1, y_1)$ کے کوئی دو نقاط ہیں اور $B(x_2, y_2)$ کا درمیانی نقطہ ہے، پھر A اور B کا درمیانی نقطہ کہلاتا ہے۔

$$C(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$





مثال 01: نقطہ جو B (3, 4) اور A (2, 1) کو ملاتا ہے اس کا درمیانی نقطہ تلاش کریں۔

حل: A (2, 1) اور B (3, 4) قطعہ خط کے نقاط ہیں۔

درمیانی نقطہ۔۔۔؟

درمیانی نقطہ کا فارمولا استعمال کر کے،

$$\overline{AB} = \left(\frac{2+3}{2}, \frac{1+4}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right) \text{ درمیانی نقطہ}$$

مثال 02: اگر A(2, 1), B(5, 2) اور C(3, 4) کے راس ہیں، تو $\triangle ABC$ اضلاع R اور P, Q کے

بالترتیب درمیانی نقاط $\overline{AC}$, $\overline{AB}$ and $\overline{BC}$ اور $\triangle ABC$ تلاش کریں

حل: درمیانی نقطہ کا فارمولا استعمال کر کے،

$$C(x, y) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right), \text{ ہمارے پاس ہے}$$

$$\therefore \overline{AC} = P = \left(\frac{2+3}{2}, \frac{1+4}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right), \text{ کا درمیانی نقطہ}$$

$$\overline{AB} = Q = \left(\frac{2+5}{2}, \frac{1+2}{2} \right) = \left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2} \right), \text{ کا درمیانی نقطہ}$$

$$\text{اور } \overline{BC} = R = \left(\frac{5+3}{2}, \frac{2+4}{2} \right) = (4, 3), \text{ کا درمیانی نقطہ}$$

لہذا $\triangle ABC$ کے اضلاع کے درمیانی نقاط $\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right)$, $\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2} \right)$ اور $(4, 3)$ ہیں۔

16.4 فاصلہ اور درمیانی نقطہ کا فارمولا لگا کر جیومیٹری سے متعلق مختلف معیاری نتائج کی تصدیق کر سکیں۔

مثال 01: تجرباتی طور پر ثابت کریں کہ دائیں مثلث کے مفہوم کی درمیانی لمبائی مفروضے کی نصف لمبائی ہے۔

حل: فرض کریں ABC ایک مثلث ہے جو B کے قائمہ الزاویہ پر ہے۔ B کو درمیانی نقطہ لیں اور $\overline{BC}$ اور $\overline{BA}$ کو بالترتیب x اور y کے ایکسر لیں۔

فرض کریں $|\overline{BC}| = a$, $|\overline{BA}| = b$ اور B تو C (0, 0) ہے، (a, 0) ہے اور A (0, b) ہے اس لیے M جو $\overline{AC}$

$$\text{کا درمیانی نقطہ ہے } \left(\frac{a+0}{2}, \frac{b+0}{2} \right) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \right)$$



$$\begin{aligned} \text{اب } |\overline{AM}| &= |\overline{CM}| = \frac{1}{2} |\overline{AC}| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{|\overline{AB}|^2 + |\overline{BC}|^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{اور } |\overline{BM}| &= \sqrt{\left(\frac{a}{2} - 0\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - 0\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

اسلئے

$$|\overline{BM}| = \frac{1}{2} |\overline{AC}|$$

لہذا وسطیہ کی لمبائی مفروضے $|\overline{AC}|$ کی نصف لمبائی ہے۔

مثال 02: ثابت کریں کہ کسی بھی چوکور کے اطراف کے درمیانی نقطوں کو جوڑ کر حاصل اشکال متوازی الاضلاع ہے۔

حل:

فرض کریں کہ ABCD ایک چوکور ہے اور H اور G اور F اور E بالترتیب




DA اور CD، BC، AB کے درمیانی نقطہ ہیں

A کو اور یجن (origin) لیں، $\overline{AB}$ ایکسز اور A سے آنے والی خط اور $\overline{AB}$ کے عمود پر واقع کو y ایکسز لیں۔

پھر A ہے اور دوبارہ فرض کریں کہ B ہے (0, 0)، C ہے (a, 0)، D ہے (a-b, d+e)

اب درمیانی نقاط D اور (a+c, e) بالترتیب

اسلئے، فاصلہ کے فارمولا سے $\left(\frac{a}{2}, 0\right), \left(\frac{2a+c}{2}, \frac{e}{2}\right), \left(\frac{2a-b+c}{2}, \frac{d+2e}{2}\right)$ and $\left(\frac{a-b}{2}, \frac{d+e}{2}\right)$





$$|\overline{EF}|^2 = \left(\frac{2a+c}{2} - \frac{a}{2} \right)^2 + \left(\frac{e}{2} - 0 \right)^2 \quad \text{اسی طرح}$$

$$= \left(\frac{a+c}{2} \right)^2 + \left(\frac{e}{2} \right)^2$$

$$(i) \quad = \frac{1}{4} \{ (a+c)^2 + e^2 \}$$

$$|\overline{GH}|^2 = \left(\frac{2a-b+c}{2} - \frac{a-b}{2} \right)^2 + \left(\frac{d+2e}{2} - \frac{d+e}{2} \right)^2$$

$$= \left(\frac{a+c}{2} \right)^2 + \left(\frac{e}{2} \right)^2$$

$$(ii) \quad = \frac{1}{4} \{ (a+c)^2 + e^2 \}$$

(i) اور (ii) سے، ہمارے پاس ہے

$$|\overline{EF}| = |\overline{GH}|$$

$$\text{Similarly, } |\overline{GF}| = |\overline{EH}|$$

کیونکہ متقابل اضلاع برابر ہیں EFGH ایک متوازی الاضلاع۔

مشق 16.3

1. درمیانی نقطہ کا فارمولا استعمال کر کے درج ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیانی نقاط تلاش کریں۔

$$P(-3, -1) \text{ and } Q(5, 2) \quad (ii) \quad A(2, 6) \text{ and } B(-4, 8) \quad (i)$$

$$C(0, 0) \text{ and } D(2\sqrt{3}, 4\sqrt{3}) \quad (iv) \quad L(0, 6) \text{ and } M(-8, 0) \quad (iii)$$


2. دائرے کا درمیانی نقطہ تلاش کریں جس کے قطر کے اختتامی نقاط A(-5, 6) and B(3, -4) ہیں

3. دائرے کا درمیانی نقطہ (3, 4) ہے اور اسے قطر کا ایک اختتامی نقطہ (4, 6) ہے۔ دوسرے اختتامی نقطہ تلاش کریں۔

4. دائرے کا قطر نقاط A(11, 6) and B(-3, 4) کے درمیان ہے۔ دائرے کا درمیانی نقطہ اور رداس تلاش کریں۔

5. ثابت کریں کہ مثلث ایک متساوی الساقین مثلث ہے صرف اور صرف اگر اس کے پاس دو برابر وسطانیے ہوں۔

6. ثابت کریں کہ متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔



اعادہ مشق 16

1. درج ذیل جملوں کو دھیان سے پڑھیں اور درست کی صورت میں 'د' اور غلط کی صورت میں 'غ' پر دائرہ لگائیں۔

(i) R کا درمیانی نقطہ ہے $\overline{PQ}$ اگر R کے درمیانی واقع ہے۔ (د/غ)

(ii) الاضلاع مثلث میں تمام اضلاع برابر ہوتے ہیں۔ (د/غ)

(iii) عمودی خطوط 135 کے زاویہ پر ملتی ہیں۔ (د/غ)

(iv) ہم خط نقاط مثلث بنا سکتے ہیں۔ (د/غ)

(v) غیر ہم خط نقاط مثلث بنا سکتے ہیں۔ (د/غ)

(vi) متساوی الساقین مثلث میں دو اضلاع کے زاویے برابر ہوتے ہیں۔ (د/غ)

(vii) y ایکسز پر موجود تمام نقاط ہم خط ہوتے ہیں۔ (د/غ)

(viii) x ایکسز اور y ایکسز کے کاٹنے کا مقام $(0,0)$ ہے (د/غ)

(ix) اور جن (origin) سے $(6,0)$ کا فاصلہ 36 یونٹ ہے۔ (د/غ)

2. خالی جگہ پُر کریں۔

(i) اگر $A(x_1, y_1)$ and $B(x_2, y_2)$ کسی خط کے دو نقاط ہیں تو $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$

(ii) ہم خط نقاط ایک جیسی پر ہوتے ہیں۔ $\underline{\hspace{2cm}}$

(iii) چوتھے کوآرڈینٹ میں $x > 0$ and $y > 0$ $\underline{\hspace{2cm}}$

3. درست جواب پر (✓) لگائیں۔

(i) دو عمودی خطوط زاویہ پر ملتی ہیں:


45 (ا) 60 (ب) 90 (ج) 180 (د)

(ii) $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ کہلاتا ہے۔

(ا) درمیانی نقطہ فارمولا (ب) فاصلہ کا فارمولا (ج) تقسیم کا فارمولا (د) تناسب کا فارمولا

(iii) $A(3, 0)$ and $B(0, 3)$ پلین میں کوئی سے دو نقاط ہیں تو $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$

6 (ا) $6\sqrt{2}$ یونٹ (ب) $3\sqrt{2}$ یونٹ (ج) $3\sqrt{2}$ یونٹ (د) $3\sqrt{2}$ یونٹ






- (iv) زاویوں کے تمام تین اندرونی ناصف کا نقطہ قطع کہلاتا ہے:
- (i) سینٹر وید (centroid) (ب) اندرونی مرکز (incentre)
- (ج) عمودی مرکز (orthocentre) (د) محاصرہ مرکز (circumcentre)



خلاصہ

- دو نقاط $P_1(x_1, y_1)$ اور $P_2(x_2, y_2)$ ہوں تو $d = |P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ یونٹ کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے۔
- قطعہ خط $\overline{AB}$ کا درمیانی نقطہ ہوتا ہے $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$
- ہم خط نقاط سیدھی لکیر بناتے ہیں۔
- تین نقاط A, B اور C ہم خط نقاط تب ہوں گے جب

$$|\overline{AC}| = |\overline{AB}| + |\overline{BC}|$$
 یا
$$|\overline{AB}| = |\overline{AC}| + |\overline{CB}|$$
 یا
$$|\overline{BC}| = |\overline{BA}| + |\overline{AC}|$$
- تین غیر ہم خط نقاط A, B and C مثلث بناتے ہیں، اگر دو اضلاع کی جمع شدہ لمبائی تیسرے ضلع کی لمبائی سے زیادہ ہے۔
- اگر $|\overline{AB}| = |\overline{BC}| < |\overline{AC}|$ تو نقاط A, B and C سے کوئی مثلث نہیں بن سکتا۔



جواب


مشق 1.1

- ii. غیر ناطق عدد
iv. ناطق عدد
vi. غیر ناطق عدد
viii. غیر ناطق عدد
x. ناطق عدد
xii. ناطق عدد

- ii. غیر مختتم کسر
iv. مختتم کسر
vi. غیر مختتم کسر

- i. ناطق عدد
iii. غیر ناطق عدد
v. غیر ناطق عدد
vii. ناطق عدد
ix. غیر ناطق عدد
xi. غیر ناطق عدد

- i. مختتم کسر
iii. غیر مختتم کسر
v. مختتم کسر



4. ہم ایک اور 2 کے بیچ میں تمام حقیقی اعداد کی فہرست نہیں بنا سکتے۔

5. π ایک غیر ناطق عدد ہے کیونکہ یہ ناختم ہونے والی کسرا عشریہ ہے۔

6. i. غلط ii. درست iii. درست iv. درست v. درست vi. غلط
(i, ii, iii, v) درست جوابات ہیں

مشق 1.2

1. i. خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع
ii. خاصیت تلازم بلحاظ جمع
iii. بائیں ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ جمع
iv. دائیں ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ جمع
v. دائیں ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ تفریق
vi. خاصیت مبادلہ بلحاظ ضرب
vii. خاصیت تلازم بلحاظ ضرب
viii. ضربی معکوس
ix. جمعی معکوس
x. ضربی معکوس
xi. بائیں ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ تفریق
xii. ضربی معکوس

$$i. \frac{\sqrt{2}}{5} + \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\boxed{3}}{\sqrt{6}} + \frac{\sqrt{2}}{\boxed{5}} \quad ii. \frac{7}{10} + \left(\frac{70}{\boxed{10}} + \frac{16}{33} \right) = \frac{7}{\boxed{10}} + \left(\frac{\boxed{70}}{10} + \frac{16}{\boxed{33}} \right)$$

$$iii. \frac{99}{50} \times \frac{50}{99} = \boxed{1} \quad iv. \frac{59}{95} \times \frac{95}{59} = \boxed{1}$$


$$v. (-21) + (\boxed{21}) = 0 \quad vi. \frac{5}{8} \times \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{7} \right) = \left(\frac{\boxed{5}}{8} \times \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{5}{8} \times \frac{\boxed{5}}{7} \right)$$

$$i. 5 < 10 \quad ii. 10 > 5 \quad iii. 6 + 9 \quad .3$$

$$iv. 4 + 8 < 6 + 8 \quad v. 8 + 8 > 6 + 8$$

$$i. 7 \times 12 \quad ii. 5 \times 12 \quad iii. < \quad iv. > \quad .4$$





ضربی معکوس

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{-1}{7}$$

$$\frac{1}{0.3}$$

$$\frac{-5}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{\sqrt{12}}{9}$$

موجود نہیں ہے۔

جہی معکوس

$$-3$$

$$7$$

$$-0.3$$

$$\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{-9}{\sqrt{12}}$$

$$0$$

5.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.


مشق 1.3



1. i. مجذور = 5 ، اشاریہ = 3

ii. مجذور = $\frac{x}{y}$ ، اشاریہ = 4

iii. مجذور = x^2yz ، اشاریہ = 5



2. i. $\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$ ii. $\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{5}{2}}$ iii. $\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{5}{3}}$ iv. $(yz)^{\frac{7}{3}}$ v. $(27)^{\frac{1}{9}}$
vi. $(-64)^{\frac{2}{3}}$ vii. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{m}{3}}$ viii. $(xy)^{\frac{3}{5}}$ ix. $\left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{6}}$


3. i. $\sqrt[7]{(5)^3}$ ii. $\sqrt[3]{\frac{a}{b^2}}$ iii. $\sqrt[7]{\left(\frac{5}{7}\right)^{15}}$ iv. $\sqrt{\left(\frac{a}{b}\right)^m}$ v. $\sqrt[5]{\left(\frac{11}{13}\right)\left(\frac{12}{13}\right)}$

مشق 1.4

1. i. 27 ii. 20 iii. $(a+b)(c+d)$
2. i. $\left(\frac{1}{3}\right)^9$ ii. $\left(\frac{3}{4}\right)^7$ iii. $\left(\frac{4}{5}\right)^8$ iv. $-3^3 \times 5^6$ v. $3^3 \times 4^6$
vi. $\frac{a^9}{b^9 c^9}$ vii. $\frac{c^{10}}{d^{10}}$ viii. $m^6 n^5 t^{11}$ ix. $a^9 b^6 c^8$
3. i. 5^6 ii. $x^{15} y^{15}$ iii. $(4)^{10}$ iv. $-3^9 \times 4^6$ v. $\frac{b^6}{5^3}$
vi. $\frac{4^6}{9^6}$ vii. z^{24} viii. m^{100} ix. $-(0.1)^{18}$

مشق 1.5

1. i. $1+2i$ ii. $2+2i$ iii. $3+4i$
iv. $-1+i$ v. $-2+2i$ vi. $-3+4i$




2. i. $\operatorname{Re}(z)=1, \operatorname{Im}(z)=2$ ii. $\operatorname{Re}(z)=4, \operatorname{Im}(z)=9$
 iii. $\operatorname{Re}(z)=-5, \operatorname{Im}(z)=6$ iv. $\operatorname{Re}(z)=-1, \operatorname{Im}(z)=-1$
 v. $\operatorname{Re}(z)=\frac{-3}{4}, \operatorname{Im}(z)=\frac{4}{5}$ vi. $\operatorname{Re}(z)=-1, \operatorname{Im}(z)=2$
3. i. $\bar{z}=3-2i$ ii. $\bar{z}=(4, -9)$ iii. $\bar{z}=(-1, -1)$
 iv. $\bar{z}=1+i$ v. $\bar{z}=\frac{-3}{4}+\frac{4}{5}i$ vi. $\bar{z}=1-3i$
5. i. $x=-5, y=5$ ii. $x=\pm \frac{4}{3}$
 $y=\pm \frac{3}{5}$
 iii. $x=\frac{-27}{5}, y=\pm 11$ iv. $x=\frac{9\sqrt{30}}{\sqrt{5}}, y=\frac{-4}{27}$

مشق 1.6



1. i. $(12, 5)$ ii. $\left(\frac{13}{6}, \frac{13}{6}\right)$ iii. $(5, 21)$
 iv. $\left(0, -\frac{1}{15}\right)$ v. $(5, 0)$ vi. $(0, -41)$
 vii. $\left(\frac{3-6\sqrt{2}}{4}, \frac{3+3\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}\right)$ viii. $\left(\frac{-5}{13}, \frac{-27}{13}\right)$
2. i. $\frac{-1}{2}+\frac{1}{2}i$ ii. -4
 iii. $-\frac{i}{2}$ iv. 16



اعادہ مشق 1

1. i. $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ii. حقیقی اعداد کا سیٹ iii. 0
 iv. 7 v. 0 vi. غیر ناطق عدد
 vii. ناطق اعداد viii. $-3-5i$ ix. 2
 x. $(ac-bd, ab+bc)$

2. i. درست ii. درست iii. درست iv. درست v. درست

3. i. a ii. b iii. c iv. b

مشق 2.1

1. i. 9.7×10^3 ii. 4.98×10^6 iii. 9.6×10^7 iv. 4.169×10^3
 v. 8.4×10^4 vi. 7.18×10^{-1} vii. 6.43×10^{-3} viii. 7.4×10^{-3}
 ix. 2.1005×10^{-1}
2. i. 70000 ii. 0.0000000008072 iii. 6018000 iv. 786500000
 v. 0.000205 vi. 72500000000 vii. 4502000 viii. 0.00000002865
 ix. 3056000

مشق 2.2

1. i. $\log_7 343 = 3$ ii. $\log_3 \frac{1}{81} = -4$ iii. $\log_{10}(0.001) = -3$
 iv. $\log_8(2) = \frac{1}{3}$
2. i. $(27)^{\frac{4}{3}} = 81$ ii. $(2)^{-3} = \frac{1}{8}$ iii. $10^0 = 1$ iv. $(10)^{-2} = 0.01$
3. i. $x = 4\sqrt{2}$ ii. $a = 9$ iii. $y = 4$ iv. $x = 8$
 v. $y = 2$ vi. $a = 4$ vii. $a > 0$ یا a کوئی بھی مثبت حقیقی عدد ہے۔
 viii. $y = 1$ ix. $x = 1$

مشق 2.3

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. i. خاصه : 0
منشیه : 0.9031 | ii. خاصه : 3
منشیه : 0.7036 | iii. خاصه : 0
منشیه : 0.9997 |
| iv. خاصه : 2
منشیه : 0.8839 | v. خاصه : -3
منشیه : 0.5172 | vi. خاصه : -5
منشیه : 0.4771 |
| 2. i. 0.9542 | ii. 1.7448 | iii. 1.4711 |
| v. 3.6712 | vi. 5.8808 | iv. 2.6078 |
| 3. i. 0.4926 | ii. 2.4926 | iii. 3.4926 |
| v. 2.4926 | vi. 5.4926 | iv. 3.4926 |

مشق 2.4

- | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 1. i. 3692 | ii. 0.5530 | iii. 2.278 |
| iv. 653800 | v. 0.0002425 | vi. 8.292 |
| 2. i. 2.954242509 | ii. 1.658393026 | iii. 4.563267445 |
| iv. 2.917137753 | v. -2.07007044 | vi. -4.013228266 |
| 3. i. 56.2989 | ii. 4.5803 | iii. 0.024367 |
| iv. 3019.95 | v. 0.0000000991 | vi. 1.8471 |

مشق 2.5

- | | |
|--|--|
| 1. i. $3\log_a x + \log_a y - 2\log_a z$ | ii. $\frac{1}{2}\log_a x + \log_a y + \frac{1}{2}\log_a z$ |
| iii. $\frac{-7}{12}\log_a(x) - \log_a y$ | iv. $-\frac{2}{3}\log_a x + \frac{3}{2}\log_a y - \frac{2}{3}\log_a z$ |
| 2. i. $\log_a(2\sqrt{2})$ | ii. $\log_a(x^2 - 1)$ |
| iii. $\log \frac{(x+1)^2}{x(x-1)}$ | |

3. i. 1.1761 ii. 1.8062 iii. 0.5 iv. 1.6812
v. 0.6276 vi. 1.4771 vii. 0.4260 viii. 0.4604

مشق 2.6

1. i. 253.688 ii. 6750 iii. 48.2176 iv. $x = 930.80$
v. 15.20 vi. 1.2585 vii. 410130 viii. 1.84077×10^{13}
2. i. 8 ii. 22 iii. 15 iv. 14 v. 29

اعاده مشق 2

1. i. غلط ii. غلط iii. درست iv. غلط v. درست
2. i. مشترک لوگر تھم ii. 0 iii. منشیہ
iv. 9 v. $\log_a n$ vi. $a^x = y$
vii. $\log_a y = 10$ viii. 1 ix. $\log_a m - \log_a n$
x. 2 xi. 0 xii. -5
3. i. d ii. b iii. b iv. b v. a
vi. c vii. c viii. b ix. b

مشق 3.1

1. i. کثیر رقی ii. کثیر رقی نہیں iii. کثیر رقی
iv. کثیر رقی نہیں v. کثیر رقی نہیں vi. کثیر رقی نہیں
2. i. ناطق ii. غیر ناطق iii. ناطق
iv. غیر ناطق v. ناطق vi. غیر ناطق
3. i. $p - 10$ ii. $\frac{a}{a+b}$ iii. $\frac{a}{2(a+b)}$
iv. $x + y - z$ v. $\frac{3m(m+5)}{2}$ vi. $\frac{x-3}{x-2}$



4. i. $\frac{4x^2-1}{x^2-1}$

iv. $\frac{-15}{(x+3)(x+6)}$

ii. $\frac{3x+7}{(x+2)(x+3)}$

v. $\frac{-2b}{a^2-b^2}$

iii. $\frac{2x^2y^2+xy+1}{(xy+1)(xy-1)}$

vi. $\frac{-(y-1)}{y+1}$

5. i. $\frac{8y^3}{(2y-x)^2(2y+x)}$

iv. $\frac{5}{3}$

ii. $-\frac{2x+3y}{y}$

v. $\frac{(q-5)(q+3)}{q^2}$

iii. 1

vi. $\frac{8(z-1)}{z-5}$

6. $\frac{2(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$

7. i. $\frac{1}{6}$

iv. $-4\frac{4}{9}$

ii. $9\frac{9}{55}$

v. $1\frac{1}{11}$

iii. $-\frac{17}{73}$

مشق 3.2



1. $a^2+b^2=50, ab=7$

2. $a^2+b^2=17, ab=4$

3. $a^2+b^2+c^2=55$

4. $a^2+b^2+c^2=\frac{5}{9}$

5. $a+b+c=\pm 7$

6. $a+b+c=\pm\sqrt{2.5}$

7. $ab+bc+ca=40$

8. $a^3+b^3=28$

9. $ab=-8$

10. $ab=-4$

11. $a^3-b^3=230$

12. $125x^3+y^3=247$

13. $216a^3-343b^3=12419$

14. $x^3+\frac{1}{x^3}=322$

15. $x^3-\frac{1}{x^3}=1364$



16. i. $\frac{27b^3}{8} + \frac{8}{27b^3}$

ii. $\frac{343y^6}{729} + \frac{729}{343y^6}$

iii. $\frac{x^{12}}{1728} - \frac{1728}{x^{12}}$

iv. $c^6 - \frac{1}{c^6}$

17. i. $8x^6 + 27y^6$

ii. $8x^6 - 27y^6$

iii. $x^{12} - y^{12}$

iv. $256x^8 - 6561y^8$

مشق 3.3

1. i. $\frac{3z}{x^2}$

ii. $4\sqrt[3]{4a^2b^4c^3}$

iii. 2

iv. $36\sqrt{6}$

v. $\frac{25}{32}$

vi. $\frac{14\sqrt{3}}{11}$

vii. 6

viii. 2

2. i. $8 + 4\sqrt{3}$

ii. $6\sqrt{6} - 2\sqrt{3}$

iii. $8\sqrt{12} - \sqrt{8}$

iv. $2 + \sqrt{3}$

3. i. $66\sqrt{2}$

ii. $13\sqrt{5}$

iii. $20 + 9\sqrt{3}$

iv. $15\sqrt{10}$

v. $4\sqrt{5} + 25$

vi. $\sqrt{11}$

vii. 136

viii. $3\sqrt{2}$

ix. $\frac{1}{3}$

x. 2

xi. $134 - 24\sqrt{30}$

xii. $30 + 12\sqrt{6}$

مشق 3.4

1. i. $2 - \sqrt{3}$

ii. $3 - 2\sqrt{2}$

iii. $-\left(\frac{5\sqrt{2} + 4\sqrt{3}}{2}\right)$

iv. $16(2\sqrt{3} - 11)$

v. $\frac{83 - 18\sqrt{2}}{79}$

vi. $\frac{11 + 3\sqrt{3}}{2}$



2. i. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 256$ ii. $x = -\left(\frac{4\sqrt{7} + 11}{9}\right)$

iii. $x + \frac{1}{x} = 6, x - \frac{1}{x} = -4\sqrt{2}, x^2 + \frac{1}{x^2} = 34, x^2 - \frac{1}{x^2} = -24\sqrt{2}, x^4 + \frac{1}{x^4} = 1154$

3. 322

4. 194

5. $112\sqrt{3}$


اعادہ مشق 3


- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 1. i. b | ii. b | iii. a |
| iv. a | v. a | vi. a |
| vii. b | viii. a | ix. a |
| x. a | xi. a | xii. b |

2. i. سب سے زیادہ قوت نما ii. $2 + \sqrt{3}$
- iii. 4 iv. غیر مناطق اظہاریہ
- v. $x^4 + y^4$

مشق 4.1

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. i. $4(x + 4y + 6z)$ | ii. $x^2(1 + 3y + 4y^2z)$ |
| iii. $3pq(r + 2t + s)$ | iv. $9qr(s^2 + t^2)(1 + 2qr)$ |
| v. $\frac{xz^2}{4} \left(\frac{1}{4} - \frac{x}{2} + \frac{xz}{3} \right)$ | vi. $a(x - y)(1 - ab + ab^2)$ |
| 2. i. $(7 + z)(x + z)$ | ii. $3(3ab - 2c)(a + 2b)$ |
| iii. $2(t - 2p)(3 + 2q)$ | iv. $(r + 9s)(r - 7s)$ |








v. $(1-z)\left(\frac{y^2}{4} - \frac{z^2t}{9}\right)$

vi. $\frac{1}{11}(2y+z)(5x-7y)$



3. i. $(2a+3b)^2$

ii. $(6x^2+1)^2$



iii. $\left(x + \frac{1}{2x}\right)^2$

iv. $(9y+8z)^2$

v. $(25+a^2b)^2$

vi. $(a+0.2)^2$



4. i. $(b^2-2c^2)^2$

ii. $\left(\frac{3x^2}{2} - \frac{2}{3x^2}\right)^2$

iii. $2ab^3(a-4b)^2$

iv. $(3p+3q-r^2)^2$

v. $(xy-0.05)^2$

vi. $(a-b-9)^2$



5. i. $(2a-3b)(2a+3b)$

ii. $(4x-5y)(4x+5y)$

iii. $(10xz+y^2)(10xz-y^2)$

iv. $\left(\frac{x^2}{10}+10y^2\right)\left(\frac{x^2}{10}-10y^2\right)$

v. $\left(\frac{8f}{9}-\frac{9g^2}{8}\right)\left(\frac{8f}{9}+\frac{9g^2}{8}\right)$

vi. $\left(\frac{x^2}{11}-11y\right)\left(\frac{x^2}{11}+11y\right)$



6. i. $8xz$

ii. $4(3a-2b)(a-7b)$

iii. $(13x^2-3t-4)(13x^2+3t+4)$

iv. $(13x^2-5y^2)(5x^2-3y^2)$



v. $\left(a + \frac{1}{a} + b - \frac{1}{b}\right)\left(a + \frac{1}{a} - b + \frac{1}{b}\right)$

vi. $\left(3x + \frac{1}{3x} + 2y - \frac{1}{2y}\right)\left(3x + \frac{1}{3x} - 2y + \frac{1}{2y}\right)$




7. i. $(x+y-3z^2)(x+y+3z^2)$

ii. $(2a+2b^2-3c)(2a+2b^2+3c)$

iii. $(4d^2-c^2+d)(4d^2+c^2-d)$

iv. $(2x+2y^2+3y^3)(2x+2y^2-3y^3)$





v. $(x + y - 1)(x - y - 3)$

vi. $(2x + y + 1)(2x - y - 1)$

8. i. $(\sqrt{ab} - \sqrt{c})(\sqrt{ab} + \sqrt{c})$

ii. $(2\sqrt{x} - 3\sqrt{y})(2\sqrt{x} + 3\sqrt{y})$

iii. $\left(\sqrt{yz} - \frac{1}{\sqrt{yz}}\right)\left(\sqrt{yz} + \frac{1}{\sqrt{yz}}\right)$

iv. $\left(\sqrt{xzt} - \frac{1}{\sqrt{t}}\right)\left(\sqrt{xzt} + \frac{1}{\sqrt{t}}\right)$

4.2 مشق



1. i. $(a^2 + x^2 + ax)(a^2 + x^2 - ax)$ ii. $(b^2 - b + 1)(b^2 + b + 1)$

iii. $(a^2 + x^2 - ax)(a^2 + x^2 + ax)(a^4 + x^4 - a^2 x^2)$

iv. $(z^2 + z + 1)(z^2 - z + 1)(z^4 - z^2 + 1)$

2. i. $(x^2 + 2xy + 2y^2)(x^2 - 2xy + 2y^2)$ ii. $9(2x^2z^2 + 2xyz + y^2)(2x^2z^2 - 2xyz + y^2)$

iii. $(2t^2 + 10t + 25)(2t^2 - 10t + 25)$ iv. $(2t^2 + 2t + 1)(2t^2 - 2t + 1)$

3. i. $(x - 2)(x + 5)$

ii. $(ab + 2)(ab - 5)$

iii. $(y - 7)(y + 14)$

iv. $(xyz - 4)(xyz + 6)$

4. i. $(3y + 8z)(3y - z)$

ii. $2(7x + 1)(3x - 1)$

iii. $(2x + 1)(2x + 5)$

iv. $(3x + y)(x - 13y)$

4.3 مشق



1. i. $(x - 2)^2(x - 7)(x + 3)$


ii. $(x^2 + 5x + 3)(x^2 + 5x + 7)$

iii. $(x - 3)(x + 1)(x^2 - 2x + 10)$

iv. $(x^2 - 8x + 1)(x^2 - 8x - 1)$

v. $(x^2 + 9x - 2)(x^2 + 9x + 6)$

vi. $(x - 6)(x + 1)(x^2 - 5x + 16)$



2. i. $(x^2 + 5x - 2)(x^2 + 5x + 12)$ ii. $(x^2 + 7x + 16)(x + 6)(x + 1)$
 iii. $(x - 5x - 5)(x - 5x + 15)$ iv. $(x^2 - 12x + 30)(x - 8)(x - 4)$
 v. $(x^2 - 5x - 10)(x^2 - 5x + 20)$ vi. $(x^2 - 7x + 27)(x^2 - 7x - 5)$
3. i. $(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})(x + 2\sqrt{3})(x - 2\sqrt{3})$
 ii. $(x^2 + 1)(x + \sqrt{14})(x - \sqrt{14})$ iii. $(x + \sqrt{3})^2(x - \sqrt{3})^2$
 iv. $(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})(x + 4\sqrt{2})(x - 4\sqrt{2})$
 v. $(x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5})(x + 2\sqrt{5})(x - 2\sqrt{5})$ vi. $(x + 2\sqrt{3})(x - 2\sqrt{3})(x^2 - 2x - 12)$

4.4 مشق

1. i. $(b + c)^3$ ii. $(2x + y)^3$ iii. $\left(4x + \frac{1}{4}\right)^3$
 iv. $(2x + 3)^3$ v. $\left(\frac{1}{3} + y^2\right)^3$ vi. $\left(\frac{2}{3}x + \frac{3}{2}y\right)^3$
 vii. $\left(\frac{4}{3} + x\right)^3$ viii. $\left(\frac{z}{2} + \frac{y}{3}\right)^3$
2. i. $(d - 2c)^3$ ii. $\left(x^2 - \frac{4}{3}\right)^3$ iii. $\left(\frac{x}{5} - y\right)^3$
 iv. $(5z - y^2)^3$ v. $\left(\frac{z}{3} - 6y\right)^3$ vi. $\left(\frac{b^2}{3} - \frac{c^2}{2}\right)^3$
 vii. $\left(6 - \frac{z}{2}\right)^3$ viii. $\left(\frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y\right)^3$

4.5 مشق

1. i. $(x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2)$ ii. $a^2(a + b)(a^2 - ab + b^2)(a^6 - a^3b^3 + b^6)$
 iii. $(a^2 + 1)(a^4 - a^2 + 1)$ iv. $(ab + 8)(a^2b^2 - 8ab + 64)$



v. $b^3(a+3b)(a^2-3ab+9b^2)$ vi. $\left(\frac{x}{5} + \frac{5}{x}\right)\left(\frac{x^2}{25} - 1 + \frac{25}{x^2}\right)$

vii. $x^3(x^2+y^2z^3)(x^4-x^2y^2z^3+y^4z^6)$

viii. $\left(\frac{x^2}{3} + \frac{2}{x}\right)\left(\frac{x^4}{9} - \frac{2x}{3} + \frac{4}{x^2}\right)$

2. i. $(x-2y)(x^2+2xy+4y^2)$ ii. $(x^3-2y^3)(x^6+2x^3y^3+4y^6)$

iii. $\left(10 - \frac{xy}{5}\right)\left(100 + 2xy + \frac{x^2y^2}{25}\right)$

iv. $(a+b)(a^2-ab+b^2)(a-b)(a^2+ab+b^2)$

v. $\left(\frac{x}{2} + \frac{2}{x^2}\right)\left(\frac{x}{2} - \frac{2}{x^2}\right)\left(\frac{x^4}{4} - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}\right)\left(\frac{x^4}{4} + \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}\right)$

vi. $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4-x^2y^2)(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)$

vii. $\left(\frac{3}{x} - 2y^2\right)\left(\frac{9}{x^2} + \frac{6y^2}{x} + 4y^4\right)$ viii. $\left(2x^2 - \frac{1}{9}\right)\left(4x^4 + \frac{2x^2}{9} + \frac{1}{81}\right)$

مشق 4.6

1. i. $R = -2$ ii. $R = 2$ iii. $R = 18$ iv. $R = -42$ v. $R = -11$

vi. $R = \frac{3}{2}$ vii. $R = -8$ viii. $R = 3y^4$

2. $m = -1$

3. $k = -24$

4. $r = 1, r = -3$

مشق 4.7

1. i. $R = 0, q(x) = x^2 + 1$ ii. $R = -2, q(x) = x^2 - 2x + 1$

iii. $R = -60, q(x) = x^2 - 8x + 27$ iv. $R = 4, q(x) = x^2 + 8x + 5$

v. $R = 29, q(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - 15$ vi. $R = 1, q(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$

vii. $R = -291, q(x) = x^4 - 3x^3 + 10x^2 - 32x + 96$

viii. $R = 174, q(x) = x^4 + 2x^3 + 7x^2 + 18x + 60$

ix. $R = 175, q(x) = 2x^3 + 2x^2 + 104x + 40$



x. $R = -300, q(x) = 6x^3 - 42x^2 + 90x - 114$

2. $k = 24$

3. $m = 4$

4. $m = -24$

5. $m = -1$

مشق 4.8

1. i. $(x-1)(x^2+1)$

ii. $(x+1)^2(x-1)$

iii. $(x-1)(x-2)(x-3)$

iv. $(x+2)(x-2)(x+5)$

v. $(x-2)(x^2+9)$

vi. $(x+1)(2x-1)(3x+2)$

vii. $(x+1)(x+3)(x+4)$

viii. $(x+1)(2x+1)(x+3)$

ix. $(x+2)(x+4)(x+6)$

اعاده مشق 4

1. i. درست

ii. درست

iii. درست

iv. غلط

v. غلط

vi. غلط

2. i. $4x + y^2$

ii. $x^2 + 4xy + 16y^2$

iii. $x + 3$

iv. $2xy$

v. $a^2 - 3ab + 9b^2$

3. i. b

ii. c

iii. d

iv. a

v. b

vi. c

مشق 5.1

1. i. مشترک عاذا عظم = $24x^3y^5z^2$

ii. مشترک عاذا عظم = $6r^3s^3t^3$

iii. مشترک عاذا عظم = $(x+3)$

iv. مشترک عاذا عظم = $(2x-3)$

v. مشترک عاذا عظم = $2(a-2b)$

vi. مشترک عاذا عظم = $(x+1)$

2. i. مشترک عاذا عظم = $(x+1)$

ii. مشترک عاذا عظم = $x^2 + 7x + 12$

iii. مشترک عاذا عظم = $(x-2)$

iv.

3. i. مشترک ذواضعاف اقل = $81a^4b^5c^8$

ii. $600p^5q^4r^8$

iii. $7x(x-1)(3x-2)$

iv. $(x+4)(x+7)(x-3)$

v. $(3x+1)(x-1)(2x+3)$



vi. $(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$

4. i. $(x-20)(x-5)(x+4)$

ii. $(3x+2)(x+4)(2x-1)$

iii. $(x+y+z)(x-y-z)(x-z-x)$

iv. $12x^3(x-4)(x+7)(x-2)$

5. $(x-8)(x-3)^2$

6. x^2+2x-3

7. $9x^4+15x^3-12x-14x^2+8$

9. 6 سینٹی میٹر

10. 11 بج کر 54 منٹ

مشق 5.2



1. i. $\frac{7x+3}{(x+1)^2}$

ii. $\frac{12x^2+29x+16}{3x(2x+1)(x+1)}$

iii. $\frac{-4x^3+x^2+9x-4}{(x+1)^2(x-3)}$

iv. $\frac{2(x^2+3x+3)}{(x+1)(x+2)(x+3)}$

v. $2x+6$

vi. $\frac{x+3}{x+9}$

vii. $\frac{-(x+3)(4x+7)}{(x+1)^2(x+2)}$

viii. $\frac{-2x-7}{(x-2)(x-3)}$

ix. $\frac{x^2-5x-42}{(x^2-9)(x+4)(x+5)}$

x. $\frac{2(x^2+5)}{4x^2+x+2}$

مشق 5.3



1. i. $6x-5y$

ii. $3x+\frac{1}{x}$

iii. $2x^2y^2-\frac{3xy}{z^2}$

iv. $18-12x-4y$

v. $x+\frac{1}{x}+1$

vi. $3(2x-1)(x-3)$

vii. $(x-1)(x-3)$

viii. $(x+3)(x+5)(x+2)$

2. i. x^2+x+1

ii. $5x^2+4x+1$

iii. $2x^2+2x+4$



iv. $\left(\frac{x}{y} + 7 - \frac{y}{x}\right)$

v. $x - 1 + \frac{1}{x}$

vi. $x + \frac{y}{3} + 3z$

vii. $x^2 - 4 + \frac{1}{x^2}$

viii. $x^3 - 2 + \frac{1}{x^3}$

3. 7

4. $-(24x^2 - 9)$

5. $m = 20$

6. $p = -56, q = -49$

اعاده مشق 5

1. i. درست ii. غلط iii. درست iv. غلط v. درست

2. i. ,, ii. $p(x)q(x)$ iii. 1

iv. $(y+1)(y+2)(y+3)$ v. $y + \frac{1}{y}$

3. i. d ii. d iii. b iv. c v. b vi. d
vii. c viii. b ix. b x. c

مشق 6.1

1. i. $x = 20$ ii. $x = -12$ iii. $x = 30$ iv. $x = 40$

v. $y = \frac{1}{15}$ vi. $y = \frac{11}{20}$ vii. $x = \frac{44}{17}$ viii. $x = 105$

ix. $\frac{105}{13}$ x. $x = 1$ xi. $x = -\frac{20}{7}$ xii. $x = 12$

xiii. $x = -\frac{5}{4}$ xiv. $x = -4$ xv. $m = \frac{-11}{6}$

2. $\{5\}$ 3. $x = 7$ 4. بلال = 18 سال
علی = 12 سال


5. i. $\{1\}$ ii. $\{10\}$ iii. $\{100\}$
iv. $\{-12\}$ v. $\{143\}$ vi. $\{ \}$
vii. $\{2\}$ viii. $\{81\}$ ix. $\{80\}$

مشق 6.2


1. i. $\left\{-\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right\}$ ii. $\{1\}$ iii. $\{-42, 42\}$ iv. $\left\{-\frac{25}{2}, \frac{23}{2}\right\}$
 v. $\{3\}$ vi. $\left\{-\frac{78}{5}, \frac{76}{5}\right\}$ vii. $\left\{-\frac{23}{2}, \frac{17}{2}\right\}$ viii. $\{-10, 6\}$
 ix. $\left\{-\frac{19}{14}, -\frac{13}{14}\right\}$ x. $\{-41, 44\}$ xi. $\{\}$ xii. $\{-4, 3\}$

مشق 6.3


1. i. $\{14, 15, 16, \dots\}$



- ii. $\{x / x \in \mathbb{R} \wedge x > 4\}$




- iii. $\{1, 2, 3, 4\}$



- iv. $\{\}$



- v. $\{y / y \in \mathbb{R} \wedge -\frac{19}{2} < y < \frac{3}{2}\}$



2- 4 سے بڑے سب حقیقی اعداد۔


3- علی کو کم سے کم 87 اسکور بونس انعام کے لیے کرنا چاہیے۔

اعادہ مشق 6

1. i. غلط ii. غلط iii. درست iv. درست v. غلط
2. i. $\{0\}$ ii. $\{20\}$ iii. $\{\pm 4\}$
iv. $\{-1\}$ v. $\{y \mid y \in \mathbb{R} \wedge -2 < y < 3\}$
3. i. a ii. a iii. c iv. a v. b vi. c
vii. c viii. c ix. c x. a

مشق 7.1

1. i. x کو آڈینٹ $-2 = y$ کو آڈینٹ 2 ii. x کو آڈینٹ $-1 = y$ کو آڈینٹ 5
iii. x کو آڈینٹ $4 = y$ کو آڈینٹ 0 iv. x کو آڈینٹ $-5 = y$ کو آڈینٹ -6
v. x کو آڈینٹ $3 = y$ کو آڈینٹ 4 vi. x کو آڈینٹ $-\sqrt{8} = y$ کو آڈینٹ $\sqrt{8}$
2. i. -IV ریلج میں ہے۔ ii. -II ریلج میں ہے۔
iii. -IV ریلج میں ہے۔ iv. -III ریلج میں ہے۔
v. -I ریلج میں ہے۔ vi. -I ریلج میں ہے۔
3. i.




A coordinate plane with x and y axes ranging from -6 to 6. Four points are plotted: $(-3, 3)$, $(0, 2)$, $(2, 0)$, and $(3, -3)$. Each point is labeled with its coordinates.


A coordinate plane with x and y axes ranging from -6 to 6. Five points are plotted: $(-6, 5)$ in blue, $(0, 0)$ as a black dot, $(-3, -3)$ as a black dot, $(-4, -3)$ in blue, and $(5, -6)$ in blue. Each point is labeled with its coordinates.




4.




5.







6.



7.



8.

9. i. $y = 2 - x$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	5	4	3	2	1	0	-1

ii. $y = 2x - 6$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0

iii. $x = 12 - 2y$

y	-3	-2	-1	0	1	2	3
x	18	16	14	12	10	8	6


iv. $x = 2y - 3$

y	-3	-2	-1	0	1	2	3
x	-9	-7	-5	-3	-1	1	3

مشق 7.2


1. $y = 6 - x$

y	-3	-2	-1	0	1	2	3
x	9	8	7	6	5	4	3





3. i.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	3	3	3	3	3	3	3



ii.


x	3	3	3	3	3	3	3
y	-3	-2	-1	0	1	2	3







iii.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	0	0	0	0	0	0	0




v.

x	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
y	-3	-2	-1	0	1	2	3



vi.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	6	4	2	0	-2	-4	-6



4. i.

مساوات	x - محددات	y - محددات
$y = \frac{1}{2}x$	0	0
	4	2

ii.


مساوات	x - محددات	y - محددات
$y = \frac{2}{3}x$	1	$\frac{3}{2}$
	1	$\frac{3}{2}$

iii.


مساوات	x - محددات	y - محددات
$2x + 4y = 8$	0	2
	$\frac{7}{2}$	$\frac{1}{4}$

iv.

مساوات	x - محددات	y - محددات
$2x + y = 6$	1	4
	3	0



v.	مساوات	x - محدودات	y - محدودات
	$x - y = 2$	2	0
		1	-1
vi.	مساوات	x - محدودات	y - محدودات
	$x - 3y = 6$	3	-1
		3	-1



6. a. عائشہ نے 100 کلومیٹر سواری کے لئے 5 گھنٹے لیے۔
b. عائشہ نے 60 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے میں طے کیا۔

مشق 7.3

- | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. i. 1.6 کلومیٹر | ii. 4.8 کلومیٹر | iii. 1.2 میل | iv. 4.9 میل یا 5 میل | |
| 2. i. 5 ایکڑ | ii. 12 ایکڑ | iii. 2 ہیکڑ | iv. 6 ہیکڑ | |
| 3. i. 35.6°F | ii. 35.4°F | iii. 0°C | iv. 2.44°C | |
| 4. i. 90° | ii. 156 روپے | iii. 5 ریال | iv. 2.6 ریال | |
| 5. i. $\{3, -2\}$ | ii. $\{3, 1\}$ | iii. $\{3, 1\}$ | iv. $\{4, 7\}$ | v. $\{1, 1\}$ |
| vi. $\{-3, -4\}$ | vii. $\{-3, 2\}$ | viii. $\{1, 1\}$ | ix. $\{8, 4\}$ | x. $\{5, 1\}$ |

اعادہ مشق 7

- | | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------|------|-------|--------|
| 1. i. درست | ii. غلط | iii. غلط | iv. غلط | | | |
| 3. i. c | ii. b | iii. a | iv. b | v. c | vi. a | vii. a |

مشق 8.1

1. i. $\{-2, -3\}$ ii. $\left\{\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right\}$ iii. $\{6, 5\}$ iv. $\{2, 0\}$
 v. $\{5, -3\}$ vi. $\left\{\frac{8}{3}, \frac{3}{4}\right\}$ vii. $\{8, 2\}$ viii. $\left\{0, -\frac{8}{3}\right\}$

2. i. $\{-3+2\sqrt{2}, -3-2\sqrt{2}\}$ ii. $\left\{0, -\frac{10}{3}\right\}$ iii. $\left\{\frac{4+\sqrt{13}}{3}, \frac{4-\sqrt{13}}{3}\right\}$
 iv. $\left\{\frac{3}{4}, -\frac{7}{6}\right\}$ v. $\left\{4, -\frac{3}{2}\right\}$ vi. $\left\{\frac{-2+\sqrt{6}}{2}, \frac{-2-\sqrt{6}}{2}\right\}$

3. i. $b = -2$ ii. $-\frac{4}{3}$

مشق 8.2

1. i. $\{5, -3\}$ ii. $\left\{\frac{3}{5}, -\frac{5}{2}\right\}$
 iii. $\left\{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$ iv. $\left\{\frac{1+2\sqrt{7}}{3}, \frac{-1-2\sqrt{7}}{3}\right\}$
 v. $\left\{\frac{2+3i\sqrt{5}}{3}, \frac{2-3i\sqrt{5}}{3}\right\}$ vi. $\left\{\frac{-3+\sqrt{41}}{4}, \frac{-3-\sqrt{41}}{4}\right\}$
 vii. $\left\{\frac{1+i\sqrt{5}}{3}, \frac{1-i\sqrt{5}}{3}\right\}$ viii. $\left\{\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right\}$
 ix. $\left\{\frac{5}{2}, 0\right\}$ x. $\{1, -1\}$
 xi. $\{3\}$ xii. $\{\sqrt{14}, -\sqrt{14}\}$

مشق 8.3

- | | |
|--|--|
| 1. $\{\pm 3, \pm i\}$ | 2. $\{\pm 2, \pm i\}$ |
| 3. $\left\{\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{6}}{3}\right\}$ | 4. $\left\{-\frac{3}{4}, -2\right\}$ |
| 5. $\left\{\pm \frac{\sqrt{6}}{2}i, \pm 2\frac{\sqrt{14}}{7}i\right\}$ | 6. $\{-1, 2\}$ |
| 7. $\{2\}$ | 8. $\{-2, 1\}$ |
| 9. $\{-1\}$ | 10. $\{-2\}$ |
| 11. $\{2, 4\}$ | 12. $\left\{3, -10, \frac{-7 \pm \sqrt{79}}{2}i\right\}$ |
| 13. $\left\{-6, 1, \frac{-5 \pm \sqrt{39}}{2}i\right\}$ | 14. $\left\{0, 1, \frac{1 \pm \sqrt{57}}{2}\right\}$ |

مشق 8.4

- | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 1. $\{4\}$ | 2. $\{6\}$ | 3. $\{1, 3\}$ |
| 4. $\{2\}$ | 5. $\left\{0, \frac{-3}{2}\right\}$ | 6. $\{0, 3\}$ |

اعاده مشق 8

- | | | |
|-------------|---|----------------|
| 1. i. 2 | ii. $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ | iii. قوت نمائی |
| iv. $x = 2$ | v. $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ | |
| 2. i. b | ii. a | iii. c |
| vi. c | vii. b | iv. a |
| | | v. a |
| | | ix. c |
| | | x. a |
| 3. i. غلط | ii. غلط | iii. غلط |
| v. غلط | vi. درست | iv. غلط |
| | | vii. درست |

اعادہ مشق 9


1. 30°
2. i. درست ii. غلط iii. درست iv. غلط v. غلط
3. i. $\overline{DF}$ ii. $\angle RPQ$ iii. مماثل
iv. مساوی الاضلاع v. وتر vi. 90°
4. i. b ii. c iii. b iv. c

اعادہ مشق 10

1. i. مماثل ii. مماثل iii. مماثل iv. ناصف
v. برابر vi. مماثل vii. 360°
2. i. d ii. b iii. d iv. c v. b
vi. b vii. a viii. a

مشق 11.1



3. تین غیر ہم خط نقاط سے صرف اور صرف دائرہ گزر سکتا ہے۔ دائرہ کا مرکزی نقطہ کے ناصف کا تقاطع ان غیر ہم نقاط کو باہم ملانے سے ملتا ہے۔ یہ نقطہ تقاطع کے تین غیر ہم خط سے ہم فاصلہ ہیں۔



اعادہ مشق 11

3. i. درست ii. درست iii. درست
4. i. c ii. c iii. b iv. a




مشق 12.1




اعادہ مشق 12

- | | | | | |
|------------|---------|------------|---------|---------|
| 1. i. درست | ii. غلط | iii. درست | iv. غلط | v. درست |
| 2. i. عمود | | ii. بڑا ہے | | iii. BC |
| 3. i. a | ii. b | | | |


مشق 13.1



3.




4.




6.


i.



ii.




iii.






7.


i.



ii.




iii.





مشق 13.2



1.




2.






8.


i.




ii.



9.




10.






مشق 13.3

1.



2.





اعادہ مشق 13

1. i. وتر ii. مثلث کے ارتضاع iii. وسطانیہ
iv. ہم فاصلہ v. برابر
2. i. c ii. d iii. c iv. b v. a
vi. d vii. c viii. b ix. d

مشق 14.1

3. $\Delta ABCD = 21\sqrt{2} \text{ cm}^2$

اعادہ مشق 14

1. i. درست ii. درست iii. غلط iv. درست v. غلط
vi. غلط vii. غلط viii. درست
2. i. b ii. b iii. c iv. d v. d vi. b



مشق 15.1

1. i. ضلع $\overline{AB} = 3\sqrt{7}cm$, رقبہ $= \frac{9\sqrt{3}}{2}cm^2$
- ii. ضلع $\overline{AB}$ کی لمبائی $= 4\sqrt{7}cm$, رقبہ $= 8\sqrt{3}cm^2$
2. ضلع $\overline{AC}$ کی لمبائی $= \sqrt{116}cm$, رقبہ $= 12cm^2$
3. ضلع $\overline{AC}$ کی لمبائی $= \sqrt{232}cm$, رقبہ $= 24cm^2$

مشق 15.2

2. $m\overline{BC} = 46cm$
4. قائمہ الزاویہ مثلث
5. وسطیہ کی لمبائی $= \sqrt{\frac{7}{2}}cm$

اعادہ مشق 15

1. i. $(m\overline{BC})^2$ ii. مساوی الاضلاع iii. $(m\overline{AC})^2$ iv. مثلث
2. $m\overline{AB} = 8cm$

مشق 16.1

1. i. $\sqrt{101}$ ii. 1 iii. $2\sqrt{2}$ iv. $2\sqrt{2}$
2. i. 5 ii. $\sqrt{117}$ iii. 5 iv. $\sqrt{10}$
3. $P = 12$

مشق 16.2

4. نقطہ A, B اور C مساوی الساقین مثلث بناتے ہیں
5. نقطہ A, B اور C قائمہ الزاویہ مثلث بناتے ہیں
6. $k = 1 \pm 3\sqrt{3}$
9. کیونکہ چوکور کے اضلاع برابر ہوتے ہیں اسلئے یہ نقطے برابر ہیں



مشق 16.3

1. i. $(-1, 7)$ ii. $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ iii. $(-4, 3)$ iv. $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

2. $(-1, 1)$ 3. $B = (2, 2)$ 4. در میانی نقطه $(4, 5)$
رداس $= 5\sqrt{2}$ س-م

اعاده مشق 16

1. i. درست ii. غلط iii. غلط iv. غلط v. درست
vi. درست vii. درست viii. درست ix. غلط

2. i. $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ii. خط iii. $y < 0$

3. i. c ii. a iii. d iv. d