

اس باب کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- ہوائی راستہ (Air passageway) اور پیپھڑوں کے حصوں کے کردار بیان کریں۔
- پسلیوں اور ڈایا فرام (diaphragm) کی حرکات کے لحاظ سے تنفس (breathing) کا عمل بیان کریں۔
- تنفس کے دوران داخل ہونے والی اور خارج ہونے والی ہوا کی ترکیب میں فرق واضح کریں۔
- ریسپریٹری سسٹم کی بیماریوں جیسے برونکائٹس (bronchitis)، ایملفیرما (emphysema)، نمونیا (pneumonia)، دمہ (asthma)، اور پیپھڑوں کے سرطان (کینسر) پر مختصر بات کریں۔

انسانی طرزِ سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انسانی طرزِ سوالات

سوال 1: سیلولر سپریشن، گیسوں کے تبادلے اور تنفس میں فرق کریں۔


جواب: سیلولر سپریشن: جاندار سیلولر سپریشن (cellular respiration) کے ذریعے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں سیلز خوراک (گلوکوز) کی آکسائیڈیشن (oxidation) کرتے ہیں اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جانداروں کو آکسیجن اپنے سیلز تک پہنچانے اور سیلز سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایروبک ریسپریشن کے کیا پراڈکٹس ہیں؟

ایروبک ریسپریشن (aerobic respiration) میں، آکسیجن استعمال ہوتی ہے جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی پیدا ہوتے ہیں۔

گیسوں کا تبادلہ (gaseous exchange): گیسوں کا تبادلہ وہ عمل ہے جس میں سانس کے ذریعے اندر لی گئی ہوا (پیپھڑوں میں) میں موجود آکسیجن خون میں چلی جاتی ہے، اور خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالی جانے والی ہوا میں چلی جاتی ہے۔ گیسوں کے تبادلے کے لیے، جانور سانس لیتے ہیں (جسے تنفس کہتے ہیں)۔

تنفس (Breathing): تنفس وہ عمل ہے جس میں جانور ہوا کو اپنے جسم کے اندر لے جاتے اور باہر نکالتے ہیں۔ یہ ہوا سے آکسیجن حاصل کرنے اور اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تنفس اور ریسپریشن ایک کیمیائی عمل ہے جبکہ تنفس ایک طبعی عمل ہے۔ تنفس گیسوں کے تبادلہ میں مدد کرتی ہے۔ بدلے میں گیسوں کا تبادلہ ریسپریشن میں مدد کرتا ہے۔



ریسپریشن، گیسوں کا تبادلہ اور تنفس کے درمیان تعلق

(HUMAN RESPIRATORY SYSTEM) انسان کا ریسپریٹری سسٹم


2.1

سوال 2: انسان میں ہوا کے راستے کے مختلف حصوں پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: ریسپریٹری سسٹم، تنفس اور گیسوں کے تبادلے کا ذمہ دار ہے۔ انسان کا ریسپریٹری سسٹم دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے، یعنی ہوا کا راستہ (air passageway) اور پیچھڑے۔

ہوا کا راستہ (Air Passageway): جب ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے، تو پیچھڑوں تک پہنچنے کے لیے جڑی ہوئی نالیوں (connected tubes) میں سے گزرتی ہے۔ پیچھڑوں میں گیسوں کے تبادلے کے بعد، ہوا ان ہی جڑی ہوئی نالیوں کے ذریعے پیچھڑوں سے نکل کر باہر جاتی ہے۔ ان جڑی ہوئی نالیوں کو مجموعی طور پر ہوا کا راستہ کہتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہے۔

ناسٹلز اور نزل کیوٹی (Nostrils and Nasal cavity): نزل کیوٹی دو باریک حالی جگہوں (cavities) پر مشتمل ہے جو ناسٹلز (نھنوں) اور فیریکس کے درمیان موجود ہیں۔ ناسٹلز کے ذریعے ہوا نزل کیوٹی میں داخل ہوتی ہے۔ نزل کیوٹی میں موجود باریک بال آنے والی ہوا میں موجود گرد کے بڑے ذرات کو پھنسا کر اسے فلٹر (filter) کرتے ہیں۔ نزل کیوٹی کی دیواروں پر موجود میوکس گرد کے چھوٹے ذرات کو پھنسا لیتا ہے۔ میوکس ہوا کو گرم بھی کرتا ہے اور اس کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے قریب برابر رکھتا ہے۔



ہوا کا راستہ اور پیچھڑے

نیزل کیوٹی فیرنکس میں کھلتی ہے۔ فیرنکس کے فرش پر ایک سوراخ گلاٹس (glottis) ہے۔
یہ فیرنکس میں کھلتا ہے۔ ایک پردہ (flap) گلاٹس کی حفاظت کرتا ہے جسے اپی گلاٹس (epiglottis) کہتے ہیں۔ یہ خوراک اور مائع کو ہوا کی نالی (ٹریکیا) اور پیچھڑوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔

سوال: ہوا اور خوراک کے لیے مشترک راستہ کون سا ہے؟
جواب: فیرنکس ایک مشترک راستہ ہے جو خوراک کو پیچھڑوں اور ہوا کو فیرنکس تک جانے دیتا ہے۔

فیرنکس (Larynx):


یہ فیرنکس اور ٹریکیا کے درمیان ایک خانہ ہے۔ اسے آواز پیدا کرنے والا خانہ (voice box) بھی کہتے ہیں۔ فیرنکس کی اندرونی دیواروں کے ساتھ دو ریشہ دار پٹیوں (fibrous bands) کا جوڑا لگا ہوتا ہے۔ ان پٹیوں کو وکل کارڈز (vocal cords) کہتے ہیں۔ وکل کارڈز میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

سوال: آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟

جواب: وکل کارڈز میں ارتعاش اور ہونٹوں، رخسار، زبان اور جڑوں کی حرکات سے مخصوص ساؤنڈ (Sound) پیدا ہوتی ہے، جس سے ہماری بول چال کی آواز (speech) بنتی ہے۔

ٹریکیا اور بروئکائی (Trachea and Bronchi):

ٹریکیا ہوا کی نالی (windpipe) ہے جو تقریباً 12 سنی میٹر لمبی ہے۔ یہ فیرنکس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور دو شاخوں پر ختم ہوتی ہے۔ جنہیں بروئکائی (bronchi) واحد بروئکس کہتے ہیں۔ ہر بروئکس اپنی جانب کے پیچھڑے میں داخل ہوتی ہے۔
ٹریکیا اور بروئکائی کی اندرونی دیواروں پر میوکس اور سیلیا (cilia) ہوتے ہیں۔ میوکس مٹی کے باریک ذرات اور بیکٹیریا کو پکڑتا ہے۔ سیلیا بیرونی ذرات کو میوکس کے ساتھ ہی اوپر فیرنکس کی جانب دھکیلتے ہیں۔ جبکہ بروئکائی کی دیواروں میں پلیٹ (plate) جیسے کارٹیج ہوتے ہیں۔ یہ کارٹیج ٹریکیا اور بروئکائی کو سکڑ جانے (collapse) سے بچاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اندر ہوا موجود نہ بھی ہو۔



بروئکیولز اور ایلوپولاائی (Bronchioles and Alveoli):

پیچھڑوں میں بروئکائی تقسیم در تقسیم ہو کر بہت باریک نالیاں بنا دیتی ہیں جنہیں بروئکیولز کہتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ تقسیم ہوتی رہتی ہیں، ان کی دیواروں میں کارٹیج کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ نتیجہ میں سب سے چھوٹی بروئکیول میں کارٹیج بالکل نہیں ہوتی۔ ہر بروئکیول کا اختتام ایک چھوٹی نالی (duct) میں ہوتا ہے۔ یہ نالی تھیلیوں کے ایک گچھے میں کھلتی ہے۔ ان تھیلیوں کو ایلوپولاائی (واحد: ایلوپولس: alveolus) کہتے ہیں۔ ایلوپولس کی دیواریں بہت باریک ہوتی ہیں۔ اس کے گرد بلڈ کپلر یز لپٹی ہوتی ہیں۔ ہوا جب ایلوپولاائی میں پہنچتی ہے تو اس میں سے آکسیجن خون میں داخل ہو جاتی ہے اور خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اس ہوا میں آ جاتی ہے۔

سوال: سینے کی دیوار کس پر مشتمل ہوتی ہے؟

جواب: سینے کی دیوار پسلیوں (ribs) کے 12 جوڑوں اور ان کے ساتھ لگے انٹر کاسٹل (inter-costal) مسلز پر مشتمل ہوتی ہے۔

سوال 3: بروئکس، ٹریکیا اور ایلوپولاائی کے افعال اور مقامات کو بیان کریں۔
جواب: بروئکس کا مقام: ٹریکیا دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جنہیں بروئکائی کہتے ہیں۔ ہر بروئکس اپنے متعلقہ پیچھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔
افعال: بروئکائی ٹریکیا سے ہوا کو پیچھڑوں تک لے جاتی ہے۔ بروئکائی کی اندرونی دیواروں میں سیلیا اور میوکس موجود ہوتا ہے میوکس باریک گردوغبار کو پھانس لیتا ہے اور سیلیا اسے اوپر فیرنکس کی طرف لے جاتے ہیں۔
بروئکائی ہوا کے بہاؤ کو منظم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔


ٹریکیا کا مقام: ٹریکیا جسے ہوا کی نالی بھی کہتے ہیں ایک لمبی نالی ہے جو ٹریکس سے جڑی ہوتی ہے اور نیچے سینے کے خلا تک جاتی ہے۔
 افعال: ٹریکیا ہوا کو پیپھردوں تک لے جاتی اور واپس لاتی ہے ٹریکیا کی دیواروں میں C شکل کے کارٹیلاج ہوتے ہیں جو اسے سکڑنے سے بچاتے ہیں اور اسے کھلا رکھتے ہیں۔ اس کی اندرونی دیواروں میں سیلیا اور میوکس ہوتا ہے جو گردہ کو پکڑ کر اس کی طرف لے جاتا ہے۔
 ایلویولائی کا مقام: ایلویولائی باریک دیواروں والی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جو پیپھردوں کے اندر بروکھولہ کے آخری کناروں پر موجود ہوتی ہیں۔
 افعال: ایلویولائی گیسوں کے تبادلے کا اہم مقام ہیں۔

جب ہوا ایلویولائی تک پہنچتی ہے تو آکسیجن ہوا سے خون میں داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خون سے نکل کر ایلویولائی میں شامل ہو جاتی ہے۔

سوال 4: پیپھردوں کی ساخت بیان کریں۔

جواب: پیپھرے (The Lungs):


سینے یعنی تھوریکس (thorax) کے خلا میں پیپھردوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے۔ پیپھردوں کے بالائی جانب اور اطراف پر سینے کی دیوار (chest wall) سے



ہوتی ہے۔ جبکہ پیپھردوں کے نیچے ایک موٹی عضلاتی یعنی مسکولر (muscular) ساخت ہے جسے ڈایافراگم (diaphragm) کہتے ہیں۔
 پیپھرے اسفنج جیسے نرم (spongy) اور لچک دار آرگنز ہیں۔ بائیں پیپھرے میں دو لوبز (lobes) ہوتے ہیں جبکہ دایاں پیپھرے میں تین لوبز پر مشتمل ہے۔ پیپھردوں کے گرد ایک دوہری ممبرین ہوتی ہے جسے پلورا (pleura) کہتے ہیں۔ اس کی اندرونی ممبرین پیپھردوں کی سطح سے جڑی ہوتی ہے جبکہ بیرونی ممبرین سینے کی دیوار اور ڈایافراگم کی اندرونی سطح کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ پلورا میں پلورل فلوئڈ (pleural fluid) ہوتا ہے۔ جو پیپھردوں اور سینے کی دیوار کے درمیان رگڑ کم کرتا ہے۔

سوال 5: پیپھردوں میں خون کی گردش کی وضاحت کریں۔

جواب: پیپھردوں میں خون کی گردش (Blood Circulation in Lungs):




پلمونری آرٹری دل سے ڈی آکسیجنیٹڈ (deoxygenated) خون کو پیپھردوں میں لاتی ہے۔ ہر پیپھرے کے اندر پلمونری آرٹری تقسیم ہو کر آرٹریولز (arterioles) بنا دیتی ہے۔ آرٹریولز مزید تقسیم ہوتے ہیں اور ایلویولائی کے گرد کپھریز بنا دیتے ہیں۔ ایلویولائی کے گرد لپٹنے کے بعد، کپھریز مل کر وینیولز (venules) بناتی ہیں۔ وینیولز پلمونری وین بناتی ہیں جو آکسیجنیٹڈ (oxygenated) خون کو واپس دل کی جانب لے جاتی ہے۔

سوال 6: انہیلیشن اور اگزیمیلیشن کے عمل کی وضاحت کریں۔

جواب: انہیلیشن (انسپیریشن) (Inhalation Inspiration)۔

ہوا کو پھیپھڑوں میں لے جانا انہیلیشن کہلاتا ہے۔ اس کے دوران مندرجہ ذیل عوامل ہوتے ہیں: انٹرکوسٹل مسلز (inter-costal muscles) سکڑتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پسلیاں (ribcage) پھیل جاتی ہیں۔ اسی دوران ڈایا فرام بھی سکڑتا ہے اور نیچے ہو جاتا ہے۔ ان دو سکڑاؤ کی وجہ سے سینے کے خلا کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پھیپھڑوں کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور باہر کی ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔



تنفس (a) انہیلیشن؛ (b) اگزیمیلیشن

اگزیمیلیشن (ایکسپیریشن) (Exhalation Expiration):

ہوا کو پھیپھڑوں سے باہر نکالنا اگزیمیلیشن کہلاتا ہے۔ اس کے دوران مندرجہ ذیل عوامل ہوتے ہیں: انٹرکوسٹل مسلز پھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پسلیاں اندر کی طرف دبتی ہیں۔ اسی دوران ڈایا فرام بھی پھیلتا ہے اور اوپر ہو جاتا ہے۔ ان دو حرکات کی وجہ سے سینے کے خلا کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ اس سے سینے کے اندر ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور سینے کی ہوا باہر نکل جاتی ہے۔

سوال 7: انسان میں نارمل حالات اور سخت کام کے دوران تنفس کی رفتار بیان کریں۔

جواب: تنفس کی رفتار (شرح) (The Rate of Breathing):

سوال: ایک دن میں عمل تنفس کے دوران ہمارے جسم سے کتنا پانی ضائع ہوتا ہے؟
جواب: ایک دن میں تنفس سے آدھا لٹر پانی ہمارے جسم سے نکلتا ہے۔ یہ پانی کے دو بخارات ہوتے ہیں جو اہم شیشے پر سانس نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔

انسان میں نارمل حالات یعنی آرام کے وقت سانس لینے (تنفس) کی رفتار 16 سے 20 مرتبہ فی منٹ ہے۔ مشقت یا سخت کام کے دوران مسلز زیادہ رفتار سے سیلولر ریسپریشن کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتی ہے۔ دماغ میں موجود ریسپریریٹری سینٹر خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادہ مقدار کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بڑے مسلز اور ڈایا فرام کو تیز رفتار سے پیغامات بھیجتا ہے۔ ان مسلز کے سکڑنے اور پھیلنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح تنفس کی رفتار 30 سے 40 مرتبہ فی منٹ تک بڑھ جاتی ہے۔

سوال 8: کون سے دوران اندر داخل ہونے والی اور باہر خارج ہونے والی ہوا کا موازنہ کریں۔

جواب:

خصوصیت	اندر داخل ہونے والی ہوا	باہر خارج ہونے والی ہوا
آکسیجن کی مقدار (فیصد)	21	16
ناٹروجن کی مقدار (فیصد)	0.04	4
ناٹروجن کی مقدار (فیصد)	79	79
پانی کے بخارات	قابل تغیر	قریباً جسمانی ٹمپریچر کے برابر
گرو کے ذرات	قابل تغیر	قریباً کوئی نہیں

ریسپیریٹری سسٹم کی بیماریاں (RESPIRATORY DISORDERS)

2.3

سوال 9: برونکائٹس کیا ہے؟ اس کی اقسام، وجوہات علامات اور علاج بیان کریں۔

جواب: برونکائٹس (Bronchitis):

برونکائی یا برونکیولز میں ہونے والی سوزش (انفلمیشن: inflammation) کو برونکائٹس کہتے ہیں۔ برونکائٹس میں برونکیولز کی اندرونی جگہ کم ہو جاتی ہے۔ برونکائٹس ایکیوٹ (acute) یعنی کم عرصہ (دو ہفتے) اور کرائک (chronic) یعنی لمبے عرصہ (سالوں) کا بھی ہو سکتا ہے۔ کرائک برونکائٹس میں برونکائی کی دیواروں میں میوکس پیدا کرنے والے سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس سے برونکائی میں زیادہ میوکس رہتا ہے۔ اس سے تنفس میں آئے اور جانے والی ہوا کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے۔



نارمل برونکس

برونکس میں سوزش

نارمل اور سوزش والے برونکائی

وجوہات: (کھانسی ختم کرنے والی) تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو، اینٹی بائیوٹک (اگر برونکائٹس بیکٹیریا کے انفیکشن سے ہو تو) اینٹی وائرل (anti-viral) ادویات (جب یہ کسی وائرس کے انفیکشن سے ہو) جلن پیدا کرنے والی چیزوں (irritants) مثلاً دھواں اور آلودگی سے بچتا ہے۔

علامات: کھانسی، سانس میں ہلکی خراہٹ، بخار، ہر دی لگنا اور سانس کی تنگی (shortness of breathing)۔

علاج: ادویات (کھانسی ختم کرنے والی) تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو؛ اینٹی بائیوٹک (اگر برونکائٹس بیکٹیریا کے انفیکشن سے ہو تو)؛ اینٹی وائرل (anti-viral) ادویات (جب یہ کسی وائرس کے انفیکشن سے ہو)؛ جلن پیدا کرنے والی چیزوں (irritants) مثلاً دھواں اور آلودگی سے بچنا۔

سوال 10: ایبھی سیما پر نوٹ لکھیں۔


جواب: ایبھی سیما میں ایلیو لائی کی اندرونی دیواریں نرم ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس طرح بہت سی چھوٹی جگہوں کی بجائے ایک بڑی جگہ بن جاتی ہے۔




جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے گیسوں کے تبادلہ کے لیے سطح کم پڑ جاتی ہے۔ اس طرح مریض کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔
وجوہات: ہوا میں موجود سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز کا زیادہ عرصہ تک سامنا مثلاً تمباکو کا دھواں، کیمیکل خوشبوئیں اور دوسرے فضائی پولیوٹنٹس (pollutants)۔

علامات: سانس کی تنگی (shortness of breath)، دیرینہ کھانسی (chronic cough) (میوکس کے ساتھ یا بغیر)، سانس میں خرخراہٹ (wheezing) اور سینے کی جکڑن (chest tightness)۔

علاج: کھانسی کم کرنے والی اور سانس کی تنگی سے آرام کی ادویات کا مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا۔



سوال 11: نمونیا ریسرپیٹری سسٹم کی بیماری ہے تفصیل سے بیان کریں۔
جواب: نمونیا پھیپھڑوں کی ایک سوزش ہے جو ایلیو پولائی میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمونیا ایلیو پولائی میں پس (pus) بھر جاتی ہے۔
وجوہات: بیکٹیریا، وائرس یا فنجائی سے ہونے والے انفیکشن۔
علامات: تیز بخار، سردی لگنا، سانس میں تنگی اور بلغم والی کھانسی کی شکایات۔
علاج: بیکٹیریل نمونیا کا علاج اینٹی بائیوٹکس سے کیا جاتا ہے۔ وائرل اور فنگل نمونیا کے علاج کے لیے اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ بیکٹیریل نمونیا سے بچاؤ کے لیے ویکسینز (vaccines) بھی دستیاب ہوتی ہیں۔




سوال 12: دومہ کی علامات، وجوہات اور علاج لکھیں۔
جواب: دومہ (Asthma): یہ برونکائی میں ایک سوزش (انفلیمیشن) ہے جس میں برونکائی اور برونکیولز کی دیواریں سوج جاتی ہیں اور ان نالیوں میں سکڑاؤ آ جاتا ہے۔
علامات: سانس کی تنگی، خرخراہٹ (سانس لیتے وقت سیٹی کی آواز)، کھانسی اور سینے میں تنگی کے دورے۔

وجوہات: الرجی پیدا کرنے والے عوامل یعنی الرجنز (allergens) مثلاً گرد و غبار کے کیڑے (dust mites)، پولین (pollen)، پھپھوندی (mold)، اور پالتو جانوروں کی خشکی (pet dander)، موسمیاتی تبدیلی خاص طور پر ٹھنڈی ہوا اور آشی عوامل (دومہ یا الرجی کا خاندانی طور پر موجود ہونا)۔
علاج: دومہ کے دورے کے دوران برونکیولز کھولنے والی ادویات یعنی برونکیوڈائلیٹرز (bronchodilators) دی جاتی ہیں۔

سوال 13: پیپھردوں کے کینسر سے کیا مراد ہے؟ اس کی ممکنہ وجوہات، اور علاج کی وضاحت کریں۔

جواب: سرطان یعنی کینسر سے مراد جسم کے کسی حصے میں سبز کی تعداد میں بے قابو اضافہ ہے۔ جب پیپھردوں میں غیر فعلی سبز کے مجموعے میں یا سبز سے اسے پیپھردوں کا کینسر کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والا کینسر ہے۔ وجوہات: کینسر کرنے والے کیمیکلز یعنی کارسینوجنز (carcinogens) مثلاً جو جلنے والے تمباکو میں پائے جاتے ہیں: آئیونائزنگ (ionizing) ریڈیشن اور وائرل انفیکشن پسویہ (passive) سموکنگ یعنی کسی دوسرے کی سموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا سانس کے ذریعہ اندر جانا، بھی پیپھردوں کے کینسر کی ایک وجہ ہے۔ سگریٹ کے جلنے کنارے سے نکلنے والا دھوئیں، اس دھوئیں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو سگریٹ پینے والا باہر نکالتا ہے۔



پیپھردوں کا کینسر

علامات: اس کی عام علامات سانس کی تنگی، کھانسی (جس میں خون کی کھانسی بھی شامل ہے) اور وزن میں کمی ہوتا ہیں۔

سوال: پیپھردوں کے کینسر کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

جواب: پیپھردوں کا کینسر دنیا بھر میں سب سے زیادہ تشخیص ہونے والا کینسر ہے، جو نئے کینسر کیسز کی کل تعداد کا قریباً 12.4% ہے۔ یہ کینسر دنیا میں سالانہ 1.5 ملین سے زیادہ اموات کی وجہ بنتا ہے۔

پاکستان میں پیپھردوں کا کینسر سالانہ نئے کینسر کیسز کی کل تعداد کا قریباً 5.1% ہے۔ ہر سال تقریباً 22,000 پیپھردوں کے کینسر کے نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔

ماخذ: (Source) ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن

علاج: کینسر کے مریض کا علاج ایک یا زیادہ طریقوں سے کیا جاتا ہے جن میں سرجری (surgery)، کیموتھراپی (chemotherapy) اور ریڈیشن تھراپی (radiation therapy) شامل ہیں۔

سوال 14: سموکنگ کے اثرات تفصیل سے لکھیں۔

جواب: سموکنگ کے اثرات (Effects of Smoking):

- سموکرز میں بہت سی جان لیوا بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ سموکنگ سے پیدا ہونے والے بڑے خطرات میں پیپھردوں، گردوں، اورل کیوینی، لیمرکس، چھاتی، مثانہ، ایسوفیگیس، ہنکر یا ز اور معدہ میں کینسر اور دوسری بیماریاں ہیں۔
- تمباکو کے دھوئیں میں 4,000 سے زائد کیمیکلز ہوتے ہیں مثلاً کلوئین اور کاربن مونو آکسائیڈ۔ ان میں سے 69 سے زائد کیمیکلز کارسینوجنز (انسان میں کینسر کرنے والے کیمیکلز) ہیں مثلاً ٹار اور بینزین۔
- کلوئین (nicotine) سگریٹ میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل ہے۔ یہ کئی آدھ گھنٹہ بعد ہی دماغ میں پہنچتا ہے۔ جن میں دماغ بھی شامل ہے۔ یہ آرٹریز کی دیواروں کو بھی سخت کر دیتا ہے اور نتیجہ میں دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔
- کاربن مانو آکسائیڈ (Carbon monoxide) سموکنگ کے دوران تمباکو کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک زہریلی گیس ہے۔ یہ ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور آکسیجن کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔

سوال: نان سموکرز میں دل کی بیماریوں اور پیپھردوں کے کینسر ہونے کی کیا شرح ہے؟

جواب: سموکنگ نہ کرتے والے ایسے لوگوں میں جو دوسروں کی سموکنگ کا دھواں سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں دل کی بیماریوں اور پیپھردوں کے کینسر کے مواقع 30% زیادہ ہوتے ہیں۔

سوال: پاکستان میں بالغ سموکرز کی شرح کیا ہے؟

جواب: پاکستان میں 12% بالغ سموکنگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی تمام اموات میں سے 7.6% اموات سموکنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

• نار (tar) یعنی تارکول سگریٹ میں ٹھوس ذرات کی شکل میں ہوتا سوال: ویپنگ (Vaping) سے کیا مراد ہے؟


• ہے۔ جب سانس کے ذریعے جاتا ہے تو یہ پیپھروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ ویپنگ (Vaping) سے مراد ای۔ سگریٹ (e-cigarette) سے پیدا جاتا ہے۔ یہاں یہ گیسوں کے تبادلہ کے لیے سطح کو کم کر دیتا ہے۔ ہونے والے بخارات کو اندر کھینچنا ہے۔ یہ آلات ایک مائع کو گرم کرتے ہیں جس میں بنزین (benzene) سگریٹ کا اہم جزو ہے۔ یہ ایک کارسینوجن

• ہے اور بلڈ کینسر (لیوکیمیا: leukaemia) کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سگریٹ میں موجود فارمیڈی ہائیڈ (formaldehyde) کینسر اور ریسپیریٹری سسٹم، جلد اور معدے اور آنتوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔

• امونیا (ammonia)، جو کہ ٹوائلٹ کی صفائی میں استعمال ہوتا ہے، تمباکو سے ٹوٹین کو الگ کرتا ہے اور اس سے ایک گیس بنتی ہے۔ یہ گیس جسم کے لیے زہریلی ہوتی ہے۔ سگریٹ میں کئی اور سوزش پیدا کرنے والے (irritants) کیمیکلز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہوا کے راستے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ریسپیریٹری سسٹم کی کئی بیماریوں، بشمول کینسر، کا باعث بنتے ہیں۔

• سوال: ورلڈ نو ٹو باکو ڈے World No Tobacco Day کب منایا جاتا ہے؟ جواب: ہر سال 31 مئی کو تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن یعنی ورلڈ نو ٹو باکو ڈے (World No Tobacco Day) منایا جاتا ہے۔

• سموکنگ سے خون میں کولیسٹرول (cholesterol) کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے اور خون کی نالیاں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ دانتوں پر دانی کی اہم وجہ بھی سموکنگ ہے۔ سموکرز میں سانس میں بدبو آتا عام ہے۔ سموکرز میں سگریٹ نہ پینے والوں کی نسبت دانت گرنے کا عمل 2 سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سموکرز میں (tuberculosis) کا خطرہ 2 سے 4 گنا اور نمونیا کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔



پیپھروں پر سموکنگ کے اثرات

معروضی طرز سوالات

اضافی کثیر الانتخابی سوالات

گنہگار کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

○ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- جاندار کس کے ذریعے انرجی حاصل کرتے ہیں؟

- (a) ٹرانسپائریشن (b) تنفس (c) کیسوں کا جاندار (d) سیلولر ریسپریشن

2- مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک روک ریسپریشن کی پراڈکٹ ہے؟

- (a) آکسیجن (b) گلوکوز
(c) کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی (d) نائٹروجن
3- وہ عمل جس میں سانس کے ذریعے آکسیجن اندر لی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالی جاتی ہے۔
(a) تنفس (b) آکسیڈیشن (c) گیسوں کا تبادلہ (d) تھرمسٹیشن
4- وہ عمل جس کے ذریعے جانور ہوا کو اپنے جسم میں لے جانے اور باہر نکالتے ہیں۔
(a) آکسیڈیشن (b) تنفس (c) گیسوں کا تبادلہ (d) تھرمسٹیشن
5- ریسپریشن کونسا عمل ہے؟
(a) کیمیکل (b) فزیکل (c) مکینیکل (d) بائیو لوجیکل

2.1 انسان کا ریسپریٹری سسٹم (HUMAN RESPIRATORY SYSTEM)

- 6- انسان کا ریسپریٹری سسٹم کن دو حصوں پر مشتمل ہے؟
(a) نزل کیوٹی اور ٹریکیا (b) دل اور پیچھے پھڑے (c) ہوا کا راستہ اور پیچھے پھڑے (d) پٹلیاں اور لیا فرام
7- کاربن ڈائی آکسائیڈ کہاں بنتی ہے؟
(a) ہوا کے راستے میں (b) سیولر ریسپریشن کے دوران (c) پیچھے پھڑوں سے باہر (d) سکیٹل ریڈنگ میں
8- نزل کیوٹی میں موجود باریک بالوں کا کردار ہے۔
(a) ہوا کو فلٹر کرنا (b) سیوس بنانا (c) حفاظت (d) ہوا کو گرم کرنا
9- نزل کیوٹی میں موجود میوکس کا کام ہے۔
(a) ذرات کو پھنسانا (b) ہوا کو فلٹر کرنا (c) ہوا کو گرم کرنا (d) حفاظت
10- اورل کیوٹی کھلتی ہے۔
(a) لیرنکس میں (b) بروئکائی میں (c) ٹریکیا میں (d) فیرنکس میں
11- فیرنکس کے فرش پر ایک سوراخ کھلاتا ہے۔
(a) ٹریکیا (b) گلاس (c) اپی گلاس (d) ویکل کارڈز
12- فیرنکس اور ٹریکیا کے درمیان باکس کھلاتا ہے۔
(a) بروئکائی (b) ایلیو لائی (c) نزل کیوٹی (d) لیرنکس
13- فیرنکس کس کے لیے مشترک راستہ ہے؟
(a) ذائقہ اور بو (b) خوراک اور ہوا (c) بریدنگ اور ریسپریشن (d) خوراک اور پانی
14- ویکل کارڈز میں ہونے والے ارتعاش سے پیدا ہوتا ہے۔
(a) حرارت (b) ٹھنڈک (c) سلائیا (d) آواز
15- ٹریکیا کی لمبائی ہے۔
(a) 10cm (b) 12cm (c) 14cm (d) 16cm
16- ہر بروئکس کس میں داخل ہوتی ہے؟
(a) دل (b) ایلیو لائی (c) فیرنکس (d) بچھڑے

- 17- ٹریکیا اور بروٹکائی کی اندرونی دیواروں پر ہوتا ہے۔
 (a) میوکس (b) سیلیا (c) دونوں (a) اور (b) (d) فلی جیلا
- 18- ٹریکیا کی دیوار میں کارٹیلج کے رنجز ہوتے ہیں۔
 (a) "U" شکل کے (b) "C" شکل کے (c) "N" شکل کے (d) "J" شکل کے
- 19- پھیپھڑوں میں بروٹکائی تقسیم در تقسیم ہو کر بناتی ہیں۔
 (a) ٹریکیا (b) ایلیوپورڈکٹس (c) بروٹکیولز (d) ویکٹر
- 20- ہر بروٹکیول کا اختتام ایک چھوٹی نالی میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں۔
 (a) ایلیوپورڈکٹ (b) پلیورل کیوٹی (c) ڈایا فرام (d) بروٹکس
- 21- ایلیوپورڈکٹس کے آخری سروں پر باریک دیواروں والی تھیلیاں کیا ہوتی ہیں؟
 (a) کپلریز (b) ایلیوپولائی (c) لوہز (d) شاخیں
- 22- ایلیوپولائی کے گرد کونسی ساخت گیسوں کے تبادلے میں مدد کرتی ہے؟
 (a) پسلیوں کے مسلز (b) کارٹیلج (c) بلڈ کپلریز (d) پلیورل فلوئڈ
- 23- چٹ کیوٹی میں پسلیوں کے کتنے جوڑے پائے جاتے ہیں؟
 (a) 8 (b) 12 (c) 16 (d) 20
- 24- ریز مسٹر کہاں سے ہیں۔
 (a) "C" شکل کے کارٹیلج (b) انٹرکوسٹل مسلز (c) سپونجی مسلز (d) ایلاسٹک مسلز
- 25- انسان میں پھیپھڑوں کا جوڑا کہاں پایا جاتا ہے؟
 (a) ایبڈومنل کیوٹی (b) پلیوک کیوٹی (c) تھوریک کیوٹی (d) کریینیل کیوٹی
- 26- سینے کی دیوار پسلیوں کے کتنے جوڑوں سے مل کر بنتی ہے؟
 (a) 10 جوڑے (b) 12 جوڑے (c) 14 جوڑے (d) 24 جوڑے
- 27- پھیپھڑوں کے نیچے ایک مسکولر ساخت کا نام کیا ہے؟
 (a) پلیورا (b) ڈایا فرام (c) ایلیوپلس (d) ٹریکیا
- 28- پھیپھڑے ہوتے ہیں۔
 (a) سخت اور ٹھوس (b) سپونجی اور ایلاسٹک (c) مائع اور سموتھ (d) باریک اور کھوکھلے
- 29- دائیں پھیپھڑے میں کتنے لوہز پائے جاتے ہیں؟
 (a) ایک (b) دو (c) تین (d) چار
- 30- بائیں پھیپھڑے میں کتنے لوہز پائے جاتے ہیں؟
 (a) ایک (b) دو (c) تین (d) چار
- 31- پھیپھڑوں کی ممبرینز کے درمیان پائے جانے والے پلیورل فلوئڈ کا کیا کام ہوتا ہے؟
 (a) آکسیجن لے کر جانا (b) فکشن کو کم کرنا (c) ذرات کو فلٹر کرنا (d) ہوا کو گرم کرنا
- 32- ایلیوپولائی کے گرد موجود کپلریز مل کر بناتی ہیں۔
 (a) آرٹریز (b) وینولز (c) بروٹکیولز (d) پلیورا

33- ایکسجینٹڈ خون واپس کہاں لاتی ہیں؟

- (a) پھیپھڑوں میں (b) گردوں میں (c) معدے میں (d) دل میں

2.2 (THE MECHANISM OF BREATHING) تنفس کا عمل

- 34- ہوا کو پھیپھڑوں میں لانے اور پھر اسے پھیپھڑوں سے باہر نکالنے کے لیے کی جانے والی جسمانی حرکات کو کہتے ہیں۔
(a) ریسپریشن (b) فوٹوسنتھسز (c) ٹرانسپائریشن (d) تنفس
- 35- انہیلیشن کے دوران انٹراکوسٹل مسلز اور ڈایافراگم۔
(a) اوپر کی جانب حرکت کرتے ہیں (b) نیچے کی جانب حرکت کرتے ہیں (c) سکڑتے ہیں (d) پھیلتے ہیں
- 36- انہیلیشن کے دوران سینے کے خلا کا حجم:
(a) کم ہوتا ہے (b) بڑھ جاتا ہے (c) یکساں رہتا ہے (d) کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
- 37- اگزپیریشن کے دوران:
(a) انٹراکوسٹل مسلز پھیلتے ہیں (b) ڈایافراگم پھیلتا ہے (c) سینے کے خلا کا حجم کم ہوتا ہے (d) مذکورہ تمام
- 38- آرام کی حالت میں انسان کے سانس لینے کی رفتار فی منٹ ہے:
(a) 15-16 (b) 20-21 (c) 25-26 (d) 30-35
- 39- مشقت یا سخت کام کے دوران سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے:
(a) 10-15 مرتبہ (b) 20-25 مرتبہ (c) 30-40 مرتبہ (d) 45-55 مرتبہ
- 40- اندر داخل ہونے والی ہوا میں آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے۔
(a) 16% (b) 20% (c) 19% (d) 21%
- 41- باہر خارج ہونے والی ہوا میں آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے۔
(a) 16% (b) 20% (c) 25% (d) 34%
- 42- باہر خارج ہونے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار ہوتی ہے۔
(a) 21% (b) 4% (c) 16% (d) 0.04%
- 43- اندر داخل ہونے والی ہوا اور باہر خارج ہونے والی ہوا میں نائٹروجن کی فیصد مقدار ہوتی ہے۔
(a) 21-4 (b) 79-79 (c) 0.04-21 (d) 0.04-4

2.3 ریسپیریٹری سسٹم کی بیماریاں (RESPIRATORY DISORDERS)

- 44- برونکائی اور برونکیولز میں ہونے والی سوزش کو کہتے ہیں۔
(a) نمونیا (b) ایفمی سیما (c) برونکائٹس (d) دمر
- 45- اکیوٹ برونکائٹس کتنے عرصے تک رہتی ہے؟
(a) ایک ہفتہ (b) دو ہفتے (c) تین ہفتے (d) چار دن
- 46- برونکائٹس کی کس قسم میں میوکس پیدا کرنے والے سیزتھیا میں بڑھتے ہیں؟
(a) اکیوٹ (b) کرائک (c) دونوں (d) کوئی نہیں

- 47- کراکے بروئکس کتنے عرصے تک رہتی ہے؟
 (a) دنوں تک (b) ہفتوں تک (c) مہینوں تک (d) سالوں تک
- 48- ایٹمی سیما متاثر کرتا ہے:
 (a) بروئکائی کو (b) ایلیو یولائی کو (c) پھیپھڑوں کو (d) ہوا کے رستے کو
- 49- نمونیا انفیکشن ہے:
 (a) گردوں کا (b) دل کا (c) پھیپھڑوں کا (d) خون کا
- 50- اگر دونوں پھیپھڑے نمونیا سے متاثر ہوں تو یہ کہلاتا ہے۔
 (a) ٹائیفائیڈ (b) ذہل نمونیا (c) گٹ (d) آر تھرائس
- 51- نمونیا کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟
 (a) بیکٹیریا (b) وائرس (c) فنجائی (d) مذکورہ تمام
- 52- بروئکائی میں ایک سوزش جس میں بروئکائی اور بروئکولائی دیواریں سوج جاتی ہیں اور ان کی نالیوں میں سکڑاؤ آ جاتے ہیں:
 (a) پھیپھڑوں کا کینسر (b) بروئکائس (c) ایٹمی سیما (d) دمہ
- 53- الرجنز ہوتے ہیں۔
 (a) گردوغبار کے کیرے (b) پولنز (c) پالتو جانوروں کی خشکی اور پھیپھوندی (d) مذکورہ تمام
- 54- الرجنز پولیٹیکس، موسمیاتی تبدیلیاں اور راشی عوامل کس کی وجوہات ہیں۔
 (a) پھیپھڑوں کا کینسر (b) دمہ (c) بروئکائس (d) ایٹمی سیما
- 55- جسم کے کسی حصے میں سیلز کی تعداد میں بے قابو اضافہ کہلاتا ہے۔
 (a) دمہ (b) ملیریا (c) نمونیا (d) کینسر
- 56- کارسینوجنز خاص طور پر پائے جاتے ہیں۔
 (a) پرفیوم میں (b) ذرات میں (c) پالتو جانوروں کی خشکی میں (d) تمباکو کے دھوئیں میں
- 57- کسی دوسرے کی سموئنگ سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا سانس کے ذریعے اندر جانا کہلاتا ہے۔
 (a) ایکٹو سموئنگ (b) پسیو سموئنگ (c) کینسر (d) کوئی بھی نہیں
- 58- تمباکو کے دھوئیں میں کیمیکلز ہوتے ہیں۔
 (a) 1000 (b) 2000 (c) 3000 (d) 4000
- 59- 4000 کیمیکلز میں سے تمباکو کے دھوئیں میں کتنے کارسینوجنز ہوتے ہیں؟
 (a) 50 سے زائد (b) 60 سے زائد (c) 40 سے زائد (d) 69 سے زائد
- 60- سگریٹ میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل ہے۔
 (a) کاربن مونو آکسائیڈ (b) کاربن ڈائی آکسائیڈ (c) بینزین (d) نیکوٹین
- 61- سگریٹ میں ٹارکس میں پایا جاتا ہے؟
 (a) ٹھوس (b) مائع (c) گیس (d) پلازمہ
- 62- تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن یعنی ورلڈ نو ٹو بیکوڈ سے کب منایا جاتا ہے؟
 (a) 15 جون (b) 27 مارچ (c) 31 مئی (d) 25 فروری

63- سلاکرڈ مکمل ہاں سوکرڈ کی نسبت دانتوں کے گرنے کا خطرہ کتنے گنا بڑھتا ہے۔

- (a) دو سے تین گنا (b) دو سے چار گنا (c) تین سے چار گنا (d) ایک سے تین گنا

64- سموکنگ سے ٹیوبرکیولوس کا خطرہ بڑھتا ہے۔

- (a) تین گنا (b) چار گنا (c) پانچ گنا (d) دو گنا

اجابات

(d) -1	(c) -2	(c) -3	(b) -4	(a) -5	(c) -6
(b) -7	(a) -8	(c) -9	(d) -10	(b) -11	(d) -12
(b) -13	(d) -14	(b) -15	(d) -16	(c) -17	(b) -18
(c) -19	(b) -20	(b) -21	(c) -22	(b) -23	(b) -24
(c) -25	(b) -26	(b) -27	(b) -28	(c) -29	(b) -30
(b) -31	(b) -32	(d) -33	(d) -34	(c) -35	(b) -36
(d) -37	(b) -38	(c) -39	(d) -40	(a) -41	(b) -42
(b) -43	(c) -44	(d) -45	(b) -46	(d) -47	(b) -48
(c) -49	(b) -50	(d) -51	(d) -52	(d) -53	(b) -54
(d) -55	(d) -56	(b) -57	(d) -58	(d) -59	(d) -60
(a) -61	(c) -62	(a) -63	(d) -64		


اضافی مختصر سوالات

نیکر تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں سب کے لئے مختصر جوابی سوالات

انسان کا ریسپیریٹری سسٹم (HUMAN RESPIRATORY SYSTEM)

2.1

1- ریسپیریشن، گیسوں کے تبادلے اور تنفس میں تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اسکیج بنائیں۔
جواب:



ریسپیریشن، گیسوں کا تبادلہ اور تنفس کے درمیان تعلق

2- انسان کے ریسپریٹری سسٹم کے اہم حصے کون سے ہیں؟

جواب: انسان کا ریسپریٹری سسٹم دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ یعنی ہوا کا راستہ اور پھیپھڑے۔

3- ریسپریٹری سسٹم میں نزل کیوینی کا کیا کردار ہے؟

جواب: نزل کیوینی بالوں اور میوکس کے ذریعے اندر آنے والی ہوا کو فلٹر کرتی ہے۔ یہ ہوا کے درجہ حرارت کو جسم کے درجہ حرارت کے قریباً برابر رکھتا ہے۔

4- گلاٹس اور اپی گلاٹس میں فرق کریں۔

جواب: نزل کیوینی فیرنکس میں کھلتی ہے۔ فیرنکس کے فرش پر ایک سوراخ گلاٹس (glottis) ہے۔ یہ فیرنکس میں کھلتا ہے۔ ایک پردہ (flap) گلاٹس کی حفاظت کرتا ہے جسے اپی گلاٹس (epiglottis) کہتے ہیں۔ یہ خوراک اور مائع کو ہوا کی نالی (ٹریکیا) اور پھیپھڑوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔

5- وائس باکس کیا ہے؟

جواب: اسے آواز پیدا کرنے والا خانہ (voice box) بھی کہتے ہیں۔ فیرنکس کی اندرونی دیواروں کے ساتھ دوریشہ دار پٹیوں (fibrous bands) کا جوڑا لگا ہوتا ہے۔ ان پٹیوں کو وول کارڈز (vocal cords) کہتے ہیں۔ وول کارڈز میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

6- ٹریکیا پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: ٹریکیا ہوا کی نالی ہے جو تقریباً 12 سنی میٹر لمبی ہے۔ یہ فیرنکس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ٹریکیا کی اندرونی دیواروں پر میوکس اور سیلیا ہوتے ہیں۔ ٹریکیا کی دیواروں میں C شکل کے کارٹیلاج ہوتے ہیں۔

7- ٹریکیا کا سٹرکچر برونگائی سے کس طرح مختلف ہوتا ہے؟

جواب: ٹریکیا میں C شکل کے کارٹیلاج ہوتے ہیں اور یہ سنگل میوب ہوتی ہے جبکہ برونگائی کی دیواروں میں پلیٹ جیسے کارٹیلاج ہوتے ہیں اور یہ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر مزید دو میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

8- ٹریکیا کی اندرونی دیواروں میں میوکس کا فنکشن لکھیں۔

جواب: میوکس مٹی کے باریک ذرات اور بیکٹیریا کو پکڑتا ہے۔ سیلیا برونی ذرات کو میوکس کے ساتھ ہی اوپر فیرنکس کی جانب دھکیلتے ہیں۔ جبکہ برونگائی کی دیواروں میں پلیٹ (plate) جیسے کارٹیلاج ہوتے ہیں۔

9- ایلوپولائی پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: ایلوپولائی چھوٹے، باریک دیواروں والی، تھیلی نما سٹرکچر ہیں جو پھیپھڑوں میں برونگیولز کے کناروں پر پائی جاتی ہیں۔ جہاں ہوا اور خون کے مابین آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔

10- آپ پھیپھڑوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

جواب: سینے یعنی تھوریکس (thorax) کے خلا میں پھیپھڑوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے بالائی جانب اور اطراف پر سینے کی دیوار (chest wall) ہوتی ہے۔ جبکہ پھیپھڑوں کے نیچے ایک موٹی عضلاتی یعنی مسکولر (muscular) ساخت ہے جسے ڈایافراگم (diaphragm) کہتے ہیں۔ پھیپھڑے اسفنج جیسے نرم (spongy) اور چمک دار آگنر ہیں۔ باباں پھیپھڑہ ادائیں پھیپھڑے سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ بابائیں پھیپھڑے میں دو حصے (lobes) ہوتے ہیں جبکہ باباں پھیپھڑہ تین لوبز پر مشتمل ہے۔

11- ڈایافراگم کی تعریف کریں۔

جواب: پھیپھڑوں کے نیچے ایک موٹی عضلاتی یعنی مسکولر ساخت ہے جسے ڈایافراگم کہتے ہیں۔

12- پھیپھڑوں کی ممبرین کو کیا کہتے ہیں ہیلو رل فلوئڈ کا فنکشن بھی لکھیں۔

جواب: پھیپھڑوں کے گرد ایک دوہری ممبرین ہوتی ہے جسے پلو رل کہتے ہیں۔

پلو رل فلوئڈ کا کردار پلو رل میں پلو رل فلوئڈ ہوتا ہے جو پھیپھڑوں اور سینے کی دیوار کے درمیان رگڑ کم کرتا ہے۔

13- پھیپھڑوں میں خون کی گردش کیسے ہوتی ہے؟

جواب: پلمونری آرٹری دل سے ڈی آکسیجینیٹڈ (deoxygenated) خون کو پھیپھڑوں میں لاتی ہے۔ ہر پھیپھڑے کے اندر پلمونری آرٹری تقسیم ہو کر آرٹریولز (arterioles) بنادیتی ہے۔ آرٹریولز مزید تقسیم ہوتے ہیں اور ایلیولائی کے گرد کپلر بنادیتے ہیں۔ ایلیولائی کے گرد لپٹنے کے بعد، کپلر یزل کروینیولز (venules) بناتی ہیں۔ وینیولز پلمونری وین بناتی ہیں جو آکسیجینیٹڈ (oxygenated) خون کو واپس دل کی جانب لے جاتی ہے۔

تنفس کا عمل (THE MECHANISM OF BREATHING)

2.2

14- تنفس کے کتنے مراحل ہیں؟

جواب: تنفس کے دو مراحل ہیں۔

(i) انہیلیشن (ii) ایگزہیلیشن

15- انہیلیشن سے کیا مراد ہے؟

جواب: ہوا کو پھیپھڑوں میں لے جانا انہیلیشن کہلاتا ہے۔

16- انہیلیشن کا طریقہ کار بیان کریں۔

جواب: انٹرکوسٹل مسلز (inter-costal muscles) سکڑتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پسلیاں (ribcage) پھیل جاتی ہیں۔ اسی دوران ڈایا فرام بھی سکڑتا ہے اور نیچے ہو جاتا ہے۔ ان دو سکڑاؤ کی وجہ سے سینے کے خلا کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پھیپھڑوں کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور باہر کی ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔

17- ایگزہیلیشن کے دوران تھوریکس کیوٹی میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟

جواب: انٹرکوسٹل مسلز پھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پسلیاں اندر کی طرف دبتی ہیں۔ اسی دوران ڈایا فرام بھی پھیلتا ہے اور اوپر ہو جاتا ہے۔ ان دو حرکات کی وجہ سے سینے کے خلا کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ اس سے سینے کے اندر ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور سینے کی ہوا باہر نکل جاتی ہے۔

18- مشقت یا سخت کام کے دوران سانس لینے کی رفتار بڑھ کیوں جاتی ہے؟

جواب: مشقت یا سخت کام کے دوران مسلز زیادہ رفتار سے سیلولر ریسپریشن کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتی ہے۔ دماغ میں موجود ریسپریریٹری سینٹر خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادہ مقدار کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ریز کے مسلز اور ڈایا فرام کو تیز رفتار سے پیغامات بھیجتا ہے۔ ان مسلز کے سکڑنے اور پھیلنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح، تنفس کی رفتار 30 سے 40 مرتبہ فی منٹ تک بڑھ جاتی ہے۔

19- اندر داخل ہونے والی اور باہر خارج ہونے والی ہوا میں آکسیجن کی فیصد مقدار کیا ہے؟

جواب: اندر داخل ہونے والی ہوا میں آکسیجن کی فیصد مقدار 21 اور باہر خارج ہونے والی ہوا میں 16 ہے۔

20- اندر داخل ہونے والی اور باہر خارج ہونے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی فیصد مقدار کیا ہے؟

جواب: اندر داخل ہونے والی ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی فیصد مقدار 0.04 اور باہر خارج ہونے والی ہوا میں 4 ہے۔

21- اندر داخل ہونے والی اور باہر خارج ہونے والی ہوا میں نائٹروجن کی فیصد مقدار کیا ہے؟

جواب: اندر داخل ہونے والی ہوا میں نائٹروجن کی فیصد مقدار 79 اور باہر خارج ہونے والی ہوا میں 79 ہے۔

22- برونکائٹس سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو اقسام لکھیں۔

جواب: برونکائٹس: برونکائی یا برونکیولز میں ہونے والی سوزش کو برونکائٹس کہتے ہیں۔
برونکائٹس کی اقسام:

(i) اکیوٹ برونکائٹس: یہ دو ہفتوں تک رہتی ہے۔

(ii) کراک برونکائٹس: یہ سالوں تک رہتی ہے۔

23- کراک برونکائٹس کیا ہے؟

جواب: کراک برونکائٹس میں، برونکائی کی دیواروں میں میوکس پیدا کرنے والے سلیز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس سے برونکائی میں زیادہ میوکس رہتا ہے۔ اس سے تنفس میں آنے اور جانے والی ہوا کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے۔

وجوہات: وائرس یا بیکٹیریا سے ہونے والی انفیکشن: سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز (مثلاً تمباکو دھواں)۔

24- ایسٹھی سیما میں کیا ہوتا ہے؟

جواب: ایسٹھی سیما میں ایلیولائی کی اندرونی دیواریں نرم ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس طرح بہت سی چھوٹی جگہوں کی بجائے ایک بڑی جگہ بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے گیسوں کے تبادلہ کے لیے سطح کم پڑ جاتی ہے۔ اس طرح مریض کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔

25- نمونیا پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: نمونیا پھیپھڑوں کی ایک سوزش ہے جو ایلیولائی میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمونیا سے ایلیولائی میں پس (pus) بھر جاتی ہے۔

وجوہات: بیکٹیریا، وائرس یا بخاری سے ہونے والے انفیکشن۔

علامات: تیز بخار، سردی لگنا، سانس میں تنگی اور بلغم والی کھانسی کی شکایات۔

علاج: بیکٹیریل نمونیا کا علاج اینٹی بائیوٹکس سے کیا جاتا ہے۔ وائرل اور فنگل نمونیا کے علاج کے لیے اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ بیکٹیریل نمونیا سے بچاؤ کے لیے ویکسینز (vaccines) بھی دستیاب ہوتی ہیں۔

26- دمہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات بیان کریں۔

جواب: یہ برونکائی میں ایک سوزش (انفیکشن) ہے جس میں برونکائی اور برونکیولز کی دیواریں سوج جاتی ہیں اور ان نالیوں میں سکڑاؤ آ جاتا ہے۔

علامات: سانس کی تنگی، خرخراہٹ (سانس لیتے وقت سیٹی کی آواز)، کھانسی اور سینے میں تنگی

وجوہات: الرجی پیدا کرنے والے عوامل یعنی الرجنز (allergens) مثلاً گردوغبار کے کیڑے (dust mites)، پولن (pollen)، پھپھوندی (mold)، اور پالتو جانوروں کی خشکی (pet dander)، موسمیاتی تبدیلی خاص طور پر ٹھنڈی ہوا: وراثتی عوامل (دمہ یا الرجی کا خاندانی طور پر موجود ہونا۔

علاج: دمہ کے دورے کے دوران برونکیولز کھولنے والی ادویات یعنی برونکیوڈائلٹرز (bronchodilators) دی جاتی ہیں۔

27- دمہ کی علامات لکھیں۔

جواب: سانس کی تنگی، خرخراہٹ (سانس لیتے وقت سیٹی کی آواز)، کھانسی اور سینے میں تنگی

28- الرجی کی تعریف کریں۔

جواب: الرجی الرجی پیدا کرنے والے مادے ہیں۔ یہ ایمنون سسٹم کو ٹرگر کرتے ہیں جیسا کہ پولن، ذرات، پالتو جانوروں کی خشکی اور پھپھوندی وغیرہ۔

29- پیسیو سموکنگ خطرناک کیوں ہوتی ہے؟

جواب: پیسیو (passive) سموکنگ یعنی کسی دوسرے کی سموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا سانس کے ذریعہ اندر جانا، بھی پھپھڑوں کے کینسر کی ایک وجہ ہے۔ سگریٹ کے جلتے کنارے سے نکلنے والا دھوئیں، اس دھوئیں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو سگریٹ پینے والا باہر نکالتا ہے۔

30- پیپھردوں کے کینسر کی علامات کیا ہیں؟

جواب: علامات: اس کی عام علامات سانس کی تنگی، کھانسی (جس میں خون کی کھانسی بھی شامل ہے) اور وزن میں کمی ہوتا ہیں۔

31- پیپھردوں کے کینسر کے مریضوں کے ممکنہ علاج کیا ہیں؟

جواب: کینسر کے مریض کا علاج ایک یا زیادہ طریقوں سے کیا جاتا ہے جن میں سرجری (surgery)، کیموتھراپی (chemotherapy) اور ریڈییشن تھراپی (radiation therapy) شامل ہیں۔

32- پیپھردوں کے کینسر کے انسانی صحت پر کوئی دو اثرات لکھیں۔

جواب: سموکرز میں بہت سی جان لیوا بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ سموکنگ سے پیدا ہونے والے بڑے خطرات میں پیپھردوں، گردوں، اورل کیوٹیٹی، لیونکس، چھاتی، مثانہ، ایسوفیگس، ہنکریاز اور معدہ میں کینسر اور دوسری بیماریاں ہیں۔

33- گلوٹین کیا ہے؟ گلوٹین کے جسم پر کوئی دو نقصان دہ اثرات بیان کریں۔

جواب: گلوٹین (nicotine) سگریٹ میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل ہے۔ یہ کئی آرگنز کو نقصان پہنچاتا ہے، جن میں دماغ بھی شامل ہے۔ یہ آرٹریز کی دیواروں کو بھی سخت کر دیتا ہے اور نتیجہ میں دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔

34- ٹار کیا ہے؟ یہ پیپھردوں اور گیسوں کے تبادلے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟

جواب: ٹار (tar) یعنی تارکول سگریٹ میں ٹھوس ذرات کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب سانس کے ذریعے جاتا ہے تو یہ پیپھردوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ گیسوں کے تبادلے کے لیے سطح کو کم کر دیتا ہے۔

35- فارمالڈیہائیڈ اور امونیا کے نقصان دہ اثرات بیان کریں۔

جواب: سگریٹ میں موجود فارمالڈیہائیڈ (formaldehyde) کینسر اور ریسپیریٹری سسٹم، جلد اور معدے اور آنتوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ امونیا (ammonia)، جو کہ ٹوائلٹ کی صفائی میں استعمال ہوتا ہے، تمباکو سے گلوٹین کو الگ کرتا ہے اور اس سے ایک گیس بنتی ہے۔ یہ گیس جسم کے لیے زہریلی ہوتی ہے۔

36- پیپھردوں کے کینسر کے علاوہ سموکنگ کے نقصان دہ اثرات بیان کریں۔

جواب: سموکنگ سے خون میں کولیسٹرول (cholesterol) کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے اور خون کی نالیاں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ دانتوں پر داغ کی اہم وجہ بھی سموکنگ ہے۔

حل مشقی سوالات

A کثیر الانتخابی سوالات

A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

1- تنفس سے مراد ہے:

(الف) توانائی خارج کرنے کے لیے C-H بانڈز کا ٹوٹنا (ب) جسمانی حرکات، جو ہوا کو جسم کے اندر اور باہر لے جاتی ہیں

(ج) ہوا سے آکسیجن لینا اور جسم کی کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالنا (د) خون کا آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں تک ٹرانسپورٹ

2- لیونکس سے گزرنے کے فوراً بعد ہوا کون سا راستہ اختیار کرتی ہے؟

(الف) فیرنگس (ب) برونگائی (ج) ٹریکیا (د) ایلوپولائی

3- ایلوپولائی کیوں بلڈ کلیریز سے بھرے ہوئے ہیں؟

(الف) پانی جذب کرنے کے لیے (ب) گیسوں کے تبادلے کے لیے

(ج) میوکس پیدا کرنے کے لیے (د) گردے کو فیلٹر کرنے کے لیے

- 4- ایلوپلائی کی کون سی خصوصیت گیہوں کے تبادلہ کے لیے اُن کی مدد کرتی ہے؟
 (الف) موٹی دیواریں (ب) وسیع ڈایامیٹر (قطر) (ج) نرم دارِ سطح (د) مضبوط مسلز
- 5- کس عمل سے تنفس کے دوران پھیپھڑوں کا حجم بڑھ جاتا ہے؟
 (الف) ڈایافراگ کا پھیلنا (ب) انٹرنل مسلز کا سکڑنا (ج) ٹریکیا کا بند ہو جانا (د) ایلوپلائی کی دیواروں کا سخت ہو جانا
- 6- سانس کے ذریعے اندر آنے والی ہوا میں 21% آکسیجن ہوتی ہے۔ باہر نکلنے والی ہوا میں یہ کتنی ہے؟
 (الف) 0% (ب) 16% (ج) 21% (د) 42%
- 7- مندرجہ ذیل میں سے کون سا عنصر انسان میں تنفس کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے؟
 (الف) خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (ب) خون میں آکسیجن (ج) مسلز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (د) مسلز میں آکسیجن
- 8- کون سی بیماری میں ایلوپلائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں؟
 (الف) نمونیا (ب) برونکائٹس (ج) ایمفیزما (د) دمہ
- 9- سموکنگ کس طرح کینسر کا باعث بنتی ہے؟
 (الف) آکسیجن لینے کی شرح بڑھ جاتی ہے (ب) سیل ڈویژن بے قابو ہو جاتی ہے (ج) زخم بھرنے کے رفتار کم ہو جاتی ہے (د) ٹریکیا کا سائز بڑھ جاتا ہے
- 10- سگریٹ میں موجود کون سا کیمیکل عادی بنا سکتا ہے؟
 (الف) کاربن مانو آکسائیڈ (ب) نائٹروٹین (ج) ٹوٹین (د) فارمیڈی بائیڈ

جوابات :-

1- (ب)	2- (ج)	3- (ب)	4- (ج)	5- (ب)	6- (ب)	7- (الف)	8- (ج)	9- (ب)	10- (ج)
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	---------

B مختصر جوابی سوالات

- 1- گیہوں کے تبادلہ اور تنفس میں فرق بیان کریں۔
 جواب: گیہوں کا تبادلہ: گیہوں کا تبادلہ (gaseous exchange) وہ عمل ہے جس میں سانس کے ذریعے اندر لی گئی ہوا (پھیپھڑوں میں) میں موجود آکسیجن خون میں چلی جاتی ہے، اور خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالی جانے والی ہوا میں چلی جاتی ہے۔ گیہوں کے تبادلے کے لیے جاندار تنفس کا عمل اختیار کرتے ہیں۔ تنفس: تنفس ایک طبعی عمل ہے جس میں جانور ہوا کو اپنے جسم کے اندر لے جاتے اور باہر نکالتے ہیں۔ تنفس کا عمل گیہوں کے تبادلے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
- 2- تنفس اور سیلولر ریسیکیشن میں فرق بیان کریں۔
 جواب: تنفس: تنفس ایک طبعی عمل ہے جس میں جانور ہوا کو اپنے جسم کے اندر لے جاتے اور باہر نکالتے ہیں۔ سیلولر ریسیکیشن: یہ وہ عمل ہے جس میں سیلز خوراک (گلوکوز) کی آکسائیڈیشن (oxidation) کرتے ہیں اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جانداروں کو آکسیجن اپنے سیلز تک پہنچانے اور سیلز سے کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

3- ٹریکیا اور برونکائی کی دیواروں میں موجود کاربج کا کیا کام ہے؟

جواب: یہ کاربج ٹریکیا اور برونکائی کو سکڑ جانے (collapse) سے بچاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اندر ہوا موجود نہ بھی ہو۔

4- آرام اور کام کے وقت انسان میں تنفس کی اوسط رفتار کیا ہے؟

جواب: انسان میں نارمل حالات یعنی آرام کے وقت سانس لینے کی رفتار 16 سے 20 مرتبہ فی منٹ ہے۔ مشقت یا سخت کام کے دوران سانس کی رفتار 30 سے 40 مرتبہ فی منٹ تک بڑھ جاتی ہے۔

5- ایلیوپولائی کی ساخت کیسے گیسوں کے زیادہ تبادلے کا باعث بنتی ہے؟

جواب: ایلیوپولائی زیادہ سطحی رقبہ رکھنے کی وجہ سے گیسوں کے تبادلے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ لاکھوں چھوٹی تھیلیوں پر مبنی کپلریز کانیٹ ورک ہوتے ہیں۔

6- برونکائش کی علامت، وجوہات، اور علاج کی فہرست بنائیں۔

جواب: وجوہات: وائرس یا بیکٹیریا سے ہونے والی انفیکشن: سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز (مثلاً تمباکو دھواں)۔

علامات: کھانسی، سانس میں ہلکی خرخراہٹ، بخار، سردی لگنا اور سانس کی تنگی (shortness of breathing)۔

علاج: ادویات (کھانسی ختم کرنے والی) تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو: اینٹی بائیوٹک (اگر برونکائش بیکٹیریا کے انفیکشن سے ہو تو): اینٹی وائرل

(anti-viral) ادویات (جب یہ کسی وائرس کے انفیکشن سے ہو) جلن پیدا کرنے والی چیزوں (irritants) مثلاً دھواں اور آلودگی سے بچنا۔

7- ایچ ای سی کی علامات اور علاج بتائیں۔

جواب: علامات: سانس کی تنگی (shortness of breath)، دیرینہ کھانسی (chronic cough) (میوکس کے ساتھ یا بغیر)، سانس میں

خرخراہٹ (wheezing) اور سینے کی جھڑکن (chest tightness)۔

علاج: کھانسی کم کرنے والی اور سانس کی تنگی سے آرام کی ادویات۔ ایچ ای سی کا مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا۔

8- کارسینو جنز کیا ہیں؟ سگریٹ میں موجود کوئی سے دو کارسینو جنز کے نام بتائیں۔

جواب: کارسینو جنز: کارسینو جنز ایسے مادے ہیں جو جانداروں میں کینسر کا باعث بنتے ہیں۔

نکوٹین، نار اور بینزین اس کی مثالیں ہیں۔

9- مندرجہ ذیل ٹیبل کو مکمل کریں۔

خصوصیت	اندرو داخل ہونے والی ہوا	باہر خارج ہونے والی ہوا
آکسیجن	21%	
کاربن ڈائی آکسائیڈ		4%
نائٹروجن	79%	

جواب:

خصوصیت	اندرو داخل ہونے والی ہوا	باہر خارج ہونے والی ہوا
آکسیجن	21%	16%
کاربن ڈائی آکسائیڈ	0.04%	4%
نائٹروجن	79%	79%

1- انہیلیشن اور ایگزیمیلیشن کے مراحل بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال (6) کا جواب

2- انسان میں ہوا کے راستے کے مختلف حصوں پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال (2) کا جواب

3- بروئکس، ٹریکیا، اور ایلوولائی کے افعال اور مقدمات کو بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال (3) کا جواب

4- پیپیردوں کے کیمر کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں؟ تمباکو نوشی کے پیپیردوں کے کیمر کے علاوہ دیگر نقصان دہ اثرات کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 13 (وجوہات) اور سوال 14 (سوئگ کے دیگر نقصان دہ اثرات)

D- انکشافی سوالات:

1- اگر ڈایا فرام ٹھیک طرح سے کام کرنا چھوڑ دے تو سانس لینے کے عمل کو کیا ہو سکتا ہے؟

جواب: ڈایا فرام کا بنیادی کام انہیلیشن ہے۔ اگر یہ درست طریقے سے کام نہ کرے تو سینے کا خلا صحتح طور پر پھیل اور سکڑ نہیں سکے گا۔ اس طرح خون تک

2- دھوئیں کے ذرات کا پیپیردوں کے اندر جمع ہو جانا کیوں خطرناک ہے؟

جواب: دھوئیں کے ذرات پیپیردوں میں ایلوولائی اور ہوا کے راستے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سبب کے جذب ہوئے کو کم کر دیتے ہیں اور ایفٹی

سیما جیسی خطرناک بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔

3- ٹریکیا میں C- شکل کے کارٹیلج کیوں ہوتے ہیں جبکہ بروئکیولز میں یہ نہیں ہوتے؟

جواب: ٹریکیا میں C شکل کے کارٹیلج کے انگڑ ہوتے ہیں جو اسے ہر وقت کھلا رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور ہوا کے اندر باہر جانے کے دوران اسے دب

جانے سے بچاتے ہیں۔

بروئکیولز: بروئکیولز میں C شکل کے کارٹیلج کے رنگ نہیں ہوتے کیونکہ وہ بہت چھوٹے، نرم اور چکدار ہوتے ہیں۔ ان کی دیواریں سموتھ مسلز کی

وجہ سے کھلی رہتی ہیں اس لیے سخت کارٹیلج کی ضرورت نہیں ہوتی۔

4- دمہ کے دوروں کے دوران مریضوں کو سانس اندر لینے کی نسبت سانس باہر نکالنے میں زیادہ مشکل محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب: دمہ بروئکس کی سوزش ہے جس میں بروئکس اور بروئکیولز سوج جاتے ہیں اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ سانس اندر لیتے وقت سینہ پھیلتا ہے اس لیے ہوا

اندر آئے کہ جانا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ہوا باہر نکالتے وقت سینے کا خلا پھیل جاتا ہے اور باؤ بڑھ جاتا ہے جس سے پہلے سے تنگ اور سوجی ہوئی

ہوا کی نالیاں مزید دب جاتی ہیں۔ اس وجہ سے پیپیردوں سے ہوا کا باہر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

