

اس باب کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- انجیشن (ingestion) ڈائیجیشن (digestion)، انجذاب (absorption)، ایسی میلیشن (assimilation) اور انجیشن کی ضرورت بیان کریں۔
- غذائی نالی (ایلیمنٹری کینال) کے اہم حصوں اور اس سے وابستہ آرگنز کی بناوٹ کی شناخت کریں اور وضاحت کریں۔
- خوراک نگلنے اور پیری شالس کے عمل کی وضاحت کریں۔
- ایلیمنٹری کینال کے مختلف حصوں میں اینزائمز کی کارکردگی کو ان کے سبسٹریٹس اور پیدا ہونے والے مادوں کے لحاظ سے ترتیب دیں۔
- جگر کا کردار بیان کریں۔
- ولانی کی ساخت بیان کریں، جس میں کپلریز اور لیٹیکل کا کردار بھی شامل ہو۔
- ایلیمنٹری کینال کی بیماریوں مثلاً ڈائریا، قبض اور السر کی علامات، وجوہات، علاج اور بچاؤ کے طریقے بیان کریں۔

انسانی طرزِ سوالات

مجموعہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انسانی طرزِ سوالات

1.1 نیوٹریشن اور اس کی اہمیت (NUTRITION AND ITS IMPORTANCE)

سوال 1: نیوٹریشن کی تعریف کریں۔ نیوٹریشن کے اہم مراحل بیان کریں۔

جواب: نیوٹریشن: نیوٹریشن سے مراد وہ عمل ہے جس میں خوراک تیار کی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے اور اسے نشوونما اور توانائی کے لیے جسمانی مادوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

نیوٹریشن کے مراحل: جانوروں میں نیوٹریشن مندرجہ ذیل مراحل میں مکمل ہوتی ہے۔

- انجیشن: ٹھوس خوراک اور مشروبات کو جسم میں لے جانا۔
- ڈائیجیشن: خوراک کو چھوٹے اجزاء میں توڑنا جنہیں جسم جذب کر سکے۔
- انجذاب: ہضم شدہ خوراک میں سے غذائی اجزاء کو خون اور لمف میں جذب کرنا۔
- ایسی میلیشن: جذب ہو جانے والے مواد کو سیلز اور ٹشوز میں استعمال کرنا۔
- انجیشن: غیر ہضم شدہ خوراک اور دوسرے بیکار مواد کو جسم سے نکالنا۔

سوال: آٹوٹراک اور ہیٹروٹراک نیوٹریشن میں فرق کریں۔


جواب: آٹوٹراک (autotrophic) نیوٹریشن وہ طریقہ ہے جس میں جاندار غیر نامیاتی مادوں سے روشنی یا کیمیائی توانائی کی مدد سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔

ہیٹروٹراک (heterotrophic) نیوٹریشن وہ طریقہ ہے جس میں جاندار اپنی خوراک دوسرے جانداروں کو یا نامیاتی مادوں کو کھا کر حاصل کرتے ہیں۔

سوال 2: ڈائیجیشن سے کیا مراد ہے؟ مختصر اور وضاحت کریں۔

جواب: ڈائیجیشن: ایسا عمل جس میں خوراک کے کیمیکل اور فزیکل مادیات کو سادہ اور قابل حل اجزاء میں توڑا جاتا ہے، ڈائیجیشن کہلاتا ہے۔ جو

خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بڑے مالیکیولز یعنی پولیمرز میں مشتمل ہوتی ہے جیسے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس یہ بڑے مالیکیولز سیل ممبرینز سے نہیں گزر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انھیں توڑ کر چھوٹے اور حل پذیر اجزاء میں بدل دیا جائے جنہیں مونومرز کہا جاتا ہے جیسے شوگر، امینو ایسڈ اور فیٹی ایسڈز وغیرہ۔



انسان کا ڈائیجسٹو سسٹم

انسان کا ڈائیجسٹو سسٹم (HUMAN DIGESTIVE SYSTEM)


1.2

سوال 3: اورل کیوویٹی کیا ہے؟ ڈائیجسٹو سسٹم میں اورل کیوویٹی کے کردار کی وضاحت کریں۔

جواب: اورل کیوویٹی (Oral Cavity): منہ کے پیچھے موجود جگہ کو اورل کیوویٹی کہتے ہیں۔ اس میں زبان کی سطح پر لگے ٹیٹ بڈز (taste buds) ہوتے ہیں جو خوراک کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ اورل کیوویٹی میں خوراک کی مکینیکل (mechanical) ڈائیجیشن شروع ہوتی ہے۔ مکینیکل ڈائیجیشن میں دانت خوراک کو کاٹ کر چھوٹے ٹکڑوں میں پس دیتے ہیں۔

اورل کیوویٹی میں سلائیویری گلینڈز (salivary glands) کے تین جوڑے کاربوہائیڈریٹس (carbohydrates) کی جزوی کیمیکل ڈائیجیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ گلینڈز اورل کیوویٹی سے منسلک ہوتے ہیں اور سلائیوا (saliva) خارج کرتے ہیں۔ سلائیوا پانی، میوکس (mucus)، اور ایک اینزائم (enzyme) یعنی سلائیویری ایمیلیز (salivary amylase) پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی اور میوکس خوراک کے ٹکڑوں کو نرم کرتے ہیں۔ سلائیویری ایمیلیز (salivary amylase) خوراک میں موجود سٹارچ کو مالٹوز (maltose) میں توڑ دیتا ہے۔

گٹا (Swallowing) جسمانی (Physical) اور جنوی کیمیکل ڈائیجیشن کے بعد اورل کیوٹیٹی میں خوراک کا مجموعہ بولس (bolus) کہلاتا ہے۔ اسے فیرنکس (pharynx) کی طرف دھکیل کر اگلا جاتا ہے۔ نگلنے کے لیے، زبان بولس کو اورل کیوٹیٹی کے پچھلے حصے کی طرف دھکیلتی ہے۔ نگلی گئی خوراک فیرنکس میں داخل ہو جاتی ہے۔



سوال 4: الیمینٹری کینال سے کیا مراد ہے؟ فیرنکس کی ساخت اور فنکشن بیان کریں۔

جواب: الیمینٹری کینال: انسان کا ڈائیجسٹو سسٹم ایک لمبی نالی اور چند مددگار اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نالی کو الیمینٹری کینال (alimentary canal) کہتے ہیں۔ یہ نالی منہ سے شروع ہو کر اینس (anus) پر ختم ہوتی ہے۔ سیلائٹری گینڈز (salivary glands)، جگر (liver) اور لبلبہ (pancreas) کی رطوبتیں الیمینٹری کینال میں پہنچتی ہیں اور خوراک کی ڈائیجیشن میں مدد کرتی ہیں۔

فیرنکس (Pharynx):

یہ اورل کیوٹیٹی کے بعد ایک چھوٹا نلی نما (tube-like) حصہ ہے۔ یہ اورل کیوٹیٹی کو ایسوفیگس (oesophagus) سے اور ناک کو ٹریکیا (trachea) سے جوڑتا ہے۔ اورل کیوٹیٹی میں شروع ہونے والا کیمیکل ڈائیجیشن کا عمل فیرنکس میں بھی جاری رہتا ہے۔ فیرنکس کا ایک اہم کام خوراک کے ذرات کو پھینپھروں میں جانے سے روکنا ہے۔ یہ کام ایک پلکاردار کیرٹیلاج ٹشو (elastic cartilage tissue) یعنی اپی گلوٹیس (epiglottis) کی مدد سے کیا جاتا ہے جو کئی گلوکوز مالکیولز سے بنا ہوتا ہے۔ مالتوز (maltose) دو گلوکوز کے ہے۔ جب نگلی گئی خوراک فیرنکس سے گزرتی ہے، تو ہوا کی نالی یعنی ٹریکیا مالکیولز سے بنا ہوتا ہے یعنی ڈائی سیکرائڈ (disaccharide) ہے۔


(Windpipe means, trachea) کا اوپری حصہ اپنی گلاٹس (epiglottis) کی جانب اوپری طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہوا کی نالی کا سوراخ یعنی گلاٹس (glottis) بند ہو جاتا ہے اور نگلی گئی خوراک اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔

سوال 5: خوراک الیمینٹری کینال سے معدہ کی طرف کیسے جاتی ہے؟

جواب: ایسوفیگس: یہ ایک لمبی نالی (تقریباً 25 اینچی میٹر) ہے۔ یہ فیرنکس کو معدہ (stomach) سے جوڑتی ہے۔ جب خوراک ایسوفیگس میں داخل

ہوتی ہے تو اس کی مسکڑی دیواروں (muscular walls) میں لگاتار سکڑنے (contraction) کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سکڑنے کی لہریں خوراک کو ایسوفیگس کے ذریعے معدہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ مسکڑنے کے اس سکڑنے کی لہروں کو پیری سٹالس (peristalsis) کہتے ہیں۔

سوال 6: معدہ کی ساخت اور افعال کی وضاحت کریں۔



پیری سٹالس

جواب: معدہ کی ساخت: "J" شکل کا معدہ ایبڈومن (abdomen) میں اوپری بائیں جانب ڈایا فرام (diaphragm) کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ معدہ کا وہ حصہ جو ایسوفیگس کے فوراً بعد ہے، کارڈیک (cardiac) حصہ کہلاتا ہے جبکہ وہ حصہ جو شمال انٹسٹائن سے پہلے ہے، پائی لورک (pyloric) حصہ کہلاتا ہے۔ ایسوفیگس اور معدہ کے جوڑ پر ایک مسلز کا حلقہ یعنی سفنکٹر (sphincter) موجود ہوتا ہے جسے کارڈیک سفنکٹر (cardiac sphincter) یا ایسوفیگس کا زیریں سفنکٹر (lower oesophageal sphincter) کہتے ہیں۔ یہ خوراک کو معدہ سے واپس ایسوفیگس میں جانے سے روکتا ہے۔ اسی طرح، معدہ اور چھوٹی آنت (small intestine) کے درمیان پائی لورک سفنکٹر (pyloric sphincter) موجود ہوتا ہے۔

معدہ کی خوراک کی مکینیکل ڈائیجیشن: معدہ خوراک کی مکینیکل (mechanical) اور جزوی کیمیکل ڈائیجیشن (partial chemical digestion) کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ خوراک کو ذخیرہ بھی کرتا ہے۔ معدہ کی دیواریں موٹے سموتھ مسلز (smooth muscles) سے بنی ہوتی ہیں۔ جب خوراک معدہ میں پہنچتی ہے تو یہ مسلز زوردار طریقے سے سکڑتے ہیں۔ ان کا سکڑاؤ خوراک کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ اس ٹوٹنے (churning) کی وجہ سے حرارت (heat) بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت لیڈز (lipids) کو پگھلانے میں مدد دیتی ہے۔

کیسٹرک جوس کی سیکریشن: معدہ کی اندرونی دیواروں میں کئی چھوٹے چھوٹے کیسٹرک گلینڈز (gastric glands) ہیں جو کیسٹرک جوس (gastric juice) خارج کرتے ہیں۔ اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ (hydrochloric acid)، ایک غیر فعال اینزائم پیپسی نوجن (pepsinogen)، اور میوکس (mucus) شامل ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ پیپسی نوجن (pepsinogen) کو ایک فعال اینزائم


یعنی پپسن (pepsin) میں تبدیل کرتا ہے۔ پپسن اینزائم بڑی پروٹینز کو امائنو ایسڈ (amino acids) کی چھوٹی زنجیروں میں توڑتا ہے جنہیں پپٹائڈز (peptides) کہتے ہیں۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ خوراک میں موجود بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا (pathogenic bacteria) کو بھی مار ڈالتا ہے۔

میوکس معدہ کی اندرونی دیواروں پر ایک حفاظتی تہہ بناتا ہے۔ یہاں، یہ HCl کو غیر موثر (neutralizes) کرتا ہے۔ اس لیے، پیپسی نوجن یہاں فعال نہیں ہو سکتا اور دیواریں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہتی ہیں۔ خوراک معدہ میں عموماً تین سے چار گھنٹے تک رہتی ہے۔ یہاں ہونے والے

سوال: نگلنے کے دوران نزل کیوٹی کا راستہ کیسے بند ہوتا ہے؟

جواب: نگلنے کے دوران، تالو (plate)، یعنی اورل کیوٹی کی چھت اوپر کی طرف اٹھتی ہے تاکہ ناک کی کیوٹی (nasal cavity) کا راستہ بند ہو جائے۔

اعمال کی وجہ سے خوراک ایک شوربے جیسا میجر (soup-like mixture) بن جاتی ہے جسے کائم (chyme) کہتے ہیں۔ کائم کے بہاؤ کو پانی لورک سفنکٹر کنٹرول کرتا ہے۔ ہر بار جب پانی لورک سفنکٹر اگلے 5 میٹر سے 15 میٹر کائم چھوٹی آنت یعنی سال انٹسٹائن (small intestine) میں چلا جاتا ہے۔



معدہ کی ساخت

سوال 7: سال انٹسٹائن (چھوٹی آنت) کی ساخت بیان کریں۔

جواب: سال انٹسٹائن (Small Intestine) سال انٹسٹائن بہت زیادہ بل دار نالی (coiled tube) ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 7 میٹر ہوتی ہے۔ اس کے تین حصے ہیں:

سوال 8: سال انٹسٹائن (چھوٹی آنت) کی ساخت بیان کریں۔

جواب: سال انٹسٹائن (Small Intestine) سال انٹسٹائن بہت زیادہ بل دار نالی (coiled tube) ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 7 میٹر ہوتی ہے۔ اس کے تین حصے ہیں:

- ڈیوڈینم (Duodenum) پہلا حصہ ہے۔ یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔
- جیجنم (Jejunum) درمیانی حصہ ہے۔ یہ تقریباً 2.5 میٹر لمبا ہوتا ہے۔
- ایلینم (Ileum) آخری حصہ ہے۔ یہ تقریباً 4 میٹر لمبا ہوتا ہے۔

ڈیوڈینم میں خوراک پر جگر اور لبلبہ کی رطوبتیں (secretions) اثر کرتی ہیں۔ جگر کی رطوبت یعنی بائل (bile) ایک نالی یعنی کامن بائل ڈکٹ (common bile duct) کے ذریعے ڈیوڈینم میں داخل ہوتا ہے۔ بائل میں ایسے نمکیات ہوتے ہیں جو فٹس (fats) کو چھوٹے قطروں (droplets) میں توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح، ایک دودھیا مائع (milky fluid) بنتا ہے جس میں فٹس کے قطرے (fat droplets) الگ الگ رہتے ہیں۔ اس عمل کو ایملسیفیکیشن (Emulsification) کہتے ہیں۔ پنکریاز کی رطوبت یعنی پنکریازک جوس (pancreatic juice)، پنکریازک ڈکٹ (pancreatic duct) کے ذریعے ڈیوڈینم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پنکریازک ڈکٹ ڈیوڈینم میں داخل ہونے سے پہلے کامن بائل ڈکٹ میں کھل جاتی ہے۔


پنکریازک جوس میں کئی اینزائمز پائے جاتے ہیں مثلاً ٹریپسن (trypsin)، پنکریازک ایمائی لیز (pancreatic amylase) اور لائیپیز (lipase)۔ یہ اینزائمز پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور لیپڈز کے ہاضمے میں مدد دیتے ہیں۔ پنکریازک جوس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے جو کائم کی تیزابیت کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ انٹسٹائن کی دیواروں میں موجود گلیٹڈز بھی اینزائمز خارج کرتے ہیں جو تمام اقسام کی خوراک کی ڈائیجیشن کو مکمل کرتے ہیں۔

سوال 8: چھوٹی آنت میں خوراک کا جذبہ بیان کریں۔

جواب: خوراک کا جذبہ (Absorption of Food): خوراک کی مکمل ڈائیجیشن کے بعد اختتامی پراڈکٹس یعنی ایمائنو ایسڈز، سادہ شوگرز،

گلیکول اور فیٹی ایسڈز اسٹیمٹری کینال سے نکل کر سرکولیٹری (circulatory) سسٹم میں چلے جاتے ہیں۔ سمال انٹسٹائن کی اندرونی دیواریں بہت تہہ دار ہوتی ہیں۔ مزید برآں ان تہوں پر لاکھوں انگلی نما اعضاء بھی ہوتے ہیں جنہیں ولائی (villi: واحد ولس villus) کہتے ہیں۔ یہ تہیں اور ان پر موجود ولائی خوراک کے انجذاب کے لیے بڑا سطحی رقبہ بناتے ہیں۔ خوراک کے مالیکیولز اس سطح سے ڈیفیوژن اور ایکٹو ٹرانسپورٹ کرے جذب ہوتے ہیں۔ ہر ولس کی دیوار سلیز کی صرف ایک ہی تہہ کی بنی ہوتی ہے۔ ولس کے اندر بلڈ کپیلرز (blood capillaries) اور ایک لمف وایسل (lymph vessel) یعنی لیکٹیل (lacteal) ہوتی ہے۔

سمال انٹسٹائن میں موجود گسرول اور فیٹی ایسڈز ولائی کے لیکٹیل میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکٹیل انہیں بڑی لمف وایسلز میں لے جاتے ہیں۔ یہ لمف وایسلز دل کے قریب بڑی بلڈ وایسلز (blood vessels) میں کھلتی ہیں۔ اماٹو ایسڈز اور سادہ شوگرز ولائی کی بلڈ کپیلرز میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کپیلرز مل کر ہپٹک پورٹل وین (hepatic portal vein) بناتی ہیں جو ان مادوں کو جگر میں لے جاتی ہے۔ جگر سے خوراک کے ضروری مالیکیولز ہپٹک وین کے ذریعے دل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے انہیں جسم کے تمام حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔



سمال انٹسٹائن اور ولائی

سوال 9: لارج انٹسٹائن کی ساخت اور افعال بیان کریں۔

جواب: لارج انٹسٹائن (Large Intestine): ہضم شدہ خوراک اور کچھ پانی کے انجذاب کے بعد، غیر ہضم شدہ مواد اور پانی پیری سٹالس کے ذریعے لارج انٹسٹائن میں جاتے ہیں۔ لارج انٹسٹائن کے تین حصے ہیں یعنی سیکم (caecum) جو سمال انٹسٹائن کے ساتھ لگی ایک چھوٹی سی تھیلی ہے، کولون (colon) اور ریکٹم (rectum)۔ لارج انٹسٹائن سے زیادہ تر بقیہ پانی خون میں جذب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچنے والا مواد نسبتاً ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے فضلہ (faeces) کہتے ہیں۔ اس میں خوراک کا ڈائی جیسٹ نہ ہونے والا حصہ، بہت سے بیکٹیریا،

سوال: بکٹریا کیسے خارج کیے جاتے ہیں؟


جواب: بائل میں رنگدار مادے (pigments) بھی شامل ہوتے ہیں جو جگر میں ریڈ بلڈ سیلز (RBCs) کے ٹوٹنے سے بنتے ہیں۔ یہ رنگدار مادے فضلہ (faeces) کے ذریعے جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔

سوال: اپینڈیکس پر مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: سیکم کے بند سرے پر ایک چھوٹی انگلی نما اپینڈیکس (appendix) ہوتی ہے۔ اپینڈیکس میں انفیکشن شدید درد کا سبب بنتا ہے۔ اگر متعدد اپینڈیکس (infected appendix) کو سرجری کے ذریعے نہ نکالا جائے، تو یہ پھٹ سکتی ہے اور انفیکشن پیٹ میں پھیل سکتا ہے۔

ایکٹو ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہضم شدہ مواد پانی ہوتا ہے۔ فضلہ کو کچھ وقت کے لیے ریکٹم میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ انفیکشن کے دوران فضلہ کو اینس (anus) کے ذریعے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔

سوال 10: ڈائٹیشن میں جگر کی اہمیت اور افعال لکھیں۔



جواب: جگر کا کردار (Role of liver): جگر ایک بڑا آرگن ہے جو معدے کی دائیں جانب ہے۔ ایک بالغ انسان میں اس کا وزن تقریباً 1.5 کلوگرام ہوتا ہے۔ اس کی ٹحلی یعنی وینٹریل (ventral) جانب ایک تھیلا نما حصہ آرگن ہے جسے گال بلیڈر (gall bladder) کہتے ہیں۔ جگر بائل خارج کرتا ہے جسے گال بلیڈر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ کاسن بائل ڈکٹ کے ذریعے یہ بائل گال بلیڈر سے ڈیوڈینم میں جاتا ہے۔ بائل میں اینزائمز نہیں ہوتے۔ لیکن اس میں نمکیات ہوتے ہیں جو فیٹس کو چھوٹے قطروں میں توڑتے ہیں۔ بائل کے نمکیات ان قطروں کو ایک دوسرے سے الگ الگ بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح اینزائمز کو فیٹس پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جگر جسم میں بہت سے دوسرے افعال بھی سرانجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر:

- گلوکوز کو گلائیکوجن (glycogen) کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر گلوکوز مہیا کرتا ہے۔
- فیٹس میں حل پذیر (fat-soluble) وٹامنز کو ذخیرہ کرتا ہے۔
- ایمائنو ایسڈز کو دوسرے آرگینک کمپاؤنڈز میں توڑتا ہے۔ اس عمل میں نقصان دہ امونیا (ammonia) بنتا ہے۔
- امونیا کو ایک کم زہریلے مادے یعنی یوریا (urea) میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے پھر پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔
- زہریلے مادوں مثلاً الکوحل کو بھی توڑتا ہے۔
- اُن ریڈ بلڈ سیلز کو توڑتا ہے جو اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں۔
- جگر کیروٹین سے وٹامن A بناتا ہے۔
- سرد موسم میں میٹابولزم کی رفتار تیز کر کے حرارت پیدا کرتا ہے۔

سوال 11: ایلیمنٹری کینال کے مختلف حصوں میں اینزائمز کے افعال بیان کریں۔

ایلیمنٹری کینال کا حصہ	اینزائم	سیسٹنٹ	پراڈکٹ
اورل کیو بیٹی	سلائیوری ایمائلز Salivary amylase	شارچ	پراڈکٹ مالٹوز
معدہ	پپسن Pepsin	پروٹینز	پپٹائڈز
سہل انشعائش	پنکریاسک ایمائلز Pancreatic amylase	شارچ	مالٹوز
	ٹریپسن Trypsin	پروٹینز	پپٹائڈز
	کائموٹریپسن Chymotrypsin	پروٹینز	امائنو ایسڈز اور پپٹائڈز
	پپٹائڈیز Peptidase	پپٹائڈز	امائنو ایسڈ اینڈ پپٹائڈ
	لائیپیز Lipase	فیٹس	فیٹی ایسڈ گلیسرول
	نیوکلی ایزز Nucleases	نیوکلیک ایسڈ	نیوکلیوٹائڈز
	مالٹیز Maltase	مالٹوز	گلوکوز
	سکریز Sucrase	سکروز	گلوکوز اور فروکٹوز
	لیکٹیز Lactase	لیکٹوز	گلوکوز اور گلیکٹوز
	ڈائی پیپٹائڈیز Dipeptidases	ڈائی پیپٹائڈز	امائنو ایسڈز

سوال 12: ڈائریا کیا ہے؟ ڈائریا کی علامات، اسباب اور علاج بیان کریں۔

جواب: اسہال (Diarrhoea): ڈائریا میں بار بار پتلے یا پانی والے پاخانے آتے ہیں۔ ڈائریا جسم میں پانی کی کمی (dehydration) کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں میں۔

- علامات (Signs and Symptoms): بار بار پتلے یا پانی والے پاخانے، پیٹ میں درد (cramps or pain)، پیٹ کا پھولنا (bloating)، اور پانی کی کمی یعنی پیاس، منہ کا خشک ہونا، گہرا پیشاب۔
- اسباب (Causes): (بیکٹیریل، وائرل، یا پیراسائٹک) انفیکشنز؛ کھانے کی الرجی؛ ذہنی دباؤ/تناؤ؛ بعض ادویات مثلاً اینٹی بائیوٹکس (antibiotics)۔

- علاج (Treatment): کثرت سے فلوئڈز (fluids) پینا؛ ORS کا استعمال؛ ہلکی غذا (soft diet) کھانا؛ اسہال کش (anti-diarrheal) ادویات کا استعمال؛ اینٹی بائیوٹکس یا دیگر ادویات لینا (شدید صورتوں میں)۔
- بچاؤ (Prevention): باقاعدگی سے ہاتھ دھونا (خاص طور پر کھانے سے پہلے یا ہاتھ روم استعمال کرنے کے بعد)؛ آلودہ خورک (contaminated food) یا پانی سے پرہیز کرنا؛ تناؤ سے بچنا۔

سوال 13: قبض کسے کہتے ہیں؟ اس کی علامات، اسباب اور علاج کے متعلق لکھیں۔


- جواب: قبض (Constipation): قبض ایک ایسی کیفیت ہے جس میں فضلہ/پاخانہ باقاعدہ وقفوں سے جسم سے خارج نہیں ہوتا۔
- علامات (Signs and Symptoms): پاخانہ کے غیر معمولی یا مشکل اخراج (ایک ہفتے میں 3 بار سے کم)؛ سخت اور خشک پاخانہ/فضلہ پیٹ میں تکلیف یا پیٹ کا پھولنا (bloating)۔
 - اسباب (Causes): خوراک میں فائبر (fibre) کی کمی؛ پانی کی کمی (dehydration)؛ جسمانی سرگرمی کی کمی؛ بعض ادویات کا استعمال (مثلاً درد کم کرنے والی ادویات، آئرن سپلیمنٹس (iron supplements)؛ دیگر بیماریاں (مثلاً دیابت (diabetes))۔
 - علاج (Treatment): فائبر (fibre) کا زیادہ استعمال (پھل، سبزیاں، ثابت اناج (Whole grains))؛ کثرت سے پانی پینا؛ باقاعدہ ورزش؛ قبض کشادہ ادویات کا استعمال۔

- بچاؤ (Prevention): فائبر سے بھرپور غذا کھانا؛ کثرت سے فلوئڈز اور پانی پینا۔

سوال 14: السر کی اقسام، علامات اور اسباب بیان کریں۔

جواب: السرز (Ulcers): ایلیمنٹری کینال کی دیواروں میں ہونے والے زخم پیپٹک (peptic) السر کہلاتے ہیں۔ السر عام طور پر معدہ کی دیواروں میں پیدا ہوتا ہے اور اسے گیسٹرک السر (gastric ulcer) کہا جاتا ہے۔ اہم، السر ڈیوڈینم (ڈیوڈینل السر - duodenal ulcer) یا ایسوفیگس (ایسوفیجیل السر - oesophageal ulcer) میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔

- علامات (Signs and Symptoms): پیٹ میں جلن اور درد، اگائے (regurgitation) کے بعد سلائوا (saliva) کا تیزی سے منہ میں آجانا، جھوک میں کمی، وزن میں کمی، خون کی آلودگی (شدید صورتوں میں)۔



زخم (گیسٹرک السر)
گیسٹرک السر

- **اسباب (Causes):** جلی کوککس پائوری (Helicobacter pylori) بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن، غیر سٹیرائڈل سوزش کش ادویات (NSAIDs-nonsteroidal anti-inflammatory drugs) کا طویل المدتی استعمال، شراب کا زیادہ استعمال، تمباکو نوشی، ذہنی دباؤ/تناؤ (stress) (اگرچہ یہ براہ راست وجہ نہیں لیکن یہ علامات کو گھڑکتا ہے)۔
- **علاج (Treatment):** ایچ پائوری (H.pylori) انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس، ترشہ شکن (antacids) اور پروٹون پمپ انہیڈرز (proton pump inhibitors) نامی ادویات۔
- **بچاؤ (Prevention):** درد کم کرنے والی ادویات (NSAIDs) کے زیادہ استعمال سے پرہیز، مرچوں والے کھانوں سے پرہیز، متوازن غذا کھانا۔

معروضی طرز سوالات

اضافی کثیر الانتخابی سوالات

میکر تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

1.1 نیوٹریشن اور اس کی اہمیت (NUTRITION AND ITS IMPORTANCE)

- درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔
1- ہمارے جسم میں ہونے والا ہر عمل جیسا کہ حرکت، نشوونما اور صحت مند رہنا کس پر منحصر ہے؟
(a) ڈائی جیشن (b) ایکسکریشن (c) نیوٹریشن (d) ریسپریشن
- 2- کون سا پروٹین خوراک کو جسمانی سیلز کے لیے قابل استعمال نیوٹریٹس میں تبدیل کرتا ہے؟
(a) گوٹیشن (b) ٹرانسپائریشن (c) سرکولیشن (d) ڈائی جیشن
- 3- کس عمل میں جاندار نیوٹریٹس حاصل کرتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں؟
(a) ڈائی جیشن (b) ایسی میلیشن (c) انجیشن (d) نیوٹریشن
- 4- ٹھوس خوراک اور مشروبات کو جسم میں لے جانا کس مرحلے کی تعریف ہے؟
(a) ایسی میلیشن (b) انجذاب (c) انجیشن (d) ڈائی جیشن
- 5- ہضم ہو جانے والے مواد کو سیلز اور ٹشوز میں استعمال کرنا کہلاتا ہے۔
(a) ڈائی جیشن (b) ایسی میلیشن (c) انجیشن (d) انجذاب
- 6- غیر ہضم شدہ خوراک اور دوسرے بیکار مواد کو جسم سے نکالنا کہلاتا ہے۔
(a) ایکسکریشن (b) انجیشن (c) سکریشن (d) انجیشن
- 7- بڑے مالیکیول جیسا کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کو سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔
(a) مونومرز (b) اینزائمرز (c) پولیمرز (d) ہارمونز
- 8- پولیمرز کس میں سے نہیں گزر سکتے؟
(a) سیل وال (b) سیل ممبرین (c) پروٹوپلازم (d) سائٹوپلازم

(d) مذکورہ تمام

(c) فیٹی ایسڈز

(b) امائنو ایسڈز

(a) شوگرز

(HUMAN DIGESTIVE SYSTEM)

1.2

10- انسان کا ڈائی جیسٹو سسٹم مشتمل ہوتا ہے۔

(a) ایلیمنٹری کینال (b) سال انٹسٹائن (c) معدہ (d) مذکورہ تمام

11- ایلیمنٹری کینال کہاں سے شروع ہوتی ہے؟

(a) ایسوفیگس (b) منہ (c) معدہ (d) اینس

12- ایلیمنٹری کینال کہاں ختم ہوتی ہے؟

(a) سال انٹسٹائن (b) اینس (c) منہ (d) لارج انٹسٹائن

13- مندرجہ ذیل میں سے کون سا آرگن ڈائی جیسٹو سسٹم میں مددگار سمجھا جاتا ہے؟

(a) دل (b) جگر (c) پھیپھڑے (d) گردے

14- منہ کے پیچھے موجود جگہ کو کہتے ہیں۔

(a) نزل کیوٹی (b) اورل کیوٹی (c) چسٹ کیوٹی (d) لیپڈوٹیل کیوٹی

15- ٹیسٹ ہڈز کس کی سطح پر ہوتے ہیں؟

(a) (b) مسوڑھے (c) زبان (d) پیلیٹ

16- خوراک کی کیمیکل ڈائی جیشن کا آغاز ہوتا ہے؟

(a) معدے میں (b) ایسوفیگس میں (c) اورل کیوٹی میں (d) سال انٹسٹائن میں

17- منہ کے اندر مکینیکل ڈائی جیشن کے دوران دانتوں کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟

(a) نیوٹرینٹس کو جذب کرنا (b) خوراک کو توڑنا اور پینا (c) سلائیو بنانا (d) خوراک کو چکھنا

18- اورل کیوٹی کے ساتھ کتنے سلائیویری گینڈز جڑے ہوتے ہیں؟

(a) ایک (b) دو (c) تین (d) چار

19- سلائیو ایکسچر ہے۔

(a) پانی (b) میوکس (c) ڈائی جیسٹو اینزائمز (d) مذکورہ تمام

20- سلائیو میں کون سا اینزائم ہوتا ہے؟

(a) پیپسن (b) لائی پیز (c) سلائیویری ایمیلیز (d) پروٹینز

21- فزیکل اور پارشل کیمیکل ڈائی جیشن کے بعد اورل کیوٹی میں خوراک کا مجموعہ کہلاتا ہے۔

(a) کائم (b) بولس (c) مونومر (d) پولیمر

22- نگلنے کے دوران بولس ڈائی جیسٹو سسٹم کے کس حصے کی طرف دھکیلا جاتا ہے؟

(a) معدہ (b) ٹریکیا (c) فینکس (d) سال انٹسٹائن

23- نگلنے کے دوران کون سا اسٹریکچر اپنی طرف حرکت کر کے نزل کیوٹی کے سوراخ کو بند کرتا ہے۔

(a) زبان (b) اپی گلاس (c) پیلیٹ (d) گلاس

24- اورل کیو بی کے ہمارے چھوٹے حصہ کہلاتا ہے۔

(d) منہ

(c) فیرنکس

(b) فیرنکس

(a) معدہ

25- فیرنکس اورل کیو بی کو کس سے جوڑتا ہے؟

(d) ایسوفیگس

(c) پیپٹک

(b) دل

(a) سال انٹسٹائن

26- فیرنکس میں ایلائنگ کارٹیج ٹشو کہلاتا ہے۔

(d) فیرنکس

(c) اپی گلاس

(b) گلاس

(a) پیلیٹ

27- ٹریکیا کی اوپننگ کہلاتی ہے۔

(d) ایسوفیگس

(c) گلاس

(b) بولس

(a) فیرنکس

28- ایسوفیگس کی لمبائی کتنی ہے؟

(d) 100 cm

(c) 50 cm

(b) 25 cm

(a) 10 cm

29- ایسوفیگس فیرنکس کو کس سے جوڑتا ہے؟

(d) لارج انٹسٹائن

(c) اورل کیو بی

(b) معدہ

(a) سال انٹسٹائن

30- معدہ کس شکل کا ہے۔

(d) ایس شکل

(c) جے شکل

(b) یو شکل

(a) سی شکل

31- معدے کا وہ حصہ جو ایسوفیگس کے فوری بعد شروع ہوتا ہے، کہلاتا ہے۔

(d) ان میں سے کوئی نہیں

(c) سفنکٹر

(b) کارڈیک حصہ

(a) پائلورک حصہ

32- معدے کا وہ حصہ جو سال انٹسٹائن سے پہلے آتا ہے کہلاتا ہے۔

(d) پیری سٹالس

(c) جسم

(b) کارڈیک حصہ

(a) پائلورک حصہ

33- پائلورک سفنکٹورس کے درمیان پایا جاتا ہے؟

(d) سال انٹسٹائن اور فیرنکس

(c) معدہ اور سال انٹسٹائن

(b) معدہ اور فیرنکس

(a) اورل کیو بی اور فیرنکس

34- مندرجہ ذیل میں سے کون سا آرگن خوراک کو ذخیرہ کرتا ہے؟

(d) معدہ

(c) سال انٹسٹائن

(b) اورل کیو بی

(a) فیرنکس

35- کیسٹرک گلیٹنڈز پائے جاتے ہیں۔

(b) معدے کی بیرونی دیواروں میں

(a) معدے کی اندرونی دیواروں میں

(d) ان میں سے کوئی نہیں

(c) معدے کی مرکزی دیواروں میں

36- کیسٹرک جوس میں پایا جاتا ہے۔

(d) مذکورہ تمام

(c) میوکس

(b) پیپسی نو جن

(a) ہائڈروکلورک ایسڈ

37- HCl معدے میں غیر فعال پیپسی نو جن کو کسی میں تبدیل کرتا ہے؟

(d) امائو ایسڈز

(c) پیپسن

(b) پیپٹائڈز

(a) مالٹور

38- اینزائم پیپسن پروٹین کو کس میں توڑتا ہے؟

(d) شارچ

(c) پیپٹائڈز

(b) فیٹی ایسڈز

(a) شوگرز

39- معدے میں جیکسن کا بنیادی کردار کیا ہے؟

(d) لپڈز کو پگھلانا

(c) حفاظتی تہہ بنانا

(b) لیٹیپلر ہارمونز

(a) پروٹینز کو ڈائیجسٹ کرنا

(d) پانچ سے چھ گھنٹے

(c) دو سے تین گھنٹے

40- محلے میں خوراک کتنے وقت تک کے لیے رہتی ہے؟
(a) تین سے چار گھنٹے (b) تین سے پانچ گھنٹے

(d) کرشا

(c) میٹرکس

(b) کاتم

(a) بولس

42- سال انشٹائن کی لمبائی کتنی ہے؟

(d) 10 میٹر

(c) 7 میٹر

(b) 5 میٹر

(a) 3 میٹر

43- سال انشٹائن کا سب سے چھوٹا حصہ کہلاتا ہے۔

(d) کولن

(c) ڈیوڈنیم

(b) ایلیم

(a) جیجنم

44- ڈیوڈنیم کی لمبائی ہے۔

(d) 25 سینٹی میٹر

(c) 20 سینٹی میٹر

(b) 15 سینٹی میٹر

(a) 10 سینٹی میٹر

45- سال انشٹائن کا درمیانی حصہ کہلاتا ہے۔

(d) کولن

(c) جیجنم

(b) ایلیم

(a) ڈیوڈنیم

46- ایلیم کی لمبائی ہے۔

(d) 4 سینٹی میٹر

(c) 2 سینٹی میٹر

(b) 2.5 سینٹی میٹر

(a) 25 سینٹی میٹر

47- جگر کے خارج کردہ مواد کو کہتے ہیں۔

(d) میٹرکس

(c) بولس

(b) بال

(a) کولن

48- بال میں ہوتا ہے۔

(d) پیپسی نوجن

(c) سالٹس

(b) پیپسن

(a) HCl

49- پنکر یا زکی رطوبت ہے۔

(d) پنکر یا ٹک جوس

(c) کیسٹرک جوس

(b) کاتم

(a) بال

50- پنکر یا ٹک جوس میں کون سے اینزائم ہوتے ہیں؟

(d) مذکورہ تمام

(c) لائی پیز

(b) پنکر یا ٹک ایمائی لیز

(a) ٹرپسن

51- پنکر یا ٹک جوس میں کون سا اینزائم لپڈز کو ڈائی جیسٹ کرتا ہے؟

(d) میوکس

(c) لائی پیز

(b) ایمائی لیز

(a) ٹرپسن

52- پنکر یا ٹک جوس میں کون سا اینزائم پروٹین کو ڈائی جیسٹ کرتا ہے؟

(d) پیپسن

(c) ایمائی لیز

(b) ٹرپسن

(a) لائی پیز

53- پنکر یا ٹک ایمائی لیز کس کو ڈائی جیسٹ کرنے کا ذمہ دار ہے؟

(d) وٹامنز

(c) فیش

(b) کاربوہائیڈریٹس

(a) پروٹینز

54- خوراک کی مکمل ڈائی جیشن کے بعد آخری پراڈکٹس الیمینٹری کینال سے کہاں جاتے ہیں؟

(d) دل

(c) ڈائی جیسٹو سٹم

(b) سرکولیٹری سٹم

(a) ریسپیریٹری سٹم

55- سال انشٹائن کی لمبائی کتنی ہے؟

(d) ویز

(c) ولائی

(b) کاتم

(a) بولس

- 56- ولائی مہیا کرتے ہیں۔
 (a) سپورٹ (b) حفاظت (c) لارج سرفیس ایریا (d) لوکوموشن
- 57- ولائی کی سطح سے خوراک کے مالیکیول کس عمل کے ذریعے جذب ہوتے ہیں؟
 (a) ایکٹو ٹرانسپورٹ (b) ڈیفیوژن (c) پیسیو ٹرانسپورٹ (d) دونوں (a) اور (b)
- 58- ولائی کی دیواریں کس سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔
 (a) سیلز کی ایک تہہ (b) سیلز کی دوہری تہہ (c) سیلز کی کئی تہوں (d) کوئی بھی نہیں
- 59- ولائی کے اندر کون سا سٹرکچر گلاسرول اور فٹی ایسڈز کو جذب کرنے کا ذمہ دار ہے؟
 (a) بلڈ کپریز (b) لیکٹینز (c) پورٹل دین (d) پیپٹائڈ لیسیز
- 60- امائنو ایسڈز اور شوگرز ولائی کے کون سے حصے میں داخل ہوتے ہیں؟
 (a) لیکٹینز (b) اندرونی دیواریں فولڈز (c) بلڈ کپریز (d) سیکم
- 61- ہپیک پورٹل دین نیوٹرینٹس کو سال انٹسٹائن سے کہاں لے جاتے ہیں۔
 (a) دل (b) جگر (c) معدہ (d) گردے
- 62- کون سا اینزائم اورل کیوٹی میں شارچ کو توڑنے میں مدد دیتا ہے۔
 (a) پپسن (b) سلائیوری ایمائی لیز (c) ٹرپسن (d) لائی پیز
- 63- پنکریاس سال انٹسٹائن میں پروٹینز کی ڈائیجیشن کے لیے کون سا اینزائم پیدا کرتا ہے؟
 (a) پنکریاسک ایمائی لیز (b) کاسٹریکس (c) پیپٹائڈز (d) سلائیوری ایمائی لیز
- 64- لارج انٹسٹائن کا بنیادی مقصد ہے۔
 (a) پروٹینز کی ڈائیجیشن (b) زیادہ پانی کا جذب (c) بائل کا اخراج (d) امائنو ایسڈز کو توڑنا
- 65- پانی کے جذب ہونے کے بعد بچنے والا غیر ہضم شدہ ٹھوس مواد کھلاتا ہے۔
 (a) کاسٹم (b) بائل (c) فضلہ (d) گلائیوسین
- 66- فضلہ کو عارضی طور پر کہاں ذخیرہ کیا جاتا ہے؟
 (a) جگر میں (b) لیرنکس میں (c) ریکٹم میں (d) گال بلیڈر میں
- 67- ایک بالغ انسان میں جگر کہاں پایا جاتا ہے؟
 (a) معدے کی بائیں جانب (b) پنکریاس کے پیچھے (c) معدے کی دائیں جانب (d) لارج انٹسٹائن کے قریب
- 68- ایک بالغ انسان میں جگر کا وزن کتنا ہوتا ہے؟
 (a) 0.5 گلوگرام (b) 1.0 گلوگرام (c) 1.5 گلوگرام (d) 2.5 گلوگرام
- 69- جگر کی خلی یعنی وینٹرل جانب ایک تھیلانما آرگن کھلاتا ہے۔
 (a) پنکریاس (b) ریکٹم (c) معدہ (d) گال بلیڈر
- 70- بائل پیدا کرتا ہے۔
 (a) گال بلیڈر (b) پنکریاس (c) گال بلیڈر (d) ریکٹم
- 71- بائل ذخیرہ کیا جاتا ہے۔
 (a) جگر (b) پنکریاس (c) گال بلیڈر (d) ریکٹم

- 72- بائلس کا فنکشن کیا ہے؟
 (a) پروٹینز کو ڈائیجسٹ کرنا (b) فائبرس کو توڑنا (c) گلوکوز کو تبدیل کرنا (d) معدے کو نیوٹرائز کرنا
- 73- جگر ذخیرہ کرتا ہے۔
 (a) فائبرس میں حل پذیر وٹامنز (b) پانی میں حل پذیر وٹامنز (c) فائبرس ایسڈز (d) منرلز
- 74- جگر جب امائنو ایسڈز کو توڑتا ہے تو کون سی زہریلی شے پیدا ہوتی ہے۔
 (a) یوریا (b) امونیا (c) الکحل (d) کاربن ڈائی آکسائیڈ
- 75- جگر زہریلی امونیا کو کس میں تبدیل کرتا ہے؟
 (a) کیریوٹین (b) یوریا (c) بائلس (d) گلائیکوجن

1.3 ڈائیجسٹو سسٹم کی بیماریاں (DISORDERS OF THE DIGESTIVE SYSTEM)

- 76- کس بیماری میں بار بار پتلے یا پانی والے پاخانے آتے ہیں؟
 (a) قبض (b) السر (c) دمہ (d) اسہال (ڈائریا)
- 77- کثرت سے فلوئڈ ز پیٹا، ہلکی غذا کھانا، اسہال کش ادویات کا استعمال کس کا علاج ہے؟
 (a) السر (b) قبض (c) ڈائریا (d) دمہ
- 78- ایسی حالت جس میں فضلہ باقاعدہ وقفوں سے جسم سے خارج نہیں ہوتا۔
 (a) ڈائریا (b) قبض (c) السر (d) ڈیٹیکٹی
- 79- خوراک میں قابض کی کمی، پانی کی کمی اور جسمانی سرگرمی کی کمی کس کے اسباب ہیں۔
 (a) نمونیا (b) ایسٹی سیما (c) ڈائریا (d) قبض
- 80- گیسٹرک السر اس زخم کو کہتے ہیں جو ہوتا ہے۔
 (a) معدے کی دیواروں میں (b) ڈیوڈینم میں (c) ایسوفیگس (d) لارج انٹسٹائن
- 81- السر کی عام علامات ہیں:
 (a) گہرا پیشاب اور پیاس (b) پیٹ میں جلن اور درد (c) بار بار پتلا پاخانہ آنا (d) منہ کا خشک ہونا

اجوابات

- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| (b) -5 | (c) -4 | (d) -3 | (d) -2 | (c) -1 |
| (d) -10 | (d) -9 | (b) -8 | (c) -7 | (b) -6 |
| (c) -15 | (b) -14 | (b) -13 | (b) -12 | (b) -11 |
| (c) -20 | (d) -19 | (c) -18 | (b) -17 | (c) -16 |
| (d) -25 | (c) -24 | (c) -23 | (c) -22 | (b) -21 |
| (c) -30 | (b) -29 | (b) -28 | (c) -27 | (c) -26 |
| (a) -35 | (d) -34 | (c) -33 | (a) -32 | (b) -31 |
| (a) -40 | (c) -39 | (c) -38 | (c) -37 | (d) -36 |
| (c) -45 | (c) -44 | (c) -43 | (c) -42 | (b) -41 |
| (d) -50 | (d) -49 | (c) -48 | (b) -47 | (d) -46 |
| (c) -55 | (b) -54 | (b) -53 | (b) -52 | (c) -51 |
| (c) -60 | (b) -59 | (a) -58 | (d) -57 | (c) -56 |

(c) -65

(b) -64

(b) -63

(b) -62

(b) -61

(b) -70

(d) -69

(c) -68

(c) -67

(c) -66

(b) -75

(b) -74

(a) -73

(b) -72

(c) -71

(a) -80

(d) -79

(b) -78

(c) -77

(d) -76

(b) -81

اضافی مختصر سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

1.1 نیوٹریشن اور اس کی اہمیت (NUTRITION AND ITS IMPORTANCE)

- 1- ہمارا جسم نیوٹرینٹس کیسے حاصل کرتا ہے؟
جواب: نیوٹرینٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا جسم خوراک کو پہلے سادہ اجزاء میں توڑتا ہے تاکہ جسم کے سیلز انھیں جذب کر سکیں۔ یہ عمل ہمارے ڈائی جیسٹو سسٹم میں ہوتا ہے۔
- 2- نیوٹریشن اور نیوٹرینٹس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
جواب: نیوٹریشن سے مراد ہے کہ جاندار کس طرح غذائی اجزاء حاصل کرتا ہے اور کیسے انھیں استعمال کرتا ہے۔ نیوٹرینٹس جانداروں کی نشوونما کرنے، صحت مند رہنے اور جسم کی مرمت کرنے میں مدد کرتے ہیں
- 3- نیوٹریشن کیوں اہم ہے؟
جواب: نیوٹریشن جانداروں کو نشوونما پانے، صحت مند رہنے اور جسم کی مرمت کرنے میں مدد کرتی ہے۔
- 4- نیوٹریشن میں شامل مراحل کے نام لکھیں۔
جواب: انجیشن • ڈائی جیشن • جذب • اسیملیشن • انجیشن
- 5- انجیشن کے عمل کی تعریف کریں۔
جواب: ٹھوس خوراک اور مشروبات کو جسم میں لے جانے کا عمل انجیشن کہلاتا ہے۔
- 6- ڈائی جیشن سے کیا مراد ہے؟
جواب: خوراک کو چھوٹے اجزاء میں توڑنا جنھیں جسم جذب کر سکے ڈائی جیشن کہلاتا ہے۔
- 7- اسیملیشن اور انجیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
جواب: اسیملیشن: جذب ہو جانے والے مواد کو سیلز اور ٹشوز میں استعمال کرنا اسیملیشن کہلاتا ہے۔
انجیشن: غیر ہضم شدہ خوراک اور دوسرے بیکار مواد کو جسم سے نکالنے کو انجیشن کہتے ہیں۔
- 8- جذب کی تعریف کریں۔
جواب: ہضم شدہ خوراک میں سے غذائی اجزاء کو خون اور لمف میں جذب کرنا جذب کہلاتا ہے۔
- 9- پولیمرز اور مونومرز میں فرق کریں۔
جواب: پولیمرز: پولیمرز وہ بڑے مالیکیول ہیں جو بہت سے مونومرز کے آپس میں ملنے سے بنتے ہیں۔
مثالیں: کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس

موجودہ: مونو مر ایک چھوٹا اور سادہ مالیکیول ہے جو بنیادی بلند نگ بلاک کے طور پر کام کرتا ہے۔
مثالیں: شوگرز، آکسائیڈز اور فٹسی ایسڈز۔

انسان کا ڈائی جیسٹو سسٹم (HUMAN DIGESTIVE SYSTEM)

1.2

- 10- ایلیمنٹری کینال سے کیا مراد ہے؟
جواب: انسان کا ڈائی جیسٹو سسٹم ایک لمبی نالی اور چند مددگار اعضا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نالی کو ایلیمنٹری کینال (alimentary canal) کہتے ہیں۔ یہ نالی منہ سے شروع ہو کر اینس (anus) پر ختم ہوتی ہے۔
- 11- چند مددگار اعضاء کس طرح ایلیمنٹری کینال میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟
جواب: سیلائٹوری گلینڈز (salivary glands)، جگر (liver) اور بلبلہ (pancreas) کی رطوبتیں ایلیمنٹری کینال میں پہنچتی ہیں اور خوراک کی ڈائی جیشن میں مدد کرتی ہیں۔
- 12- منہ کے پیچھے خالی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟
جواب: منہ کے پیچھے خالی جگہ کو اورل کیوٹی کہتے ہیں۔
- 13- اورل کیوٹی میں موجود کون سے ہائیڈرو جیکل اجزاء خوراک کے چکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟
جواب: اورل کیوٹی میں زبان کی سطح پر ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں جو خوراک کا ذائقہ چکھنے میں مدد دیتے ہیں۔
- 14- مکینیکل ڈائی جیشن کے دوران کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟
جواب: مکینیکل ڈائی جیشن کے دوران دانت خوراک کو توڑتے ہیں، اور اسے چھوٹے ٹکڑوں میں پیستے ہیں۔
- 15- کیمیکل ڈائی جیشن کے دوران اورل کیوٹی میں کیا ہوتا ہے؟
جواب: اورل کیوٹی میں سیلائٹوری گلینڈز (salivary glands) کے تین جوڑے کاربوہائیڈریٹس (carbohydrates) کی جزوی کیمیکل ڈائی جیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ گلینڈز اورل کیوٹی سے منسلک ہوتے ہیں اور سلائیوا (saliva) خارج کرتے ہیں۔
- 16- ڈائی جیشن میں سلائٹوری گلینڈز کا کردار بیان کریں۔
جواب: سلائٹوری گلینڈز سلائیوا بناتے ہیں جو پانی اور میوکس کا کچھر ہوتا ہے۔
- 17- سلائٹوری گلینڈز ڈائی جیسٹو اینزائم سلائٹوری ایمائی لیز خارج کرتے ہیں جو سٹارچ کو مالٹوز میں توڑتا ہے۔
جواب: سلائٹوری گلینڈز سلائٹوری میوکس اور سلائٹوری ایمائی لیز کا کچھر ہوتا ہے۔
- 18- بولس کیا ہے اور یہ فیرکس میں کیسے داخل ہوتا ہے؟
جواب: بولس: اورل کیوٹی میں موجود خوراک کا مجموعہ بولس کہلاتا ہے۔
اسے فیرکس کی طرف دھکیل کر نگلا جاتا ہے۔
- 19- نگلنے کے عمل کے مراحل لکھیں۔
جواب: بولس کے بننے کے بعد زبان اس کو منہ کی پچھلی جانب دھکیلتی ہے۔
• (ٹانگو) (بیلیٹ) اوپر کی طرف اٹھتا ہے تاکہ ناک کی کیوٹی کا راستہ بند ہو جائے۔
• زبان بولس کو فیرکس میں داخل کرتی ہے۔
• ٹریکیا کا اوپری حصہ اپنی گلاس کی جانب اوپر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔

• ہوا کی نالی کا سوراخ یعنی گلاش بند ہو جاتا ہے۔

• نگلی گئی خوراک بند نہ کیلئے اوپر سے گزر کر خوراک کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے۔

20- فیرکس کیا ہے؟

جواب: فیرکس: یہ اورل کیوبیٹی کے بعد ایک چھوٹا نالی نما (tube-like) حصہ ہے۔ یہ اورل کیوبیٹی کو ایسوفیگس (oesophagus) سے اور ناک کو ٹریکیا (trachea) سے جوڑتا ہے۔

21- فیرکس کا اہم فنکشن کیا ہے؟

جواب: فیرکس کا ایک اہم کام خوراک کے ذرات کو پیپیردوں میں جانے سے روکنا ہے۔ یہ کام ایک پلکار کارٹیلاج ٹشو (elastic cartilage tissue) یعنی ابی گلوٹیس (epiglottis) کی مدد سے کیا جاتا ہے۔

22- ابی گلاش اور گلاش میں فرق کریں۔

جواب: ابی گلاش: ابی گلاش ایک پلکار کارٹیلاج ٹشو ہے۔ اس کا کام خوراک کے ذرات کو ہوا کی نالی میں داخل ہونے سے بچانا ہے۔

23- نگلنے کے دوران ابی گلاش کا فنکشن بیان کریں۔

جواب: جب نگلی گئی خوراک فیرکس سے گزرتی ہے، تو ہوا کی نالی یعنی ٹریکیا (Windpipe means, trachea) کا اوپری حصہ ابی گلاش (epiglottis) کی جانب اوپر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہوا کی نالی کا سوراخ یعنی گلاش (glottis) بند ہو جاتا ہے اور نگلی گئی خوراک اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔

24- ایسوفیگس کی لمبائی بیان کریں۔

جواب: ایسوفیگس تقریباً 25 سینٹی میٹر یا 9.84 انچ لمبی نالی ہے۔

25- پیری شالس کیا ہے اور یہ خوراک کے لیے معدے میں داخل ہونے میں کس طرح مددگار ہے؟

جواب: پیری شالس: پیری شالس ایسوفیگس کی دیواروں میں لگاتار سکڑنے کی لہروں کی سیریز ہے۔ جب خوراک ایسوفیگس میں داخل ہوتی ہے تو اس کی مسکولر دیواروں میں لگاتار سکڑنے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سکڑنے کی لہریں خوراک کو ایسوفیگس کے ذریعہ معدے کی طرف لے جاتی ہیں۔

26- انسانی جسم میں معدہ کہاں پایا جاتا ہے؟

جواب: معدہ: شکل 'ا' کا آرگن جو ایڈومن میں اوپری بائیں جانب ڈایا فرام کے نیچے موجود ہوتا ہے۔

27- کارڈیک سفتکو کا کیا مقصد ہوتا ہے؟

جواب: ایسوفیگس اور معدہ کے جوڑ پر ایک مسلز کا حلقہ یعنی سفتکو (sphincter) موجود ہوتا ہے جسے کارڈیک سفتکو (cardiae sphincter) یا ایسوفیگس کا زیریں سفتکو (lower oesophageal sphincter) کہتے ہیں۔ یہ خوراک کو معدہ سے واپس ایسوفیگس میں جانے سے روکتا ہے۔

28- خوراک کی مکینیکل ڈائیجیشن میں معدہ کس طرح اپنا کردار ادا کرتا ہے؟

جواب: معدہ کی دیواریں موٹے سموتھ مسلز (smooth muscles) سے بنی ہوتی ہیں۔ جب خوراک معدہ میں پہنچتی ہے تو یہ مسلز زوردار طریقے سے سکڑتے ہیں۔ ان کا سکڑاؤ خوراک کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ اس ٹوٹنے (churning) کی وجہ سے حرارت (heat) بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت لیپڈز (lipids) کو پگھلانے میں مدد دیتی ہے۔

29- کیسٹرک جوس کے تین اہم اجزاء لکھیں۔

جواب: کیسٹرک جوس میں HCl، پیپسی نوجن اور میوکس شامل ہیں۔

30- میوکس کا فنکشن کیا ہے؟

جواب: میوکس معدہ کی اندرونی دیواروں پر ایک حفاظتی تہہ بناتا ہے۔ یہاں، یہ HCl کو غیر مؤثر (neutralizes) کرتا ہے۔

31- کالم کیا ہے؟

جواب: معدے میں ہونے والے اعمال کی وجہ سے خوراک ایک شور بے جیسا سچرہ بن جاتی ہے جسے کالم کہتے ہیں۔

32- پانکورک سفٹکو کا کیا کردار ہے؟

جواب: پانکورک سفٹکو کالم کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر بار جب پانی لورک سفٹکو کھلتا ہے کو 5 ملی لیٹر سے 15 ملی لیٹر کالم چھوٹی آنت یعنی سال انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے۔

33- سال انٹسٹائن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

جواب: سال انٹسٹائن (Small Intestine): سال انٹسٹائن بہت زیادہ بل دار نالی (coiled tube) ہے اور اس کی لمبائی قریباً 7 میٹر ہوتی ہے۔ اس کے تین حصے ہیں:

(i) ڈیوڈینم (Duodenum) پہلا حصہ ہے۔ یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔

(ii) جیجمنم (Jejunum) درمیانی حصہ ہے۔ یہ تقریباً 2.5 میٹر لمبا ہوتا ہے۔

(iii) ایلیم (Ileum) آخری حصہ ہے۔ یہ تقریباً 4 میٹر لمبا ہوتا ہے۔

34- سال انٹسٹائن میں بائل کا کردار بیان کریں۔

جواب: ڈیوڈینم میں خوراک پر جگر اور لبلبہ کی رطوبتیں (secretions) اثر کرتی ہیں۔ جگر کی رطوبت یعنی بائل (bile) ایک نالی یعنی کامن بائل ڈکٹ (common bile duct) کے ذریعے ڈیوڈینم میں داخل ہوتا ہے۔ بائل میں ایسے نمکیات ہوتے ہیں جو فٹس (fats) کو چھوٹے قطروں (droplets) میں توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح، ایک دودھیا مائع (milky fluid) بنتا ہے جس میں فٹس کے قطرے (fat droplets) الگ الگ رہتے ہیں۔

35- پنکریاٹک جوس میں کون سے اینزائمز پائے جاتے ہیں؟

جواب: پنکریاٹک جوس میں بہت سے اینزائمز ہوتے ہیں۔ مثلاً ٹریپسن، پنکریاٹک ایمپائی لینز اور لائی پیپز۔

36- پنکریاٹک جوس میں موجود اینزائمز کے فنکشن لکھیں۔

جواب: ٹریپسن: یہ پروٹینز کو ڈائی جیسٹ کرتا ہے۔

پنکریاٹک ایمپائی لینز: یہ کاربوہائیڈریٹس کو ڈائی جیسٹ کرتا ہے۔

لائی پیپز: یہ لیپڈز کو ڈائی جیسٹ کرتا ہے۔

37- ڈائی جیشن کے اختتامی پراڈکٹس کیا ہیں جو سرکولیٹری سسٹم میں چلے جاتے ہیں؟

جواب: خوراک کی مکمل ڈائی جیشن کے بعد اختتامی پراڈکٹس یعنی ایمائنو ایسڈز، سادہ شوگرز، گلیسرول اور فیٹی ایسڈز ایلیمنٹری کینال سے نکل کر سرکولیٹری (circulatory) سسٹم میں چلے جاتے ہیں۔

38- ولائی کی تعریف کریں اور یہیں سطح رقبہ کیسے بڑھاتے ہیں؟

جواب: ولائی لاکھوں انگی نما ہمار ہوتے ہیں جو سال انٹسٹائن کی تہہ دارد دیواروں پر ہوتے ہیں۔ ولائی خوراک کے انجذاب کے لیے بڑا سطحی رقبہ بناتے ہیں۔

39- کون سے دو بائیولوجیکل پروسس خوراک کے مالکیول ولائی کی دیواروں میں جذب ہوتے ہیں؟

جواب: ڈیفوژن اور ایکٹو ٹرانسپورٹ کے ذریعے خوراک کے مالکیول ولائی کی دیواروں میں جذب ہوتے ہیں۔

40- لیٹھلو کیا ہیں اور ڈائی جیشن میں ان کا کیا کردار ہے؟

جواب: لیٹھلو، لیٹھلو، وہ کمف ویسٹو ہیں جو سال انٹیکشن کے ولانی میں ہوتی ہیں۔

کردار: یہ گلاسروں اور فیٹی ایسڈز کو جذب کرتی ہیں اور انہیں ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔

41- اماٹو ایسڈز اور سادہ شوگرز کس طرح خون میں شامل ہوتے ہیں؟

جواب: اماٹو ایسڈز اور سادہ شوگرز سال انٹیکشن کے ولانی میں موجود بلڈ کپلرز کے ذریعے خون میں شامل ہوتے ہیں۔

42- ہپٹک پورٹل وین کا کیا فنکشن ہے؟

جواب: ہپٹک پورٹل وین اماٹو ایسڈز اور شوگرز کو جگر میں داخل کرتی ہیں۔

43- غیر ہضم شدہ مواد اور پانی کس طرح لارج انٹیکشن میں جاتے ہیں؟

جواب: غیر ہضم شدہ مواد اور پانی پیری سنالس کے ذریعے لارج انٹیکشن میں داخل ہوتے ہیں۔

44- لارج انٹیکشن کے حصوں کے نام لکھیں۔

جواب: لارج انٹیکشن کے تین حصے ہوتے ہیں۔

(i) سکیم (ii) کولون (iii) ریکٹم

45- فضلے کی تعریف کریں اور اس کے اجزاء بیان کریں۔

جواب: لارج انٹیکشن میں موجود غیر ہضم شدہ ٹھوس مواد کو فضلہ کہتے ہیں۔

اجزاء: اس میں خوراک کا ڈائی جیشن نہ ہونے والا حصہ، بہت سے بیکٹیریا، پلیمری کینال کے ٹوٹے ہوئے سیلز، بائل پکٹنس اور پانی ہوتا ہے۔

46- انسانی جسم میں جگر کہاں پایا جاتا ہے؟

جواب: جگر ایک بڑا آرگن ہے جو معدے کی دائیں جانب ہے۔

47- جگر کے دو افعال لکھیں۔

جواب: جگر کے افعال: (i) جگرفیٹ میں حل پذیر وٹامنز کو ذخیرہ کرتا ہے۔

(ii) جگرا مونیو کو کم زہریلے مادے یعنی یوریا میں تبدیل کرتا ہے تاکہ یہ پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جائے۔

1.3 ڈائی جیسٹو سسٹم کی بیماریاں (DISORDERS OF THE DIGESTIVE SYSTEM)

48- ڈائریا کیا ہے؟ اس کی وجوہات لکھیں۔

جواب: ڈائریا میں بار بار پتلے یا پانی والے پاخانہ آتے ہیں۔ ڈائریا جسم میں پانی کی کمی (dehydration) کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر بچوں

اور بزرگوں میں۔

49- ڈائریا کی علامات کیا ہیں؟

جواب: علامات (Signs and Symptoms): بار بار پتلے یا پانی والے پاخانہ، پیٹ میں درد (cramps or pain)، پیٹ کا پھولنا

(bloating)، اور پانی کی کمی، منہ کا خشک ہونا، گہرا پیشاب۔

50- قبض کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات بیان کریں۔

جواب: قبض ایک ایسی کیفیت ہے جس میں فضلہ/پاخانہ باقاعدہ وقفوں سے جسم سے خارج نہیں ہوتا۔

51- قبض سے کیسے بچا جاسکتا ہے؟

جواب: قبض سے بچاؤ: فابھر سے بھر پور غذا کھانے اور کثرت سے پانی پینے سے قبض سے بچا جاسکتا ہے۔

52- ہیکٹس السر سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایسٹنٹری کینال کی دیواروں میں ہونے والے زخم پپٹک (peptic) السر کہلاتے ہیں۔ السر عام طور پر معدہ کی دیواروں میں پیدا ہوتا ہے اور اسے کیسٹرک السر (gastric ulcer) کہا جاتا ہے۔ تاہم، السر ڈیوڈینم (ڈیوڈینل السر- duodenal ulcer) یا ایسوفیگس (ایسوفیگل السر- oesophageal ulcer) میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔

53- السر کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: السر کی اقسام درج ذیل ہیں: کیسٹرک السر، ڈیوڈینل السر یا ایسوفیگل السر

54- السر کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟

جواب: علاج (Treatment): ایچ پائلوری (H.pylori) انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس: اینٹ ایسڈز (antacids) اور پروٹون پمپ انہیبرز (proton pump inhibitors) نامی ادویات۔

حل مشقی سوالات

A کثیر الانتخابی سوالات

A- درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

1- سال انٹسٹائن کے تین حصے، درست ترتیب کے ساتھ ہیں:

(الف) ڈیوڈینم، جیونم، ہیکٹم (ب) ایٹم، ڈیوڈینم، جیونم (ج) کولون، سیکم، ریکٹم (د) سیکم، کولون، ریکٹم

2- مسلز کی امواج میں حرکت، جو ڈائی جیسٹو سسٹم میں خوراک آگے کی جانب لے جاتی ہے:

(الف) کیمیکل ڈائی جیشن (ب) میکانیکل ڈائی جیشن (ج) فیزیکی خالص (د) ایئر اپشن (انجذاب)

3- ڈائی جیسٹو سسٹم کا وہ حصہ جہاں کوئی کیمیکل ڈائی جیشن نہیں ہوتی:

(الف) اورل کیوٹی (ب) ایسوفیگس (ج) معدہ (د) ڈیوڈینم

4- اینزائمز کا کون سا گروپ شارچ اور دوسرے کاربوہائیڈریٹس کو توڑتا ہے؟

(الف) پروٹینیز (ب) لائی پیز (ج) ایمائی لیزز (د) پیپسن

5- ہٹکریاز ڈائی جیسٹو اینزائمز میں سے ہے اور انھیں خارج کرتا ہے:

(الف) کولون میں (ب) گال بلیڈر میں (ج) جگر میں (د) ڈیوڈینم میں

6- معدے میں پیپسی نو جن کس کے عمل سے پیپسن میں تبدیل ہو جاتا ہے؟

(الف) بائل نمکیات (ب) ہارمونز (ج) HCl (د) بائی کاربونیٹ

7- ڈائی جیسٹو سسٹم کے کون سے حصے میں کاربوہائیڈریٹس، لپڈز اور پروٹینز کو ڈائی جیسٹ کیا جاتا ہے؟

(الف) اورل کیوٹی (ب) معدہ (ج) سال انٹسٹائن (د) لارج انٹسٹائن

8- اینزائم ٹریپسن کس رطوبت میں موجود ہوتا ہے؟

(الف) ہٹکریازک جوس (ب) بائل (ج) کیسٹرک جوس (د) سیلائو

9- گالا بلینڈ ہے بالی کاسن پائل ڈکٹ کے ذریعے کہاں پہنچتا ہے؟

(الف) معدہ (ب) ڈیوڈنٹم (ج) کولون (د) پنکریاز

10- سال انشائن میں بہت زیادہ تھیں کیوں ہوتی ہیں اور ہاں ولانی اور مائیکروویلی (microvilli) کیوں ہوتے ہیں؟

(الف) خوراک کے گزرنے کی رفتار کو کم کرنے کے لیے (ب) خوراک کا انجذاب تیز کرنے کے لیے
(ج) کائیم کے پیچھے کی طرف بہاؤ کو روکنے کے لیے (د) اینزائمز پیدا کرنے کے لیے

جوابات

1- (الف)	2- (ج)	3- (ب)	4- (ج)	5- (د)	6- (ج)	7- (ج)	8- (الف)	9- (ب)	10- (ب)
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------

B- مختصر جوابات لکھیں۔

1- سلائیوری گلینڈز کا ڈائی جیشن (انہضام) میں کیا کردار ہے؟ بیان کریں۔

جواب: سلائیوری گلینڈز سلائیو بناتے ہیں جو کہ پانی اور میوکس کا مکسچر ہوتا ہے۔

سلائیوری گلینڈز ڈائی جیسٹو اینزائم سلائیوری ایمائی لیز خارج کرتے ہیں جو کہ شارچ کو مالٹوز میں توڑتا ہے۔

2- نگلنا اور پیری شالس کی اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟

جواب: نگلنا: نگلنا وہ عمل ہے جس کے ذریعے خوراک اور لیکیوٹی سے ایسوفیگس میں داخل ہوتی ہے۔

پیری شالس: مسکوڑیوں میں نگلنا سگرنے کی لہروں کو پیری شالس کہتے ہیں۔

3- کیسٹرک جوس میں موجود ہائیڈروکلورک ایسڈ کے کیا افعال ہیں؟

جواب: (i) ہائیڈروکلورک ایسڈ پیپسی نوجن (pepsinogen) کو ایک فعال اینزائم یعنی پیپسن (pepsin) میں تبدیل کرتا ہے۔

(ii) ہائیڈروکلورک ایسڈ خوراک میں موجود بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا (pathogenic bacteria) کو بھی مار ڈالتا ہے۔

4- پنکریاٹک جوس خوراک کی ڈائی جیشن میں کیا کردار ادا کرتا ہے، بیان کریں؟

جواب: (i) پنکریاٹک جوس میں کئی اینزائمز پائے جاتے ہیں مثلاً ٹریپسن (trypsin)، پنکریاٹک ایمائی لیز (pancreatic amylase) اور لائی

پیز (lipase)۔ یہ اینزائمز پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور لیپڈز کے ہاضمے میں مدد دیتے ہیں۔

(ii) پنکریاٹک جوس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے جو کائیم کی تیزابیت کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔

5- ولانی کی ساخت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔

جواب: ولانی لاکھوں انگلی نما ابھار ہوتے ہیں جو سال انشائن کی تہہ واردیواروں پر ہوتے ہیں۔ ولانی خوراک کے انجذاب کے لیے بڑا سطحی رقبہ بناتے ہیں۔

6- السر کی وجوہات اور علامات کیا ہیں؟

جواب: ● علامات (Signs and Symptoms): پیٹ میں جلن اور درد؛ اُگلنے (regurgitation) کے بعد سلائیوا (saliva) کا تیزی

سے منہ میں آ جانا؛ بھوک میں کمی؛ وزن میں کمی؛ خون کی الٹی (شدید صورتوں میں)۔

● اسباب (Causes): ہیلیکوبیکٹر پائلوری (Helicobacter pylori) بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن؛ غیر سٹیرائڈل سوزش کش ادویات

(NSAIDs-nonsteroidal anti-inflammatory drugs) کا طویل المدتی استعمال؛ شراب کا زیادہ استعمال؛ تمباکو نوشی؛ ذہنی

دباؤ/تناؤ (stress) (اگرچہ یہ براہ راست وجہ نہیں لیکن یہ علامات کو بگاڑ سکتا ہے)۔

1- چھوٹی آنت میں خوراک کا انجذاب بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال (8) کا جواب۔

2- ڈائی جیسٹو سسٹم میں اورل کیوٹی کے کردار کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال (3) کا جواب۔

3- معدہ کی ساخت اور افعال کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال (6) کا جواب۔

4- ڈائی جیشن میں جگر اور پتھر یا ز کی اہمیت کا جواز پیش کریں۔

جواب: جگر کا کردار: جواب کے لیے دیکھیے سوال (10) کا جواب۔

پتھر یا ز کا کردار: پتھر یا ز کی رطوبت یعنی پتھر یا ٹک جوس (pancreatic juice)، پتھر یا ٹک ڈکٹ (pancreatic duct) کے ذریعے ڈیوڈینم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پتھر یا ٹک ڈکٹ ڈیوڈینم میں داخل ہونے سے پہلے کاسن بال ڈکٹ میں کھل جاتی ہے۔

پتھر یا ٹک جوس میں کئی اینزائمز پائے جاتے ہیں مثلاً ٹریپسن (trypsin)، پتھر یا ٹک ایمائی لیز (pancreatic amylase) اور لائیپیز (lipase)۔ یہ اینزائمز پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور لیپڈز کے ہاضمے میں مدد دیتے ہیں۔ پتھر یا ٹک جوس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے جو کاسم کی تیزابیت کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ انشاسن کی دیواروں میں موجود گلینڈز بھی اینزائمز خارج کرتے ہیں جو تمام اقسام کی خوراک کی ڈائی جیشن کو مکمل کرتے ہیں۔

D- تشخیصی سوالات:

1- کسی ایسے شخص کو جسے جگر کی بیماری ہو، اسے فیس کو ہضم کرنے میں دشواری کیوں پیش آتی ہے؟

جواب: جگر کے مریض کو فیس کو ہضم کرنے میں دشواری ہوتی ہے کیونکہ جگر بال بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بال فیس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جگر کی بیماری میں بال کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فیس اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی۔

2- ایلیمینٹری کینال (گٹ) کے بیکٹیریا کا صحت مند توازن برقرار رکھنا کیوں اہم ہے؟

جواب: ایلیمینٹری کینال کے بیکٹیریا کا صحت مند توازن برقرار رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خوراک کے اچھی طرح ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے اور آنتوں میں نقصان دہ جراثیم کی افزائش کو روکتا ہے۔

3- کارڈیک سفنکلو میں خرابی تیزابی مواد کے معدے سے واپسی بہاؤ کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟

جواب: کارڈیک سفنکلو ایک مسکولر رینگ ہے جو خوراک کی نالی اور معدے کے جنکشن پر موجود ہوتا ہے۔ اس کا کام خوراک اور معدے کے ایسڈ کو واپس خوراک کی نالی میں جانے سے روکتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک سے بند نہ ہو یا خراب ہو جائے تو HCl خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے جس سے جلن پیدا ہوتی ہے جسے ایسڈ ریفلکس کہتے ہیں۔

4- بال کو خارج ہونے سے پہلے گال بلیڈر میں ذخیرہ کرنا کیوں ضروری ہے؟

جواب: گال بلیڈر بال کو ذخیرہ کرنے کا کام کرتا ہے تاکہ اسے گاڑھا کیا جاسکے اور ضرورت کے وقت زیادہ مقدار میں خارج کیا جاسکے۔ خاص طور پر جب کاسم ہال انشاسن میں داخل ہوتا ہے۔ یہ معدے کے ایسڈ کا کم کوفوری طور پر غیر موثر کرنے اور فیس کے موثر طور پر ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

