


اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ:

- وضاحت کریں کہ سائنس آئنک کمپاؤنڈز ہیں جو مخالف چارج رکھنے والے آئنوں کے درمیان الیکٹروسٹیٹک قوت کشش کی وجہ سے بنتے ہیں (جس میں مثبت آئن ہیں سے آتا ہے اور منفی آئن ایسڈ سے آتا ہے)۔
- وضاحت کریں کہ ایس۔ ٹی۔ پی (STP) پر سائنس ٹھوس کیوں ہوتے ہیں اور ان کے میلنگ پوائنٹس بھی زیادہ کیوں ہوتے ہیں۔
- بیان کریں کہ عام حالات میں آئنک کمپاؤنڈز اپنے لیٹس سٹرکچرز کے ساتھ ٹھوس حالت میں پائے جاتے ہیں۔
- وضاحت کریں کہ کچھ گھلے ہوئے سائنس یا سائنس کے آبی سلوشنز آزادانہ حرکت کرنے والے آئنز کی موجودگی کی وجہ سے بجلی کے کنڈکٹر ہوتے ہیں۔
- سائنس کی حل پذیری کے عمومی اصول بیان کریں۔ (جن میں درج ذیل شامل ہیں):

- (الف) سوڈیم نائٹریٹ اور پوٹاشیم اور امونیم سائنس (ب) لیڈ اور سلور کلورائیڈ کے علاوہ باقی سارے کلورائیڈز حل پذیر ہیں
- (ج) سوڈیم پوٹاشیم اور امونیم کاربونیٹس کے علاوہ تمام کاربونیٹس غیر حل پذیر ہیں۔
- (د) سوڈیم، پوٹاشیم، امونیم اور میگنیشیم (جزوی طور پر) ہائیڈروآکسائیڈز کے علاوہ باقی تمام ہائیڈروآکسائیڈز غیر حل پذیر ہیں۔



ایسڈز اور الکلیز کے ری ایکشنز (یعنی نائٹریٹیشن) کے دوران، ایسڈز کے اضافی مقدار میں موجود میٹلز، غیر حل شدہ پیسز اور غیر حل شدہ کاربونیٹس کے ساتھ ری ایکشنز کے نتیجے میں بننے والے سائنس کی تیاری اور ان کو خالص حالت میں حاصل کرنے کے طریقے بیان کریں۔

انشائی طرز سوالات

مکمل تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

سائنس میں آئنز کی ترتیب (Arrangement of Ions in Salts)	18.1
آئنک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس (Melting Points of Ionic Compounds)	18.2
آئنک کمپاؤنڈز کی کنڈکٹیویٹی (Conduction of Electricity by Ionic Compounds)	18.3


سوال 1: (الف) نیوٹرلائزیشن ری ایکشن کیا ہے؟ اس کی مثال دیں۔

جواب: نیوٹرلائزیشن ری ایکشن (Neutralization Reaction):

جب ایسڈز، پیسز یا الکلیز کی نیوٹرلائز کرتے ہیں تو سائنس اور پانی بنتے ہیں۔

مثال: سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ جو ایک الکلی ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ کی نیوٹرلائز کر کے سوڈیم کلورائیڈ اور پانی بناتی ہے۔

اس رمی ایکشن (Neutralization) ایکشن کہتے ہیں۔



مساوات:

(ب) سالٹ کی تعریف کریں۔ سالٹس کیسے بنتے ہیں؟

جواب: سالٹس (Salts):

سالٹ مثبت اور منفی چارج والے آئنز کے ملنے سے بنتا ہے۔

الیکٹروسٹیٹک کشش کی قوتوں کا کردار: مخالف چارج رکھنے والے یہ آئنز پھر الیکٹروسٹیٹک (Electrostatic) کشش کی قوتوں سے ایک دوسرے سے بانڈز بناتے ہیں۔ اس بننے والے بانڈ کی طاقت کا انحصار چارجز کی مقدار اور ان کے درمیان فاصلے پر ہے۔

سوال 2: کرشل لیٹس کیا ہے؟ سوڈیم کلورائیڈ کرشل کے بننے کی وضاحت کریں۔

جواب: کرشل لیٹس (Crystal Lattice):

یہ مخالف چارج رکھنے والے آئنز پھر باقاعدگی کے ساتھ اور ایک ہی انداز میں تینوں سمتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تینوں اطراف میں پھیلا ہوا یہ مربوط سٹرکچر (Structure) کرشل لیٹس (Crystal Lattice) کہلاتا ہے۔

آئینک کمپاؤنڈز کے فوائد: آئینک کمپاؤنڈز (Ionic Compounds) جو خواص رکھتے ہیں یہ اس باقاعدہ سٹرکچر کی وجہ سے ہیں۔ پائیدار اور پختہ کے عام حالات میں یہ آئینک کمپاؤنڈز کرشلائن ٹھوس (Crystalline Solids) کے طور پر پائے جاتے ہیں۔

وجود برقرار رکھتے ہیں۔

سوڈیم کلورائیڈ کرشل (Sodium Chloride Crystal): سوڈیم کلورائیڈ میں ہر ایک سوڈیم آئن کے گرد چار کلورائیڈ آئنز اور ہر کلورائیڈ آئن کے گرد چار سوڈیم آئنز کی شکل فیس سینٹرڈ (Face-Centered) کیوب کی طرح کی ہوتی ہے۔

گرد بھی چھ سوڈیم آئنز ہوتے ہیں۔ اس کرشل لیٹس کی شکل فیس سینٹرڈ (Face-Centered) کیوب کی طرح کی ہوتی ہے۔

سوال 3: آئینک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹ عام طور پر زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: مضبوط الیکٹروسٹیٹک کشش کی قوتیں (Strong Electrostatic Forces of Attractions):

چونکہ آئینک کمپاؤنڈز کے کرشل لیٹس میں موجود آئنز کے درمیان کشش کی بہت مضبوط قوتیں ہوتی ہیں اس لیے ان طاقت ور قوتوں کو توڑنے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آئینک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

وضاحت: میلنگ کے عمل کے دوران کشش کی یہ قوتیں ٹوٹ کر آئنز کو آزاد کر دیتی ہیں۔ آئینک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں اس کا انحصار آئنز پر موجود چارجز کی مقدار اور ان کے سائز پر ہے۔ چارجز کی یہ مقدار جتنی زیادہ ہوگی اور آئنز کے سائز جتنے چھوٹے ہوں گے کشش کی قوتیں ان کے درمیان اتنی ہی زیادہ ہوں گی اور اتنے ہی زیادہ ان کے میلنگ پوائنٹس ہوں گے۔

سوال 4: آئینک کمپاؤنڈز ٹھوس حالت میں بجلی کنڈکٹ کیوں نہیں کرتے جبکہ پگھلی ہوئی حالت میں اور پانی میں حل ہو کر بجلی کنڈکٹ کرتے ہیں؟

جواب: آئینک کمپاؤنڈز (Ionic Compounds):

آئینک کمپاؤنڈز ٹھوس حالت میں کنڈکٹر نہیں ہیں لیکن جب ان کو پگھلایا جاتا ہے یا پھر پانی میں حل کیا جاتا ہے تو بجلی ان میں سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھوس حالت میں آئینک کمپاؤنڈز میں موجود آئنز مضبوط کشش کی قوتوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اس لیے بجلی بھی ان میں سے نہیں گزر سکتی۔

آئینک کمپاؤنڈز پگھلی ہوئی حالت میں: تاہم جب آئینک کمپاؤنڈز کو پگھلایا جاتا ہے تو ان میں موجود آئنز آزاد ہو کر بجلی کے کنڈکٹر بن جاتے ہیں۔

آئینک کمپاؤنڈ پانی میں حل کیا جاتا ہے تو ان میں موجود آئنز کے درمیان کشش کی قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس بار پھر یہ آئنز آزادانہ حرکت کرنے کے قابل ہو کر بجلی کے کنڈکٹر بن جاتے ہیں۔ آئینک کمپاؤنڈز پانی میں حل ہو کر بہت اچھے الیکٹرولائٹس (Electrolytes) بن جاتے ہیں۔

18.4 حل پذیر اور ناعحل پذیر سالتس (Soluble and Insoluble Salts)

18.5 پانی میں حل پذیر سالتس کی تیاری (Preparation of Soluble Salts)

سوال 5: وضاحت کریں کہ کون سے سالتس پانی میں حل ہوتے ہیں اور کون سے حل نہیں ہوتے؟

جواب: سالتس کی حل پذیری (Solubility of Salt):

ایک سالت کی کسی سولیوینٹ میں حل پذیری کا انحصار بہت سے عوامل پر ہے جن میں بذات خود سالت کی نوعیت اور ٹمپریچر زیادہ اہم ہیں۔ حل پذیر سالتس: سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیم کے سالتس پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام مٹلیک نائٹریٹس بھی پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور یہی بات زیادہ تر مٹلیک کلورائیڈز اور سلفیٹس کے لیے بھی کہی جاسکتی ہے۔ ناعحل پذیر سالتس: اس کے مقابلے میں تمام کاربونیٹس، ماسوائے سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیم کاربونیٹس کہ باقی سب پانی میں ناعحل پذیر ہیں اسی طرح سلور اور لیڈ کے کلورائیڈز اور بیرویم اور لیڈ کے سلفیٹس بھی پانی میں حل نہیں ہوتے۔ سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیم کے ہائیڈروآکسائیڈز پانی میں حل پذیر ہیں جبکہ کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ پانی میں بہت کم حل ہوتا ہے۔ بیریم اور میگنیشیم کے مٹلیک ہائیڈروآکسائیڈز پانی میں حل نہیں ہوتے۔


پانی میں سالتس کی حل پذیری

سالتس	حل پذیر	ناعحل پذیر
سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیم کے سالتس اور تمام مٹلیک نائٹریٹس	تمام حل پذیر	کوئی بھی نہیں
مٹلیک کلورائیڈز، برومائیڈز اور آئیوڈائیڈز	زیادہ تر حل پذیر	کوئی بھی نہیں
مٹلیک سلفیٹس	زیادہ تر حل پذیر	سلور اور لیڈ کے ناعحل پذیر
مٹلیک کاربونیٹس	سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیم حل پذیر	بیریم، لیڈ (II) اور کیلشیم کے ناعحل پذیر
مٹلیک ہائیڈروآکسائیڈز	سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیم حل پذیر	زیادہ تر ناعحل پذیر (کیلشیم مجروری حل پذیر)

سوال 6: حل پذیر سالتس کی تیاری کی وضاحت کریں۔

جواب: نائٹریٹیشن کا طریقہ (Titration Method):

پانی میں حل پذیر ایسڈ کو پانی میں حل پذیر بیس سے ری ایکشن کر کے اس طریقہ کو نائٹریٹیشن کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں پانی میں حل پذیر ایسڈ کاری ایکشن پانی میں حل پذیر بیس سے کیا جاتا ہے۔ ایسڈ اور بیس کا انتخاب تیار ہونے والے سالت کی نوعیت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ پانی میں حل پذیر پوٹاشیم نائٹریٹ کی تیاری: پانی میں حل پذیر پوٹاشیم نائٹریٹ کی تیاری کے لیے ایک کوئیٹل فلاسک میں پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ کے مخصوص والیوم کاری ایکشن نائٹرک ایسڈ کے مخصوص والیوم سے کیا جاتا ہے جس سے پوٹاشیم نائٹریٹ تیار ہو جاتا ہے۔ پانی میں حل پذیر ہونے کی وجہ سے یہ سلوشن کے اندر ہی رہتا ہے۔





اس سلوشن کو پھر تھنڈا کر ڈش (Evaporating Dish) میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر بننے والا سالٹ زیادہ ٹھیکر پھر تحلیل نہیں ہو جاتا تو اس سلوشن کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ سارا پانی بخارات بن کر اڑ جائے اور سالٹ باقی رہ جائے۔ اگر بننے والا سالٹ زیادہ ٹھیکر پھر تحلیل ہو جاتا ہے تو پھر اس سلوشن کا آہستہ گرم کرتے ہیں حتیٰ کہ سلوشن کی سطح پر بننے والے سالٹ کی پتلی سی جھلی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس سلوشن کو ٹھنڈا کریں تو پانی میں سے سالٹ نکل آتا ہے۔ اس آمیزے کو پھر فلٹر کر کے سالٹ کی کرشلز حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کرشلز کو فلٹر پیپر ز کی تہوں میں رکھ کر سکھا لیتے ہیں۔

سوڈیم سلفیٹ کرشلز کی تیاری:

- (i) ایک صاف ستھری کو نیکل فلاسک میں پپٹ کی مدد سے 1 mol/dm^3 , 50 cm^3 سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ ڈالیں۔
 - (ii) اس میں پھر فینا فتھلین (Phenolphthalein) اینڈی کیٹر (Indicator) کے چند قطرے ڈالیں جن سے سلوشن گلابی رنگ کا ہو جائے گا۔
 - (iii) بیورٹ میں لیے گئے 1 mol/dm^3 سلفیورک ایسڈ سلوشن کو آہستہ آہستہ اس کو نیکل فلاسک میں ڈالیں حتیٰ کہ سلوشن کا رنگ مستقل طور پر غائب ہو جائے۔
 - (iv) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے لیے گئے والیوم کی نیوٹرلائزیشن کے لیے سلفیورک ایسڈ کے استعمال ہونے والے والیوم کو بیورٹ سے نوٹ کریں۔
- $$2\text{NaOH}_{(aq)} + \text{H}_2\text{SO}_{4(aq)} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_{4(aq)} + 2\text{H}_2\text{O}$$
- (v) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور سلفیورک ایسڈ کے یہی والیوم استعمال کر کے اس ری ایکشن کو دوبارہ کریں لیکن اس بار اینڈی کیٹر استعمال نہیں کرنا۔
 - (vi) اسی نیوٹرل سلوشن کو پھر تغیری ڈش میں منتقل کر کے آہستہ آہستہ گرم کریں حتیٰ کہ سلوشن کا والیوم ایک تہائی رہ جائے۔
 - (vii) اس سلوشن میں ایک گلاس راڈ ڈبو کر اس کو باہر نکالیں۔
 - (viii) اگر گلاس راڈ کے ڈوبنے والا سر اوڑھ دیا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سلوشن اتنا مرکب ہو چکا ہے کہ اس میں کرشلز بن سکتی ہیں۔
 - (ix) سلوشن کو ٹھنڈا کریں تاکہ کرشلز تیز لیش کا عمل مکمل ہو سکے۔
 - (x) اس آمیزے کو پھر فلٹر کریں اور فلٹر پیپر کے اوپر موجود کرشلز کو ٹھنڈے اور ڈسلڈ پانی سے دھوئیں تاکہ کرشلز سے منسلک کثافتیں اور باقی ایسڈ باہر نکل جائے۔

(xi) ان کرشلز کو پھر فلٹر پیپر ز کی تہوں میں یا اوون (Oven) میں خشک کریں۔

سوال 7: پانی میں حل پذیر ایسڈ اور پانی میں نائل پذیر بیس کے ری ایکشن سے حل پذیر سالٹس کی تیاری کی وضاحت کریں۔



جواب: پانی میں حل پذیر ایسڈ اور پانی میں نائل پذیر بیس کے ری ایکشن سے:

یہ بھی ایک ایسا نیوٹرلائزنگ ری ایکشن ہے جس میں پانی میں حل پذیر ایسڈ اور پانی میں نائل پذیر بیس استعمال ہوتا ہے۔ پانی میں حل پذیر بیس کوئی موزوں میٹل آکسائیڈ، میٹل کاربونیٹ یا پھر میٹل ہائیڈروآکسائیڈ ہو سکتا ہے۔

ایسڈ اور بیس کا انتخاب: ایسڈ اور بیس کا انتخاب بنائے جانے والے سالٹ کی نوعیت دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سالٹ ایک ایسے ری ایکشن کے ذریعے بھی بنایا جاتا ہے جس میں ایسڈ اور بیس حصہ لیتے ہیں۔

ہلانا اور ملانا: اس طریقہ میں منتخب ایسڈ کو منتخب بیس یا ایک میٹل سے ملا یا جاتا ہے اور پھر اس سلوشن کو اچھی طرح ہلاتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ ایسڈ کا بیس یا میٹل کے ساتھ ری ایکشن مکمل ہو گیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ میٹل کو اتنی مقدار میں ایسڈ سے ملائیں تاکہ سارا ایسڈ لازمی طور پر استعمال ہو جائے۔

فلٹر کرنا: فلٹر کرنا کو پھر اتنا گرم کریں کہ سلوشن سیچورٹڈ (Saturated) حالت میں آجائے۔ اس سلوشن کو پھر ٹھنڈا کریں تاکہ سالٹ کی خالص کرشلز ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ ان کرشلز کو فلٹر کر کے خشک کر لیں۔




سوال 8: وضاحت کریں کہ آپ لیبارٹری میں زنک سلفیٹ کی کرشلز کس طرح تیاری کریں گے؟

جواب: زنک سلفیٹ کی کرشلز کی تیاری (Preparation Crystals of Zinc Sulphate):

درکار سامان: ایک بیکر • ایک ایوپورینگ ڈش • فلٹر پیپر

• ڈائیکوٹ سلفیورک ایسڈ • زنک میٹل کے دانے



کیمیکیل مساوات: زنک سلفیٹ کی خالص کرشلز کی تیاری:

(i) ڈائیکوٹ سلفیورک ایسڈ 25cm³ ایک بیکر میں ڈالیں اور اس کو آہستہ آہستہ گرم کریں۔

(ii) اس میں پھر آہستہ آہستہ زنک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں حتیٰ کہ زنک میٹل نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے۔

(iii) سلوشن میں سے زنک میٹل نکالنے کے لیے اسے فلٹر کریں اور فلٹریٹ حاصل کر لیں۔

(iv) اس فلٹر کا پیپر تھیں ڈش میں گرم کر کے مرکز سلوشن بنائیں۔

(v) سلوشن کو اتنا گرم نہ کریں کہ وہ بجلا شروع ہو جائے۔

(vi) سلوشن کو پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا کریں اور کرشلز کو بیٹھنے دیں۔

(vii) جب ساری کرشلز ظاہر ہو جائیں تو سلوشن کو فلٹر کر کے کرشلز حاصل کریں۔

فوری جانچ 18.1

سوال 1: سوڈیم کلورائیڈ میں موجود آئنز کس طرح خود کو ترتیب دے کر کرشل لیں بناتے ہیں؟

جواب: سوڈیم کلورائیڈ میں ہر سوڈیم آئن کے گرد چھ کلورائیڈ آئن ہوتے ہیں اور ہر کلورائیڈ آئن کے گرد چھ سوڈیم آئن ہوتے ہیں۔ یہ آئنز ایک فیس سینٹر کیوب کی شکل میں کرشل لیں میں ترتیب پاتے ہیں۔ بڑے کلورائیڈ آئن کیوب کے کونوں اور ہر سطح کے مرکز پر ہوتے ہیں۔ چھوٹے سوڈیم آئن کیوب کے کناروں پر موجود ہوتے ہیں۔

سوال 2: آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پوٹاشیم کلورائیڈ (KCl) کا میلنگ پوائنٹ سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) سے زیادہ ہوتا ہے یا کم؟

جواب: پوٹاشیم کلورائیڈ (KCl) کا میلنگ پوائنٹ سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) سے کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوٹاشیم آئن سوڈیم آئن سے بڑا ہوتا ہے جس کے باعث الیکٹرونیک قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بانڈز آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ چھوٹے کیلکائن مضبوط آئینک ترتیب بناتے ہیں جسے پگھلانے کے لیے زیادہ حرارت درکار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بڑے آئن کمزور لیں سٹرکچر بناتے ہیں۔

فوری جانچ 18.2

سوال 1: بیریم اور کیلشیم کے کون سے سالتس پانی میں حل ہو جاتے ہیں؟

جواب: بیریم کے حل پذیر سالتس: بیریم نائٹریٹ • بیریم کلورائیڈ

کیلشیم کے حل پذیر سالتس: کیلشیم نائٹریٹ • کیلشیم کلورائیڈ

سوال 2: بیریم سلفیٹ کو تجربہ گاہ میں کیسے بنایا جاتا ہے؟

جواب: بیریم سلفیٹ کو لیبارٹری میں رسوب سازی (پریسیپیشن) کے عمل کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔

طریقہ کار: (i) دو مل پانی کو اجالت سلوٹھ کو آپس میں ملائیں جن میں سے ایک میں بیریم آئنز اور دوسری میں سلفیٹ آئنز ہوں۔



(ii) بیریم سلفیٹ سفید ٹھوس اسوب کی شکل میں بنتا ہے جو کہ پانی میں حل نہیں ہوتا۔

(iii) مکچر کو فلٹر کر کے ٹھوس کر شلر اکٹھے کریں۔

دلچسپ معلومات

- عام ملنے والا سالٹ ماضی میں بڑا اہم تجارتی مال سمجھا جاتا تھا۔ اس کو کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔
- کارپسلفیٹ کو ٹنگس ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ دوسرے سالٹس پانی کو سافٹ کرنے اور شیشہ بنانے کام آتے ہیں۔



معروضی طرز سوالات

اضافی کثیر الانتخابی سوالات

یہ تمام سوالات کی مشقی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

18.1	سالتس میں آئنز کی ترتیب
18.2	آئینک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس
18.3	آئینک کمپاؤنڈز کی کنڈکٹیویٹی

درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- جب ایک ایسڈ (acid)، بیس (base) یا الکل کو نیوٹرلائز کرتا ہے تو بنیادی طور پر کون سی اشیائیں بنتی ہیں؟
 (a) نمک اور پانی (b) نمک اور ہائیڈروجن گیس (c) نمک اور ایک دھات (d) نمک اور ایک آکسائیڈ
- 2- ری ایکشن $NaOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟
 (a) ہائیڈروکلورک ایسڈ (b) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (c) سوڈیم کلورائیڈ (d) ہائیڈروجن آکسائیڈ
- 3- سالت میں مخالف چارج والے آئنز کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے کون سی فورس ذمہ دار ہوتی ہے؟
 (a) نیوکلیر فورس (b) الیکٹروستیک فورس آف اٹریکشن (c) ہائیڈروجن فورس (d) میکینیک فورس
- 4- سالت میں آئنز کے ذریعے بننے والے قوی ڈائیمینشنل (three dimensional) نیٹ ورک ڈھانچے کو کیا کہا جاتا ہے؟
 (a) اٹاکم کلاؤڈ (b) مائع میٹلس (c) مالیکیول چین (d) کرشل لیٹس
- 5- درجہ حرارت اور دباؤ کے عام حالات میں آئینک کمپاؤنڈز کس حالت میں پائے جاتے ہیں؟
 (a) مائع حالت (b) قلمی ٹھوس (c) کیسی حالت (d) پلازما حالت
- 6- سوڈیم کلورائیڈ کے کرشل میں، ہر ایک انفرادی سوڈیم آئن کو کتنے کلورائیڈ آئنز نے گھیرا ہوتا ہے؟
 (a) چھ (b) سات (c) آٹھ (d) نو

7- NaCl کے ذرات کی جو میٹرککل شکل کیا ہے؟

- (a) ہیکساگونل پوزم (b) مکعب (c) فیس سینٹرڈ کیوب (d) اوکٹاہیڈرون

8- سوڈیم کرشل کیوب میں چھوٹے سوڈیم آئنز کہاں واقع ہوتے ہیں؟

- (a) کیوب کے کونوں پر (b) ہر رخ کے مرکز میں (c) کیوب کے کناروں پر (d) کیوب کے باہر تیرتے ہوئے

9- ماضی میں عام سالٹ کو کس طرح استعمال کیا جاتا تھا؟

- (a) بطور کرنی (b) بطور ایندھن (c) روشنی کے منبع کے طور پر (d) ریڈی ایشن کے منبع کے طور پر

10- آئیونک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آئنز کے درمیان _____ الیکٹروسیٹک فورسز موجود ہوتی ہیں۔

- (a) مضبوط (b) بہت مضبوط (c) کمزور (d) بہت کمزور

11- کشش کی قوتیں کس عمل کے دوران ٹوٹ جاتی ہیں اور آئنز کو آزادانہ حرکت کرنے دیتی ہیں؟

- (a) پگھلنا (b) ابلا (c) بخارات بننا (d) کشاف

12- آئیونک کمپاؤنڈز کس حالت میں بجلی نہیں گزارتے؟

- (a) پانی میں حل شدہ (b) پگھلی ہوئی حالت (c) ٹھوس حالت (d) ان میں سے کوئی نہیں

13- آئنز کس حالت میں مضبوط کشش کی قوتوں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں؟

- (a) مائع حالت (b) ٹھوس حالت (c) گیس کی حالت (d) یہ تمام

14- آئیونک کمپاؤنڈز کام کرتے ہیں بطور:

- (a) کمزور الیکٹرو لائٹس (b) برے الیکٹرو لائٹس (c) اچھے الیکٹرو لائٹس (d) طاقتور الیکٹرو لائٹس

15- زیادہ چار جڑ اور آئن کا چھوٹا سائز مضبوط کشش کا باعث بنتا ہے اور اس طرح:

- (a) بوائلنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں (b) میلنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں

- (c) بوائلنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں (d) میلنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں

16- آئنز کے درمیان کشش کی قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور آئنز دوبارہ آزادانہ حرکت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جب آئیونک کمپاؤنڈز:

- (a) ٹھوس حالت میں ہوں (b) پگھلی ہوئی حالت میں ہوں (c) پانی میں حل شدہ ہوں (d) b اور c دونوں

18.4 حل پذیر اور مائع پذیر سالتس

18.5 پانی میں حل پذیر سالتس کی تیاری

17- آئیونک کمپاؤنڈز کس حالت میں بجلی نہیں گزارتے؟

- (a) پگھلی ہوئی حالت (b) ٹھوس حالت (c) مائع حالت (d) آبی محلول

18- مادے کی کس حالت میں آئنز مضبوط کشش کی قوتوں کے ذریعے جڑے رہتے ہیں؟

- (a) ٹھوس حالت (b) مائع حالت (c) گیس کی حالت (d) یہ تمام

19- جب کسی آئیونک کمپاؤنڈ کو اس کے میلنگ پوائنٹ تک گرم کیا جاتا ہے تو اس کے آئنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

- (a) وہ ساکن ہو جاتے ہیں (b) وہ غائب ہو جاتے ہیں

- (c) وہ حرکت کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں (d) ان میں سے کوئی نہیں

20- جب کوئی آئیونک کمپاؤنڈ پانی میں حل ہوتا ہے تو اس کے آئنز کے درمیان کشش کی قوتیں:

- (a) مضبوط ہو جاتی ہیں (b) ٹوٹ جاتی ہیں (c) ویسی ہی رہتی ہیں (d) مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں

- 21- آئیوٹیک کیا ہے؟ (a) منجمد (b) بھنا (c) بخارات بنا (d) الگ/منتشر ہو جاتے ہیں۔
- 22- حل پذیری کے اصولوں کے مطابق، ان میں سے نمکیات کا کون سا گروپ پانی میں ہمیشہ حل پذیر ہوتا ہے؟ (a) سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیم نمکیات تمام (b) بیریم اور لیڈ سلفائیڈ (c) سلور اور لیڈ کلورائیڈز (d) یہ تمام
- 23- تمام کاربونیٹس پانی میں غیر حل پذیر ہوتے ہیں سوائے ان کاربونیٹس کے: (a) سوڈیم (b) پوٹاشیم (c) امونیم (d) یہ تمام
- 24- پانی میں حل پذیر ایسڈ اور پانی میں حل پذیر بیس کے درمیان ری ایکشن کو _____ بھی کہا جاتا ہے۔ (a) فلٹریشن (b) کرسٹلائزیشن (c) ٹائٹریشن میتھڈ (d) ایوپوریشن
- 25- پوٹاشیم ٹائٹریٹ (KNO_3) تیار کرنے کے لیے ٹائٹریشن کے طریقے میں کون سا ایسڈ اور اساس استعمال ہونا چاہیے؟ (a) ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ (b) سلفورک ایسڈ اور پوٹاشیم کاربونیٹ (c) نائٹرک ایسڈ اور پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ (d) نائٹرک ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ
- 26- درج ذیل میں سے کون سا سالٹ فیکس کش کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ (a) پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ (b) پوٹاشیم ٹائٹریٹ (c) سوڈیم کاربونیٹ (d) کارپسلیٹ
- 27- ایسڈ اور غیر حل پذیر بیس کے ری ایکشن میں کچھ سے اضافی غیر حل پذیر بیس کو نکالنے کے لیے کون سا قدم اٹھایا جاتا ہے؟ (a) فلٹریشن (b) ایوپوریشن (c) کرسٹلائزیشن (d) ہلانا
- 28- ان میں سے کون سا سالٹ عام طور پر پانی میں غیر حل پذیر ہوتا ہے؟ (a) سوڈیم کاربونیٹ (b) امونیم ٹائٹریٹ (c) لیڈ سلفیٹ (d) پوٹاشیم کلورائیڈ
- 29- درج ذیل میں سے کون سا سالٹ پانی میں صرف جزوی طور پر حل پذیر ہے؟ (a) پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ (b) کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ (c) امونیم ہائیڈروآکسائیڈ (d) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ
- 30- سلفیورک ایسڈ کے ساتھ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کون سا انڈیکیٹر استعمال کیا جاتا ہے؟ (a) میتھائل اورنج (b) فینوفتھالین (c) ٹمٹس (d) a اور b دونوں
- 31- رنگ کی کون سی تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ نیوٹرلائز ہو چکا ہے؟ (a) بے رنگ سے گلابی (b) گلابی سے بے رنگ (c) نیلے سے سرخ (d) سرخ سے بے رنگ
- 32- حل پذیر ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرنے کے لیے کس قسم کی غیر حل پذیر بیس استعمال کی جاسکتی ہے؟ (a) میٹل آکسائیڈ (b) میٹل کاربونیٹ (c) میٹل ہائیڈروآکسائیڈ (d) یہ تمام
- 33- اگر تیار کیا جانے والا سالٹ حرارت کے خلاف مستحکم ہو تو اسے سلوشن سے کیسے حاصل کیا جانا چاہیے؟ (a) فلٹریشن (b) مکمل کشش بخارات بنا (c) ٹھنڈا کرنا (d) گرم کرنا
- 34- خالص سالٹ کے کرسٹلز کو فلٹر کرنے کے بعد کیسے خشک کرنا چاہیے؟ (a) گرم کر کے (b) انہیں بیکر میں چھوڑ کر (c) فلٹر پیپر کی تہوں کے درمیان (d) ان میں سے کوئی نہیں

جوابات:

(b)	-10	(a)	-9	(c)	-8	(c)	-7	(a)	-6	(b)	-5	(d)	-4	(b)	-3	(c)	-2	(a)	-1
-----	-----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

(b) -20	(c) -19	(a) -18	(b) -17	(c) -16	(d) -15	(d) -14	(b) -13	(c) -12	(a) -11
(b) -30	(b) -29	(c) -28	(a) -27	(d) -26	(c) -25	(c) -24	(d) -23	(a) -22	(d) -21
						(c) -34	(b) -33	(d) -32	(b) -31

اضافی مختصر سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

سائنس میں آنسز کی ترتیب	18.1
آئینک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس	18.2
آئینک کمپاؤنڈز کی کنڈکٹیویٹی	18.3



مختصر جواب دیں

- 1- نیوٹرلائزیشن ری ایکشن کیا ہے؟
جواب: جب ایسڈ (acids) بیس، الکلیز (bases) کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو سالم اور پانی بنتے ہیں۔ اس ری ایکشن کو نیوٹرلائزیشن کہا جاتا ہے۔
- 2- نیوٹرلائزیشن ری ایکشن کے لیے متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔
جواب: $\text{NaOH}_{(aq)} + \text{HCl}_{(aq)} \longrightarrow \text{NaCl}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$
- 3- لفظ سالم کی تعریف کریں۔
جواب: سالم مثبت اور منفی آنسز کا ایک کیمیائی مجموعہ ہے۔
- 4- جب ایک ایسڈ کسی بیس یا الکلی کو نیوٹرلائز کرتا ہے تو کیا بنتا ہے؟
جواب: جب ایک ایسڈ کسی بیس یا الکلی کو نیوٹرلائز کرتا ہے تو سالم اور پانی بنتے ہیں۔
- 5- سالم میں آنسز کو کون سی فورس جوڑتی ہے؟
جواب: سالم میں مثبت اور منفی آنسز کو الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن جوڑتی ہے۔
- 6- سالم میں کشش کی قوت کا تعین کون سے دو عوامل کرتے ہیں؟
جواب: نمک میں کشش کی قوت کا انحصار درج ذیل دو عوامل پر ہوتا ہے:
• چارجز کی مقدار
• آنسز کے درمیان فاصلہ
- 7- آنسز کے باقاعدہ، تکرار پذیر سہ ابعادی نیٹ ورک کو کیا کہا جاتا ہے؟
جواب: آنسز کے باقاعدہ، تکرار پذیر سہ ابعادی نیٹ ورک کو کرسٹل لٹیس کہا جاتا ہے۔
- 8- درجہ حرارت اور دباؤ کے عام حالات میں کمپاؤنڈز کس حالت میں پائے جاتے ہیں؟
جواب: درجہ حرارت اور دباؤ کے عام حالات میں آئیونک کمپاؤنڈز کرسٹلائن ٹھوس کے طور پر پائے جاتے ہیں۔
- 9- سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) لٹیس کی مخصوص شکل کیا ہے؟
جواب: سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) لٹیس کی مخصوص شکل فیس سینٹرڈ کیوب ہے۔

10- ہر سوڈیم آئن کو کتنے کلورائیڈ آئنز نے گھیرا ہوتا ہے؟

جواب: ہر سوڈیم آئن کو چھ (6) کلورائیڈ آئنز نے گھیرا ہوتا ہے۔

11- سوڈیم یا کلورائیڈ میں سے کون سا آئن بڑا ہے؟

جواب: کلورائیڈ (Cl^-) آئن بڑا ہوتا ہے۔

12- سوڈیم کلورائیڈ کے فیس سینٹرڈ کیوب میں کلورائیڈ آئنز کہاں واقع ہوتے ہیں؟

جواب: سوڈیم کلورائیڈ کے فیس سینٹرڈ کیوب میں، بڑے کلورائیڈ آئنز کونوں پر اور کیوب کے ہر رخ کے مرکز میں موجود ہوتے ہیں۔

13- سوڈیم کلورائیڈ کے فیس سینٹرڈ کیوب میں سوڈیم آئنز کہاں واقع ہوتے ہیں؟

جواب: سوڈیم کلورائیڈ کے فیس سینٹرڈ کیوب میں، چھوٹے سوڈیم آئنز کیوب کے کناروں پر جگہ گھیرتے ہیں۔

14- ماضی میں سالٹ کو ایک تجارتی شے (commodity) کے طور پر کیسے استعمال کیا جاتا تھا؟

جواب: ماضی میں عام سالٹ ایک قیمتی تجارتی شے تھی۔ اسے بطور کرنسی (سکہ رائج الوقت) استعمال کیا جاتا تھا۔

15- آئیونک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس (نقطہ پگھلاؤ) عام طور پر بہت زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس عام طور پر بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کرشل لیٹس کے اندر آئنز کے درمیان بہت مضبوط الیکٹروسٹیٹک فورسز کے اثر کی وجہ سے موجود ہوتی ہیں۔

16- آئیونک کمپاؤنڈز کو پگھلانے کے لیے توانائی کی بڑی مقدار کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

جواب: چونکہ کرشل لیٹس کے اندر آئنز کے درمیان بہت مضبوط الیکٹروسٹیٹک فورسز موجود ہوتی ہیں، اس لیے ان قوتوں کو توڑنے کے لیے انرجی کی ایک خاصی بڑی مقدار درکار ہوتی ہے۔

17- پگھلنے کے عمل کے دوران آئنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

جواب: پگھلنے کے عمل کے دوران، آئنز کے درمیان الیکٹروسٹیٹک فورسز آف اثر لیٹن ٹوٹ جاتی ہیں اور آئنز کو آزادانہ حرکت کرنے کا موقع ملتا ہے۔

18- آئیونک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس کی مضبوطی کا انحصار کن دو عوامل پر ہوتا ہے؟

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹس کا انحصار درج ذیل دو عوامل پر ہوتا ہے:

• آئنز پر موجود چارجز
• آئنز کے سائز

19- آئیونک چارجز اور سائز میلنگ پوائنٹس پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟

جواب: زیادہ چارجز اور آئنز کا چھوٹا سائز مضبوط کشش کا باعث بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں میلنگ پوائنٹس زیادہ ہو جاتے ہیں۔

20- آئیونک کمپاؤنڈز ٹھوس حالت میں بجلی کیوں نہیں گزارتے؟

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز ٹھوس حالت میں بجلی نہیں گزارتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھوس حالت میں آئنز مضبوط کشش کی قوتوں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ حرکت کے لیے آزاد نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے بجلی نہیں گزار سکتے۔

21- آئیونک کمپاؤنڈز کن حالات میں بجلی گزارتے ہیں؟

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز دو حالتوں میں بجلی گزارتے ہیں:

• پگھلی ہوئی حالت میں
• جب وہ پانی میں حل شدہ ہوں

22- آئیونک کمپاؤنڈز پگھلی ہوئی حالت میں بجلی گزارنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز پگھلی ہوئی حالت میں بجلی گزارنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جب آئیونک کمپاؤنڈز کو ان کے میلنگ پوائنٹس تک گرم کیا جاتا ہے تو ان کے آئنز آزاد ہو جاتے ہیں۔

- 23- آئیونک کمپاؤنڈز جب پانی میں حل ہوتے ہیں تو بجلی کیوں گزارتے ہیں؟
 جواب: آئیونک کمپاؤنڈز جب پانی میں حل ہوتے ہیں تو بجلی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئیونک کمپاؤنڈز پانی میں حل ہوتے ہیں تو آنکڑ کے درمیان کشش کی قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور آنکڑ آزادانہ حرکت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
- 24- بحث کریں کہ آئیونک کمپاؤنڈز کو طاقتور الیکٹرولائٹس کیوں سمجھا جاتا ہے؟
 جواب: آئیونک کمپاؤنڈز طاقتور الیکٹرولائٹس کے طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ پانی میں حل ہونے پر وہ مکمل طور پر آئنوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔

حل پذیر اور ناقابل پذیر سالٹس

18.4

پانی میں حل پذیر سالٹس کی تیاری

18.5

- 25- آئیونک مرکبات طاقتور الیکٹرولائٹس کے طور پر کیوں کام کرتے ہیں؟
 جواب: آئیونک مرکبات طاقتور الیکٹرولائٹس کے طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ پانی میں حل ہونے پر وہ مکمل طور پر آنکڑ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
- 26- نمک کی حل پذیری (solubility) پر اثر انداز ہونے والے دو عوامل بتائیں۔
 جواب: نمک کی نوعیت (nature) اور درجہ حرارت (temperature) وہ دو عوامل ہیں جو نمک کی حل پذیری پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
- 27- حل پذیر سالٹس (Soluble salts) میں کیا کیا شامل ہے؟
 جواب: حل پذیر سالٹس نمک شامل ہیں:
- تمام سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیئم نمکیات۔
 - تمام دھاتی نائٹریٹس۔
 - زیادہ تر کلورائیڈز اور سلفائیڈس۔
 - کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ پانی میں صرف جزوی طور پر حل پذیر ہے۔
- 28- غیر حل پذیر نمکیات میں کیا کیا شامل ہے؟
 جواب: غیر حل پذیر نمکیات میں شامل ہیں:
- سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیئم کے علاوہ تمام کاربونیٹس۔
 - سلور اور لیڈ کے کلورائیڈز۔
 - بیریئم اور لیڈ کے سلفائیڈس۔
 - بیریئم اور مینگنیٹیم ہائیڈروآکسائیڈز۔
- 29- جب کوئی آئیونک مرکب پانی میں حل ہوتا ہے تو آنکڑ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
 جواب: جب آئیونک مرکبات پانی میں حل ہوتے ہیں، تو آنکڑ کے درمیان کشش کی قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور آنکڑ دوبارہ آزادانہ حرکت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
- 30- کارسلیٹ کا عام استعمال کیا ہے؟
 جواب: کارسلیٹ کو فٹنس کش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- 31- ٹائٹریشن میتھڈ (Titration method) کیا ہے؟
 جواب: یہ پانی میں حل پذیر تیزاب اور پانی میں حل پذیر اساس (base) کے درمیان ری ایکشن کے ذریعے نمک تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
- 32- حل پذیر پوٹاشیم نائٹریٹ تیار کرنے کے لیے کون سے ری ایکٹنٹس (reactants) استعمال کیے جاتے ہیں؟
 جواب: ایک مخروطی فلاسک میں پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ (KOH) اور نائٹرک ایسڈ (HNO_3) کی مناسب مقدار ملا کر ری ایکٹ کرایا جاتا ہے۔
- 33- کیا ایسڈ کے دھات کے ساتھ ری ایکشن سے سالٹ بنتا ہے؟
 جواب: جی ہاں، جب ایک ایسڈ دھات کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے تو سالٹ بنتا ہے۔

- 34- نیوٹرلائزیشن ری ایکشن میں غیر حل پذیر ہیں یا دھات کو اضافی مقدار میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟
جواب: نیوٹرلائزیشن ری ایکشن میں غیر حل پذیر ہیں یا دھات کو ہمیشہ اضافی مقدار میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ موجود تمام ایسڈری ایکٹ کر چکا ہے۔
- 35- آپ اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہیں کہ سلوشن کرشل بنانے کے لیے کافی گاڑھا ہو چکا ہے؟
جواب: نیوٹرلائزڈ سلوشن میں شیشے کی ایک سلاخ ڈبو کر باہر نکالیں۔ اگر سلاخ کا ڈبویا ہوا سر ادھندلا ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ سلوشن کرشل بنانے کے لیے کافی گاڑھا ہو چکا ہے۔
- 36- رنگ کی کون سی تبدیلی ظاہر کرتی ہے کہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ نیوٹرلائز ہو چکا ہے؟
جواب: اگر سلوشن کارنگ ہلکے گلابی سے بے رنگ ہو جائے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ نیوٹرلائز ہو چکا ہے۔
- 37- جب KOH اور HNO_3 آپس میں ری ایکٹ کرتے ہیں تو کیا مصنوعات بنتی ہیں؟
جواب: جب KOH نائٹرک ایسڈ (HNO_3) کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے تو KNO_3 (پوٹاشیم نائٹریٹ) اور H_2O (پانی) بنتے ہیں۔
- 38- سلفیورک ایسڈ کے ساتھ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کون سا انڈیکیٹر استعمال کیا جاتا ہے؟
جواب: سلفیورک ایسڈ کے ساتھ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے فینولتھلین استعمال کیا جاتا ہے۔
- 39- کچھ سے ہیں یا میٹل کی اضافی مقدار کو کیسے نکالا جاتا ہے؟
جواب: ہیں یا میٹل کی اضافی مقدار کو نکلانے کے لیے کچھ کو فلٹر کیا جاتا ہے۔
- 40- خالص سالٹ کے کرشلز کو فلٹر کرنے کے بعد کیسے خشک کرنا چاہیے؟
جواب: ایک بار جب کرشلز کو فلٹر کر لیا جائے، تو انہیں فلٹر پیپر کی تہوں کے درمیان خشک کر دیں۔

حل مشقی سوالات

A کثیر الانتخابی سوالات

- صحیح جواب پر (✓) کریں۔
- 1- کون سی بیس پانی میں حل نہیں ہوتی؟
(الف) KOH (ب) Mg(OH)_2 (ج) NaOH (د) Na_2CO_3
- 2- NaCl کے کرشل کی شکل ہے:
(الف) کیوبک (ب) ہیگروگونل (ج) رومبک (د) ٹرائیگونل
- 3- کون سے سالتس پانی میں ہمیشہ حل پذیر ہوتے ہیں:
(الف) کلورائیڈز (ب) سلفیٹس (ج) نائٹریٹس (د) کاربونیٹس
- 4- جب ماربل کے ٹکڑوں کا مرکب نائٹرک ایسڈ کے ساتھ ری ایکشن ہوگا تو کون سا سالت بنے گا؟
(الف) سوڈیم نائٹریٹ (ب) کیلشیم نائٹریٹ (ج) پوٹاشیم نائٹریٹ (د) میکینیشیم نائٹریٹ
- 5- پانی میں نائل پذیر سالت:
(الف) کیلشیم سلفیٹ (ب) سوڈیم سلفیٹ (ج) پوٹاشیم سلفیٹ (د) میکینیشیم سلفیٹ

جوابات

- | | | | | |
|--------|----------|--------|--------|----------|
| 1- (ب) | 2- (الف) | 3- (ج) | 4- (ب) | 5- (الف) |
|--------|----------|--------|--------|----------|

18.1 کون سے عوامل آئنز کے مابین الیکٹروستیک فورس کے طاقت ور ہونے کے ذمہ دار ہیں؟

جواب: آئنز کے درمیان الیکٹروستیک فورسز کی قوت کا انحصار سالٹ کی نوعیت پر ہوتا ہے جس میں شامل ہے:

- آئنز کا چارج
- آئنز کا سائز

18.2 کیا لیڈ (II) کلورائیڈ پانی میں حل پذیر ہے؟

جواب: کلورائیڈز عام طور پر حل پذیر ہوتے ہیں تاہم لیڈ (II) کلورائیڈ مختلف نوعیت کا رویہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ ٹھنڈے پانی میں غیر حل پذیر سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ پانی گرم کرنے پر یہ تھوڑا سا زیادہ حل پذیر ہو سکتا ہے۔

18.3 کون سے لیڈ (Lead) سالٹس پانی میں ناعمل پذیر ہیں؟

جواب: پانی میں ناعمل پذیر لیڈ کے سالٹس درج ذیل ہیں:

- لیڈ کلورائیڈ
- لیڈ سلفائیڈ
- لیڈ کاربونیٹ

18.4 کوئی سے دو ناعمل پذیر کاربونیٹس کے نام بتائیں۔

جواب: دو ناعمل پذیر کاربونیٹس یہ ہیں:

- کپاشیم کاربونیٹ
- بیریم کاربونیٹ

18.5 کرشل لیٹس کہتے ہیں؟

جواب: کسی سالٹ میں مخالف چارج والے آئن ایک باقاعدہ اور دہرائے جانے والے انداز میں ترتیب پا کر ایک تین سمتوں والا نیٹ ورک بناتے ہیں جسے کرشل لیٹس کہتے ہیں۔

ج) تعمیری فکر پر مبنی سوالات

18.1 آئنک سالٹس کے میالنگ پوائنٹس عام طور پر بہت زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟

جواب: آئنک کمپاؤنڈز کے میلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مثبت اور منفی آئنز کے درمیان بہت مضبوط الیکٹروستیک قوتوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ سالٹس کو پگھلانے کے لیے ان مضبوط کشش کی فورسز کو توڑنے کے لیے پورے کرشل لیٹس میں کافی ہیٹ انرجی فراہم کرنا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بانڈز بہت مضبوط ہوتے ہیں اس لیے آئنز کو الگ کرنے کے لیے بہت زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔

18.2 آئنک سالٹس ٹھوس حالت میں کیوں پائے جاتے ہیں؟

جواب: آئنک سالٹس ٹھوس کی شکل میں ہوتے ہیں کیونکہ مخالف چارج والے آئنز سوڈیم (Na^+) اور کلورائیڈ (Cl^-) ایک دوسرے کو اتنی مضبوطی سے کھینچتے ہیں کہ وہ ایک دہرائے جانے والے تین سمتوں والے پیٹرن میں جڑ جاتے ہیں جسے کرشل لیٹس کہتے ہیں۔ اس حالت میں آئن ارد گرد گھومنے کے لیے آزاد نہیں ہوتے۔ وہ گرد و پیش کے آئنز کی وجہ سے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں جو مادے کو روم نمبر پچر پر سخت ٹھوس بنا دیتا ہے۔

18.3 آپ لیبارٹری میں کپاشیم سلفائیڈ کو کیسے تیار کریں گے؟

جواب: لیبارٹری میں کپاشیم سلفائیڈ کی تیاری: چونکہ کپاشیم سلفائیڈ ایک غیر حل پذیر سالٹ ہے، اس لیے اسے پریسیپیٹیشن ری ایکشن کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔

طریقہ کار:

(i) حل پذیر کپاشیم سالٹ (جیسے کپاشیم کلورائیڈ $CaCl_2$) کے سلوشن کو ایک حل پذیر سلفائیڈ (جیسے سوڈیم سلفائیڈ Na_2SO_4) کے سلوشن کے ساتھ ملائیں۔

(ii) کیلشیم آکسائیڈ اور سلفیٹ آکسائیڈ کے پانی میں پانی کو تبدیل کر کے ٹھوس کیلشیم سلفیٹ بنائیں گے۔
ری ایکشن: کمپن کو فلٹر کر کے ٹھوس CaSO_4 جمع کریں۔ اسے ڈسٹریکٹور سے ہوائیں اور خشک کریں۔
18.4 NaCl اور MgCl_2 کے میلنگ پوائنٹس کا موازنہ کریں۔

جواب: سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) کا میلنگ پوائنٹ میگنیشیم کلورائیڈ (MgCl_2) سے زیادہ ہوتا ہے۔
• سوڈیم کلورائیڈ 801°C • میگنیشیم کلورائیڈ 714°C
کیونکہ NaCl کے لیٹس سٹرکچر میں زیادہ آئینک کیریکٹر ہوتا ہے جس کو توڑنے کے لیے زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے جبکہ MgCl_2 میں موثر کوویلنٹ کیریکٹر زیادہ ہوتا ہے۔

18.5 آپ کا پراسٹیکٹ کے خالص کرکٹز لیبارٹری میں کس طرح تیار کریں گے؟
جواب: کا پراسٹیکٹ ایک حل پذیر سالٹ ہے اس لیے اسے ایک ایسڈ کو غیر حل پذیر کو غیر حل پذیر بنائیں کے ساتھ ری ایکٹ کروا کر تیار کیا جاتا ہے۔
طریقہ:

- گرم ڈائلوٹ سلفیورک ایسڈ میں اضافی کا پر (II) آکسائیڈ پاؤڈر شامل کریں۔
- اضافی غیر ری ایکٹ شدہ کا پر آکسائیڈ کو نکالنے کے لیے سلوشن کو فلٹر کریں۔
- فلٹر پیپر (کا پراسٹیکٹ سلوشن) کو تب تک بخارات بنائیں جب تک یہ پیچوریلڈ نہ ہو جائے۔
- اسے آہستہ آہستہ ہوائیں تاکہ کا پراسٹیکٹ کے بڑے خالص نیلے کرشل بن جائیں۔

D تفصیلی سوالات


18.1 سوڈیم کلورائیڈ کرشل کی تشکیل کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے سوال 2 دیکھیے۔

18.2 دو حل پذیر سالٹس کی تیاری کا طریقہ بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے سوال 6 اور 7 دیکھیے۔

18.3 مندرجہ ذیل سالٹس کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟



جواب: K_2SO_4 کی تیاری: پوٹاشیم سلفیٹ K_2SO_4 حل پذیر سالٹ ہے اور عام طور پر نائٹریشن کے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔

ری ایکٹنٹس: پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ (KOH) اور سلفیورک ایسڈ (H_2SO_4)۔


طریقہ:

(i) KOH کے معلوم والیوم کو فیو لفٹھیلین انڈیکیٹر استعمال کرتے ہوئے K_2SO_4 کے ساتھ نائٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ درست نیوٹرلائزیشن پوائنٹ معلوم ہو سکے۔

(ii) اینڈ پوائنٹ مل جانے کے بعد خالص سلوشن حاصل کرنے کے لیے تجزیاتی کوآڈیکیٹر کے بغیر ہرایا جاتا ہے۔

(iii) پھر پانی کو بخارات بنا کر K_2SO_4 کے کرشل حاصل کیے جاتے ہیں۔

ری ایکشن:



CuCl_2 کی تیاری: کا پر (II) کلورائیڈ ایک حل پذیر سالٹ ہے جو ایک ایسڈ کے غیر حل پذیر بنائیں کے ساتھ ری ایکشن سے تیار کیا جاتا ہے۔

ری ایکٹنس: کاپر (11) آکسائیڈ اور ڈائیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ (HCl)۔

طریقہ:

- گرم ڈائیوٹ HCl کے معلوم والیوم میں اضافی کاپر آکسائیڈ پاؤڈر شامل کریں۔
- مکچر کو اس وقت تک ہلائیں جب تک مزید آکسائیڈ ری ایکٹ نہ کرے۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تمام ایسڈ نیوٹرلائز ہو گیا ہے۔
- غیری ایکٹ شدہ کاپر آکسائیڈ کو نکالنے کے لیے مکچر کو فلٹر کریں۔
- فلٹریٹ کو ایک بخارات بنانے والی ڈش میں گرم کریں جب تک کہ سٹراٹزیشن پوائنٹ نہ آجائے۔
- اسے ٹھنڈا ہونے دیں تاکہ کرسٹل بن جائیں پھر انھیں فلٹر کریں اور فلٹر پیپر کے درمیان دبا کر خشک کریں۔

ری ایکشن:




CaCl₂ کی تیاری: ایک حل پذیر سالٹ ہے جو ایک ایسڈ کو غیر حل پذیر کاربونیٹ کے ساتھ ری ایکٹ کروا کے تیار کیا جاتا ہے۔
ری ایکٹنس: بکشیٹیم کاربونیٹ (CaCO₃) اور ڈائیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ (HCl)۔

طریقہ:

- بیکر میں ڈائیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ میں اضافہ بکشیٹیم کاربونیٹ شامل کریں۔
- جھاگ نکلتا بند ہونے کا انتظار کریں جو ظاہر کرتا ہے کہ تمام ایسڈ ری ایکٹ کر چکا ہے۔
- بچے ہوئے بکشیٹیم کاربونیٹ کو نکالنے کے لیے سلوشن کو فلٹر کریں۔
- سلوشن کو مرکب کرنے کے لیے فلٹریٹ کو بخارات میں تبدیل کریں۔
- CaCl₂ کے کرسٹل بننے کے لیے سلوشن کو ٹھنڈا کریں پھر انھیں جمع کر کے خشک کریں۔

ری ایکشن:



18.4 کون سے سالٹس پانی میں حل پذیر ہیں اور کون سے نائل پذیر؟ وضاحت کریں۔
جواب: وہ سالٹس جو عموماً پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں:

- تمام نائٹریٹس مثلاً NaNO₃, KNO₃
- الکلی میٹلز کے تمام سالٹس مثلاً Na⁺ اور Li⁺ سالٹس
- تمام امونیم سالٹس مثلاً NH₄Cl
- وہ سالٹس جو عموماً پانی میں غیر حل پذیر ہوتے ہیں:
- زیادہ تر کاربونیٹس مثلاً CaCO₃, MgCO₃
- زیادہ تر ہائیڈروکسائیڈ مثلاً Al(OH)₃, Pb(OH)₂
- زیادہ تر فاسفیٹس مثلاً Ca₃(PO₄)₂, Mg₃(PO₄)₂

