



اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- معلوم کریں کہ فضا میں موجود نائٹروجن کے آکسائیڈز ( $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ) غیر جلے ہوئے ہائیڈروکاربنز کے ساتھ ری ایکشن کرتے ہوئے پر آکسی ایسیٹک ٹائیٹرٹ یا پی اے این (PAN) بناتے ہیں جو فوٹو کیمیکل سموگ کا ایک جزو ہے۔
- تیزابی بارش کی تشکیل میں  $\text{NO}$  اور  $\text{NO}_2$  کے براہ راست کردار کو اور فضا میں موجود سلفر ڈائی آکسائیڈ کی آکسائیڈیشن (Oxidation) میں ان کے بطور کیٹالسٹ کردار کی وضاحت کریں۔
- ہیمبر پروس (Haber Process) میں امونیا بنانے کی علامتی مساوات کو تحریر کریں۔




- ہیمبر پروس میں پائیدار اور چھوٹے کاسورس میتھین ( $\text{CH}_4$ ) اور نائٹروجن کاسورس ہوا (Air) ہے۔
- ہیمبر پروس کے دوران امونیا بنانے کی کنڈیشنز  $20000 \text{ KPa}/20 \text{ atm}$ ,  $450^\circ\text{C}$  اور آئرن بطور کیٹالسٹ کا استعمال بیان کریں۔
- کنٹیکٹ پروس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کی علامتی مساوات کے طور پر بیان کریں۔



- کنٹیکٹ پروس میں استعمال ہونے والی سلفر ڈائی آکسائیڈ (سلفر کا جلنا یا سلفر کی دھات کی روٹنگ) اور آکسیجن (ہو) کا ماخذ بتائیں۔
- کنٹیکٹ پروس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے لیے کنڈیشنز  $200 \text{ kPa}/\text{atm}$ ,  $450^\circ\text{C}$  اور وینڈیم (V) آکسائیڈ بطور کیٹالسٹ آکسائیڈ بیان کریں۔
- ایمفوٹریک کے آکسائیڈز کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایسڈز اور بیسز دونوں کے ساتھ ری ایکشن کر کے سائلز اور پانی بناتے ہیں۔
- آکسائیڈز کی درجہ بندی کریں بطور ایسڈک ( $\text{CO}_2$  اور  $\text{SO}_2$ ) بطور بیسیک ( $\text{CuO}$  اور  $\text{CaO}$ ) بطور ایمفوٹریک آکسائیڈز، ( $\text{Al}_2\text{O}_3$  اور  $\text{ZnO}$ ) یہ درجہ بندی ان کے میٹلیک اور نان میٹلیک کردار کی وجہ سے ہے۔

دھاتوں کی خصوصیات

- دھاتوں کی عام کیمیائی خصوصیات کی نشاندہی کریں اور ڈائیٹیلوٹ ایسڈ، ٹھنڈے پانی، بھاپ اور آکسیجن کے ساتھ ایکشنز تک محدود رہیں۔
- متعلقہ معلومات کے مدد سے دھاتوں کی ری ایکٹیویٹی کی درجہ بندی کریں۔





# انسانی طرز سوالات

مختصر کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انسانی طرز سوالات

امونیا (Ammonia)

19.1



سلفیورک ایسڈ (Sulphuric Acid)

19.2

سوال 1: صنعتی پیمانے پر امونیا کی تیاری کی وضاحت کریں۔

جواب: مہمر پروکس (Ha'ber Process)

صنعتی پیمانے پر امونیا کو مہمر (Ha'ber) کے طریقہ کے مطابق بنایا جاتا ہے جو ایک جرمنی کے کیمسٹ ایف۔ جے مہمر (F.J Haber) نے دریافت کیا تھا۔ اس طریقہ میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو بالفاظ والیوم 1:3 کی نسبت سے 200 ایسٹما سفیرک پریشر اور  $Fe/Al_2O_3$  کیپالست کی موجودگی میں  $400^{\circ}C$  سے  $500^{\circ}C$  تک ہیٹ کیا جاتا ہے تو امونیا بنتی ہے۔



اس ری ایکشن سے حاصل ہونے والے آمیزہ میں ایکولبریم حالت پر والیوم کے لحاظ سے 35% امونیا ہوتی ہے۔ اس آمیزہ کو پھر ٹھنڈا کرنے والے کوائلوں (Coils) سے امونیا گیس کو  $-33.4^{\circ}C$  پر مائع امونیا میں تبدیل کیا جاتا ہے اس طرح یہ مائع گیس آمیزہ سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ آمیزہ کے دوسرے اجزاء یعنی نائٹروجن اور ہائیڈروجن گیسوں کو دوبارہ ری ایکشن کرنے والے چیمبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔

سوال 2: مہمر پروکس میں استعمال ہونے والے نائٹروجن اور ہائیڈروجن کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں؟

جواب: نائٹروجن کا سورس (Source of Nitrogen)



امونیا گیس کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال میں سے نائٹروجن گیس ہوا کی فریکشنل ڈسٹیلیشن (Fractional Distillation) سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ہوا کو کاربن ڈائی آکسائیڈ سے پاک کیا جاتا ہے اور پھر اس پر 200 ایسٹما سفیرک پریشر ڈالا جاتا ہے۔ اس دباؤ ہوتی ہوا کو پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور اسے ایک بہت چھوٹے سوراخ سے گزارا جاتا ہے۔ اس سوراخ سے گزرنے کے بعد یہ ہوا یکدم پھیلتی ہے اور اس کا ٹمپرچر مزید کم ہو جاتا ہے۔ دبانے اور پھیلانے کا عمل بار بار کرنے سے ہوا بالآخر مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

اس مائع ہوا کی پھر فریکشنل ڈسٹیلیشن (Fractional Distillation) کی جاتی ہے چونکہ نائٹروجن کا بوائلنگ پوائنٹ آکسیجن سے کم ہے اس لیے یہ  $196^{\circ}C$  پر پہلے بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مائع ہوا میں آکسیجن باقی رہ جاتی ہے۔ علیحدہ کی گئی نائٹروجن گیس کو دوبارہ مائع بنا کر مخصوص سیلنڈر میں سٹور کر لیا جاتا ہے۔

ہائیڈروجن کا سورس (Source of Hydrogen): امونیا بنانے کے لیے دوسرے خام مال ہائیڈروجن کو حاصل کرنے کے لیے میتھین (Methane)



کو آکسیجن کی محدود مقدار کے ساتھ جوہی آکسائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ساری کی ساری کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ آکسیجن کی مقدار محدود ہونے کی وجہ سے ری ایکشن کے پروڈکٹس میں ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائیڈ زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس ری ایکشن میں حاصل ہونے والی کاربن مونو آکسائیڈ کا پھر پانی کے ساتھ ری ایکشن کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور مزید ہائیڈروجن حاصل کی جاتی ہے۔





سوال 3: سلفیورک ایسڈ کی پیداوار کے لیے کنٹیکٹ پروسس کی تفصیلی جائزہ دیں۔

جواب: کنٹیکٹ پروسس (Contact Process):


سلفیورک ایسڈ ایک بہت ہی اہم کیمیکل کمپاؤنڈ ہے۔ اس کو نہ صرف لیبارٹری میں بلکہ تقریباً ہر صنعت میں براہ راست یا بالواسطہ کسی نہ کسی سٹیج (Stage) میں استعمال کیا جاتا ہے۔

صنعتی پیمانے پر سلفیورک ایسڈ کنٹیکٹ پروسس (Contact Process) سے بنایا جاتا ہے۔ یہ پروسس درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتے ہیں۔


سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کی تیاری (Preparation of Sulphur Dioxide Gas): سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس یا تو سلفر عنصر کو ہوا میں جلانے سے بنائی جاتی ہے یا پھر سلفر کی کچھ دھات، آئرن پائکرائٹ کو ہوا کی زیادہ مقدار میں گرم کیا جاتا ہے۔



سلفر ڈائی آکسائیڈ کی آکسیدیشن (Oxidation of Sulphur Dioxide) بالکل صاف شفاف اور خشک گیسوں ( $\text{SO}_2$  اور  $\text{O}_2$ ) کو پھر ایک کنٹیکٹ چیمبر (Contact Chamber) میں 2 تا 3 ایٹما سفر پریشر اور  $450^\circ\text{C}$  ٹمپریچر پر وینڈیم (Vandium V) آکسائیڈ کیپالسٹ کے اوپر سے گزارا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ری ایکشن ایک ریورسیبل (Reversible) ری ایکشن ہے پھر بھی ان حالات میں 98% سلفر ڈائی آکسائیڈ، سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شکل (19.2)۔




کنٹیکٹ چیمبر میں بننے والی سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کو پھر 98% سلفیورک میں جذب کیا جاتا ہے جس سے اولیم (Oleum) بنتا ہے۔





اولیم کو پھر پانی کی ایک مخصوص مقدار سے ملا کر مطلوبہ ارتکاز والا سلیفورک ایسڈ بنایا جاتا ہے



آکسائیڈز (Oxides)

19.3

میٹلز (Metals)

19.4






سوال 4: ایسڈک اور بیسک آکسائیڈز کی تشکیل اور خصوصیات کی وضاحت کریں۔

جواب: آکسائیڈز (Oxides):




مختلف عناصر کے ساتھ آکسیجن کے بائنری (Binary) کمپائونڈز کو آکسائیڈز کہتے ہیں۔ ان آکسائیڈز میں آکسیجن کی آکسائیڈیشن سٹیٹ -2 ہوتی ہے۔

میٹل آکسائیڈز (Metal oxides): عام طور پر میٹل آکسائیڈ بیسک (Basic) یا ایفوفیریک (Amphoteric) ہوتے ہیں۔  
نان میٹلو آکسائیڈز (Non metal oxides): نان میٹلو کے آکسائیڈز ایسڈک (Acidic) ہوتے ہیں۔


بیسک اور ایسڈک آکسائیڈز کے بننے کا عمل: بیسک اور ایسڈک آکسائیڈز دونوں کو بنانے کے لیے میٹلو اور نان میٹلو کو آکسیجن یا پھر ہوا میں گرم کیا جاتا ہے۔ میٹل آکسائیڈز آئینک کمپائونڈز ہیں جن کے بننے کے دوران الیکٹرانز میٹلو سے آکسیجن کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ نان میٹل آکسائیڈز کوویلنٹ کمپائونڈز ہیں اور ان کے بننے کے دوران نان میٹلو اور آکسیجن کے درمیان الیکٹرانز بانٹے جاتے ہیں۔  
بیسک آکسائیڈز کی خصوصیات: آکسیجن جب میٹلو سے ری ایکشن کرتی ہے تو جو آکسائیڈز بنتے ہیں ان کو پانی ملا کر حل کرنے سے ہائڈرو آکسائیڈز وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہائڈرو آکسائیڈز سرخ لٹمس کو نیلا کر دیتے ہیں اور جب ان کا ری ایکشن ایسڈز کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ سالتس بناتے ہیں۔



ایسڈک آکسائیڈز کی خصوصیات: آکسیجن جب نان میٹلو (S, C, N) کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے تو ایسڈک آکسائیڈز بنتے ہیں۔ یہ آکسائیڈز پانی کے ساتھ ری ایکشن کر کے ایسڈز بناتے ہیں جو نیلے لٹمس کو سرخ کر دیتے ہیں۔





سلفر ڈائی آکسائیڈ



سلفیورس ایسڈ

ایسڈک آکسائیڈز جب بیس سے ری ایکشن کرتے ہیں تو سالتس بنتے ہیں۔







سوال 5: نیوٹرل آکسائیڈز کیا ہوتے ہیں؟ ایفوفیرک آکسائیڈز کی تشکیل اور خصوصیات کی وضاحت کریں۔


جواب: نیوٹرل آکسائیڈز (Neutral Oxides):

نیوٹرل آکسائیڈز اُن آکسائیڈز کو کہتے ہیں جو پانی کے ساتھ مل کر نہ ایسڈ اور نہ ہی بیس بناتے ہیں۔ پانی میں ان کے سلوشنز نیلے اور سرخ لٹمس دونوں پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ کاربن مونو آکسائیڈ (CO) نائٹرک آکسائیڈ (NO) اور نائٹرس آکسائیڈ (N<sub>2</sub>O) نیوٹرل آکسائیڈز کی مثالیں ہیں۔



ایفوفیرک آکسائیڈز (Amphoteric Oxides): ایفوفیرک آکسائیڈز اُس وقت بنتے ہیں جب ایسی میٹلو آکسیجن سے ری ایکشن کرتی ہیں جو کم الیکٹرو پوزیٹو (Electropositive) ہیں۔



یہ آکسائیڈز بطور ایسڈ اور بیس دونوں طرح کے خواص رکھتے ہیں۔ زنک آکسائیڈ اور ایلومینیم آکسائیڈ، ایسڈ کی موجودگی میں بیس کے خواص ظاہر کرتے ہیں۔



یہی آکسائیڈز الکلیز کی موجودگی میں ایسڈز کے خواص ظاہر کرتے ہیں۔



سوڈیم زنکائیٹ



سوڈیم ایلومینائیٹ

یہ آکسائیڈز پانی میں نائل پذیر ہیں اور لٹمس پیپر پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔


سوال 6: ٹھنڈے پانی، بھاپ، آکسیجن اور ڈائیوکسائیڈ ایسڈز کے ساتھ میٹلو کے ری ایکشنز کی وضاحت کریں۔

جواب: پیریاڈک ٹیبل میں موجود تقریباً تین چوتھائی عناصر میٹلو ہیں۔ میٹلو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے میں موجود الیکٹرانز کو کھو کر کیٹائنز (Cations) بنائیں۔

ٹھنڈے پانی کے ساتھ میٹلو کے ری ایکشنز (Reactions of Metals with cold water): پیریاڈک ٹیبل کے پہلے اور دوسرے گروپ میں موجود عناصر ٹھنڈے پانی کے ساتھ تیزی سے ری ایکشن کر کے اپنے ہائیڈرو آکسائیڈز بناتے ہیں اور ہائیڈروجن گیس خارج کرتے ہیں۔




میکینیشیم تاہم ٹھنڈے پانی سے ری ایکشن کر کے آہستہ آہستہ میکینیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتی ہے۔







میٹلوں کے ساتھ میٹل کے ری ایکشنز (Reactions of metals with steam): ایک میٹل جتنی زیادہ ری ایکٹیو (Reactive) ہوگی اتنا ہی تیزی سے سٹیم کے ساتھ ری ایکشن کرے گی۔ ری ایکٹیو میٹلوں مثلاً لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشیم نہایت خطرناک طریقے سے سٹیم کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہیں۔


بیریلیم اور ایلومینیم سٹیم کے ساتھ زیادہ ٹھہرچہ ( $700^{\circ}\text{C}$  کے لگ بھگ) پر ری ایکشن کر کے اپنے اپنے آکسائیڈز بناتی ہیں اور ہائیڈروجن خارج کرتی ہیں۔




آکسیجن کے ساتھ میٹلوں کے ری ایکشنز (Reactions of metals with oxygen): میٹلوں آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کر کے میٹل آکسائیڈز بناتی ہیں۔ یہ ری ایکشن کتنی آسانی سے وقوع پذیر ہوتا ہے اس کا انحصار میٹل کی ری ایکٹیوٹی (Reactivity) اور حالات پر ہے۔ سوڈیم ہوا میں زرد شعلے سے جلتی ہے اور سوڈیم آکسائیڈ اور سوڈیم پر آکسائیڈ بناتی ہے۔




میکینشیم، پتاشیم، سٹرانسیم (Strontium) اور بیریم ہوا میں اپنے اپنے مخصوص رنگوں کے ساتھ جلتی ہیں اور اپنے اپنے آکسائیڈز بناتی ہیں۔



| شعلہ کا رنگ                       | میٹل     |
|-----------------------------------|----------|
| تیز سفید رنگ                      | میکینشیم |
| سفید شعلہ جس میں سرخ رنگ کی آمیزش | پتاشیم   |
| گہرا سرخ رنگ                      | سٹرانسیم |
| زری مائل سبز رنگ                  | بیریم    |



سٹرانسیم کا شعلہ



بیریم کا شعلہ

ڈائلوٹڈ ایسڈ کے ساتھ میٹلوں کے ری ایکشنز (Reactionss of metals with dilute acids): میٹل جتنی زیادہ ری ایکٹیو ہوگی اتنی ہی تیزی سے ڈائلوٹڈ ایسڈ سے ای ایکشن کرے گی۔ سوڈیم اور پوٹاشیم بڑی تیزی اور خطرناک طریقے سے ڈائلوٹڈ ایسڈز کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہیں اور اپنے اپنے سالٹس بناتی ہیں اور ہائیڈروجن گیس خارج کرتی ہیں۔



بیریاڈک ٹیبل میں موجود دوسرے گروپ کے عناصر بھی ڈائلوٹڈ ایسڈز کے ساتھ ری ایکشن کر کے سالٹس بناتے ہیں۔ تاہم میکینشیم میٹل ہائیڈروجن آئنز کو ریڈیوس کر کے ہائیڈروجن گیس بناتی ہے۔ اس گروپ میں جیسے جیسے ہم نیچے موجود عناصر کی طرف آتے ہیں تو یہ ری ایکشن اتنا





### میٹلوں کی ری ایکٹیوٹی سیریز (Reactivity Series of Metals)

19.5

### 19.6 فضائی آلودگی پھیلانے میں نائٹروجن کے آکسائیڈز کا کردار (Role of Oxides of Nitrogen in Spreading Air Pollution)

سوال 7: میٹلوں کی ری ایکٹیوٹی سیریز پر نوٹ لکھیں۔

| میٹلوں کی ری ایکٹیوٹی سیریز |
|-----------------------------|
| زیادہ ری ایکٹیو میٹلوں      |
| K                           |
| Na                          |
| Li                          |
| Ba                          |
| Sr                          |
| Ca                          |
| Mg                          |
| Al                          |
| C                           |
| Mn                          |
| Zn                          |
| Fe                          |
| H                           |
| Cu                          |
| Ag                          |
| Au                          |
| کم ری ایکٹیو میٹلوں         |


جواب: میٹلوں کی ری ایکٹیوٹی سیریز (Reactivity Series of Metals):

میٹلوں کے پانی یا ایسڈز کے ساتھ ری ایکشنز کی بنیاد بنا کر ان کی ری ایکٹیوٹی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس طرح مختلف میٹلوں کو ری ایکٹیوٹی میں کمی کے لحاظ سے مرتب کیا جاسکتا ہے۔

میٹلوں کی اسی ری ایکٹیوٹی سیریز کے مطابق، کیلشیم اور اس کے اوپر آنے والی میٹلوں ٹھنڈے پانی سے ری ایکشن کر کے میٹل ہائیڈروآکسائیڈز اور ہائیڈروجن گیس بناتی ہیں۔ تاہم کیلشیم سے نیچے والی میٹلوں ٹھنڈے پانی کی بجائے گرم پانی کے ساتھ ری ایکشن کر کے میٹل آکسائیڈز اور ہائیڈروجن بناتی ہیں۔

ری ایکٹیوٹی سیریز میں موجود ہائیڈروجن سے اوپر آنے والی میٹلوں ڈائیٹائیٹ کے ساتھ ری ایکشن کر کے ہائیڈروجن گیس خارج کرتی ہیں۔ ہائیڈروجن سے نیچے آنے والی میٹلوں ری ایکٹیوٹی میں اس لیے یہ ڈائیٹائیٹ ایسڈز سے ری ایکشن نہیں کرتیں۔ میٹل جتنی زیادہ ری ایکٹیو ہوگی اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ ڈائیٹائیٹ ایسڈز سے ری ایکشن کرے گی۔

اسی طرح سوڈیم اور پوٹاشیم جیسی ری ایکٹیو میٹلوں آکسیجن کے ساتھ آسانی سے ری ایکشن کریں گی جبکہ سلور، کانپر اور آئرن جیسی کم ری ایکٹیو میٹلوں آکسیجن کے ساتھ بڑے دھیمے انداز میں ری ایکشن کرتی ہیں۔ ری ایکٹیوٹی کے سب سے اوپر موجود میٹلوں طاقت ور ریڈیو سٹنگ ایجنٹس ہیں کیونکہ یہ میٹلوں بڑی آسانی سے آکسائیڈز ہو جاتی ہیں۔ تاہم ریڈیو سٹنگ کرنے کی یہ طاقت سیریز کے نیچے آتے آتے بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔



سوال 8: PAN اور ایسڈ رین کے بننے کے عمل میں نائٹروجن کا کردار بیان کریں۔


جواب: PAN اور ایسڈ رین کے بننے میں نائٹروجن کا کردار (Role of Nitrogen in formation of PAN and Acid rain):

پرائمری پلوشمنٹس: فضا میں موجود بنیادی آلودگی پھیلانے والی اشیاں ہیں نائٹروجن، سلفر اور کاربن کے آکسائیڈز کے علاوہ بعض ہائیڈروکاربنز بھی شامل ہیں۔ سیکنڈری پلوشمنٹس: بنیادی آلودگی پھیلانے والی یہ اشیاں پھر دوسرے درجے کی آلودگی کا باعث بنتی ہیں اور ایسا فضا میں وقوع پذیر ری ایکشنز کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ دوسرے درجے کی آلودگی پھیلانے والی ان اشیاں میں اوزون (Ozone)، پراکسی ایسٹائل نائٹریٹ (Peroxyacetyl Nitrate) اور سلفیورک ایسڈ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سارے کمپائونڈز نہ صرف کے زہریلے ہیں بلکہ فضا میں ان کے ارتکاز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔



نائٹروجن کے خطرناک آکسائیڈز نائٹروجن کے آکسائیڈز جن کی فضا میں موجودگی خطرناک ہے ان میں NO اور NO<sub>2</sub> شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ان آکسائیڈز کو NO<sub>x</sub> سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نائٹروجن کے یہ آکسائیڈز قدرتی اور انسانی دونوں ذرائع سے فضا میں داخل ہوتے ہیں۔

NO<sub>x</sub> کے قدرتی ذرائع: نائٹروجن کے آکسائیڈز بنانے کے قدرتی ذرائع میں بارشوں کی گرج چک شامل ہے۔ بجلی کی اس کرک کی وجہ سے فضا میں موجود نائٹروجن اور آکسیجن ری ایکشن کر کے نائٹریک آکسائیڈ بناتی ہیں جو کہ بننے کے فوراً بعد کیمیکل کی مدد سے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔




NO<sub>x</sub> کے انسانی ذرائع: فضا نائٹروجن کے آکسائیڈز داخل کرنے کے اضافی ذرائع میں گاریوں میں فوسل ایندھن کا جلنا، بعض صنعتی ذرائع اور بجلی بنانے والے پاور پلانٹس شامل ہیں۔ ان ذرائع کے علاوہ کھتی باڑی سے منسلک بعض سرگرمیاں اور فصلوں میں کھادوں کا استعمال بھی ہوا میں نائٹروجن کے آکسائیڈز شامل کرنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ صبح اور شام کے اوقات میں ٹریفک کا ہجوم اور بعض صنعتی سرگرمیاں فضا میں نائٹروجن کے آکسائیڈز کی مقدار بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ یہ عناصر آسانی سے بخارات میں تبدیل ہونے والے آرگینک کمپاؤنڈز یعنی وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز (Volatile Organic Compounds VOC<sub>2</sub>) بھی ہوا میں شامل کرتے ہیں۔

PAN کی پیداوار: سورج سے آنے والی ہلانی شعاعیں (Ultraviolet Radiation) جب نائٹروجن کے آکسائیڈز اور VOCs سے ملتی ہیں تو بہت پیچیدہ ری ایکشنز کی بدولت ثانوی آلودگی والے عناصر تشکیل پاتے ہیں ان میں اوزون، ایلڈی ہائیڈز (Aldehydes) اور PAN شامل ہیں۔

تیزابی بارش بننے کے عمل: نائٹروجن کے آکسائیڈز ایک ثانوی آلودگی کا موجب بھی بنتے ہیں اس آلودگی کو ایسڈ رین (Acid Rain) کہتے ہیں۔ نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (NO<sub>2</sub>) پانی اور فضا میں موجود دوسرے کیمیکلز سے ری ایکشن کر کے نائٹریک ایسڈ اور نائٹریک (Nitrous) ایسڈ کے بخارات بناتے ہیں۔

ایسڈز کے یہ بخارات پھر پانی کے بخارات سے مل کر زمین پر ایسڈ رین کی شکل میں گرتے ہیں۔ نائٹروجن کے آکسائیڈز فضا میں موجود ایک اور آلودہ شے سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفیورک ایسڈ میں تبدیل کرنے کے لیے کیٹالسٹ کا رول بھی ادا کرتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ، ایسڈ رین ہی کا ایک جزو ہے۔



ایسڈ رین کی pH 5.6 سے تھوڑی کم ہوتی ہے۔ ایسڈ رین ہمارے ماحولیاتی نظام (Ecosystem) کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ نہ صرف کہ مادی اشیاء کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے بلکہ اس سے جانداروں کو سانس کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔

## فوری جانچ 19.1

سوال 1: امونیا گیس بنانے کے بعد اس کو مائع میں کیوں تبدیل کیا جاتا ہے؟

جواب: امونیا کو ایک مائع میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اسے بغیر کسی ری ایکشن کے نائٹروجن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈز سے الگ کیا جاسکے جس سے انھیں دوبارہ استعمال کر کے چیمبر کی کارکردگی میں اضافہ کیا جاسکے۔

سوال 2: امونیا گیس کی تیاری میں اتنا زیادہ پریشر کیوں ضروری ہے؟

جواب: چونکہ امونیا کی تشکیل میں ری ایکٹنٹس کے 4 مولز شامل ہوتے ہیں جو پریشر کے دو مولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، 200 atm کے پریشر کو برقرار رکھتے



ہوئے ایکوی لبریم کو اس حالت میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ امونیا کی پیداوار میں اضافہ ہو۔

## فوری جانچ 19.2

سوال 1:  $FeS_2$  سے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کیسے بنائی جاتی ہے؟

جواب: سلفر ڈائی آکسائیڈ آئرن پائراٹ کو زیادہ ہوا کی موجودگی میں روست کر کے تیار کیا جاتا ہے۔  
کیمیکل ری ایکشن یہ ہے:



سوال 2:  $SO_3$  بنانے والے ری ایکشن سے پہلے سلفر ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کو کیوں صاف کیا جاتا ہے؟

جواب: گیس میں موجود ڈسٹ، ناخالص مادوں اور آرسینک کے کمپائونڈز کو نکالنے کے لیے گیسوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ قدم اہم ہے کیونکہ آرسینک کے کمپائونڈز کیٹالسٹ جیسا کہ  $V_2O_5$  پر زہریلے اثرات مرتب کرتے ہیں۔

## فوری جانچ 19.3

سوال 1: لیڈ آکسائیڈ کو ایمفوٹیرک آکسائیڈ کیوں کہتے ہیں؟


جواب: لیڈ آکسائیڈ کو ایمفوٹیرک آکسائیڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسڈ اور طاقتور بیس دونوں سے ری ایکٹ کر کے سالٹ اور پانی بناتا ہے اور اس طرح ایسڈ اور بیس دونوں طرح کی خصوصیات کا مظاہرہ کرتا ہے۔

سوال 2: نان میٹلو آکسیجن سے ری ایکشن کر کے کوہیلٹ آکسائیڈز کیوں بناتی ہیں؟

جواب: نان میٹلو کی الیکٹرونیکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو مستحکم ہونے کے لیے الیکٹرانز ٹرانسفر کرنے کی بجائے انھیں شیئر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کوہیلٹ بانڈز بنتے ہیں۔

## فوری جانچ 19.4

سوال 1: بیریم اور پانی کے درمیان ہونے والے ری ایکشن کی مساوات لکھیں۔



سوال 2: ایلومینیم اور زنک پانی کے ساتھ کیسے ری ایکشن کرتے ہیں؟

جواب: ایلومینیم اور زنک اپنی سطح پر حفاظتی آکسائیڈز کی تہہ کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتے تاہم وہ زیادہ درجہ حرارت پر بھاپ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے متعلقہ آکسائیڈز اور ہائیڈروجن بناتے ہیں۔

## فوری جانچ 19.5

سوال 1: زنک اور آئرن میں سے کون سی میٹل ہائیڈروکلورک ایسڈ سے تیزی کے ساتھ ری ایکشن کرے گی؟

جواب: زنک  $HCl$  کے ساتھ تیزی سے ری ایکٹ کرے گا کیونکہ اسے ری ایکٹیوٹی سیریز میں آئرن سے اوپر رکھا گیا ہے جو اسے زیادہ ری ایکٹیو بناتا ہے۔

سوال 2: ایسی ایک میٹل کا نام بتائیں جو کہ زنک کو اس کے سالٹ سے باہر نکال دے گی۔

جواب: سیریز میں زنک کے اوپر کی کوئی بھی میٹل جیسے میگنیشیم (Mg)، آلومینیم (Al)، یا سوڈیم (Na) زنک کو اس کے سالٹ سے ڈس پلےس کر دے گی۔

## فوری جانچ 19.6

سوال 1: انسانی صحت پر نائٹروجن کے آکسائیڈز کے معز اثرات کون سے ہیں؟

جواب: (i) نائٹروجن کے آکسائیڈز سانس کے سگین مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔

(ii) یہ اوزون اور PAN جیسے نائٹرو پلوتینس کی تشکیل میں بھی حصہ ڈالتے ہیں جو انسان کے لیے زہریلے ہیں۔



سوال 2: نائٹروجن کے آکسائیڈز فضا کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟

جواب: نائٹروجن کے آکسائیڈز ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔

- ایسڈ رین کے لیے بطور کیٹالسٹ کام کر کے
- نائٹریک ایسڈ رین بنانے کے لیے پانی کے ساتھ ری ایکٹ کر کے
- سورج کی روشنی کی موجودگی میں سموگ اور سیکنڈری پلوتینس جیسے اوزون اور PAN کی تشکیل میں حصہ ڈال کے۔

### دلچسپ معلومات

- ماحول میں نائٹروجن فلیسیشن کا 13% ہبیر پروسس کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے۔
- سلفیورک ایسڈ کو کیمیکلز کا بادشاہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً ہر صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔
- پانی ایک ایفوفیٹرک شے ہے۔ یہ ایسڈ اور بیس دونوں طرح کے خواص ظاہر کرتا ہے اور ان خواص کا انحصار اس شے پر ہے جس سے یہ ری ایکشن کرے۔
- اگر خلا میں ایک میٹل کے دو ٹکڑوں جن پر کسی قسم کی تہ نہ جی ہو، ملایا جائے تو مستقل طور پر ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسا زمین پر ممکن نہیں کیونکہ زمین کی ہوا کی وجہ سے ان ٹکڑوں کی سطحوں پر آکسائیڈ کی تہ جم جاتی ہے جو کہ ان کو جڑنے سے روکتی ہے۔
- فضائی آلودگی سالانہ 7 سے 8 ملین اموات کا باعث بنتی ہے جو کہ بچوں کی صحت کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔

## معروضی طرز سوالات

### اضافی کثیر الانتخابی سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

امونیا

19.1

سلفیورک ایسڈ

19.2

درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- ہبیر پراسیس (Haber process) میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن کس تناسب (بذریعہ ولیم) سے استعمال ہوتے ہیں؟  
(a) 1:1 (b) 3:1 (c) 1:3 (d) 3:2
- 2- امونیا کی تیاری (Synthesis) میں کون سا کیٹالسٹ (Catalyst) استعمال ہوتا ہے؟  
(a) وینڈیم (V) آکسائیڈ (b) پلاٹینم (c) آئرن (d) نکل
- 3- فریکشنل ڈسٹیلیشن کے دوران مائع ہوا سے نائٹروجن کس درجہ حرارت پر الگ ہوتی ہے؟  
(a)  $-196^{\circ}\text{C}$  (b)  $-33.4^{\circ}\text{C}$  (c)  $450^{\circ}\text{C}$  (d)  $0^{\circ}\text{C}$
- 4- ہبیر پراسیس میں ہائیڈروجن کی تیاری کے لیے خام مال (Raw material) کون سا ہے؟  
(a) آئرن پائیرائٹ (b) کاربن ڈائی آکسائیڈ (c) میتھین ( $\text{CH}_4$ ) (d) سلفر
- 5- اولیم (Oleum) کا کیمیائی فارمولا کیا ہے؟  
(a)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (b)  $\text{SO}_3$  (c)  $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$  (d)  $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$



6- کنٹیکٹ پروسیس (Contact process) میں  $SO_2$  کی آکسڈیشن کے لیے کون سا کیمیکل اسسٹنٹ استعمال ہوتا ہے؟

- (a) آئرن (b) میکینیشیم (c) وینڈیم پینٹا آکسائیڈ (d) کاپر

7- ماحول میں نائٹروجن فیکسیشن (Nitrogen fixation) کا کتنا فیصد حصہ مہر پر (بیس) سے حاصل ہوتا ہے؟

- (a) 80% (b) 13% (c) 98% (d) 35%

8- کس مرکب (Compound) کو "کیمیکلز کا بادشاہ" کہا جاتا ہے؟

- (a) امونیا (b) نائٹرک ایسڈ (c) میتھین (d) سلفیورک ایسڈ

9- آئرن پائیرائٹ ( $FeS_2$ ) کے روستنگ سے کون سی گیس پیدا ہوتی ہے؟

- (a)  $SO_2$  (b)  $NH_3$  (c)  $CO_2$  (d)  $H_2$

10- مہر پرائیس میں عام طور پر کتنا پریشر (Pressure) برقرار رکھا جاتا ہے؟

- (a) 100 atm (b) 200 atm (c) 300 atm (d) 400 atm

11- عالمی سطح پر تیار کی جانے والی امونیا کا بنیادی استعمال کیا ہے؟

- (a) پلاسٹک (b) ریفریجریٹس (c) دھماکہ خیز مواد (d) کھادیں

آکسائیڈز

19.3

میٹلز

19.4

12- جب آکسیجن نان میٹل (جیسے سلفر یا کاربن) کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہے تو کس قسم کا آکسائیڈ بنتا ہے؟

- (a) بیسک آکسائیڈ (b) تیزابی آکسائیڈ (c) نیوٹرل آکسائیڈ (d) ایمفوٹریک آکسائیڈ

13- بیریم (Ba) جب آکسیجن میں جلتا ہے تو اس کے شعلے (Flame) کا مخصوص رنگ کیا ہوتا ہے؟

- (a) شدید سفید (b) گہرا سرخ (c) ہلکا سبز (d) سفید مع سرخ

14- یہ ایک نیوٹرل آکسائیڈ کی مثال ہے:

- (a)  $ZnO$  (b)  $Na_2O$  (c)  $CO$  (d)  $Al_2O_3$

15- جلنے پر کون سی دھات گہرا سرخ (Crimson) شعلہ پیدا کرتی ہے؟

- (a) کیشیم (b) سٹرانسیم (c) میکینیشیم (d) پوٹاشیم

16- مندرجہ ذیل میں سے کون سی دھات ہلکے حیزاب (Dilute acids) کے ساتھ سب سے زیادہ تیزی سے رد عمل ظاہر کرتی ہے؟

- (a) سوڈیم (b) زنک (c) آئرن (d) میکینیشیم

17- یہ ایک ایمفوٹریک (Amphoteric) مادہ ہے:

- (a) پانی (b) کاربن ڈائی آکسائیڈ (c) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (d) ہائیڈروکلورک ایسڈ

میٹلز کی ری ایکٹیوٹی سیریز

19.5

فضائی آلودگی پھیلانے میں نائٹروجن کے آکسائیڈز کا کردار

19.6

18- ہوا میں موجود آکسیجن کے ذریعے کون سی گیس تیزی سے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ ( $NO_2$ ) میں تبدیل ہو جاتی ہے؟

- (a) نائٹرک آکسائیڈ ( $NO$ ) (b) نائٹرس آکسائیڈ ( $N_2O$ ) (c) امونیا ( $NH_3$ ) (d) نائٹروجن ( $N_2$ )



19- پر آکسی لیسٹ (PAN) سورج کی روشنی اور کے درمیان ریکشن سے بنتا ہے۔

(a) کاربن ڈائی آکسائیڈ (b) دو لینائل آرگینک کمپاؤنڈز

(c) آبی بخارات (d) آکسیجن

20- کون سی دھات ہلکے تیزاب سے ہائیڈروجن کو خارج (Displace) نہیں کر سکتی؟

(a) آئرن (Fe) (b) زنک (Zn) (c) لیڈ (Pb) (d) سونا (Au)

جوابات:

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (b) -10 | (a) -9  | (d) -8  | (b) -7  | (c) -6  | (c) -5  | (c) -4  | (a) -3  | (c) -2  | (b) -1  |
| (d) -20 | (b) -19 | (a) -18 | (a) -17 | (a) -16 | (b) -15 | (c) -14 | (c) -13 | (b) -12 | (d) -11 |

## اضافی مختصر سوالات

منیٹر تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے نمونہ جوابی سوالات

امونیا

19.1

سلفیورک ایسڈ

19.2

مختصر جواب دیں۔

1- امونیا کے بڑے صنعتی استعمال کیا ہیں؟

جواب: امونیا بنیادی طور پر نائٹروجن والی کھادیں (تقریباً 80%) جیسے یوریا بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ پلاسٹک، ادویات کی تیاری اور ریفریجریٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔


2- امونیا کی تیاری کے لیے ہمہ پراسیس کس نے دریافت کیا؟

جواب: ہمہ پراسیس ایک جرمن کیمیا دان ایف جے ہمبر (F.J. Haber) نے امونیا کی پیداوار کے لیے دریافت کیا تھا۔

3- ہمہ پراسیس (Haber process) کے لیے موزوں ترین حالات (Optimum conditions) کیا ہیں؟

جواب: اس کے لیے 400-500°C درجہ حرارت، 200 ایٹوسفیرک پریشر اور کیٹالسٹ Fe/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> کی موجودگی ضروری ہے۔

4- امونیا کی تیاری (Synthesis) کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔



5- ہمہ پراسیس کے لیے نائٹروجن کیسے حاصل کی جاتی ہے؟

جواب: ہمہ پراسیس کے لیے نائٹروجن مائع ہوا کی فریکشنل ڈسٹیلیشن (Fractional distillation) سے حاصل کی جاتی ہے۔ چونکہ نائٹروجن کا بوائلنگ پوائنٹ آکسیجن سے کم ہے، اس لیے نائٹروجن 196°C پر پہلے بخارات بن کر اڑ جاتی ہے اور آکسیجن پیچھے رہ جاتی ہے۔ الگ کی گئی نائٹروجن کو دوبارہ مائع بنا کر مخصوص سلنڈروں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔

6- ماحول میں نائٹروجن فکسیشن کا کتنا حصہ ہمہ پراسیس سے حاصل ہوتا ہے؟

جواب: ماحول میں ہونے والی کل نائٹروجن فکسیشن کا 13% حصہ ہمہ پراسیس کے ذریعے ہوتا ہے۔



7- سلفیورک ایسڈ صنعتی طور پر کیسے تیار کیا جاتا ہے؟

جواب: سلفیورک ایسڈ صنعتی پیمانے پر کنٹیکٹ پروسس (Contact process) کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔

سوال 8: SO<sub>2</sub> اور O<sub>2</sub> کو کنٹیکٹ چیمبر میں داخل کرنے سے پہلے صاف کرنا کیوں ضروری ہے؟  
جواب: انہیں گرد و غبار اور آرسینک کے مرکبات سے پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ناخالص مادے بعد میں استعمال ہونے والے کیٹالسٹ کو زہریلا (Poison) کر کے ناکارہ بنا سکتے ہیں۔

سوال 9: سلفیورک ایسڈ کو کیمیکلز کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: سلفیورک ایسڈ کو کیمیکلز کا بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تقریباً ہر صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔

10- O<sub>2</sub> کو SO<sub>3</sub> میں تبدیل کرنے کے لیے کون سا کیٹالسٹ اور حالات استعمال ہوتے ہیں؟

جواب: O<sub>2</sub> کو SO<sub>3</sub> میں تبدیل کرنے کے لیے وینڈیم پینٹا آکسائیڈ (V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) کیٹالسٹ، 450°C درجہ حرارت اور 2-3 ایٹمو سفیورک پریشر استعمال کیا جاتا ہے۔

میٹلر

19.4

آکسائیڈز

19.3

11- آکسائیڈ کیا ہیں؟

جواب: عناصر کے ساتھ آکسیجن کے باہمی مرکبات (Binary compounds) کو آکسائیڈز کہا جاتا ہے۔

12- بیسک اور تیزابی آکسائیڈز میں فرق واضح کریں۔

جواب: • بیسک آکسائیڈز: یہ عام طور پر دھاتوں سے بنتے ہیں۔ یہ پانی میں حل ہو کر بائیڈروآکسائیڈ بناتے ہیں اور سرخ ٹمس کو نیلا کر دیتے ہیں۔  
• تیزابی آکسائیڈز: یہ عام طور پر نان میٹلز (جیسے N, C, S) سے بنتے ہیں۔ یہ پانی میں حل ہو کر ایسڈ بناتے ہیں جو نیلے ٹمس کو سرخ کر دیتے ہیں۔

13- نیوٹرل آکسائیڈز کیا ہیں؟

جواب: نیوٹرل آکسائیڈز وہ آکسائیڈز ہیں جو پانی کے ساتھ مل کر نہ تیزاب بناتے ہیں اور نہ ہی بیس (Base)۔  
مثالیں: کاربن مونو آکسائیڈ (CO)، نائٹرک آکسائیڈ (NO) اور نائٹرس آکسائیڈ (N<sub>2</sub>O)۔


14- امفیوٹریک آکسائیڈز (Amphoteric oxides) کی تعریف کریں۔

جواب: امفیوٹریک آکسائیڈز: یہ آکسائیڈز عام طور پر تیزاب بننے میں جب آکسیجن کم الیکٹرو پوزیٹو (less electropositive) دھاتوں کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہے۔ یہ تیزاب اور بیس (Base) دونوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ الکل کی موجودگی میں ایسڈ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔

مثالیں: زنک آکسائیڈ (ZnO) اور آلومینیم آکسائیڈ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)۔


15- ایک ایسا کیمیائی عمل (Reaction) لکھیں جس میں زنک آکسائیڈ (ZnO) ایک بیس کے طور پر کام کر رہا ہو۔

جواب: زنک آکسائیڈ تیزاب کی موجودگی میں ایک بیس کے طور پر کام کرتا ہے:



16- ایک ایساری ایکشن لکھیں جس میں آلومینیم آکسائیڈ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ایک ایسڈ کے طور پر کام کر رہا ہو۔

جواب: جب آلومینیم آکسائیڈ ایک الکل جیسے کہ سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (NaOH) کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے، تو یہ ایسڈ کے طور پر کام کرتا ہے:






17- پانی ایک ایفونیٹرک مادہ ہے۔ کیسے؟

جواب: پانی ایک ایفونیٹرک مادہ ہے۔ یہ تیزاب اور بنیں دونوں کے طور پر کام کر سکتا ہے، جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ کس دوسرے مادے کے ساتھ ری ایکٹ کر رہا ہے۔


18- گروپ 1 کی دھاتیں (K, Na) ٹھنڈے پانی کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کرتی ہیں؟

جواب: یہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ انتہائی تیزی (Vigorously) سے ری ایکٹ کرتی ہیں اور اپنے متعلقہ ہائیڈروآکسائیڈز اور ہائیڈروجن گیس پیدا کرتی ہیں۔



19- میکینیشیم پانی کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے؟

جواب: میکینیشیم ٹھنڈے پانی کے ساتھ ست رفتاری سے ری ایکٹ کر کے میکینیشیم ہائیڈروآکسائیڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔



20- Mg, Ca, Sr اور Ba کے شعلوں (Flame) کے مخصوص رنگ کیا ہیں؟

جواب: (Mg): شدید سفید شعلہ (Intense white flame)

• کیلشیم (Ca): ہلکی سرخی مائل سفید شعلہ (White flame with a ting of red)

• سٹرانسیم (Sr): گہرا سرخ شعلہ (Crimson flame)

• بیریم (Ba): ہلکا بنر شعلہ (A pale green flame)

19.5 مپٹون کی ری ایکٹیوٹی سیریز

19.6

فضائی آلودگی پھیلانے میں نائٹروجن کے آکسائیڈز کا کردار

سوال 21: کون سی ڈائلیوٹ ایسڈ سے ہائیڈروجن گیس خارج کر سکتی ہیں؟

جواب: صرف وہ مپٹون جو ری ایکٹیوٹی سیریز میں ہائیڈروجن سے اوپر موجود ہیں، مپٹون کے ساتھ ری ایکشن کر کے ہائیڈروجن گیس خارج کر سکتی ہیں۔

سوال 22: کون سی مپٹون آکسیجن کے ساتھ آسانی سے ری ایکٹ کرتی ہیں اور کون سی ست رفتاری سے؟

جواب: ری ایکٹیو مپٹون جیسے پوٹاشیم اور سوڈیم، آکسیجن کے ساتھ آسانی سے ری ایکٹ کرتی ہیں جبکہ کم ری ایکٹیو مپٹون جیسے چاندی، تانبا (کاپر) اور لوہا (آئرن) آکسیجن کے ساتھ بہت ست رفتاری سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔

سوال 23: ری ایکٹیوٹی سیریز میں کون سی مپٹون طاقتور ہیں اور کیوں؟

جواب: سیریز میں سب سے اوپر موجود دھاتیں طاقتور ریڈیوسنگ ایجنٹس (Reducing agents) ہیں کیونکہ وہ آسانی سے آکسائیڈ ہو جاتی ہیں۔

سوال 24: ری ایکٹیوٹی سیریز میں مپٹون کی ریڈیوسنگ صلاحیت (Reducing ability) کیسے کم ہوتی ہے؟

جواب: سیریز میں نیچے کی طرف جاتے ہوئے مپٹون کی ریڈیوسنگ صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔

سوال 25: پرائمری پلوٹنٹ (Primary pollutants) میں کیا شامل ہے؟

جواب: پلوٹنٹس میں نائٹروجن، سلفر اور کاربن کے آکسائیڈز اور مختلف ہائیڈروکاربن شامل ہیں۔

سوال 26: پرائمری اور سیکنڈری پلوٹنٹس میں فرق واضح کریں۔


جواب: پرائمری پلوٹنٹس: وہ پلوٹنٹس جو براہ راست ایٹوسفیر میں خارج ہوتے ہیں، پرائمری پلوٹنٹس کہلاتے ہیں، جیسے نائٹروجن کے آکسائیڈز

(NO<sub>x</sub>)، سلفر اور کاربن کے آکسائیڈز اور مختلف ہائیڈروکاربن۔



سینڈری پلٹنٹس: سینڈری پلٹنٹس تب بنتے ہیں جب پرائمری پلٹنٹس فضا میں آپس میں ری ایکٹ کرتے ہیں، جیسے اوزون ( $O_3$ )، پیروکسی لیسینائل نائٹریٹ (PAN) اور سلفورک ایسڈ۔

سوال 27: نائٹرک آکسائیڈ (NO) قدرتی طور پر کیسے پیدا ہوتی ہے؟  
جواب: یہ بجلی چمکنے (Lightening) کے دوران پیدا ہوتی ہے جب برقی اخراج (electrical discharges) کی وجہ سے فضائی نائٹروجن اور آکسیجن آپس میں ری ایکٹ کرتے ہیں۔



سوال 28: ایسڈ رین (Acid rain) بننے میں  $NO_2$  کا کیا کردار ہے؟  
جواب: نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ ہوا میں پانی اور دیگر کیمیکلز کے ساتھ ری ایکٹ کر کے نائٹرک ایسڈ ( $HNO_3$ ) اور نائٹریک ایسڈ ( $HNO_2$ ) کے بخارات بناتی ہے، جو تیزابی بارش کا باعث بنتے ہیں۔

سوال 29: تیزابی بارش کے منفی اثرات کیا ہیں؟

- جواب: • تیزابی بارش ماحولیاتی نظام (Ecosystem) کے لیے نقصان دہ ہے۔  
• اشیاء/مواد (Materials) کو زنگ آلود (Corrode) کر سکتی ہے۔  
• یہ سانس کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔

## حل مشقی سوالات

### A کثیر الانتخابی سوالات

صحیح جواب پر (✓) کریں۔

- i- امونیا کی پیداوار کے لیے ری ایکشن کا درجہ حرارت زیادہ رکھنے کی وجہ ہے:  
(الف) ری ایکشن انرجی بہت زیادہ ہے۔  
(ب) ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی بہت کم ہے۔  
(ج) نائٹروجن اور ہائیڈروجن دونوں گیس ہیں۔  
(د) کم درجہ حرارت پر نائٹروجن اور ہائیڈروجن مائع میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
- ii-  $H_2SO_4$  کی صنعتی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والا کومپیکٹ پروکس  $SO_4$  اور  $O_2$  میں موجود کثافتوں کے لیے حساس ہے کیونکہ کثافتیں:  
(الف)  $SO_2$  کا آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن نہیں ہونے دیتیں۔ (ب)  $H_2SO_4$  کے خالص پن کو متاثر کرتی ہیں۔  
(ج)  $SO_2$  کا آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن نہیں ہونے دیتیں۔ (د) ری ایکشن کے ریٹ کو قابل ذکر حد تک کم کر دیتی ہیں۔
- iii- کون سا آکسائیڈ نیوٹرل ہونے کی خصوصیات رکھتا ہے:  
(الف)  $Al_2O_3$  (ب)  $SO_2$  (ج)  $CO_2$  (د)  $NO$
- iv- سوڈیم، میگنیشیم سے زیادہ ری ایکٹو سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ:  
(الف) یہ میگنیشیم سے زیادہ الیکٹرو پازٹیو ہے۔  
(ب) یہ پانی کے ساتھ آہستہ ری ایکشن کرتی ہے۔  
(ج) یہ دوسرے گروپ میں پائی جاتی ہے۔  
(د) یہ کم متھیل ہے۔
- v- فضا میں موجود ثانوی (Secondary) آلودہ ذرات کون سے ہیں؟  
(الف) نائٹروجن کے آکسائیڈز  
(ب) سلفر کے آکسائیڈز  
(ج) اوزون اور پی اے این (PAN)  
(د) کاربن کے آکسائیڈز



-vi سلفیورک ایسڈ کی تیاری کے دوران، SO<sub>2</sub> پانی کے بجائے H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> میں جذب کی جاتی ہے۔ کیونکہ:

(الف) SO<sub>2</sub> پانی کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتی۔  
(ب) SO<sub>2</sub> کا پانی کے ساتھ ری ایکشن بہت زیادہ کمزور ہے۔ جس سے سلفیورک ایسڈ ایک دھند کی مانند پیدا ہوتا ہے جسے کنڈنس (Condense) کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

(ج) یہ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> کی بہتر پیداوار فراہم کرتی ہے۔  
(د) SO<sub>2</sub> کا پانی کے ساتھ ری ایکشن دھماکے کا سبب بن سکتا ہے۔

-vii کون سے آکسائیڈز بننے ہیں جب آکسیجن دھاتوں کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے:

(الف) ایسڈک (ب) بیسک (ج) غیر جانبدار (د) بیسک اور ایسڈک

-viii ایسڈ رین (Acid Rain) کے اہم اجزاء ہیں:

(الف) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> اور HNO<sub>3</sub> (ب) H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> اور HNO<sub>2</sub> (ج) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> اور HCl (د) ایسڈک ایسڈ اور HNO<sub>3</sub>


### جوابات:

i- (الف) ii- (الف) iii- (د) iv- (الف) v- (ج) vi- (ب) vii- (ب) viii- (الف)

### B مختصر جوابی سوالات:

19.1 نائٹروجن ہوا سے کیسے حاصل کی جاتی ہے؟  
جواب: نائٹروجن مائع ہوا کی فریکشنل ڈسٹیلیشن (fractional distillation) کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ چونکہ نائٹروجن کا بوائونگ پوائنٹ آکسیجن سے کم ہوتا ہے، اس لیے نائٹروجن 196°C پر پہلے بخارات بن کر اٹھ جاتی ہے اور آکسیجن پیچھے رہ جاتی ہے۔ علیحدہ شدہ نائٹروجن کو دوبارہ مائع بنا کر خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے سلنڈروں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔

19.2 ہائیڈروجن میتھین سے کیسے بنائی جاتی ہے؟  
جواب: ہائیڈروجن میتھین کو آکسیجن کی محدود مقدار میں گرم کر کے تیار کی جاتی ہے جو کہ میتھین کو مکمل طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی میں آکسائیڈائز کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ کم آکسیجن کی موجودگی میں، ری ایکشن کے نتیجے میں بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تھوڑی سی مقدار بنتی ہے۔ حاصل شدہ کاربن مونو آکسائیڈ کو پھر پانی کے ساتھ ری ایکٹ کرایا جاتا ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور مزید ہائیڈروجن گیس حاصل ہو سکے۔



19.3 SO<sub>2</sub> کو SO<sub>3</sub> میں آکسائیڈائز کرنے کے لیے کون سی کنڈیشن مطلوب ہوتی ہیں؟

جواب: کونٹیکٹ پراسیس (contact process) میں، آکسائیڈیشن 450°C درجہ حرارت، 2-3 ایٹوسفیئر (atmosphere) پر پریشر اور کیٹالسٹ ویناڈیم (پینٹا) آکسائیڈ (V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) کی موجودگی میں ہوتی ہے۔

19.4 CO<sub>2</sub> کو ایسڈک آکسائیڈ جبکہ CO کو نیوٹرل آکسائیڈ کیوں پایا جاتا ہے؟

جواب: کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO<sub>2</sub>) ایک ایسڈک آکسائیڈ ہے کیونکہ یہ پانی میں حل ہو کر کاربونیک ایسڈ (H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) بناتی ہے اور سائلٹ بنانے کے لیے بیسز کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے۔

دوسری طرف کاربن مونو آکسائیڈ (CO) ایک نیوٹرل آکسائیڈ ہے کیونکہ یہ ایسڈ یا بیس کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرتی اور لٹمس پیپر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔




19.5 میکٹیشیم اور میگنیشیم پانی کے ساتھ ری ایکشن میں ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں؟

جواب: میکٹیشیم ٹھنڈے پانی کے ساتھ تیزی سے ری ایکشن کر کے میکٹیشیم ہائیڈروآکسائیڈ اور ہائیڈروجن پیدا کرتا ہے۔



میکٹیشیم ٹھنڈے پانی کے ساتھ بہت آہستہ ری ایکشن کرتا ہے اور میگنیشیم ہائیڈروآکسائیڈ اور ہائیڈروجن گیس دیتا ہے۔



19.6 دھاتوں کی ری ایکٹیویٹی کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟

جواب: میٹلو کی ری ایکٹیویٹی کا تعین اس بات کا موازنہ کر کے کیا جاتا ہے کہ وہ پانی، ڈائیوٹ ایسڈز اور آکسیجن کے ساتھ کتنی شدت سے ری ایکٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد میٹلو کو ان کی ری ایکٹیویٹی کی کم ہوتی ہوئی ترتیب میں رکھا جاتا ہے۔

19.7 نائٹروجن کے آکسائیڈز سے کون سے ثانوی آلودہ ذرات پیدا ہوتے ہیں؟

جواب: نائٹروجن کے آکسائیڈز (NO<sub>x</sub>) دوسرے مرکبات اور سورج کی روشنی کے ساتھ مل کر اوزون (O<sub>3</sub>)، پرائیمری ایسیٹائل نائٹریٹ (PAN)، سلفیورک ایسڈ اور تیزابی بارش پیدا کرتے ہیں۔

### C تعمیری فکر پر مبنی سوالات

19.1 امونیا کو ایک اہم کیمیکل کیوں سمجھا جاتا ہے؟


جواب: امونیا (NH<sub>3</sub>) کو کئی وجوہات کی بنا پر ایک انتہائی اہم کیمیکل سمجھا جاتا ہے:

- زراعت: دنیا بھر میں پیدا ہونے والی امونیا کا تقریباً 80 فیصد حصہ نائٹروجنی کھادوں، جیسے کہ یوریا اور مختلف امونیم نمکیات بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ عالمی آبادی کو خوراک فراہم کرنے کے لیے فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں ضروری ہیں۔
- صنعتی استعمال: امونیا پلاسٹک اور دوا سازی (pharmaceuticals) کی تیاری میں ایک اہم خام مال ہے۔
- ریفریجریشن: اپنی تھرموڈائنامک خصوصیات کی وجہ سے، امونیا کو صنعتی ریفریجریٹ کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- نائٹروجن فیکیشن: ہیبیر پروسیس (Haber process)، جو امونیا پیدا کرتا ہے، ماحول میں کل نائٹروجن فیکیشن میں 13 فیصد تک حصہ ڈالتا ہے۔

19.2 ہوا میں موجود SO<sub>2</sub> کیسے SO<sub>3</sub> میں تبدیل ہوتی ہے؟

جواب: فضا میں سلفر ڈائی آکسائیڈ (SO<sub>2</sub>) کا سلفر ٹرائی آکسائیڈ (SO<sub>3</sub>) میں تبدیل خود بخود نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ایک کیٹالسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

- کیٹالسٹ کا کردار: ہوا میں موجود نائٹروجن کے آکسائیڈز (NO<sub>x</sub>) اس ری ایکشن کے لیے کیٹالسٹ کا کام کرتے ہیں۔



ایک بار جب SO<sub>3</sub> بن جاتی ہے، تو یہ ہوا میں موجود آبی بخارات کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) بناتی ہے، جو کہ تیزابی بارش کا ایک بڑا جزو ہے۔

19.3 کار کے انجن میں فوسل فیولز کا جلنا نائٹروجن کے آکسائیڈز بناتا ہے۔ وضاحت کریں۔


جواب: کار کے انجن میں فوسل فیولز کے جلنے سے نائٹروجن کے آکسائیڈز پیدا ہوتے ہیں، جس کی تفصیل ذیل میں ہے:

- ہائی ٹمپریچر کا ماحول: کار کے انجن کے اندر، فوسل فیولز کا جلنا انتہائی زیادہ درجہ حرارت پیدا کرتا ہے۔

- تھرمل ری ایکشن: یہ شدید گرمی ماحولیاتی نائٹروجن (N<sub>2</sub>) اور آکسیجن (O<sub>2</sub>) کے براہ راست ری ایکٹ کرنے کے لیے ضروری ایکٹیویشن انرجی فراہم کرتی ہے۔



یہ پہلے نائٹروکس (NO) بناتے ہیں، جو پھر ہوا میں موجود مزید آکسیجن کے ساتھ تیزی سے ری ایکٹ کر کے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (NO<sub>2</sub>) بناتا ہے۔



19.4 ری ایکٹیوٹی سیریز میں اوپر والا حصے میں موجود دھاتیں کو نیچے حصے میں موجود دھاتوں کے مقابلے میں زیادہ ری ایکٹیو ہوتی ہیں۔ اس بیان پر تبصرہ کریں۔

● جواب: دھاتوں کی ری ایکٹیوٹی: کسی دھات کی ری ایکٹیوٹی کا تعین اس کے الیکٹران کھونے اور مثبت آئن بنانے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔

● دھاتوں کی ری ایکٹیوٹی سیریز: پانی اور ایسڈ کے ساتھ ان کے ری ایکشن کی بنیاد پر، دھاتوں کو ان کی ری ایکٹیوٹی کی گھٹی ہوئی ترتیب میں ترتیب دیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی ترتیب کو ری ایکٹیوٹی سیریز کہتے ہیں۔

● سیریز کا اوپری حصہ: پوٹاشیم (K) اور سوڈیم (Na) جیسی دھاتیں سب سے اوپر ہوتی ہیں کیونکہ وہ انتہائی الیکٹرو پازٹیو ہوتی ہیں۔

● وہ اپنے ویلنس الیکٹران بہت آسانی سے کھودیتے ہیں اور پانی اور ایسڈ کے ساتھ تیزی سے ری ایکشن کرتے ہیں۔

● ریڈیوسنگ ایجنٹس: کیونکہ وہ آسانی سے آکسائیڈائز ہو جاتے ہیں (الیکٹران کھودیتے ہیں)، اس لیے اوپر موجود دھاتیں طاقتور ریڈیوسنگ ایجنٹس سمجھی جاتی ہیں۔


● سیریز کا نچلا حصہ: چاندی (Ag) اور سونا (Au) جیسی دھاتیں نیچے ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت مستحکم (stable) ہوتی ہیں اور آسانی سے الیکٹران نہیں ہٹاتیں، جس کی وجہ سے وہ کم ری ایکٹیو ہوتی ہیں۔

19.5 فوسل فیوز SO<sub>2</sub> کیسے پیدا کرتے ہیں؟

● جواب: سلفر ڈائی آکسائیڈ توانائی کی پیداوار اور صنعتی عمل کا ایک بانی پروڈکٹ ہے۔

● امپورٹنٹ: زیادہ تر فوسل فیوز، خاص طور پر کوئلہ اور بھاری تیل، قدرتی طور پر بطور امپورٹنٹ سلفر کے مرکبات کی ہوا میں مقدار رکھتے ہیں۔

● جلنے کا عمل: جب یہ ایندھن پاور پلانٹس، فیکٹریوں یا گھریلو ہیٹنگ سسٹم میں جلائے جاتے ہیں، تو سلفر آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے۔



● اور روئنگ (Ore Roasting): مزید برآں، آئرن پائرائٹ (FeS<sub>2</sub>) جیسے سلفائیڈ اور کوآکسائیڈ ہوا میں بھونکنے سے بھی بڑی مقدار میں SO<sub>2</sub> خارج ہوتی ہے۔

### D تفصیلی سوالات

19.1 صنعتی پیمانے پر امونیا کی تیاری کی وضاحت کریں۔ جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 1۔

19.2 سلیفورک ایسڈ کی پیداوار کے لیے کنٹیکٹ پروسیس کا تفصیلی جائزہ دیں۔

● جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 3۔

19.3 ایسڈک اور بیسک آکسائیڈز کی تشکیل اور خصوصیات کی وضاحت کریں۔

● جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 4۔

19.4 آکسیجن اور پانی کے ساتھ ری ایکشنز کی بنیاد پر پہلے اور دوسرے گروپ کی دھاتوں کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔

● جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 6۔

19.5 تیزابی بارش اور پی اے این (PAN) کی تشکیل میں نائٹروجن کے آکسائیڈز کے کردار کی وضاحت کریں۔

● جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 8۔