



اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- ٹرمپرچر میں تبدیلی کے ساتھ طبعی حالت (میلنگ، بوائلنگ، فریزنگ، کنڈنسیشن، سب لیمیشن اور ڈیپوزیشن) اور انٹرنل انرجی میں تبدیلی کی کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کے لحاظ سے وضاحت کریں۔
- ایوپوریشن اور بوائلنگ کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔
- کائی ٹیک تھیوری کے لحاظ سے ہیٹنگ اور کولنگ کروڈز (Heating and Cooling Curves) کی تشریح کریں۔
- کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کے لحاظ سے بوائلز، چارلس لا اور ایوگڈروڈ لا کے حوالے سے گیس کے دباؤ، ٹرمپرچر اور والیوم میں سے دو میں تبدیلی کا تیسرے پر ہونے والے اثرات کی وضاحت کریں۔
- بوائلنگ اور ایوپوریشن کی شرح پر بیرونی دباؤ کے اثر کا کوالیٹیٹیو (Qualitative) لحاظ سے جائزہ لیں۔
- کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیفیوژن کی تشریح کریں۔
- ڈیفیوژن کی شرح پر مائیکرو ماس اور ٹرمپرچر کے اثرات کا کوالیٹیٹیو (Qualitative) جائزہ لیں۔
- ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والی سب سے زیادہ شے کے استعمالات کی وضاحت کریں۔ ٹھوس ایئر فریشنر (Air Freshner) اور 3-D پرنٹنگ اس کی مثالیں ہیں۔
- کائی ٹیک تھیوری کے لحاظ سے انسانی جسم میں ادویات کے ڈیفیوژن کی شرح کی اہمیت کو واضح کریں۔



انشائی طرز سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

انٹرنل انرجی (Internal Energy)

14.1

(Interconversion of Physical States of Matter)

14.2

سوال 1: وضاحت کریں کہ کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کی روشنی میں مادہ کی حالتوں میں پارٹیکلز کی ترتیب اور حرکت کو بیان کرتی ہے؟
جواب: مادہ کی بنیادی حالتیں: اس دُنیا میں مادہ چار حالتوں میں پایا جاتا ہے جس کو ٹھوس، مائع، گیس اور پلازما کہتے ہیں۔

کائیٹک (Kinetic Particle Theory) کے مطابق تمام گیسوں کے خواص کا مطالعہ سب سے پہلے کیا گیا۔ گیسوں کے طبعی خواص مثلاً ان کا سکڑ جانا یا پھیل جانا اور نفوذ (Diffuse) ہو جانا آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ گیس چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہیں جو کہ لگاتار ہر سمت میں گھوم رہے ہیں۔ ان خیالات کی بنیاد پر گیسوں کی کائیٹک پارٹیکل تھیوری (Kinetic Particle Theory) بنائی گئی۔

کائیٹک پارٹیکل تھیوری کا دائرہ کار: کائیٹک پارٹیکل تھیوری کی مدد سے ہم نہ صرف گیسوں کے متعلق قوانین کی وضاحت کر سکتے ہیں بلکہ مادہ کی ٹھوس اور مائع حالتوں کی کمپوزیشن اور مادہ کی تینوں حالتوں میں باہمی تبدیلیوں کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ مادہ کی تینوں حالتیں صرف طبعی طور پر مختلف ہیں جبکہ ان کی کیمیائی ساخت بالکل ایک جیسی ہے۔ مثال کے طور پر پانی اپنی تینوں حالتوں میں فرق کے باوجود کیمیائی طور پر ایک ہی کمپاؤنڈ ہے۔

گیسوں میں بے ترتیب حرکت کے لیے کائیٹک تھیوری کے نکات: کائیٹک پارٹیکل تھیوری کے مطابق گیسیں چھوٹے چھوٹے ذرات کا مجموعہ ہوتی ہیں جو کہ ہر ممکن سمت میں لگاتار حرکت کرتے رہتے ہیں۔ کسی گیس کا پریشر اُس کے ذرات کے برتن کی دیواروں کے ٹکرانے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ چونکہ کسی گیس کا پریشر مخصوص ٹمپرچر پر مستقل رہتا ہے اس لیے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ گیس کے ذرات کے درمیان کم پریشر پر بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے اس لیے ان ذرات کے درمیان کشش کی قوتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ گیس کے ذرات کی اوسط کائیٹک انرجی کا انحصار اُس کے ٹمپرچر پر ہے۔ بشرطیکہ ٹمپرچر کو کیلون (kelvin) سکیل پر ماپا جائے۔ تمام گیسوں کی اوسط کائیٹک انرجی ایک جیسے ٹمپرچر پر ایک جیسی ہوتی ہے۔

مائع کے لیے کائیٹک پارٹیکل تھیوری کے نکات: کائیٹک تھیوری کے مطابق گیس کے ذرات کے مقابلے میں مائع کے ذرات بہت قریب قریب ہوتے ہیں اور یہ بھی ہر سمت میں ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً مائع کے ذرات کی کوئی مستقل پوزیشن نہیں ہوتی اور اس لیے ان کی شکل و صورت بھی مستقل نہیں ہوتی۔ تاہم مائع کے ذرات کے درمیان موجود کشش کی قوتوں کی وجہ سے یہ آپس میں جڑے رہتے ہیں اس لیے مائع کا وایوم (Volume) مستقل ہوتا ہے اور یہ اپنی شکل و حجم بھی رکھتی ہے۔ مائع حالت میں موجود ذرات تینوں قسم کی حرکت کر سکتے ہیں۔

ٹھوس اشیاء کے لیے کائیٹک پارٹیکل تھیوری کے نکات: ٹھوس اشیاء کے ذرات، ایٹم یا مالیکیولز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کائیٹک تھیوری کے مطابق ٹھوس اشیاء میں موجود ذرات کے درمیان کشش کی قوت بہت مضبوط ہونے کی وجہ سے ذرات ترتیب سے اپنی اپنی مستقل پوزیشنز پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ ذرات اپنی ان پوزیشنز پر صرف وابتھریت (Vibrate) کر سکتے ہیں۔ ان محدود حرکات کی وجہ سے ٹھوس اشیاء کی اشکال اور وایوم بھی مخصوص ہوتے ہیں۔

سوال 2: (الف) انٹرل انرجی (Internal Energy) سے کیا مراد ہے؟ انٹرل انرجی میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟

جواب: انٹرل انرجی (Internal Energy): کسی سسٹم کی انٹرل انرجی دراصل اس کی مجموعی انرجی کے برابر ہوتی ہے اس میں ذرات کی حرکات کی وجہ سے کائیٹک انرجی اور ذرات کے درمیان موجود کیمیائی بانڈ کی وجہ سے پوٹینشل انرجی دونوں شامل ہیں۔ کسی شے کو گرم کرنے سے اس کی انٹرل انرجی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

(ب) کسی ٹھوس کے مائع میں تبدیل ہونے کو بیان کریں۔

جواب: ٹھوس کا مائع میں تبدیل ہونا: (Conversion of a solid into a liquid)



برف کا پگھلنا

کسی ٹھوس کی طبعی حالت کو گرم کرنے سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ گرم کرنے سے ٹھوس میں موجود ذرات تیزی سے وابتھریت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

میلنگ پوائنٹ: ایک خاص ٹمپرچر پر جب ان کی وابتھریشن (Vibration) بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کے درمیان کشش کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجہ میں ٹھوس شے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اس ٹمپرچر کو ٹھوس کا میلنگ پوائنٹ (Melting Point) کہتے ہیں۔

ٹھوس کا مائع میں تبدیل ہونا: میلنگ پوائنٹ پر ٹھوس کے ذرات نہ صرف اپنی مستقل پوزیشنز چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کے درمیان کسی قسم کی ترتیب بھی برقرار نہیں رہتی۔ یہ ٹھوس

پھر اس طرح کی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی ٹھوس شے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو میٹلنگ پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے یہ ہیٹ انرجی (Heat Energy) دو کام کرتی ہے ایک تو ٹھوس کے ذرات کی کائیٹک انرجی میں اضافہ کرتی ہے، دوسرا ان ذرات میں موجود کشش کی قوتوں کو کمزور کرتی ہے۔ مزید گرم کرنے سے جب یہ ٹھوس مائع میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ٹمپریچر نہیں بڑھتا۔ اس مرحلہ پر ٹھوس کو دی جانی والی ہیٹ ساری کی ساری اس ٹھوس کو مائع میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

سوال 3: بوائٹنگ کے ذریعے کس طرح مائع گیس میں تبدیل ہوتا ہے؟

جواب: مائع کا گیس میں تبدیل ہونا: (Conversion of a liquid in Gas)

ایوپیوریشن: مائع کے مالیکیولز تمام ٹمپریچرز پر اُس کی سطح سے متواتر نکلتے رہتے ہیں۔ اس طرح مالیکیولز کا نکل کر ہوا میں شامل ہونا ایوپیوریشن (Evaporation) کہلاتا ہے۔

مائع کو گرم کرنا: جب مائع کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے ذرات کی کائیٹک انرجی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ایوپیوریشن کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ مائع کو اور زیادہ گرم کرنے سے اس کے مالیکیولز کی کائیٹک انرجی اور زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان کے درمیان کشش کی قوتیں خاصی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر مائع کے اندر سے بلبلے تیزی سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر مائع کا ویپر پریشر (Vapour Pressure) اُس کی سطح پر پڑنے والے بیرونی پریشر کے مساوی ہو جائے تو مائع اُبلنا شروع کر دیتی ہے۔

بوائٹنگ پوائنٹ: کسی ٹمپریچر پر جب مائع کا ویپر پریشر اُس کی سطح پر موجود ایٹموسفیرک یا بیرونی پریشر کے برابر ہو جائے تو اس ٹمپریچر کو مائع کا بوائٹنگ پوائنٹ (Boiling Point) کہتے ہیں۔

مائع کا گیس میں تبدیل ہونا: کسی مائع کے بوائٹنگ پوائنٹ پر جو ہیٹ اس کو دی جاتی ہے وہ مائع کو گیس میں تبدیل ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے جب کہ مائع کا ٹمپریچر نہیں بڑھتا۔ دوسرے الفاظ میں، اس موقع پر مائع کو جو ہیٹ مہیا کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری مالیکیولز کے درمیان موجود کشش کی قوتوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

سوال 4: گیس کے مائع میں تبدیل ہونے کا عمل بیان کریں۔

جواب: گیس کا مائع میں تبدیل ہونا: (Conversion of a gas into its liquid)

گیس کو ٹھنڈا کرنا: جس کسی گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس میں موجود مالیکیولز کی کائیٹک انرجی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مالیکیولز قریب آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان کشش کی قوتیں بھی خاصی مضبوط ہو جاتی ہیں۔

کنڈنیشن (Condensation): کسی موزوں ٹمپریچر پر کشش کی قوتیں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ گیس کے مالیکیولز بہت قریب آ کر اس کو مائع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو کنڈنیشن (Condensation) کہتے ہیں۔ اس تبدیلی کے دوران گیس کا ٹمپریچر بدستور مستقل رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ساری گیس مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

ہیٹنگ اور کولنگ کروڑ (Heating and Cooling Curves)

14.3

ایوپیوریشن اور بوائٹنگ (Evaporation and Boiling)

14.4

سوال 5: ہیٹنگ اور کولنگ کروڑ کی تعریف کریں۔ گراف کی مدد سے کسی ٹھوس شے میں ہیٹنگ اور کولنگ کروڑ کے مراحل کو بیان کریں۔

جواب: ہیٹنگ اور کولنگ کروڑ: (Heating and Cooling Curves)

مادہ کی مختلف حالتوں کے درمیان ہونے والی تبدیلی کو ہم ایک ایسے گراف سے بھی سمجھ سکتے ہیں جو کسی سسٹم کی انٹرنل انرجی اور اس کے ٹمپریچر کے درمیان کھینچا جاتا ہے۔ اس قسم کے گراف کو ہیٹنگ یا کولنگ کروڑ بھی کہتے ہیں۔

سوال 6: ٹیپرچر میں تبدیلی کے ساتھ پانی میں ہونے والی طبعی تبدیلیوں کے لیے ہیٹنگ کرو بنائیں۔

جواب: پانی کا ہیٹنگ کرو: اگر ہم پانی کا ہیٹنگ کرو (Heating Curve) بنائیں اور برف کو گرم کرنا شروع کریں تو یہ 0°C پر پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ برف کا میلنگ پوائنٹ ہے۔ مزید گرم کرنے سے اس وقت تک ٹیپرچر نہیں بڑھے گا جب تک ساری برف پگھل نہیں جاتی۔

بوائلنگ پوائنٹ: مزید گرم کرنے سے پانی کا ٹیپرچر بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ 100°C یعنی بوائلنگ پوائنٹ آجائے گا۔ یہ ٹیپرچر اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک سارا پانی بھاپ میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔

پانی کا کوئنگ کرو: پانی کا کوئنگ کرو بناتے ہوئے ہم بھاپ کو ٹھنڈا کریں گے حتیٰ کہ 100°C ٹیپرچر پر یہ پانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ مزید ٹھنڈا کرنے سے اس کا ٹیپرچر یہی رہے گا جب تک کہ ساری بھاپ پانی میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔

فریزنگ پوائنٹ: مزید ٹھنڈا کرنے سے 0°C ٹیپرچر پر یہ پانی آہستہ آہستہ برف میں تبدیل ہو جائے گا اور اس تبدیلی کے دوران بھی یہی ٹیپرچر برقرار رہے گا۔

سوال 7: ایوپوریشن اور بوائلنگ میں فرق کریں۔

جواب: ایوپوریشن اور بوائلنگ میں فرق: (Difference between Evaporation and Boiling)

بوائلنگ	ایوپوریشن
(i) یہ عمل پانی کو بھاپ میں تبدیل کرتا ہے اور اس دوران مستقل طور پر سارے پانی میں بلبے بنتے رہتے ہیں اور اس دوران پانی پڑنے والا بیرونی ایٹموسفیرک پریشر بھی مستقل رہتا ہے۔	(i) یہ عمل پانی کی سطح پر آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔
(ii) یہ عمل بوائلنگ کے ٹیپرچر تک پہنچنے سے پہلے تک بدستور جاری رہتا ہے۔	(ii) پانی کا ٹیپرچر بڑھنے سے ایوپوریشن کی رفتار بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔
(iii) بوائلنگ سے ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی۔	(iii) ایوپوریشن سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔
(iv) بوائلنگ کے لیے انرجی کے ایک بیرونی ماخذ کی ضرورت ہوتی ہے۔	(iv) اس عمل کے وقوع پذیر ہونے کے لیے بہت کم انرجی درکار ہوتی ہے جو کہ پانی کے اندر سے مہیا ہو جاتی ہے۔

سوال 8: ایوپوریشن اور بوائلنگ کی رفتار پر بیرونی پریشر کا اثر بیان کریں۔

جواب: ایوپوریشن اور بوائلنگ کی رفتار پر بیرونی پریشر کا اثر:

(Effect of External Pressure on the Rates of Evaporation and Boiling)

بیرونی پریشر کم ہونے سے ایوپوریشن کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے جب کہ بڑھنے سے یہ رفتار کم ہو جاتی ہے۔

وضاحت: جب ایک کھلے برتن میں موجود مائع کے مالیکیولز اس کی سطح سے باہر نکلنے ہیں تو وہ فوراً بیرونی ہوا کے ساتھ مل جاتے ہیں اور بہت کم واپس مائع میں شامل ہوتے ہیں۔

بیرونی دباؤ میں اضافہ: اگر مائع پر پڑنے والا بیرونی دباؤ زیادہ ہو جائے تو سطح سے نکلنے والے مالیکیولز ہوا میں شامل ہونے کی بجائے مائع میں واپس چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً ایوپوریشن کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔

بوائلنگ پوائنٹ: مائع کو بوائل (Boil) کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مسلسل بلبے بنتے رہتے ہیں جو کہ اوپر اٹھ کر مائع کی سطح پر آ کر پھٹ جاتے ہیں، اس دوران مائع کا ٹیپرچر مستقل ایک جگہ پر رہتا ہے۔ اس ٹیپرچر کو بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔

کم ایٹموسفیرک پریشر پر: اگر آپ کراچی میں پانی کا بوائلنگ پوائنٹ نکالیں تو یہ 100°C ہوگا تاہم اگر یہی بوائلنگ پوائنٹ مری میں نکالا جائے تو یہ 98°C ہوتا ہے۔ مری میں چونکہ بیرونی ایٹموسفیرک پریشر کراچی کی نسبت کم ہوتا ہے اس لیے پانی یہاں پر جلدی بوائل کر جاتا ہے۔

سوال 9: سب لمیشن اور ڈیپوزیشن پر نوٹ لکھیں۔

جواب: سب لمیشن (Sublimation):

کسی ٹھوس شے کا مائع حالت میں تبدیل ہوئے بغیر براہ راست بخارات میں تبدیل ہو جانا سب لمیشن کہلاتا ہے۔

مثالیں: مثال کے طور پر ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ جسے ڈرائی آئس (Dry Ice) بھی کہتے ہیں عام ٹیپر پیپر پر مائع حالت میں تبدیل ہونے کے بغیر سیدھا گیس حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سب لمیشن کی ایک اور مثال عام ملنے والی فائل کی گولیوں کا خود بخود غائب ہو جانا ہے۔ یہ گولیاں کپڑوں کے اندر رکھی جاتی ہیں تاکہ نقصان پہنچانے والے کیڑے دُور رہیں۔

وضاحت: ایوےپوریشن کی طرح سب لمیشن کے لیے بھی انرجی شے کے اندر سے مہیا ہوتی ہے۔ یہ شے پھر اپنی انرجی میں ہونے والی کمی کو ماحول سے لے کر پوری کرتی ہے۔ یہ انرجی مالیکولز کے درمیان کشش کی قوتوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ مالیکولز پھر آزاد حالت میں بخارات بن کر اُڑ جاتے ہیں۔

ڈیپوزیشن (Deposition): یہ مظاہر سب لمیشن کے الٹ ہے اور اس میں ایک گیس مائع میں تبدیل ہونے کے بغیر سیدھی ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

مثال: سردیوں میں آبی بخارات کا ٹہرے میں تبدیل ہونا ڈیپوزیشن کی ایک مثال ہے۔

سوال 10: سب لمیشن پر رنگ اور ایئر فریشنز کے استعمال میں کس طرح سے دگر ثابت ہوتی ہے؟

جواب: ٹھوس ایئر فریشنز (Solid Air Fresheners):

ایئر فریشنز سب لمیشن کے عمل کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ ان میں ایک خوشبودار شے موجود ہوتی ہے جو لگاتار بخارات کی شکل میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تبدیلی حرارت کے بغیر یا حرارت کی موجودگی دونوں صورتوں میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ یہ خوشبودار شے بخارات میں تبدیل ہو کر کمرے میں پھیل جاتی ہے اور ناپسندیدہ بدبو کا اثر ختم کر دیتی ہے۔

وضاحت: جب ٹھوس ایئر فریشنز کو کسی ماحول میں رکھا جاتا ہے یا پھر اُسے گرم کیا جاتا ہے تو اُس میں موجود ٹھوس اجزاء بکھر جاتے ہیں اور ارد گرد کے ماحول کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔

سب لمیشن پر رنگ (Sublimation Printing): جب سب لمیشن کے عمل سے کسی میٹریل یا کپڑے پر کوئی ڈیزائن پرنٹ کیا جاتا ہے تو اسے سب لمیشن پر رنگ کہتے ہیں۔

وضاحت: اس عمل کے دوران سیاہی اور حرارت کی مدد سے اس ڈیزائن کو اُس میٹریل پر منتقل کیا جاتا ہے اور اس دوران استعمال ہونے والی سیاہی بخارات بن کر کپڑے پر چپک جاتی ہے۔ اس طرح پر رنگ پائیدار ہوتی ہے اور وقت گزرنے سے دُھندلا نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیاہی کپڑے کی تہوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس عام پر رنگ میں سیاہی کپڑے کے اوپر والی سطح پر صرف چپک جاتی ہے اس لیے جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ سب لمیشن پر رنگ کے دوران حرارت اور دباؤ کی وجہ سے سیاہی کے بخارات کپڑے میں موجود خالی جگہوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ٹھنڈا کر کے پروسس میں جذب ہو جاتے ہیں۔

سب لمیشن پر رنگ کی اہمیت (Importance of Sublimation Printing): سب لمیشن پر رنگ نہ صرف عام استعمال میں آنے والی ٹی شرٹس پر ڈیزائن بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ اس سے سرائیک، لکڑی اور دھاتوں پر بھی ڈیزائن بنائے جاسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان اشیاء پر ایک خاص شے کی تہہ جمائی جاتی ہے جس پر سیاہی کے بخارات چپک جاتے ہیں۔

سوال 11: بوائل کا قانون بیان کریں اور کائی ٹیک مالیکولر تھیوری کی بنیاد پر پریشر اور والیوم کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں۔

جواب: بوائل کا قانون: (Boyle's Law) اس قانون کی رو سے کسی گیس کی خاص مقدار کے والیوم اور اس کے پریشر کے درمیان مخالف تعلق ہے بشرطیکہ اس گیس کا ٹمپریچر مستقل رکھا جائے۔
حسابی طریقے سے علم ریاضی کی رو سے اس تعلق کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔


$$V \propto \frac{1}{P} \quad (V \text{ کسی گیس کی خاص مقدار کا والیوم ہے جبکہ } P \text{ اس کا پریشر ہے۔})$$

وضاحت: کائی ٹیک تھیوری کی رو سے کسی گیس کا پریشر اس میں موجود مالیکولز کے برتن کی دیواروں سے ٹکرانے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس پریشر کا انحصار ٹکرانے والے مالیکولز کی تعداد پر ہے کہ جو دیے ہوئے وقت میں دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔

پریشر میں اضافہ: جب کسی گیس کی خاص مقدار پر اور ایک خاص ٹمپریچر پر بیرونی پریشر بڑھایا جاتا ہے تو اس کے مالیکولز کے درمیان موجود فاصلہ کم ہو جاتا ہے جس کی گیس کا والیوم کم ہو جاتا ہے۔ اگر بیرونی پریشر ڈال کر گیس کے والیوم کو آدھا کر دیا جائے تو اس میں موجود مالیکولز کی تعداد بالفاظ والیوم ڈگنی ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں برتن کی دیواروں سے ٹکرانے والے مالیکولز کی تعداد بھی ڈگنی ہو جائے گی۔ چونکہ ٹکرانے والی مالیکولز کی تعداد ڈگنی ہو گئی ہے اس لیے اس گیس کا پریشر بھی ڈگنا ہو جائے گا۔

سوال 12: بوائل کے قانون کی تجرباتی تصدیق کی وضاحت کریں۔

جواب: بوائل کے قانون کی تجرباتی تصدیق: (Experimental Verification of Boyle's law)



رابرٹ بوائل نے اپنے بنائے ہوئے پریشر اور والیوم کے درمیان تعلق کے قانون کو درج ذیل سادہ تجربہ سے ثابت کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے انگریزی حرف J کی شکل کی ایک گلاس ٹیوب لی اور اس کے چھوٹے بازو کو بند کر دیا اس کے بعد اس نے اس ٹیوب کی بڑے بازو میں مرکری (Mercury) انڈیل دی جس سے چھوٹے بازو میں موجود ہوا اس کے اندر ہی قید ہو گئی چونکہ اس نے مرکری کی بہت کم مقدار استعمال کی اس لیے یہ مقدار ہوا سکڑنے سے محفوظ رہی اور اس پر پریشر عام ہوا کے پریشر کے برابر ہی تصور کیا گیا۔ بوائل نے پھر بڑے بازو میں مزید مرکری ڈالی حتیٰ کہ دونوں بازوؤں میں مرکری کی سطحوں کے درمیان 760 ملی میٹر کا فاصلہ ہو گیا۔ اس طرح اس نے مقید ہوا پر پڑنے والے پریشر کو دو گنا کر دیا (2 × 760 ملی میٹر)۔

بوائل کے قانون کی تصدیق

نتیجہ: اس عمل کے بعد جب اس نے مقید گیس کا والیوم نوٹ کیا تو وہ پہلے سے آدھا تھا۔ واضح رہے کہ اس تجربے کے دوران ہوا کے ماس اور اس کے ٹمپریچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔


اس تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ جب گیس پر پریشر ڈگنا کیا گیا تو اس کا والیوم آدھا ہو گیا اور یہی بوائل کا قانون بھی ہے۔

سوال 13: چارلس کا قانون بیان کریں۔ کائی نٹک تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کریں گیس کو مستقل پریشر پر گرم کرنے سے اس کا وایوم کیوں بڑھتا ہے؟

جواب: چارلس کا قانون: (Charles's Law)

اس قانون کے مطابق اگر کسی گیس کی خاص مقدار کا ٹمپرچر بڑھایا جائے تو اس کا وایوم بھی بڑھ جائے گا بشرطیکہ اس پر پڑنے والا پریشر مستقل رہے۔
ریاضی کے مطابق $V \propto T$ (گیس کا ماس اور اس پر پڑنے والا پریشر مستقل رہتا ہے۔)

وضاحت: کائی نٹک تھیوری کے مطابق اگر کسی گیس کے ٹمپرچر میں اضافہ کیا جائے تو اس گیس میں موجود مالیکیولز کی اوسط رفتار اور کائی نٹک انرجی میں



بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مالیکیولز کی رفتار میں اضافہ کی وجہ سے برتن کی دیواروں کے ساتھ ان کے ٹکراؤ بھی بڑھ جاتے ہیں اور ٹکرانے کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں وجوہات کی وجہ سے گیس کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تاہم اگر گیس کا پریشر نہ بڑھنے دیا جائے تو پھر اس کے ٹمپرچر میں اضافہ کی وجہ سے اس کا وایوم بڑھ جائے گا۔

تجرباتی تصدیق: (Experimental verification) اس

عمل کا پہلا آسانی سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر گیس ایک سلنڈر میں موجود ہو اور اس سلنڈر کے ساتھ پستون لگا ہو۔ جب گیس کو گرم کیا جاتا ہے تو پستون لازمی طور پر اوپر حرکت کرے گا جس سے سلنڈر میں موجود گیس کا وایوم بڑھ جائے گا۔ یاد رہے کہ اس عمل کے دوران گیس پر پڑنے والا پریشر مستقل رہے گا۔

سوال 14: ایووگیڈرو کے قانون کو بیان کریں۔ گیس کے مالیکیولز کی تعداد اور ان کے پریشر کے مابین تعلق کی وضاحت کریں۔

جواب: ایووگیڈرو کا قانون: (Avogadro's Law)

اس قانون کے مطابق ایک جیسے وایوم رکھنے والے برتنوں میں بند مختلف گیسوں میں موجود مالیکیولز کی تعداد لازمی طور پر ایک جیسی ہوگی اگر ان کا ٹمپرچر اور پریشر ایک جیسا رکھا جائے گا۔

ریاضی کے مطابق $V \propto n$ (پریشر اور ٹمپرچر مستقل رہیں گے)

وضاحت: کائی نٹک تھیوری کے مطابق کسی گیس کا پریشر اس میں موجود مالیکیولز کا برتن کی دیواروں کے ساتھ ٹکرانے سے وجود میں آتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے پریونٹ ایریا ٹکرانے کا انحصار ان کی تعداد اور ان کی رفتار پر ہے۔

اگر آپ کے پاس دو ایک جیسے برتن ہیں اور ان میں گیس کی ایک ہی مقدار کسی خاص ٹمپرچر اور پریشر موجود ہے اور آپ کسی ایک برتن میں مزید گیس داخل کر دیتے ہیں تو قدرتی طور پر اس برتن میں موجود گیس کا پریشر بڑھ جائے گا۔ اگر آپ اس پریشر کو بڑھنے نہ دیں تو لازمی طور پر اس کا پھر وایوم بڑھ جائے گا۔ گیس کے وایوم میں اضافہ کی وجہ سے اس برتن میں موجود گیس کا پریشر پہلے جتنا ہو جائے گا۔

نتیجہ: اس مشاہدہ سے یہ نتیجہ نکلا اگر کسی برتن میں گیس کے مالیکیولز کی تعداد زیادہ ہوگی تو لازمی طور پر اس کا وایوم بھی زیادہ ہوگا بشرطیکہ ہم اس گیس کا پریشر اور ٹمپرچر تبدیل نہ ہونے دیں۔

سوال 15: کائی نیک تھیوری کی بنیاد پر دو گیسوں کے درمیان ڈیفیوژن کی شرح میں فرق کی وضاحت کریں۔

جواب: ڈیفیوژن: (Diffusion)

مختلف گیسوں میں موجود مالیکیولز ہر سمت میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ مالیکیولز کی اس حرکت کی وجہ سے مختلف گیسیں زیادہ ارتکاز والے ایریا سے کم ارتکاز والے ایریا میں نہ صرف پھیل جاتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ یکجا بھی ہو جاتی ہیں۔ گیسوں کے یکجا ہونے کی اس خاصیت کو ڈیفیوژن کہتے ہیں۔
مثال: جب جسم میں لگانے والے پرفیوم کی بوتل کو کھولا جاتا ہے تو اس میں نکلنے والی خوشبو آہستہ آہستہ ڈیفیوژن کی وجہ سے سارے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔
ہائڈروجن گیس کی ڈیفیوژن: ہائڈروجن گیس کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل یا ڈیفوز (Diffuse) ہوتا دکھایا گیا ہے۔ ڈیفیوژن ایک خود بخود ہونے والا عمل ہے اور اس کی بدولت گیس کے ذرات ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔



گیسوں کا ڈیفیوژن


کائی نیک تھیوری کی روشنی میں وضاحت: مختلف گیسوں کا مختلف رفتار سے پھیلنے یا ڈیفوز ہونے کے عمل کو کائی نیک تھیوری سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ کائی نیک تھیوری کے مطابق تمام گیسوں میں موجود مالیکیولز کی اوسط کائی نیک انرجی ایک ہی ٹمپریچر پر یکساں ہوتی ہے چونکہ ہائڈروجن آکسیجن کی نسبت ایک ہلکی گیس ہے اس لیے اس کے مالیکیولز کی رفتار بھی آکسیجن کے مالیکیولز سے زیادہ ہوگی بشرطیکہ دونوں گیسوں کا ٹمپریچر ایک ہی ہو۔ نتیجتاً ہائڈروجن گیس آکسیجن گیس کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ڈیفوز ہوگی۔
ڈیفیوژن کی رفتار میں اضافہ: گیسوں کے ڈیفیوژن کی رفتار ٹمپریچر بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ بلند ٹمپریچر پر مالیکیولز کی کائی نیک انرجی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے نہ صرف پھیل جاتے ہیں بلکہ یکجا بھی ہو جاتے ہیں۔

سوال 16: تجربے کی مدد سے ثابت کریں کہ مختلف گیسوں میں ڈیفیوژن کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔

جواب: درکار سامان: (Required Material)

- روٹی کے دو گولے
- ایک لمبی گلاس ٹیوب
- کلورائیڈ گیس
- امونیا سلوشن

طریقہ کار: (Procedure) روٹی کے دو گولے لیں ایک کو ہائڈروجن کلورائیڈ گیس اور دوسرے کو امونیا گیس کے سلوشنز میں ڈبو کر گیلا کر لیں۔ ان دونوں گولوں کو بیک وقت گلاس ٹیوب کے دونوں کھلے سروں کے اندر رکھیں، دونوں گولوں میں سے یہ گیسیں علیحدہ علیحدہ نکل کر ٹیوب میں چلیں گی اور جہاں پر یہ دونوں ملیں گی وہاں سفید رنگ کا دھواں نظر آئے گا جو کہ امونیم کلورائیڈ کا دھواں ہوگا۔ ایک ہی وقت چلتے ہوئے ہائڈروجن کلورائیڈ گیس 40.5 سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کرے گی جبکہ امونیا گیس اسی وقت میں 59.5 سینٹی میٹر فاصلہ طے کرے گی۔
نتیجہ: اس سرگرمی سے ظاہر ہوا کہ امونیا گیس نے ہلکا ہونے کی وجہ سے ہائڈروجن کلورائیڈ کی نسبت زیادہ فاصلہ طے کیا۔



دو گیسوں کے ڈیفیوژن کی رفتار کا تقابل

سوال 17: انسانی جسم میں ادویات کے ڈیفیوز ہونے کی رفتار کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: ڈیفیوژن: (Diffusion)

کسی میڈیسن میں موجود مالیکولز کا زیادہ ارتکاز والے علاقوں سے کم ارتکاز والے علاقوں میں حرکت کرنا ڈیفیوژن کہلاتا ہے۔

ادویات کے ڈیفیوز ہونے کی رفتار: ادویات کے ڈیفیوژن کی رفتار سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دوائیاں ہمارے جسم میں کتنی جلدی جذب ہوں گی یا تقسیم ہوں گی یا پھر جسم سے باہر نکلیں گی۔ جب دوائی منہ کے ذریعے لی جائے تو معدہ اور بڑی آنت کے درمیان اس کے ڈیفیوز ہونے کی رفتار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی جلدی جسم میں جذب ہو جائے گی۔ دوائی کے جذب ہونے کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی جلدی وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرے گی۔

دوا کی اثر پذیری: دوائی کے مالیکولز ایک بار جب خون میں جذب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مختلف عضلات اور اعضا میں ڈیفیوز ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ڈیفیوز ہونے کی یہ رفتار ظاہر کرتی ہے کہ دوائی کتنی جلدی اپنا کام شروع کرے گی۔

مثال: مثال کے طور پر ایسی ادویات جو چربی میں حل ہو جاتی ہیں وہ سیلز (Cells) کی جھلیوں میں سے آسانی سے ڈیفیوز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑے وقت میں زیادہ اثر دکھاتی ہیں۔ عام طور پر ڈیفیوژن کی رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے دوائی کا ارتکاز متاثرہ عضو میں زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوائی زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔

انسانی جسم میں ادویات کے ڈیفیوز ہونے کی رفتار کی اہمیت: مختصر الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے ڈیفیوژن کی رفتار انسانی جسم میں دوائیوں کے متاثرہ حصے تک پہنچنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ڈیفیوژن کا عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ضروری اشیاء متاثرہ حصوں تک جلد از جلد پہنچ کر بیماریوں کو ختم کرنے میں معاون بن سکیں۔

14.1

سوال 1: ٹرانس لیٹنل موٹن (Translational Motion) کیا ہوتی ہے؟

جواب: ٹرانس لیٹنل موٹن ایسی موٹن ہے جس میں مالیکولز ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں چاہے سب ایک ہی ہو یا مختلف لیکن وہ ایک ہی محور پر رہتے ہیں۔

سوال 2: کیا گیسوں اور مائع کے ذرات کی اوسط کاٹائی ٹیک انرجی کسی خاص نمبر پر ایک جیسی ہوتی ہے؟

جواب: جی ہاں! ایک ہی درجہ حرارت پر گیس اور مائع کے ذرات کی اوسط کاٹائی ٹیک انرجی ایک جیسی ہوتی ہے۔

14.2

سوال 1: 100°C پر بننے والی بھاپ اسی نمبر پر موجود پانی کی نسبت زیادہ شدت سے کیوں جلاتی ہے؟

جواب: اُٹلتے ہوئے پانی کے پاس اضافی ہیٹ آف ویپورائزیشن نہیں ہوتی اس لیے یہ بھاپ کی نسبت کم جلاتا ہے۔

سوال 2: گرمیوں میں سوئی کپڑے پہننا ہمارے لیے کیوں آرام دہ ہے؟

جواب: روئی ایک قدرتی ریشہ ہے۔ یہ جسم کے پسینے کو آسانی سے جذب کر لیتی ہے کیونکہ اس میں چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو ہوا کو پسینے تک پہنچنے دیتے ہیں۔ جب پسینہ بخارات بن کر اُڑ جاتا ہے تو وہ جلد سے حرارت کو ساتھ لے جاتا ہے جس سے جلد خشک اور ٹھنڈی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے گرمیوں میں سوئی کپڑے پہننے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔

14.3

سوال 1: ایوپوریشن کے عمل کے دوران کیا مائع کے نمبر پرچ میں تبدیلی آتی ہے؟

جواب: نہیں! ایوپوریشن کے دوران مائع کا درجہ حرارت یکساں رہتا ہے کیونکہ حرارت درجہ حرارت بڑھانے کے بجائے مائع کی حالت بدلنے میں استعمال ہوتی ہے۔

سوال 2: کیا برف سب لائٹم (Sublime) کرتی ہے؟

جواب: جی ہاں! بہت سرد اور خشک حالات میں برف بغیر پگھلے براہ راست پانی کے بخارات میں تبدیل ہو سکتی ہے۔

سوال 3: اوپر دی گئی مثالوں کے علاوہ سب لیشن اور ڈیفیوژن کی ایک ایک مثال دیں۔

جواب: خشک برف یہ محسوس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے۔ جب اسے روم ٹمپرچر پر چھوڑ دیا جائے تو یہ بغیر مائع بنے براہ راست دھند جیسی گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

فری جانگ 14.4

سوال 1: ایک جیسے ٹمپرچر اور پریشر پر ذیل میں سے درج کون سی گیس سب سے زیادہ جلدی ڈیفیوژن ہوگی اور کون سی گیس ڈیفیوژن ہونے کے لیے سب سے زیادہ دیر

لگائے گی۔ $\text{NO}_2, \text{SO}_2, \text{H}_2\text{S}$

جواب: دی گئی گیسوں ($\text{NO}_2, \text{SO}_2, \text{H}_2\text{S}$) میں سے H_2S زیادہ تیزی سے پھیلے گی • SO_2 سب سے آہستہ پھیلے گی • بلکی گیس کے پارٹیکلز بھاری گیسوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور جلد پھیلے ہیں۔ H_2S ان میں سب سے ہلکی ہے جبکہ SO_2 سب سے بھاری ہے۔

سوال 2: کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کی مدد سے اس بات کی وضاحت کریں کہ امونیا گیس کیوں ہائڈروجن کلورائیڈ گیس کی نسبت جلدی ڈیفیوژن ہوتی ہے۔

جواب: امونیا گیس کے پارٹیکلز ہائڈروجن کلورائیڈ کے مقابلے میں زیادہ ہلکے ہوتے ہیں۔ کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کے مطابق، ایک ہی ٹمپرچر پر ہلکے پارٹیکلز کی اوسط رفتار زیادہ ہوتی ہے۔

اسی لیے امونیا کے پارٹیکلز تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور ہوا میں ہائڈروجن کلورائیڈ کے مقابلے میں زیادہ جلدی پھیل جاتے ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

• مادے کی تینوں حالتوں کی ایک دوسرے میں تبدیلی صرف ٹمپرچر تبدیل کرنے سے ہی نہیں لائی جاسکتی۔ بعض اوقات یہ تبدیلی زیادہ بہتر انداز میں لائی جاسکتی ہے اگر ہم ٹمپرچر اور پریشر دونوں بیک وقت تبدیل کریں یا پھر مستقل ٹمپرچر پر پریشر تبدیل کریں۔ مثال کے طور پر برف کا گولہ پٹانے والے کے ہاتھ میں موجود برف دبائے سے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ امونیا گیس کو 34°C ٹمپرچر پر صرف پریشر بڑھانے سے مائع میں تبدیل کیا جاسکتا ہے حتیٰ کہ کمرے کے ٹمپرچر یعنی 25°C پر 1MPa پریشر ڈالنے سے بھی امونیا گیس مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

گیس اور مائع میں موجود ذرات تینوں قسم کی حرکت یعنی ٹرانس لیشنل، روتیشنل (Translational, Rotational) اور وائبریشنل (Vibrational) حرکت کر سکتے ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

ایسی مادی اشیاء جن میں طبعی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں ان کو کپڑوں اور عمارات کے ٹمپرچر کموزوں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

معروضی طرز سوالات

اضافی کثیر الانتخابی سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

مادہ کی طبعی حالتوں میں تبدیلیاں

14.2

انٹر انرجی

1

درست جواب کا انتخاب کریں۔

کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کے مطابق، تمام ذرات کی حرکت کی حالت کیا ہے؟

(a) صرف گرم کرنے پر حرکت کرتے ہیں

(b) مسلسل اور بے ترتیب

(c) سیشنری اور فکسڈ

(d) دائرہ نما راستے میں حرکت

- 2- (a) روئیشنل موئن (b) وائیشنل موئن (c) روئیشنل موئن (d) ٹرائیشنل موئن
- 3- اگر درجہ حرارت بڑھ جائے تو گیس کے ذرات کی اوسط کائی ایک انرجی پر کیا اثر پڑتا ہے؟
(a) کم ہو جاتی ہے (b) ایک جیسی رہتی ہے (c) بڑھ جاتی ہے (d) صفر ہو جاتی ہے
- 4- کسی شے کی انٹرنل انرجی کن دو اقسام کی انرجیز کا مجموعہ ہے؟
(a) ہیٹ انرجی اور روشنی کی انرجی (b) کائی نٹیک انرجی اور پوٹینشل انرجی (c) نیوکلیر انرجی اور سولر انرجی (d) وائیشنل انرجی اور آواز کی انرجی
- 5- میلنگ پوائنٹ پر کیا ہوتا ہے؟
(a) ٹھوس مائع میں بدل جاتا ہے (b) مائع گیس میں بدل جاتا ہے (c) گیس ٹھوس میں بدل جاتی ہے (d) گیس مائع میں بدل جاتی ہے
- 6- اس عمل کو کیا کہتے ہیں جس میں گیس دوبارہ مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے؟
(a) بوائٹنگ (b) کچھلنا (c) کنڈنسیشن (d) ایوپوریشن
- 7- بوائٹنگ پوائنٹ پر مائع کا ویپر پریشر کس کے برابر ہوتا ہے؟
(a) صفر (b) انٹرنل انرجی (c) کچھلاؤ (d) ایٹوسفیرک پریشر
- 8- مادے کی کس حالت کا حجم مقرر ہوتا ہے لیکن شکل مقرر نہیں ہوتی؟
(a) ٹھوس (b) مائع (c) گیس (d) پلازمہ
- 9- جب گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو ذرات کی حرکت پر کیا اثر پڑتا ہے؟
(a) وہ ایک دوسرے کو مزید دھکیلتے ہیں (b) وہ عائب ہو جاتے ہیں (c) وہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں (d) ان کی کائی نٹیک انرجی کم ہو جاتی ہے
- 10- ان میں سے کون سی شے تینوں طبعی حالتوں میں پائی جاتی ہے جبکہ اس کی کیمیائی فطرت بالکل ایک جیسی رہتی ہے؟
(a) آکسیجن (b) لوہا (c) کاربن ڈائی آکسائیڈ (d) پانی
- 11- مادے کی کون سی حالت حرکت کی تینوں اقسام بیک وقت ظاہر کرتی ہے؟
(a) ٹھوس اور مائع (b) صرف گیس (c) گیس اور مائع (d) صرف ٹھوس
- 12- کسی بھی درجہ حرارت پر مائع کی سطح سے مالیکولز کے اخراج کے عمل کو کیا نام دیا جاتا ہے؟
(a) کنڈنسیشن (b) ایوپوریشن (c) بوائٹنگ (d) کچھلنا
- 13- جب گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور مالیکولز ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
(a) کنڈنسیشن (b) ایوپوریشن (c) بوائٹنگ (d) کچھلنا (Melting)
- 14- جب کسی ٹھوس شے کو گرم کیا جاتا ہے، تو اس کا درجہ حرارت
(a) بڑھ جاتا ہے (b) کم ہو جاتا ہے (c) ایک جیسا رہتا ہے (d) صفر ہو جاتا ہے

ہیننگ اور کولنگ کروڈز (Curves)

14.3

ایوپوریشن اور بوائٹنگ

14.4

- 15- کنڈنسیشن کو دیکھی گھا جاتا ہے۔
 (a) میلنگ پوائنٹ (b) کیو پکچن پوائنٹ (c) بوائلنگ پوائنٹ (d) فریزنگ پوائنٹ
- 16- کنڈنسیشن کے عمل کے دوران، درجہ حرارت:
 (a) بڑھے گا (b) کم ہوگا (c) مستقل رہتا ہے (d) صفر ہو جاتا ہے
- 17- مندرجہ ذیل میں سے کون سا میلنگ پوائنٹ کے برابر درجہ حرارت کو ظاہر کرتا ہے؟
 (a) میلنگ پوائنٹ (b) فریزنگ پوائنٹ (c) کنڈنسیشن پوائنٹ (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 18- امونیا گیس کو ایٹوسفیرک پریشر اور کس درجہ حرارت پر مائع بنایا جاسکتا ہے؟
 (a) -31°C (b) -32°C (c) -33°C (d) -34°C
- 19- کراچی کے مقابلے میں مری میں پانی کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے؟
 (a) 102°C (b) 100°C (c) 98°C (d) 75°C
- 20- اگر بیرونی پریشر بڑھا دیا جائے تو ایوپوریشن کی شرح پر کیا اثر پڑتا ہے؟
 (a) وہ بھی بڑھ جاتی ہے (b) کم ہو جاتی ہے (c) مستقل رہتی ہے (d) ایک جیسی رہتی ہے
- 21- گیس کا براہ راست مائع میں تبدیل ہونے کا عمل کہلاتا ہے:
 (a) سبلیمیشن (b) کنڈنسیشن (c) میلنگ (d) بوائلنگ
- 22- پانی کا ہیٹنگ کرو (Heating curve) کس درجہ حرارت پر مستقل رہتا ہے جب کہ برف پکھل رہی ہوتی ہے؟
 (a) 0°C (b) 100°C (c) 25°C (d) -34°C
- 23- مندرجہ ذیل میں سے کون سی چیز ڈرائی آؤٹس ہے؟
 (a) جمی ہوئی امونیا گیس (b) ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ (c) مائع نائٹروجن (d) جمی ہوئی آکسیجن
- 24- ان میں سے کون سا عنصر ایوپوریشن کی شرح کو بڑھاتا ہے؟
 (a) سطح رقبے میں اضافہ (b) درجہ حرارت میں کمی (c) بیرونی پریشر میں اضافہ (d) برتن کو بند رکھنا
- 25- کراچی میں پانی کا بوائلنگ پوائنٹ کتنا ہے؟
 (a) 25°C (b) 50°C (c) 75°C (d) 100°C
- 26- جب گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس کے مالیکیولز کی کئی ایک انرجی:
 (a) کم ہو جاتی ہے (b) بڑھ جاتی ہے (c) مستقل رہتی ہے (d) صفر ہو جاتی ہے
- 27- مائع کا وہ درجہ حرارت جس پر مائع کا دھیرے دھیرے پریشر ایٹوسفیرک پریشر کے برابر ہو جائے، کہلاتا ہے:
 (a) میلنگ پوائنٹ (b) بوائلنگ پوائنٹ (c) کنڈنسیشن پوائنٹ (d) ایوپوریشن
- 28- کسی ٹھوس کا پچھلے بغیر براہ راست بخارات میں تبدیل ہونا کہلاتا ہے:
 (a) بوائلنگ (b) منجمد ہونا (c) سبلیمیشن (d) کنڈنسیشن

سبلیمیشن (Sublimation)

14.5

سبلیمیشن کے استعارات

14.6

29- سبلیمیشن کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟

- (a) میلنگ (b) ڈیپوزیشن (c) منجمد ہونا (d) بوائلنگ

30- سبلیمیشن کے ذریعے اوئی کپڑوں سے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے کون سا مادہ استعمال ہوتا ہے؟

- (a) نمک کے کرشل (b) خشک خشک باتر (c) چینی کے کیوبز (d) ڈرائی آکس

31- سردیوں میں کہر کا بننا کس عمل کی مثال ہے؟

- (a) سبلیمیشن (b) ایوپوریشن (c) ڈیپوزیشن (d) کنڈنسیشن

32- ایئرفریزنز کے کام کرنے میں کون سا عمل استعمال ہوتا ہے؟

- (a) ایوپوریشن (b) کنڈنسیشن (c) ڈیپوزیشن (d) سبلیمیشن

33- سبلیمیشن انکس کو بخارات میں تبدیل کرنے کے لیے کون سے دو عوامل لاگو کیے جاتے ہیں؟

- (a) سردی اور روشنی (b) حرارت اور دباؤ (c) پانی اور ہوا (d) روشنی اور حرارت

34- سبلیمیشن پرنٹنگ کپڑے کے علاوہ کس پر کی جاسکتی ہے؟

- (a) پلاسٹک (b) لکڑی (c) دھات (d) یہ تمام

35- جب گیس براہ راست ٹھوس میں تبدیل ہو جائے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟

- (a) ڈیپوزیشن (b) کنڈنسیشن (c) سبلیمیشن (d) پگھلنا

14.7	کائی نیک تھیوری اور گیسوں کے قوانین
14.8	ڈیفیوژن
14.9	انسانی جسم میں ادویات کے ڈیفیوز ہونے کی رفتار کی اہمیت

36- حسابی طور پر بوائل کا قانون اس طرح لکھا جاتا ہے:

- (a) $V \propto T$ (b) $V \propto \frac{1}{P}$ (c) $V \propto T$ (d) $V \propto n$

37- چارلس کا قانون ('law Charles') حسابی طور پر کیسے لکھا جاتا ہے؟

- (a) $V \propto T$ (b) $V \propto n$ (c) $V \propto \frac{1}{p}$ (d) $V \propto P$

38- مندرجہ ذیل میں سے کون سی ایویگڈرو کے قانون حسابی شکل ہے۔

- (a) $V \propto \frac{1}{p}$ (b) $V \propto P$ (c) $V \propto n$ (d) $V \propto T$

39- پریشر اور وائلم کے درمیان تعلق کی بنیاد سے پہلے کس نے مشاہدہ کی؟

- (a) رابرٹ بوائل (b) ایلیگزینڈر چارلس (c) ایویگڈرو (d) نیوٹن

40- بوائل کے قانون کے مطابق، اگر درجہ حرارت مستقل رہے اور پریشر دوگنا کر دیا جائے تو وائلم کے وائلم پر کیا اثر پڑے گا؟

- (a) وائلم دوگنا ہو جائے گا (b) وائلم ایک تہائی کم ہو جائے گا (c) وائلم وہی رہے گا (d) وائلم آدھا (دون ہاف) رہ جائے گا

- 41- چارلس کا قانون کہتا ہے کہ مستقل پریش پر، گیس کا وائیم براہ راست کس کے متناسب ہوتا ہے؟
(a) ایٹوسفیرک پریش کے (b) ایسولیوٹ (کیلون) درجہ حرارت کے
(c) مولز کی تعداد کے (d) سیلسیس درجہ حرارت کے
- 42- درجہ حرارت بڑھانے پر ڈیفیوژن کی شرح پر کیا اثر پڑتا ہے؟
(a) یہ مستقل رہتی ہے (b) یہ کم ہو جاتی ہے (c) یہ بڑھ جاتی ہے (d) یہ مکمل طور پر رک جاتی ہے
- 43- انسانی جسم میں ادویات معدے سے خون میں بنیادی طور پر کس کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں؟
(a) کپریشن (b) ایکٹو پیسنگ (c) ڈیفیوژن (d) ایوپوریشن
- 44- مادے کی کس حالت میں سب سے تیزی سے ہوتا ہے؟
(a) گیس (b) مائع (c) ٹھوس (d) پلازمہ
- 45- اگر دو برتنوں کا وائیم، درجہ حرارت اور پریش ایک جیسا ہو، تو ایوگیڈرو کے قانون کے مطابق ان میں لازمی طور پر ہوگا:
(a) مالیکیولز کی تعداد برابر (b) مختلف رفتار (c) گیس کا ماس برابر (d) ایک جیسی کیمیائی خصوصیات
- 46- خوشبو (جیسے پرفیوم) پورے کمرے میں کیوں پھیل جاتی ہے چاہے ہوا نہ بھی چل رہی ہو؟
(a) ایوپوریشن کی وجہ سے (b) ڈیفیوژن کی وجہ سے
(c) سٹیٹیشن کی وجہ سے (d) ڈیپوزیشن کی وجہ سے
- 47- چارلس کا قانون اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بہت سرد موسم میں فٹ بال کیوں چمک جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے؟
(a) چارلس کا قانون (b) ایوگیڈرو کا قانون (c) بوائل کا قانون (d) ان میں سے کوئی نہیں
- 48- اگر آپ کسی غبارے کو دبائیں (اس کا وائیم کم کریں) جبکہ درجہ حرارت مستقل رہے، تو اندرونی پریش:
(a) صفر ہو جائے گا (b) بڑھ جائے گا (c) کم ہو جائے گا (d) مستقل رہے گا
- 49- اگر دیواروں کے ساتھ ٹکراؤ کی تعداد بڑھ جائے تو گیس کے پریش پر کیا اثر پڑتا ہے؟
(a) گیس مائع میں بدل جاتی ہے (b) پریش بڑھ جاتا ہے
(c) پریش وہی رہتا ہے (d) پریش کم ہو جاتا ہے
- 50- اگر آپ کسی برتن میں گیس کے ذرات کی تعداد دو گنی کر دیں جبکہ درجہ حرارت (T) اور پریش (P) کو مستقل رکھیں، تو وائیم پر کیا اثر پڑے گا؟
(a) وائیم آدھا ہو جائے گا (b) وائیم دو گنا ہو جائے گا (c) وائیم تین گنا ہو جائے گا (d) وائیم وہی رہے گا
- 51- لپڈ میں حل پذیر ادویات اکثر زیادہ موثر ہوتی ہیں کیونکہ وہ سیل ممبرین میں:
(a) زیادہ آسانی سے ڈیفیوز ہوتی ہیں (b) آہستہ ڈیفیوز ہوتی ہیں
(c) تیزی سے ایوپوریشن ہوتی ہیں (d) ڈیفیوز نہیں ہوتی

(d) -10	(d) -9	(b) -8	(d) -7	(c) -6	(a) -5	(b) -4	(c) -3	(b) -2	(b) -1
(b) -20	(c) -19	(d) -18	(b) -17	(c) -16	(b) -15	(a) -14	(c) -13	(b) -12	(c) -11
(b) -30	(b) -29	(c) -28	(b) -27	(a) -26	(b) -25	(a) -24	(b) -23	(a) -22	(b) -21
(d) -40	(a) -39	(c) -38	(a) -37	(b) -36	(a) -35	(d) -34	(b) -33	(d) -32	(c) -31
(b) -50	(b) -49	(b) -48	(a) -47	(b) -46	(a) -45	(a) -44	(c) -43	(c) -42	(b) -41
									(a) -51

14.1	انٹرنل انرجی
14.2	مادہ کی طبعی حالتوں میں تبدیلیاں

✿ مختصر جواب دیں۔

- 1- اس دنیا میں مادہ کن چار طبعی حالتوں میں پایا جاتا ہے؟
جواب: اس دنیا میں مادہ چار طبعی حالتوں میں پایا جاتا ہے یعنی گیس، مائع، ٹھوس اور پلازما۔
- 2- مادے کی کس حالت کی خصوصیات کا مطالعہ سب سے پہلے کیا گیا؟
جواب: گیسوں کی خصوصیات کا مطالعہ سب سے پہلے کیا گیا۔
- 3- کس خیال نے گیسوں کی کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کی تشکیل کی راہ ہموار کی؟
جواب: یہ تجویز کیا گیا تھا کہ گیسوں کی طبعی خصوصیات جیسے ان کے کمپرےس ہونے یا پھیلنے کی صلاحیت، یا ڈیفیوژن کو اس مفروضے سے سمجھا جاسکتا ہے کہ گیسوں کے ذرات (پارٹیکل) مسلسل بے ترتیب حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اس خیال نے پھر گیسوں کی کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کی تشکیل کی بنیاد رکھی۔
- 4- کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کس بات کی وضاحت کرتی ہے؟
جواب: کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری درج ذیل کی وضاحت کرتی ہے:
• وہ تمام قوانین جو گیسوں کے رویے کو کنٹرول کرتے ہیں۔
• مادے کی مائع اور ٹھوس حالتوں کی ساخت۔
• کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کیا ہے؟
- 5- کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری: یہ ایک نظریہ ہے جو تجویز کرتا ہے کہ تمام مادہ ان ذرات پر مشتمل ہے جو مسلسل بے ترتیب حرکت میں رہتے ہیں۔ یہ گیسوں، مائع اور ٹھوس کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کی باہمی تبدیلی کی وضاحت کرتا ہے۔
- 6- ایسی مثال دیں جو ثابت کرے کہ تینوں طبعی حالتیں اپنی طبعی خصوصیات میں مختلف ہیں جبکہ ان کی کیمیائی فطرت ایک جیسی رہتی ہے؟
جواب: تمام تینوں طبعی حالتیں اپنی طبعی خصوصیات میں الگ ہیں جبکہ کیمیائی فطرت ایک جیسی رہتی ہے۔
مثال: پانی اپنی تینوں طبعی حالتوں (برف، پانی، بھاپ) میں کیمیائی طور پر ایک جیسی ساخت رکھتا ہے۔
- 7- کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری گیس کے پریشر کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟
جواب: کائی ٹیک پارٹیکل تھیوری کے مطابق، کسی گیس کی طرف سے ڈالا جانے والا پریشر اس کے ذرات کے برتن کی دیواروں کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔
- 8- گیس کے ذرات کے درمیان کشش کی قوتوں کو کم ہونے کے برابر کیوں مانا جاتا ہے؟
جواب: گیس کے ذرات کے درمیان کشش کی قوتوں کو کم ہونے کے برابر اس لیے مانا جاتا ہے کہ ان کے پریشر پر ذرات ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔

9- مائع کا الیوم مقرر کیوں ہوتا ہے؟

جواب: ذرات کے درمیان کشش کی قوتوں کی موجودگی کی وجہ سے مائع کا الیوم مقرر ہوتا ہے اور یہ اپنی سطح کو بھی برقرار رکھتا ہے۔

10- مائع میں ذرات کس قسم کی حرکت ظاہر کرتے ہیں؟

جواب: مائع میں ذرات حرکت کی تینوں اقسام ظاہر کرتے ہیں یعنی:

ٹرانس لیشنل

روٹیشنل

.

.

.

11- یہ کیوں مانا جاتا ہے کہ گیس کے ذرات کے درمیان ٹکراؤ گز (Friction) کی وجہ سے انرجی کے نقصان یا اضافے کا باعث نہیں بنتا؟

جواب: چونکہ مستقل درجہ حرارت پر برتن میں موجود گیس کا پریشروقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے ذرات کے درمیان ٹکراؤ گز کی وجہ سے انرجی کے کسی نقصان یا اضافے کا سبب نہیں بنتا۔

12- گیسوں میں درجہ حرارت اور کائی ٹیک انرجی کے درمیان کیا تعلق ہے؟

جواب: ذرات کی اوسط کائی ٹیک انرجی، کیلون سکیل پر ناپے گئے درجہ حرارت کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔

13- کیا ایک ہی درجہ حرارت پر تمام گیسوں کی اوسط کائی ٹیک انرجی ایک جیسی ہوتی ہے؟

جواب: جی ہاں، ایک ہی درجہ حرارت پر تمام گیسوں کی اوسط کائی ٹیک انرجی ایک جیسی ہوتی ہے۔

14- ٹھوس اشیا کن پر مشتمل ہو سکتی ہیں؟

جواب: ٹھوس اشیا کنز (Ions)، ایٹمز اور مالیکیولز پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔

15- ٹھوس میں ذرات کی حرکت کی واحد قسم کون سی ہے؟

جواب: ٹھوس کے ذرات صرف تھرڈ وائبریشنل (Vibrational) والی حرکت ظاہر کرتے ہیں۔

16- کسی شے کی انٹرل انرجی کیا ہے؟

جواب: کسی شے کی انٹرل انرجی اس میں موجود ٹوٹل انرجی کی تعداد ہوتی ہے۔ اس میں ذرات کی کائی ٹیک انرجی اور ان کے درمیان بانڈنگ کی وجہ سے پوٹینشل انرجی شامل ہوتی ہے۔

17- انٹرل انرجی کن دو اقسام کی انرجیز سے مل کر بنتی ہے؟

جواب: کسی شے کے ذرات کی کائی ٹیک انرجی اور ان کے درمیان بانڈنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی پوٹینشل انرجی مل کر انٹرل انرجی بناتی ہیں۔

18- کسی سسٹم کی انٹرل انرجی پر حرارت کا کیا اثر ہوتا ہے؟

جواب: حرارت کسی سسٹم کی انٹرل انرجی کو بڑھا دیتی ہے۔

19- کسی ٹھوس شے کی طبعی حالت کو کیسے تبدیل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: کسی ٹھوس شے کی طبعی حالت کو عام طور پر ہیٹنگ کے ذریعے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

20- میلنگ پوائنٹ کی تعریف کریں۔

جواب: میلنگ پوائنٹ ایک مخصوص درجہ حرارت پر ٹھوس ذرات کی وائبریشنل حرکت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ باہمی کشش کی قوتوں پر قابو پالیتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ٹھوس حالت کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس درجہ حرارت کو ٹھوس کا میلنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔

21- ایوپوریشن کی تعریف کریں۔

جواب: ایوپوریشن: مائع کے مالیکیول تمام درجہ حرارت پر مائع کی سطح سے باہر نکلنے لگتے ہیں اور سطح سے مالیکیولز کے اس طرح نکلنے کو ایوپوریشن کہا جاتا ہے۔

22- بوائلنگ اور ایوپوریشن کے درمیان کیا فرق ہے؟

جواب: بوائلنگ ایک مخصوص درجہ حرارت پر پورے مائع میں ہوتی ہے، جبکہ ایوپوریشن صرف مائع کی سطح پر اور اس کی درجہ حرارت پر ہوتی ہے۔

23- بوائٹنگ پوائنٹ کی تعریف کریں۔

جواب: مائع کا وہ درجہ حرارت جس پر اس کا ویپر پریشر، ایٹوسفیرک پریشر کے برابر ہو جائے، اس کا بوائٹنگ پوائنٹ کہلاتا ہے۔

24- کنڈنسیشن کیا ہے؟

جواب: کنڈنسیشن: ایک مناسب کم درجہ حرارت پر، بڑھتی ہوئی کشش کے باعث مایکیولز ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ وہ مائع حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسے کنڈنسیشن کہا جاتا ہے۔

25- کنڈنسیشن کے دوران درجہ حرارت مستقل کیوں رہتا ہے؟

جواب: کنڈنسیشن کے دوران، جیسے جیسے ذرات ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور بانڈز کشش بناتے ہیں، انرجی خارج ہوتی ہے، جو درجہ حرارت کو اس وقت تک مستقل رکھتی ہے جب تک کہ پوری گیس مائع میں تبدیل نہ ہو جائے۔

26- حرارت ذرات کی کائی ٹیک انرجی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟

جواب: حرارت ذرات کی کائی ٹیک انرجی کو بڑھا دیتی ہے جس سے وہ زیادہ فریکوئنسی (تیزی) سے وابھریت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

27- جب کوئی ٹھوس پگھل رہا ہو تو درجہ حرارت کیوں نہیں بڑھتا؟

جواب: ٹھوس کے پگھلنے کے دوران درجہ حرارت اس لیے نہیں بڑھتا کیونکہ فراہم کردہ حرارتی توانائی درجہ حرارت بڑھانے کے بجائے ذرات کے درمیان کشش کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔

28- بوائٹنگ پوائنٹ پر ویپر پریشر اور ایٹوسفیرک پریشر کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟

جواب: بوائٹنگ پوائنٹ پر ویپر پریشر اور ایٹوسفیرک پریشر ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔

14.3 میٹنگ اور کولنگ کروڑ (Curves)

14.4

ایوپوریشن اور بوائٹنگ

29- میٹنگ کرو کیا ہے؟

جواب: میٹنگ کرو: یہ ایک گراف ہے جو کسی سسٹم کی انٹرل انرجی اور درجہ حرارت کے درمیان کھینچا جاتا ہے، جو یہ مادہ کی مختلف حالتوں کے درمیان ہونے والی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔

30- کولنگ کرو کیا ہے؟

جواب: کولنگ کرو: یہ ایک گراف ہے جو کسی سسٹم کی انٹرل انرجی اور درجہ حرارت کے درمیان کھینچا جاتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب کسی شے کو الٹ ترتیب میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو درجہ حرارت کیسے تبدیل ہوتا ہے (مثلاً گیس سے مائع، یا مائع سے ٹھوس)۔

31- کنڈنسیشن یا لیکو فیکشن پوائنٹ کی تعریف کریں۔

جواب: نقطہ کنڈنسیشن یا لیکو فیکشن پوائنٹ: یہ وہ مخصوص درجہ حرارت ہے جس پر کولنگ کے عمل کے دوران ایک خالص گیس مائع میں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے، یہ وہی درجہ حرارت ہوتا ہے جو اس کا بوائٹنگ پوائنٹ۔

32- بیرونی پریشر ایوپوریشن کی شرح کو کیسے متاثر کرتا ہے؟

جواب: بیرونی پریشر میں اضافہ ایوپوریشن کو مشکل بنا دیتا ہے کیونکہ یہ گیس کے مایکیولز کو واپس مائع کی سطح کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس کے برعکس، بیرونی پریشر میں کمی ایوپوریشن کی شرح کو بڑھا دیتی ہے۔

33- کراچی (100°C) کے مقابلے مری (98°C) میں پانی کا بوائٹنگ پوائنٹ کم کیوں ہے؟

جواب: بوائٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب ویپر پریشر بیرونی پریشر کے برابر ہو جائے۔ چونکہ مری میں ایٹوسفیرک پریشر کراچی کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کم ایٹوسفیرک پریشر کی وجہ سے وہاں بوائٹنگ پوائنٹ بھی کم ہو گیا ہے۔

34- کیا درجہ حرارت تبدیل کیے بغیر حالت میں تبدیلی (change Phase) ممکن ہے؟

جواب: جی ہاں، پریش کو تبدیل کر کے، مادہ مستقل درجہ حرارت پر اپنی حالت تبدیل کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر:

(i) برف کا گولا بنانے والے کے ہاتھوں میں پریش کی وجہ سے برف پگھل جاتی ہے۔

(ii) امونیا گیس کو کمرے کے درجہ حرارت 25°C پر 1MPa پریش لگا کر مائع بنایا جاسکتا ہے۔

سبلمیشن	14.5
سبلمیشن کے استعمالات	14.6

35- سبلمیشن کیا ہے؟

جواب: سبلمیشن: کسی ٹھوس کا پگھلے بغیر براہ راست بخارات میں تبدیل ہونا سبلمیشن کہلاتا ہے۔

مثال کے طور پر: ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ جسے 'ڈرائی آئس' بھی کہا جاتا ہے، مائع بنے بغیر کمرے کے درجہ حرارت پر براہ راست گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

36- سبلمیشن کے لیے درکار انرجی کہاں سے آتی ہے؟

جواب: سبلمیشن کے لیے درکار انرجی مادی شے کے اندر سے بھی آتی ہے اور پھر یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی انرجی جذب کرتی ہے۔

37- ڈیپوزیشن کی تعریف کریں۔

جواب: ڈیپوزیشن: سبلمیشن کے الٹ عمل کو ڈیپوزیشن کہا جاتا ہے جس میں ایک گیس مائع حالت میں جائے بغیر براہ راست ٹھوس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

مثال: سردیوں کے موسم میں کہر (Frost) کا بننا۔

38- ایئر فریشرز کے کام کرنے میں کون سا عمل استعمال ہوتا ہے؟

جواب: ایئر فریشرز کے کام کرنے میں سبلمیشن (Sublimation) کا عمل استعمال ہوتا ہے۔

39- سبلمیشن پر تنگ کیا ہے؟

جواب: سبلمیشن پر تنگ: جب سبلمیشن کے عمل کو کسی میٹریل یا کپڑے پر ڈیزائن پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، تو اسے سبلمیشن پر تنگ کہتے ہیں۔

40- سبلمیشن پر تنگ میں پرنٹ وقت کے ساتھ مدہم کیوں نہیں ہوتا؟

جواب: سبلمیشن پر تنگ میں پرنٹ مستقل ہوتا ہے اور مدہم نہیں ہوتا کیونکہ سیاہی کپڑے کے ریشوں کے اندر جذب ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ عام پرنٹنگ کی طرح صرف سطح کے اوپر لگی ہو۔

41- سبلمیشن پر تنگ کن میٹریلز پر استعمال کی جاسکتی ہے؟

جواب: سبلمیشن پر تنگ عام طور پر ٹی شرٹس، سیرامک، لکڑی اور ان دھاتوں پر استعمال ہوتی ہے جن پر ان سیاہیوں کو جذب کرنے کے لیے خاص کوٹنگ لگی ہو۔

42- اوننی کپڑوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟

جواب: اوننی کپڑوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے خشک پلاسٹک استعمال کی جاتی ہیں۔

43- ڈرائی آئس کیا ہے؟

جواب: ڈرائی آئس ٹھوس کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) کا عام نام ہے۔

44- کیا آپ دھات پر ہمیشہ پرنٹنگ کر سکتے ہیں؟

جواب: جی ہاں، جب تک دھات پر سیاہی کو جذب کرنے کے لیے خاص کوٹنگ موجود ہو، اس پر سبلمیشن پرنٹنگ کی جاسکتی ہے۔

14.7 کائی نٹیک تھیوری اور گیسوں کے قوانین

14.8 ڈیفیوژن

14.9 انسانی جسم میں ادویات کے ڈیفیوز ہونے کی رفتار کی اہمیت

45- بوائل کے قانون کی تعریف کریں۔

جواب: بوائل کا قانون: یہ قانون بیان کرتا ہے کہ مستقل درجہ حرارت پر، گیس کی دی گئی مقدار کا ولیم اس کے پریشر کے انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے۔

46- بوائل کے قانون کو ریاضیاتی طور پر کیسے لکھا جاتا ہے؟

جواب: ریاضیاتی طور پر بوائل کے قانون کو یوں لکھا جاتا ہے:

$$V \propto \frac{1}{P}$$

جہاں V = گیس کی دی گئی مقدار کا ولیم ہے اور

P = گیس کا ایسولیوٹ پریشر ہے۔

47- کائی نٹیک تھیوری کے مطابق کسی برتن میں گیس کے پریشر کی وجہ کیا ہے؟

جواب: کائی نٹیک تھیوری کے مطابق، کسی برتن میں گیس کی طرف سے ڈالا جانے والا پریشر اس کے مالیکیولز کے برتن کی دیواروں کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

48- رابرٹ بوائل نے پریشر اور ولیم کے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے کیا استعمال کیا؟

جواب: رابرٹ بوائل نے پریشر اور ولیم کے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے ایک سادہ جے۔ شکل (J-shaped) ٹیوب کا استعمال کیا۔

49- رابرٹ بوائل نے جے۔ شکل کی ٹیوب میں کیا ڈالا تھا؟

جواب: رابرٹ بوائل نے جے۔ شکل کی ٹیوب میں مرمری کی کچھ مقدار ڈالی تھی۔

50- درجہ حرارت اور مالیکیولر رفتار کے درمیان کیا تعلق ہے؟

جواب: جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے، مالیکیولز کی اوسط رفتار اور کائی نٹیک انرجی بھی بڑھ جاتی ہے۔

51- کسی برتن میں گیس کا پریشر کیسے تبدیل ہوتا ہے؟

جواب: گیس کا پریشر براہ راست ان مالیکیولز کی تعداد کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے جو فی یونٹ وقت میں دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔

52- پریشر اور ولیم کے تعلق کا سب سے پہلے کس نے مشاہدہ کیا؟

جواب: پریشر اور ولیم کے تعلق کو سب سے پہلے ایک آئرش کیمیا دان رابرٹ بوائل نے مشاہدہ کیا۔

53- چارلس کا قانون بیان کریں۔

جواب: چارلس کا قانون: یہ قانون بیان کرتا ہے کہ مستقل پریشر پر، گیس کی دی گئی مقدار کا ولیم اس کے درجہ حرارت کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے۔

54- ایوگیڈرو کا قانون کیا ہے؟

جواب: ایوگیڈرو کا قانون: یہ قانون بیان کرتا ہے کہ اگر درجہ حرارت اور پریشر کو مستقل رکھا جائے تو مختلف گیسوں کے مساوی ولیم (Equal volumes) میں مالیکیولز کی تعداد برابر ہوتی ہے۔

55- ایوکیڈرو کے قانون کو حسابی طور پر کیسے لکھا جاتا ہے؟

جواب: حسابی طور پر ایوکیڈرو کے قانون کو یوں لکھا جاتا ہے

$$V \propto T$$

(جہاں درجہ حرارت اور پریشر مستقل ہوتے ہیں)۔

56- ڈیفیوژن کی تعریف کریں۔

جواب: ڈیفیوژن: گیسوں میں موجود مالیکیولز مسلسل بے ترتیب حرکت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس مالیکیولر حرکت کی وجہ سے گیس کے ذرات پھیل جاتے ہیں اور زیادہ ارتکاز والے علاقے سے کم ارتکاز والے علاقے کی طرف جا کر آپس میں مل جاتے ہیں۔ گیسوں کی اس خصوصیت کو ڈیفیوژن کہا جاتا ہے۔

57- درجہ حرارت ڈیفیوژن کی شرح کو کیسے متاثر کرتا ہے؟

جواب: درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ڈیفیوژن کی شرح بڑھ جاتی ہے کیونکہ ذرات کی کافی ٹینک انرجی بڑھ جاتی ہے اور وہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گیسیں تیزی سے آپس میں ملتی اور پھیلتی ہیں۔

58- امونیا (NH_3) ہائیڈروجن کلورائیڈ (HCl) کے مقابلے میں تیزی سے کیوں ڈیفیوز ہوتی ہے؟

جواب: کافی ٹینک تھوری کے مطابق، ایک ہی درجہ حرارت پر ہلکے مالیکیولز بھاری مالیکیولز کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ چونکہ امونیا ہائیڈروجن کلورائیڈ سے ہلکی ہے، اس لیے یہ تیزی سے ڈیفیوز ہوتی ہے۔

59- گیس پریشر کیسے ڈیٹرمینڈ ہوتا ہے؟

جواب: گیس کا پریشر گیس کے مالیکیولز کے اپنے بیڑن کی دیواروں کے ساتھ مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

60- انسانی جسم میں ادویات کے لیے ڈیفیوز کیوں اہم ہے؟

جواب: انسانی جسم میں ادویات کے لیے ڈیفیوزن اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مادہ درمی مادے اپنے ہدف تک جلدی پہنچ جائیں، جو بیماریوں کے علاج میں مددگار ہوتا ہے۔

61- ڈیفیوژن میں خود بخود ہونے والا عمل کیا ہے؟

جواب: اس کا مطلب ہے کہ گیسیں کسی بیرونی قوت یا انرجی کے بغیر قدرتی طور پر آپس میں مل جاتی ہیں۔

62- ادویات معدے سے خون میں کیسے جاتی ہیں؟

جواب: ادویات ڈیفیوژن کے عمل کے ذریعے کم ارتکاز والے علاقے (خون) کی طرف سفر کرتے ہوئے معدے سے خون میں منتقل ہوتی ہیں۔

63- ادویات کے ڈیفیوژن کی شرح کس چیز کو کنٹرول کرتی ہے؟

جواب: ادویات کے ڈیفیوژن کی شرح اس بات کو کنٹرول کرتی ہے کہ وہ کتنی تیزی اور مؤثر طریقے سے جذب، تقسیم اور جسم سے خارج ہو سکتی ہیں۔

64- لہڈ میں حل پذیر ادویات زیادہ مؤثر کیوں ہوتی ہیں؟

جواب: لہڈ میں حل پذیر ادویات سیل ممبرین میں زیادہ آسانی سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کم وقت میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔

65- خون میں جذب ہونے کے بعد ادویات کے مالیکیولز کا کیا ہوتا ہے؟

جواب: ایک بار جب دوا کے مالیکیولز خون میں جذب ہو جاتے ہیں تو وہ جسم کے مختلف ٹشوز اور اعضا میں ڈیفیوز ہونا شروع کر دیتے ہیں۔

66- ہائیڈروجن گیس کے ڈیفیوژن کی شرح آکسیجن کے مقابلے میں بہت زیادہ کیوں ہے؟

جواب: چونکہ ہائیڈروجن آکسیجن سے ہلکی ہے، اس لیے اس کے مالیکیولز دیرینے گئے درجہ حرارت پر آکسیجن کے مالیکیولز کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے حرکت کریں گے۔ لہذا، ہائیڈروجن گیس کے ڈیفیوژن کی شرح آکسیجن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔

صحیح جواب پر (✓) لگائیں۔

(i) کائی فلک تھیوری کے مطابق ٹھوس، مائع اور گیس کے درمیان بنیادی فرق اس وجہ سے ہے:

- (الف) ذرات کی حرکت میں فرق
(ب) ذرات کی کیمیائی خصوصیات
(ج) ذرات کا سائز
(د) ذرات کی شکل

(ii) ایوپوریشن کی شرح گرم کرنے پر:

- (الف) گھٹتی ہے
(ب) بڑھتی ہے
(ج) یکساں رہتی ہے
(د) پہلے گھٹتی ہے پھر مزید گرم کرنے پر بڑھتی ہے

(iii) ذرات کے مابین کشش سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے:

- (الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) پلازمہ
(د) گیس

(iv) کچھ گیسوں کے بخارات کو ٹھنڈا کرنے پر یہ براہ راست ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس مظاہر کو کیا کہتے ہیں:

- (الف) ایوپوریشن
(ب) کنڈن سیشن
(ج) سب لیمیشن
(د) ڈیپوزیشن

(v) طبعی حالت جس میں ذرات سب سے زیادہ توانائی رکھتے ہیں:

- (الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) بخارات

(vi) ایوپوریشن مائع کے مالیکیولز میں موجود کشش پر کس طرح منحصر ہے؟

- (الف) کشش میں اضافے کے ساتھ بڑھتی ہے
(ب) کشش میں اضافے کے ساتھ گھٹتی ہے
(ج) کشش کی طاقت پر منحصر نہیں ہوتی
(د) کشش کی طاقت میں اضافے کے ساتھ پہلے بڑھتی اور پھر کم ہوتی ہے

(vii) کس گیس کے ڈیفوز ہونے کی شرح تیز ترین ہے:

- (الف) $HC l$
(ب) SO_2
(ج) H_2S
(د) CO_2

(viii) A اور B طبعی تبدیلیوں کو ظاہر کرتے ہیں ان کے نام لکھیں۔ گیس A مائع B ٹھوس:

- (الف) میلنگ، ایوپوریشن
(ب) کنڈن سیشن، میلنگ
(ج) کنڈن سیشن، فریزنگ
(د) بوائلنگ، فریزنگ

(ix) ایک طالب علم نے صبح 6:30 پر میدان میں ٹمبرہ گرتے دیکھا جو کہ صبح 8:30 پر غائب ہو گیا۔ ٹمبرے کو بخارات میں تبدیل کرنے سے کون سی

طبعی تبدیلی وقوع پذیر ہوئی؟

- (الف) میلنگ
(ب) ایوپوریشن
(ج) سب لیمیشن
(د) ڈیپوزیشن

جوابات

- i - (الف) ii - (ب) iii - (الف) iv - (د) v - (ج) vi - (ب) vii - (ج)

- viii - (ج) ix - (ج)

14.1 جب مائع ایوپوریشن ہوتی ہے تو ذرات کی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟

جواب: جب مائع بھاپ بن کر اڑتا ہے تو انرجی اس کے ارد گرد کے ماحول اور خود مائع سے آتی ہے۔ ایوپوریشن کے دوران مائع کی سطح پر موجود مالیکیولز مائع کے باقی مالیکیولز اور گرد و نواح سے حرارت جذب کرتے ہیں تاکہ اپنے ماحول پریش اور مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتوں پر قابو پا سکیں اور بھاپ بن کر ہوا میں داخل ہو جائیں۔

14.2 کیا کنڈن سیشن حرارت جذب کرنے والا عمل ہے؟

جواب: نہیں۔ کنڈن سیشن ایک حرارت خارج کرنے والا عمل ہے۔ کنڈن سیشن میں گیس کے مالیکیولز اپنے گرد و نواح میں حرارت کھودیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو کر مائع بن جاتے ہیں۔

14.3 فینائل کی گولیاں (کیڑے مار دوائی) کچھ عرصے بعد تحلیل کیوں ہو جاتی ہیں؟

جواب: نیفتھالین کی گولیاں وقت کے ساتھ سب سیمیشن کی وجہ سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل میں ٹھوس مادہ بغیر مائع حالت میں جائے براہ راست گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیفتھالین کے مالیکیولز ہوا سے انرجی سے حاصل کر کے بخارات کی شکل میں اڑ جاتے ہیں اور یوں گولیاں غائب ہو جاتی ہیں۔

14.4 طبعی تبدیلی کے دوران درجہ حرارت یکساں کیوں رہتا ہے؟

جواب: حالت کی تبدیلی کے دوران فراہم کی گئی حرارت ذرات کے درمیان موجود کشش کی قوتوں کو توڑنے میں استعمال ہوتی ہے نہ کہ ذرات کی کافی نیٹک انرجی بڑھانے میں اسی لیے درجہ حرارت میں اضافہ نہیں ہوتا اور وہ مستقل رہتا ہے۔

14.5 کیا مائع کسی طرح (Compress) ممکن ہے؟

جواب: نہیں مائع کو تقریباً ناقابلِ دباؤ سمجھا جاتا ہے۔ گیس کے پارٹیکلز کے درمیان کافی خالی جگہ ہوتی ہے جبکہ مائع میں پارٹیکلز بہت قریب ہوتے ہیں اس لیے انہیں مزید دباؤ دینا ممکن نہیں ہوتا۔

14.6 لیب میں تجربے کے دوران کیا پانی کا بوائلنگ پوائنٹ تبدیل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: جی ہاں۔ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ایٹوسفیرک پریشر پر منحصر ہوتا ہے۔

• اگر پریشر کم کیا جائے تو پانی 100°C سے کم درجہ حرارت پر ابلے گا۔

• اگر پریشر بڑھایا جائے تو بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جائے گا۔

14.7 کس موسم میں گیلے کپڑے نسبتاً زیادہ دیر سے سوکتے ہیں؟

جواب: برسات کے موسم میں گیلے کپڑے دیر سے سوکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے جو ایوپوریشن کے عمل کو کم کر دیتی ہے۔

14.8 جب ٹھوس کو گرم کیا جاتا ہے تو مرتعش ذرات (Vibrating particles) کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

جواب: گرم کرنے پر پارٹیکلز کی کافی نیٹک انرجی بڑھتی ہے اور ان کی ارتعاش تیز اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ آخر کار یہ ارتعاش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ٹھوس کے مضبوط بانڈز ٹوٹ جاتے ہیں اور مادہ پکھل جاتا ہے۔

14.9 کیا ٹھوس اور مائع گیس کی طرح ڈیفوز ہوتے ہیں؟

جواب: جی ہاں۔ ٹھوس اور مائع بھی گیسوں کی طرح ڈیفوز کر سکتے ہیں مگر بہت آہستہ رفتار سے۔

مثال: اگر آپ چائے پکھڑا کر کے کئی ماہ تک صاف نہ کریں تو اسے مٹانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ چاک کے پارٹیکلز بورڈ کی سطح میں ڈیفوز کر جاتے ہیں۔

14.10 شبنم کے قطرے صبح کے وقت کیوں بنتے ہیں؟

جواب: رات کے وقت زمین اور اشیاء ٹھنڈی ہو جاتی ہیں صبح کے وقت ٹھنڈی سطحوں کے قریب ہوا ٹھنڈی ہو کر اپنے ڈیو پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ (وہ درجہ حرارت جس ہوا پانی کے بخارات سے بھر جاتی ہے) اس کے بعد ہوا مزید بخارات کو سنبھال نہیں سکتی لہذا اضافی بخارات ٹھنڈی سطحوں جیسے گھاس یا پتوں پر پانی کے قطروں کی صورت میں جم جاتے ہیں۔

14.1 ایوپوریشن اور بوائٹنگ میں فرق واضح کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 7 کا جواب

14.2 بوائٹنگ کا بیرونی دباؤ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: جب مائع کا دباؤ بیرونی دباؤ کے برابر ہو جاتا ہے تو بوائٹنگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔
کم بیرونی دباؤ:

جب بیرونی دباؤ کم ہوتا ہے تو بوائٹنگ پوائنٹ کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑوں پر پانی کم درجہ حرارت پر بوائٹل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں ایٹوسفیرک پریشر کم ہوتا ہے۔

زیادہ بیرونی دباؤ:

جب بیرونی دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو بوائٹنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پریشر ککر میں اندرونی دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی زیادہ ٹھیر چکر بوائٹل ہوتا ہے جس سے کھانا جلدی پکتا ہے۔

14.3 ایوپوریشن کے لیے توانائی کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟

جواب: بخارات کو انرجی (ان پٹ) کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ اپنے ارد گرد سے حاصل ہونے والی انرجی پر انحصار کرتے ہیں یا اس ہیٹ انرجی پر انحصار کرتے ہیں جو پانی کے مالیکیول پہلے ہی روم ٹمپریچر پر رکھتے ہیں۔

14.4 طبعی تبدیلیوں میں حرارتی اور کولنگ کروڑ (Curves) ایک ہی راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟

جواب: فیزکس کی تبدیلیوں کے لیے ہیٹنگ اور کولنگ کروڑ ایک ہی راستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ مالیکیولز کے درمیان بانڈز کو توڑنے کے لیے درکار حرارت مالیکیولز کے درمیان بانڈز بننے کے نتیجے میں خارج ہونے والی حرارت کے برابر ہوتی ہے۔

• یکساں پریشر پر ایک مادہ ایک ہی درجہ حرارت پر پگھل جائے گا اور اسی درجہ حرارت پر فریز بھی ہوگا (بوائٹنگ اور کنڈن سیشن دونوں ایک جیسے ٹمپریچر پر)۔
14.5 جب برف پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے تو وہ پگھلتی کیوں ہے؟

جواب: مائع کی حالت میں پانی ٹھوس حالت یعنی برف کی نسبت زیادہ ڈینس ہوتا ہے۔ جب آپ برف پر پریشر لگاتے ہیں تو اس کے مالیکیول ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور یہ مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

14.6 طبعی تبدیلیاں کیوں رونما ہوتی ہیں؟

جواب: فیزکس میں تبدیلی ہیٹ انرجی میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ انرجی پارٹیکلز کے برتاؤ پر اثر انداز ہوتی ہے۔

D تفصیلی سوالات

14.1 کائی میک تھیوری کی بنیاد پر دو گیسوں کے درمیان ڈیفیوژن کی شرح میں فرق کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 15 کا جواب

14.2 سب ٹیمیشن، پریٹنگ اور ایئر فریشن کے استعمال میں کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 10 کا جواب

14.3 درجہ حرارت میں تبدیلی کے ساتھ پانی میں ہونے والی طبعی تبدیلیوں کے لیے حرارتی کرو (Curve) کھینچیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال 6 کا جواب

