

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate.)

بایولوجی

10



پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی

یہ نصابی کتاب پاکستان کے 2023 کے اپ ڈیٹ شدہ/نظر ثانی شدہ قومی نصاب کے مطابق تیار کی گئی ہے۔
 جملہ حقوق (کاپی رائٹ) بحق پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسٹنٹ اتھارٹی محفوظ ہیں۔
 یہ کتاب پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسٹنٹ اتھارٹی کی تیار کردہ ہے۔ تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کا کوئی حصہ
 کسی امدادی کتاب، خلاصہ، ماڈل پیپر یا گائیڈ وغیرہ میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

مصنفین

- ✽ ڈاکٹر ظہیر الدین، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی
- ✽ ڈاکٹر رحیلہ ندیم، رجسٹرار، UBAS، لاہور
- ✽ ڈاکٹر عدنان احمد، سینئر ریسرچ آفیسر، پی سی ایس آئی آر، لاہور

ایڈیٹر

- ✽ ڈاکٹر حافظ محمد عثمان طارق، ڈیپو انسٹریٹر (فزیالوجی)، اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، لاہور

ریویو کمیٹی

- ✽ محمد نوید اصغر، لاہور گرامر سکول، ٹاؤن شپ، لاہور
- ✽ ڈاکٹر تاجیہ العارفہ، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، لاہور
- ✽ ڈاکٹر کوثر حسین شاہ، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان
- ✽ نورین ممتاز، گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین، گلبرگ، لاہور
- ✽ انیل یوسف، سینئر ڈیپارٹمنٹل ایف سی کالج (چارٹرڈ یونیورسٹی)، لاہور
- ✽ غلام یاسین، سینئر ہیڈ ماسٹر، گورنمنٹ ہائی سکول، بگا شیر، مظفر گڑھ
- ✽ صائمہ بشیر، ایس ایس ٹی، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول، تاجپورہ سکیم، لاہور
- ✽ ڈاکٹر روبیلہ شیر، پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسٹنٹ اتھارٹی، لاہور
- ✽ ڈاکٹر ملک عادل عباس (HED) ✽ عدنان خالد (HED) ✽ محمد ابراہیم (HED)
- ✽ ڈاکٹر اشفاق اسلم (SED) ✽ محمد ہمایوں عطا (SED) ✽ اولیس فدا (SED) ✽ مریم منیر (SED)

نگران طباعت

- ✽ ڈاکٹر روبیلہ شیر، ماہر مضمون، پنجاب ایجوکیشن، کریکولم، ٹریننگ اینڈ اسسٹنٹ اتھارٹی، لاہور
- ✽ ڈاکٹر یاسین (C&C) ✽ عامر ریاض ✽ ڈپٹی ڈائریکٹر (C-S) ✽ سید صغیر الحسنین ترمذی
- ✽ انچارج آرٹ سیل ✽ عائشہ صادق ✽ ڈیزائننگ ✽ حافظ انعام الحق

تجرباتی ایڈیشن

04237230777
03349941510


الفیصل ناشران، اُردو بازار لاہور

تیار کردہ



1	انسان کا ڈائی جیسٹو سسٹم	باب 1:
	1.1 نیوٹریشن اور اس کی اہمیت	
	1.2 انسان کا ڈائی جیسٹو سسٹم	
	1.3 ڈائی جیسٹو سسٹم کی بیماریاں	
12	انسان کا ریسپیریٹری سسٹم	باب 2:
	2.1 انسان کا ریسپیریٹری سسٹم	
	2.2 تنفس کا طریقہ کار	
	2.3 تنفس کی بیماریاں	
24	انسان کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم	باب 3:
	3.1 خون اور اس کی ترکیب	
	3.2 انسان کا دل	
	3.3 بلڈ ویسلز	
	3.4 آرٹیریل اور وینس سسٹم	
	3.5 کارڈیو ویکولر بیماریاں	
38	انسان کا ایوریٹری سسٹم	باب 4:
	4.1 انسان کا ایوریٹری سسٹم	
	4.2 گردے کا فعل	
	4.3 گردے کی بیماریاں	
48	کوارڈینیشن	باب 5:
	5.1 نیورانز۔ نروس سسٹم کی اکائیاں	
	5.2 نروس سسٹم کے حصے	
	5.3 اینڈوکرائن سسٹم	

باب 6:	ریپر وڈکشن	65
6.1	گیمپٹس کا بننا اور فرٹیلائزیشن	
6.2	جنسی تولید میں ہارمونز کا کردار	
6.3	ریپر وڈکٹو سسٹم	
6.4	جنسی عمل سے ہونے والی بیماریاں	
باب 7:	وراثت	74
7.1	کروموسوم کی ساخت	
7.2	ڈی این اے اور آراین اے	
7.3	مینڈل کے قوانین وراثت	
باب 8:	بائیو ٹیکنالوجی	86
8.1	بائیو ٹیکنالوجی کا تعارف	
8.2	جینیٹک انجینئرنگ	
8.3	بائیو ٹیکنالوجی کا اطلاق	
8.4	بائیو ٹیکنالوجی کے ممکنہ خطرات	
باب 9:	بیماریاں اور قوت مدافعت	96
9.1	بیماری	
9.2	بیماری پھیلانے والے جراثیم	
9.3	قوت مدافعت	
باب 10:	ارتقا	107
10.1	ڈارون کے مشاہدات	
10.2	قدرتی چناؤ سے ارتقا کا نظریہ	
10.3	پسی شیز اور پسی شیز کا بننا	
10.4	تغیرات کے ذرائع	
10.5	ارتقا کے ثبوت	
اصطلاحات		119
پیئرنگ سکیم		125
ماڈل پیپرز		126



1

انسان کا ڈائیجیسٹو سسٹم (HUMAN DIGESTIVE SYSTEM)

حاصلاتِ تعلّم



اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- ✿ انجیشن (ingestion) ڈائیجیشن (digestion)، انجذاب (absorption)، ایسی میلیشن (assimilation) اور انجیشن کی ضرورت بیان کریں۔
- ✿ غذائی نالی (ایلیمنٹری کینال) کے اہم حصوں اور اس سے وابستہ آرگنز کی بناوٹ کی شناخت کریں اور وضاحت کریں۔
- ✿ خوراک نگلنے اور پیری سلسلے کے عمل کی وضاحت کریں۔
- ✿ ایلیمنٹری کینال کے مختلف حصوں میں اینزائمز کی کارکردگی کو ان کے سبسٹریٹس اور پیدا ہونے والے مادوں کے لحاظ سے ترتیب دیں۔
- ✿ جگر کا کردار بیان کریں۔
- ✿ ولانی کی ساخت بیان کریں، جس میں کیلریز اور لیپڈز کا کردار بھی شامل ہو۔
- ✿ ایلیمنٹری کینال کی بیماریوں مثلاً ڈائریا، قبض اور اسہل کی علامات، وجوہات، علاج اور بچاؤ کے طریقے بیان کریں۔

ہمارا جسم جو کچھ بھی کرتا ہے جیسے حرکت کرنا، بڑھنا اور صحت مندر ہنا وہ غذائی اجزاء پر منحصر ہوتا ہے۔ ان اجزاء کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خوراک کو پہلے سادہ اجزاء میں توڑا جائے تاکہ جسم کے سیلز انہیں جذب کر سکیں۔ یہ عمل ہمارے ڈائی جیسٹو سسٹم میں ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم جانیں گے کہ ڈائی جیسٹو سسٹم کس طرح خوراک کو قابل استعمال غذائی اجزاء میں تبدیل کرتا ہے۔

1.1 نیوٹریشن اور اس کی اہمیت (NUTRITION AND ITS IMPORTANCE)

نیوٹریشن سے مراد ہے کہ جان دار کس طرح غذائی اجزاء حاصل کرتا ہے اور کیسے انہیں استعمال کرتا ہے۔ غذائی اجزاء جانداروں کی نشوونما کرنے، صحت مندر رہنے اور جسم کی مرمت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تمام جانور، بشمول انسان، اپنی خوراک خود نہیں تیار کر سکتے۔ وہ دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسی نیوٹریشن کو ہیٹروٹافک (heterotrophic) نیوٹریشن کہتے ہیں۔ جانوروں میں نیوٹریشن مندرجہ ذیل مراحل میں مکمل ہوتی ہے۔

آٹوٹافک (autotrophic) نیوٹریشن وہ طریقہ ہے جس میں جاندار غیر نامیاتی مادوں سے روشنی یا کیمیائی توانائی کی مدد سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔

ہیٹروٹافک (heterotrophic) نیوٹریشن وہ طریقہ ہے جس میں جاندار اپنی خوراک دوسرے جانداروں کو یا نامیاتی مادوں کو کھا کر حاصل کرتے ہیں۔

- 1۔ **انجیشن (ingestion):** ٹھوس خوراک اور شروبات کو جسم میں لے جانا۔
- 2۔ **ڈائی جیشن (digestion):** خوراک کو چھوٹے اجزاء میں توڑنا جنہیں جسم جذب کر سکے۔
- 3۔ **انجذاب (absorption):** ہضم شدہ خوراک میں سے غذائی اجزاء کو خون اور لیمف (lymph) میں جذب کرنا۔

4۔ **اسیمیلیشن (assimilation):** جذب ہو جانے والے مواد کو سیلز اور ٹشوز میں استعمال کرنا۔

5۔ **ایجیشن (egestion):** غیر ہضم شدہ خوراک اور دوسرے بیکار مواد کو جسم سے نکالنا۔

جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بڑے مالیکیولز پر یعنی پولیمرز (polymers) میں مشتمل ہوتی ہے جیسے نشاستے (کاربوہائیڈریٹس)، پروٹینز اور (فٹس: fats)۔ یہ بڑے مالیکیولز سیل ممبرینز سے نہیں گزر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انہیں توڑ کر چھوٹے اور حل پذیر اجزاء میں بدل دیا جائے، جنہیں مونومرز (monomers) کہا جاتا ہے، جیسے شوگرز (sugars)، امینو ایسڈ (amino acids)، اور فیٹی ایسڈز (fatty acids) وغیرہ۔ اس عمل کو ڈائی جیشن کہتے ہیں۔ چھوٹے مالیکیولز سیل ممبرین سے گزر کر سیلز میں داخل ہو سکتے ہیں۔

1.2 انسان کا ڈائی جیسٹو سسٹم (HUMAN DIGESTIVE SYSTEM)

انسان کا ڈائی جیسٹو سسٹم ایک لمبی نالی اور چند مددگار اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نالی کو الیمینٹری کینال (alimentary canal) کہتے ہیں۔ یہ نالی منہ سے شروع ہو کر انیس (anus) پر ختم ہوتی ہے۔ سیلانیوری گلینڈز (salivary glands)، جگر (liver) اور لبلبہ (pancreas) کی رطوبتیں الیمینٹری کینال میں پہنچتی ہیں اور خوراک کی ڈائی جیشن میں مدد کرتی ہیں۔

1۔ اورل کیوویٹی (Oral Cavity)

منہ کے پیچھے موجود جگہ کو اورل کیوویٹی کہتے ہیں۔ اس میں زبان کی سطح پر لگے ٹیسٹ بڈز (grinding) کے دوران، زبان (taste buds) ہوتے ہیں جو خوراک کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ اورل کیوویٹی میں خوراک کی


مکینیکل (mechanical) ڈائیجیشن شروع ہوتی ہے۔ مکینیکل ڈائیجیشن میں دانت خوراک کو کاٹ کر چھوٹے ٹکڑوں میں پس دیتے ہیں۔

اورل کیوٹیٹی میں سیلانیوری گلینڈز (salivary glands) کے سارچ (Starch) ایک پولی سیکرائیڈ (polysaccharide) ہے جو تین جوڑے کاربوہائیڈریٹس (carbohydrates) کی جزوی کیمیکل ڈائیجیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ گلینڈز اورل کیوٹیٹی سے منسلک ہوتے ہیں اور سلائینوا (saliva) خارج کرتے ہیں۔ سلائینوا پانی، میوکس (mucus)، اور ایک اینزائم (enzyme) یعنی سلائینوری ایمائلیز (salivary amylase) پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی اور میوکس خوراک کے ٹکڑوں کو نرم کرتے ہیں۔ سلائینوری ایمائلیز (salivary amylase) خوراک میں موجود سارچ کو مالٹوز (maltose) میں توڑ دیتا ہے۔

تین جوڑے کاربوہائیڈریٹس (carbohydrates) کی جزوی کیمیکل ڈائیجیشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ گلینڈز اورل کیوٹیٹی سے منسلک ہوتے ہیں اور سلائینوا (saliva) خارج کرتے ہیں۔ سلائینوا پانی، میوکس (mucus)، اور ایک اینزائم (enzyme) یعنی سلائینوری ایمائلیز (salivary amylase) پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی اور میوکس خوراک کے ٹکڑوں کو نرم کرتے ہیں۔ سلائینوری ایمائلیز (salivary amylase) خوراک میں موجود سارچ کو مالٹوز (maltose) میں توڑ دیتا ہے۔

نگلنا (Swallowing): جسمانی (physical) اور جزوی کیمیکل ڈائیجیشن کے بعد اورل کیوٹیٹی میں خوراک کا مجموعہ بولس (bolus) کہلاتا ہے۔ اسے فیرکس (pharynx) کی طرف دھکیل کر

نگلنا (Swallowing): جسمانی (physical) اور جزوی کیمیکل ڈائیجیشن کے بعد اورل کیوٹیٹی میں خوراک کا مجموعہ بولس (bolus) کہلاتا ہے۔ اسے فیرکس (pharynx) کی طرف دھکیل کر نگلا جاتا ہے۔ نگلنے کے لیے، زبان بولس کو اورل کیوٹیٹی کے پچھلے حصے کی طرف دھکیلتی ہے۔ نگلی گئی خوراک فیرکس میں داخل ہو جاتی ہے۔




شکل 1.1: اورل کیوٹیٹی خوراک کے مراحل

2- فیرکس اور ایسوفیگس (Pharynx and Oesophagus)

فیرکس: یہ اورل کیوٹیٹی کے بعد ایک چھوٹا نالی نما (tube-like) حصہ ہے۔ یہ اورل کیوٹیٹی کو ایسوفیگس (oesophagus) سے اور ناک کو ٹریکیا (trachea) سے جوڑتا ہے۔ اورل کیوٹیٹی میں شروع ہونے والا کیمیکل ڈائیجیشن کا عمل فیرکس میں بھی جاری رہتا ہے۔ فیرکس کا ایک اہم کام خوراک کے ذرات کو بھینچھڑوں میں جانے سے روکنا ہے۔ یہ کام ایک لچکدار کارٹیلج ٹشو (elastic cartilage tissue) یعنی اپی گلوٹیس (epiglottis) کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جب نگلی گئی خوراک فیرکس سے گزرتی ہے، تو ہوا کی نالی یعنی ٹریکیا (windpipe means trachea) کا اوپری حصہ اپی گلوٹیس (epiglottis) کی جانب اوپر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس طرح، ہوا کی نالی کا سوراخ یعنی گلاٹس (glottis) بند ہو جاتا ہے اور نگلی گئی خوراک اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔

ایسوفیگیس: یہ ایک لمبی نالی (تقریباً 25 سینٹی میٹر) ہے۔ یہ فیئکس کو معدہ (stomach) سے جوڑتی ہے۔ جب خوراک ایسوفیگیس میں داخل ہوتی ہے تو اس کی مسکولر دیواروں (muscular walls) میں لگاتار سکڑنے (contraction) کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سکڑنے کی لہریں خوراک کو ایسوفیگیس کے ذریعے معدہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ مسکڑنے کے ان سکڑنے کی لہروں کو پیری سٹالسس (peristalsis) کہتے ہیں۔

3۔ معدہ (Stomach)



شکل 1.2: پیری سٹالسس


"J" شکل کا معدہ ایبڈومن (abdomen) میں اوپری بائیں جانب ڈایافراگم (diaphragm) کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ معدہ کا وہ حصہ جو ایسوفیگیس کے فوراً بعد ہے، کارڈیک (cardiac) حصہ کہلاتا ہے جبکہ وہ حصہ جو سال انشٹائن سے پہلے ہے، پائی لورک (pyloric) حصہ کہلاتا ہے۔ ایسوفیگیس اور معدہ کے جوڑ پر ایک مسکڑ کا حلقہ یعنی سفنکٹر (sphincter) موجود ہوتا ہے جسے کارڈیک سفنکٹر (cardiac sphincter) یا ایسوفیگیس کا زیریں سفنکٹر (lower oesophageal sphincter) کہتے ہیں۔ یہ خوراک کو معدہ سے واپس ایسوفیگیس میں جانے سے روکتا ہے۔ اسی طرح، معدہ اور چھوٹی آنت (small intestine) کے درمیان پائی لورک سفنکٹر (pyloric sphincter) موجود ہوتا ہے۔

معدہ خوراک کی مکینیکل (mechanical) اور جزوی کیمیکل ڈائی جیشن (partial chemical digestion) کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ خوراک کو ذخیرہ بھی کرتا ہے۔ معدہ کی دیواریں موٹے سموتھ مسکلز (smooth muscles) سے بنی ہوتی ہیں۔ جب خوراک معدہ میں پہنچتی ہے تو یہ مسکلز زوردار طریقے سے سکڑتے ہیں۔ ان کا سکڑنا خوراک کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ اس ٹوٹنے (churning) کی وجہ سے حرارت (heat) بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت لپڈز (lipids) کو پگھلانے میں مدد دیتی ہے۔

معدہ کی اندرونی دیواروں میں کئی چھوٹے چھوٹے گیسٹرک گینڈز (gastric glands) ہیں جو گیسٹرک جوس (gastric juice) خارج کرتے ہیں۔ اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ (hydrochloric acid)، ایک غیر فعال اینزائم پیپسینوجن (pepsinogen)، اور میوکس (mucus) شامل ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ پیپسینوجن (pepsinogen) کو ایک فعال اینزائم یعنی پیپسن (pepsin) میں تبدیل کرتا ہے۔ پیپسن اینزائم بڑی پروٹینز کو امینو ایسڈ (amino acids) کی چھوٹی زنجیروں میں توڑتا ہے جنہیں پیپٹائڈز (peptides) کہتے ہیں۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ خوراک میں موجود بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا (pathogenic bacteria) کو بھی

مارڈالتا ہے۔

میوکس معدہ کی اندرونی دیواروں پر ایک حفاظتی تہہ بناتا ہے۔ یہاں، یہ HCl کو غیر موثر (neutralizes) کرتا ہے۔ اس لیے، پیپسی نوجن یہاں فعال نہیں ہو سکتا اور دیواریں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہتی ہیں۔ خوراک معدہ میں عموماً تین سے چار گھنٹے تک رہتی ہے۔ یہاں ہونے والے اعمال کی وجہ سے خوراک ایک شوربے جیسا کسچر (soup-like mixture) بن جاتی ہے جسے کائیم (chyme) کہتے ہیں۔ کائیم کے بہاؤ کو پانی اور کسکٹر کنٹرول کرتا ہے۔ ہر بار جب پانی اور کسکٹر کھلتا ہے تو 5 ملی لیٹر سے 15 ملی لیٹر کائیم چھوٹی آنت یعنی سال انٹسٹائن (small intestine) میں چلا جاتا ہے۔



شکل 1.3: معدہ کی ساخت

4- سال انٹسٹائن (Small Intestine)

سال انٹسٹائن بہت زیادہ بل دار نالی (coiled tube) ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 7 میٹر ہوتی ہے۔ اس کے تین حصے ہیں:


- ڈیوڈینم (Duodenum) پہلا حصہ ہے۔ یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔
- جیجونم (Jejunum) درمیانی حصہ ہے۔ یہ تقریباً 2.5 میٹر لمبا ہوتا ہے۔
- ایلیم (Ileum) آخری حصہ ہے۔ یہ تقریباً 4 میٹر لمبا ہوتا ہے۔

ڈیوڈینم میں خوراک پر جگر اور لہجہ کی رطوبتیں (secretions) اثر کرتی ہیں۔ جگر کی رطوبت یعنی بال (bile) ایک نالی یعنی کامن

بال ڈکٹ (common bile duct) کے ذریعے ڈیوڈینم میں داخل ہوتا ہے۔ بال میں ایسے نمکیات ہوتے ہیں جو بڑی فیٹس (fats) کو چھوٹے قطروں (droplets) میں توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح، ایک دودھیاسیال (milky fluid) بنتا ہے جس میں فیٹس کے قطرے (fat droplets) الگ الگ رہتے ہیں۔ اس عمل کو بال میں رنگدار مادے (pigments) بھی شامل ہوتے ہیں جو جگر میں ریڈ بلڈ سیلز (RBCs) کے ٹوٹنے سے بنتے ہیں۔ یہ رنگدار مادے فضلہ (faeces) کے ذریعے جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔

ایمیلیفیکیشن (Emulsification) کہتے ہیں۔ پتھر یاز کی رطوبت یعنی پتھر یانک (pancreatic juice)، پتھر یانک ڈکٹ جس (pancreatic duct) کے ذریعے ڈیوڈینم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پتھر یانک ڈکٹ ڈیوڈینم میں داخل ہونے سے پہلے کامن بائل ڈکٹ میں کھل جاتی ہے۔

پتھر یانک جس میں کئی اینزائمز ہیں مثلاً ٹریپسن (trypsin)، پتھر یانک ایمائی لیز (pancreatic amylase) اور لائی پیسز (lipase)۔ یہ اینزائمز پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور لیپڈز کے ہاضمے میں مدد دیتے ہیں۔ پتھر یانک جس میں سوڈیم ہائی کاربونیٹ بھی ہوتا ہے جو کاکم کی تیزابیت کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ انشٹائن کی دیواروں میں موجود گلیکینڈز بھی اینزائمز خارج کرتے ہیں جو تمام اقسام کی خوراک کی ڈائیجیشن کو مکمل کرتے ہیں۔




شکل 1.4: انسان کا ڈائیجیسٹو سسٹم

خوراک کا انجذاب (Absorption of Food)

خوراک کی مکمل ڈائیجیشن کے بعد اختتامی پراڈکٹس یعنی ایمائنو ایسڈز، سادہ شوگرز، گلیسرول اور فیٹی ایسڈز ایلیمنٹری کینال سے نکل کر سرکولیٹری (circulatory) سسٹم میں چلے جاتے ہیں۔ سمال انشٹائن کی اندرونی دیواریں بہت تہہ دار ہوتی ہیں۔ مزید براں ان تہوں پر

لاکھوں انگلی نما ابھار بھی ہوتے ہیں جنہیں ولوائی (villi: واحد ولس villus) کہتے ہیں۔ یہ تہیں اور ان پر موجود ولوائی خوراک کے انجذاب کے لیے بڑا سطحی رقبہ بناتے ہیں۔ خوراک کے مالیکیولز اس سطح سے ڈیفیوژن اور ایکٹو ٹرانسپورٹ کر کے جذب ہوتے ہیں۔ ہر ولس کی دیوار سیلز کی صرف ایک ہی تہہ کی بنی ہوئی ہے۔ ولس کے اندر بلڈ کپریز (blood capillaries) اور ایک لمف وِسل (lymph vessel) یعنی لیکیٹیل (lacteal) ہوتی ہے۔

سماں انتھائین میں موجود گلسرول اور فیٹی ایسڈز ولوائی کے لیکیٹیل میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکیٹیل انھیں بڑی لمف وِسلز میں لے جاتے ہیں۔ یہ لمف وِسلز دل کے قریب بڑی بلڈ وِسلز (blood vessels) میں کھلتی ہیں۔ امینو ایسڈز اور سادہ شوگرز بلڈ ولوائی کی بلڈ کپریز میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کپریز بل کرہپٹک پورٹل وین (hepatic portal vein) سیکم کے بند سرے پر ایک چھوٹی انگلی نما اپینڈکس (appendix) بناتی ہیں جو ان مادوں کو جگر میں لے جاتی ہے۔ جگر سے خوراک کے ضروری مالیکیولز ہپٹک وین کے ذریعے دل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے انھیں جسم کے تمام حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔



شکل 1.5: سماں انتھائین اور ولوائی

ٹیبل 1.1: ایلیمنٹری کینال کے مختلف حصوں میں اینزائمز کے افعال

ایلیمنٹری کینال کا حصہ	اینزائم	سبسٹریٹ	پراڈکٹ
اورل کیوبیٹی	سلائیوری ایمائلیز	Salivary amylase	پراڈکٹ
معدہ	پپسن	Pepsin	پپٹائڈز
سماں انتھائین	پنکریاٹک ایمائلیز	Pancreatic amylase	مالٹوز
	ٹریپسن	Trypsin	پپٹائڈز
	کائموتروپسن	Chymotrypsin	پپٹائڈز اور پپٹائڈز


پپٹائڈیز	Peptidase	پپٹائڈز	امائنو ایسڈ اینڈ پپٹائڈ
لائیپیز	Lipase	فیش	فیشی ایسڈ گلیسرول
نیوکلئیز	Nuclease	نیوکلک ایسڈ	نیوکلئوٹائیڈز
مالٹیز	Maltase	مالٹوز	گلوکوز
سکریز	Sucrase	سکروز	گلوکوز اور فروکٹوز
لیکٹیز	Lactase	لیکٹوز	گلوکوز اور گلیکٹوز
ڈائی پپٹائڈیز	Dipeptidases	ڈائی پپٹائڈز	امینو ایسڈز

5۔ لارج انٹسٹائن (Large Intestine)

ہضم شدہ خوراک اور کچھ پانی کے انحصار کے بعد، غیر ہضم شدہ مواد اور پانی پیری سٹالس کے ذریعے لارج انٹسٹائن میں جاتے ہیں۔ لارج انٹسٹائن کے تین حصے ہیں یعنی سیکم (caecum) جو سال انٹسٹائن کے ساتھ لگی ایک چھوٹی سی تھیلی ہے، کولون (colon) اور ریکٹم (rectum)۔ لارج انٹسٹائن سے زیادہ تر بقیہ پانی خون میں جذب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچنے والا مواد نسبتاً ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے فضلہ (faeces) کہتے ہیں۔ اس میں خوراک کا ڈائی جیسٹ نہ ہونے والا حصہ، بہت سے بیکٹیریا، الیمینٹری کینال کے ٹوٹے ہوئے سیلز، بال پگمنٹس اور پانی ہوتا ہے۔ فضلہ کو کچھ وقت کے لیے ریکٹم میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ انکیشن کے دوران فضلہ کو اینس (anus) کے ذریعے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔

جگر کا کردار (Role of liver)

جگر ایک بڑا آرگن ہے جو معدے کی دائیں جانب ہے۔ ایک بالغ انسان میں اس کا وزن تقریباً 1.5 کلوگرام ہوتا ہے۔ اس کی چلی یعنی وینٹریل (ventral) جانب ایک تھیلانما حصہ آرگن ہے جسے گال بلیڈر (gall bladder) کہتے ہیں۔ جگر بالکل خارج کرتا ہے جسے گال بلیڈر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ کامن بالڈ ڈکٹ کے ذریعے یہ بالڈر گال بلیڈر سے ڈیوڈینم میں جاتا ہے۔ بالڈر میں اینزائمز نہیں ہوتے۔



لیکن اس میں نمکیات ہوتے ہیں جو فیش کو چھوٹے قطروں میں توڑتے ہیں۔ بالڈر کے نمکیات ان قطروں کو ایک دوسرے سے الگ الگ بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح اینزائمز کو فیش پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جگر جسم میں بہت سے دوسرے افعال بھی سرانجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر؛

- گلوکوز کو گلیکوجن (glycogen) کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر گلوکوز مہیا کرتا ہے۔

- فیش میں حل پذیر (fat-soluble) وائٹامنز کو ذخیرہ کرتا ہے۔

- ایمائنو ایسڈز کو دوسرے آرگینک کمپائونڈز میں توڑتا ہے۔ اس عمل میں نقصان دہ امونیا (ammonia) بنتا ہے۔

شکل 1.6: جگر اور اس کے ساتھ موجود آرگنز

- امونیا کو ایک کم زہریلے مادے یعنی یوریا (urea) میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے پھر پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔
- زہریلے مادوں مثلاً الکوحل کو بھی توڑتا ہے۔
- اُن ریڈ بلڈ سیلز کو توڑتا ہے جو اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں۔
- جگر کیروٹین سے وائٹمن A بناتا ہے۔
- سرد موسم میں مینا بولزم کی رفتار تیز کر کے حرارت پیدا کرتا ہے۔

1.3 ڈائی جیسٹو سسٹم کی بیماریاں (DISORDERS OF THE DIGESTIVE SYSTEM)


1- اسہال (ڈائریا) Diarrhoea

ڈائریا میں بار بار پتلے یا پانی والے پاخانہ آتے ہیں۔ ڈائریا جسم میں پانی کی کمی (dehydration) کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں میں۔

- **علامات (Signs and Symptoms):** بار بار پتلے یا پانی والے پاخانہ؛ پیٹ میں درد (cramps or pain)؛ پیٹ کا پھولنا (bloating)؛ اور پانی کی کمی یعنی پیاس، منہ کا خشک ہونا، گہرا پیشاب۔
- **اسباب (Causes):** (بیکٹیریل، وائرل، یا پیراسائٹک) انفیکشنز؛ کھانے کی الرجی؛ ذہنی دباؤ/تناؤ؛ بعض ادویات مثلاً اینٹی بائیوٹکس (antibiotics)۔
- **علاج (Treatment):** کثرت سے فلوئڈز (fluids) پینا؛ ORS کا استعمال؛ ہلکی غذا (soft diet) کھانا؛ اسہال کش (anti-diarrheal) ادویات کا استعمال؛ اینٹی بائیوٹکس یا دیگر ادویات لینا (شدید صورتوں میں)۔
- **بچاؤ (Prevention):** باقاعدگی سے ہاتھ دھونا (خاص طور پر کھانے سے پہلے یا ہاتھ روم استعمال کرنے کے بعد)؛ آلودہ خوراک (contaminated food) یا پانی سے پرہیز کرنا؛ تناؤ سے بچنا۔

2- قبض (Constipation)

- قبض ایک ایسی کیفیت ہے جس میں فضلہ/پاخانہ باقاعدہ وقفوں سے جسم سے خارج نہیں ہوتا۔
- **علامات (Signs and Symptoms):** پاخانہ کے غیر معمولی یا مشکل اخراج (ایک ہفتے میں 3 بار سے کم)؛ سخت اور خشک پاخانہ/فضلہ؛ پیٹ میں تکلیف یا پیٹ کا پھولنا (bloating)۔
- **اسباب (Causes):** خوراک میں فائبر (fibre) کی کمی؛ پانی کی کمی (dehydration)؛ جسمانی سرگرمی کی کمی؛ بعض ادویات کا استعمال (مثلاً درد کم کرنے والی ادویات، آئرن سپلیمنٹس (iron supplements))؛ دیگر بیماریاں (مثلاً ذیابیطس (diabetes))۔
- **علاج (Treatment):** فائبر (fibre) کا زیادہ استعمال (پھل، سبزیاں، ثابت اناج (whole grains))؛ کثرت سے پانی پینا؛ باقاعدہ ورزش؛ قبض کشا ادویات کا استعمال
- **بچاؤ (Prevention):** فائبر سے بھرپور غذا کھانا؛ کثرت سے فلوئڈز اور پانی پینا۔



شکل 1.7: گیسرک السر

ایلیمنٹری کینال کی دیواروں میں ہونے والے زخم پپٹک (peptic) السز کہلاتے ہیں۔ السز عام طور پر معدہ کی دیواروں میں پیدا ہوتا ہے اور اسے گیسرک السر (gastric ulcer) کہا جاتا ہے۔ تاہم، السز ڈیوڈینم (ڈیوڈینل السز - duodenal ulcer) یا ایسوفیگیس (ایسوفیجیل السز - oesophageal ulcer) میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔

● علامات (Signs and Symptoms): پیٹ میں جلن اور درد؛

اُگالنے (regurgitation) کے بعد سلائیا (saliva) کا تیزی سے

منہ میں آ جانا؛ بھوک میں کمی؛ وزن میں کمی؛ خون کی اُلٹی (شدید صورتوں میں)۔

● اسباب (Causes): ہیلیکوبیکٹریا پائوری (Helicobacter pylori) بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن؛ غیر سٹیرائڈل سوزش کش

ادویات (NSAIDs - nonsteroidal anti-inflammatory drugs) کا طویل المدتی استعمال؛ شراب کا زیادہ استعمال؛ تمباکو نوشی؛ ذہنی دباؤ/تناؤ (stress) (اگرچہ یہ براہ راست وجہ نہیں، لیکن یہ علامات کو بگاڑ سکتا ہے)۔

● علاج (Treatment): اینٹی پائوری (H.pylori) انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس؛ ترشہ شکن (antacids) اور

پروٹون پمپ انہیبرٹرز (proton pump inhibitors) نامی ادویات۔

● بچاؤ (Prevention): درد کم کرنے والی ادویات (NSAIDs) کے زیادہ استعمال سے پرہیز؛ مرچوں والے کھانوں سے

پرہیز؛ متوازن غذا کھانا۔

مشق

درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

A

1- سال انٹسٹائن کے تین حصے، درست ترتیب کے ساتھ ہیں؛

(الف) ڈیوڈینم، جیچونم، ایلنم (ب) ایلنم، ڈیوڈینم، جیچونم (ج) کولون، سیکم، ریکٹم (د) سیکم، کولون، ریکٹم

2- مسلز کی امواج میں حرکت، جو ڈائی جیسٹو سسٹم میں خوراک آگے کی جانب لے جاتی ہے؛

(الف) کیمیکل ڈائی جیشن (ب) مکینیکل ڈائی جیشن (ج) پیری سٹالس (د) ایپزرائپشن (انجذاب)

3- ڈائی جیسٹو سسٹم کا وہ حصہ جہاں کوئی کیمیکل ڈائی جیشن نہیں ہوتی؛

(الف) اورل کیوٹی (ب) ایسوفیگیس (ج) معدہ (د) ڈیوڈینم

4- اینزائمز کا کون سا گروپ سٹارچ اور دوسرے کاربوہائیڈریٹس کو توڑتا ہے؟

(الف) پروٹیزز (ب) لائیپیزز (ج) ایمائی لیزز (د) پیپس

- 5- پتکریاز ڈائی جیسٹو اینز انمز بناتا ہے اور انھیں خارج کرتا ہے؛
- (الف) کولون میں (ب) گال بلیڈر میں (ج) جگر میں (د) ڈیوڈینم میں
- 6- معدے میں پیپسی نو جن کس کے عمل سے پیپسن میں تبدیل ہو جاتا ہے؟
- (الف) پائل نمکیات (ب) ہارمونز (ج) HCl (د) بائی کاربونیٹ
- 7- ڈائی جیسٹو سسٹم کے کون سے حصے میں کاربو ہائیڈریٹس، لپڈز اور پروٹینز کو ڈائی جیسٹ کیا جاتا ہے؟
- (الف) اورل کیوئی (ب) معدہ (ج) سال انشٹائن (د) لارج انشٹائن
- 8- اینزائم ٹریپس کس رطوبت میں موجود ہوتا ہے؟
- (الف) پتکریا ٹانگ جوس (ب) پائل (ج) گیسٹرک جوس (د) سیلانیو
- 9- گال بلیڈر سے پائل کا من پائل ڈکٹ کے ذریعے کہاں پہنچتا ہے؟
- (الف) معدہ (ب) ڈیوڈینم (ج) کولون (د) پتکریاز
- 10- سال انشٹائن میں بہت زیادہ تھیں کیوں ہوتی ہیں اور وہاں ولانی اور مائیکرو ولانی (microvilli) کیوں ہوتے ہیں؟
- (الف) خوراک کے گزرنے کی رفتار کو کم کرنے کے لیے (ب) خوراک کا انجذاب تیز کرنے کے لیے
- (ج) کائیم کے پیچھے کی طرف بہاؤ کو روکنے کے لیے (د) اینزائمز پیدا کرنے کے لیے

مختصر جوابات لکھیں۔

B

- 1- سلائوری گلینڈز کا ڈائی جیشن (انہضام) میں کیا کردار ہے؟ بیان کریں۔
- 2- نگلنا اور پیری سٹالس کی اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟
- 3- گیسٹرک جوس میں موجود ہائیڈروکلورک ایسڈ کے کیا افعال ہیں؟
- 4- پتکریا ٹانگ جوس خوراک کی ڈائی جیشن میں کیا کردار ادا کرتا ہے، بیان کریں؟
- 5- ولانی کی ساخت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔
- 6- السر کی وجوہات اور علامات کیا ہیں؟

تفصیلی جوابات لکھیں۔

C

- 1- چھوٹی آنت میں خوراک کا انجذاب بیان کریں۔
- 2- ڈائی جیسٹو سسٹم میں اورل کیوئی کے کردار کی وضاحت کریں۔
- 3- معدہ کی ساخت اور افعال کی وضاحت کریں۔
- 4- ڈائی جیشن میں جگر اور پتکریا کی اہمیت کا جواز پیش کریں۔

انکشافی سوالات

D

- 1- کسی ایسے شخص کو جسے جگر کی بیماری ہو، اسے فیٹس کو ہضم کرنے میں دشواری کیوں پیش آتی ہے؟
- 2- ایلیمینٹری کینال (گٹ) کے بیکٹیریا کا صحت مند توازن برقرار رکھنا کیوں اہم ہے؟
- 3- کارڈیک سفنکٹر میں خرابی تیزابی مواد کے معدے سے واپسی بہاؤ کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟
- 4- پائل کو خارج ہونے سے پہلے گال بلیڈر میں ذخیرہ کرنا کیوں ضروری ہے؟



2

انسان کا ریسپریٹری سسٹم (HUMAN RESPIRATORY SYSTEM)

❖ حاصلاتِ تعلیم ❖



اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- ❖ ہوائی راستہ (Air Passageway) اور پیچھڑوں کے حصوں کے کردار بیان کریں۔
- ❖ پسلیوں اور ڈایافراگم (diaphragm) کی حرکات کے لحاظ سے تنفس (breathing) کا عمل بیان کریں۔
- ❖ تنفس کے دوران داخل ہونے والی اور خارج ہونے والی ہوا کی ترکیب میں فرق واضح کریں۔
- ❖ ریسپریٹری سسٹم کی بیماریوں جیسے بروئکائٹس (bronchitis)، ایملفی سیما (emphysema)، پنمونیا (pneumonia)، دمہ (asthma)، اور پیچھڑوں کے سرطان (کینسر) پر مختصر بات کریں۔


جاندار سیلولر ریپریشن (cellular respiration) کے ذریعے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں سیلز خوراک (گلوکوز) کی آکسیدیشن (oxidation) کرتے ہیں اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے، جانداروں کو آکسیجن اپنے سیلز تک پہنچانے اور سیلز سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گیسوں کا تبادلہ (gaseous exchange) وہ عمل ہے جس میں سانس کے ذریعے اندر لی گئی ہوا (پھیپھڑوں میں) میں موجود آکسیجن خون میں چلی جاتی ہے، اور خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالی جانے والی ہوا میں چلی جاتی ہے۔ گیسوں کے تبادلے کے لیے، جانور سانس لیتے ہیں (جسے تنفس کہتے ہیں)۔

یاد کیجیے!

ایروبیک ریپریشن (aerobic respiration) میں، آکسیجن استعمال ہوتی ہے جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی پیدا ہوتے ہیں۔

تنفس (Breathing)

تنفس وہ عمل ہے جس میں جانور ہوا کو اپنے جسم کے اندر لے جاتے اور باہر نکالتے ہیں۔ یہ ہوا سے آکسیجن حاصل کرنے اور اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تنفس اور ریپریشن ایک ہی عمل نہیں ہے۔ ریپریشن ایک کیمیائی عمل ہے جبکہ تنفس ایک طبعی عمل ہے۔ تنفس گیسوں کے تبادلہ میں مدد کرتی ہے۔ بدلے میں گیسوں کا تبادلہ ریپریشن میں مدد کرتا ہے۔



شکل 2.1: ریپریشن، گیسوں کا تبادلہ اور تنفس کے درمیان تعلق

2.1 انسان کا ریسپریٹری سسٹم (HUMAN RESPIRATORY SYSTEM)

ریسپریٹری سسٹم، تنفس اور گیسوں کے تبادلے کا ذمہ دار ہے۔ انسان کا ریسپریٹری سسٹم دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے، یعنی ہوا کا راستہ (air passageway) اور پھیپھڑے۔


A- ہوا کا راستہ (Air Passageway)

جب ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے، تو یہ پھیپھڑوں تک پہنچنے کے لیے جڑی ہوئی نالیوں (connected tubes) میں سے گزرتی ہے۔

پھیپھڑوں میں گیسوں کے تبادلہ کے بعد، ہوا اُن ہی جڑی ہوئی نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں سے نکل کر باہر جاتی ہے۔ ان جڑی ہوئی نالیوں کو مجموعی طور پر ہوا کا راستہ کہتے ہیں۔ یہ مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہے۔

1- ناسٹریلز اور نیزل کیوٹی (Nostrils and Nasal cavity)

نیزل کیوٹی دو باریک خالی جگہوں (cavities) پر مشتمل ہے جو ناسٹریلز (نتھوں) اور فیرنکس کے درمیان موجود ہیں۔ ناسٹریلز کے



شکل 2.2: ہوا کا راستہ اور پھیپھڑے

2- فیرنکس (Pharynx)

نیزل کیوٹی فیرنکس میں کھلتی ہے۔ فیرنکس کے فرش پر ایک سوراخ گلائس (glottis) ہے۔ یہ لیرنکس میں کھلتا ہے۔ ایک پردہ (flap) گلائس کی حفاظت کرتا ہے جسے اپی گلائس (epiglottis) کہتے ہیں۔ یہ خوراک اور مائع کو ہوا کی نالی (ٹریکیا) اور پھیپھڑوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔

یاد کیجیے!

فیرنکس ایک مشترکہ راستہ ہے جو خوراک کو ایسوفیگس اور ہوا کو لیرنکس تک جانے دیتا ہے۔


3- لیرنکس (Larynx)

یہ فیرنکس اور ٹریکیا کے درمیان ایک خانہ ہے۔ اسے آواز پیدا کرنے والا خانہ (voice box) بھی کہتے ہیں۔ لیرنکس کی اندرونی دیواروں کے ساتھ دو ریشہ دار پیٹوں (fibrous bands) کا جوڑا لگا ہوتا ہے۔ ان پیٹوں کو ووکل کارڈز (vocal cords) کہتے ہیں۔ ووکل کارڈز میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

ووکل کارڈز میں ارتعاش اور ہونٹوں، رخسار، زبان اور جڑوں کی حرکات سے مخصوص ساؤنڈ (sound) پیدا ہوتی ہے، جس سے ہماری بول چال کی آواز (speech) بنتی ہے۔

4- ٹریکیا اور بروئیکاٹی (Trachea and Bronchi)

ٹریکیا ہوا کی نالی (windpipe) ہے جو تقریباً 12 سنی میٹر لمبی ہے۔ یہ لیرنکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور دو شاخوں پر ختم ہوتی ہے




شکل 3.2: ٹریکیا اور بروئیکائی میں کارٹیلج

سینے کی دیوار پسیلوں (ribs) کے 12 جوڑوں اور ان کے ساتھ لگے انٹرکاسٹل (inter-costal) مسلز پر مشتمل ہوتی ہے۔

بالکل نہیں ہوتی۔ ہر بروئیکول کا اختتام ایک چھوٹی نالی (duct) میں ہوتا ہے یہ نالی تھیلیوں کے ایک گچھے میں کھلتی ہے۔ ان تھیلیوں کو ایلیولائی (واحد؛ ایلیولوس: alveolus) کہتے ہیں۔ ایلیولوس کی دیواریں بہت باریک ہوتی ہیں۔ اس کے گرد بلڈ کپلر یز لپٹی ہوتی ہیں۔ ہوا جب ایلیولائی میں پہنچتی ہے تو اس میں سے آکسیجن خون میں داخل ہو جاتی ہے اور خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اس ہوا میں آ جاتی ہے۔

B۔ پھیپھڑے (The Lungs)


سینے یعنی تھوریکس (thorax) کے خلا میں پھیپھڑوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے بالائی جانب اور اطراف پر سینے کی دیوار (chest wall) ہوتی ہے۔ جبکہ پھیپھڑوں کے نیچے ایک موٹی عضلاتی یعنی مسکولر (muscular) ساخت ہے جسے ڈایافراگم (diaphragm) کہتے ہیں۔ پھیپھڑے سفنج جیسے نرم (spongy) اور لچک دار آرگنز ہیں۔ بایاں پھیپھڑا دائیں پھیپھڑے سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ بائیں پھیپھڑے میں دو حصے (lobes: لوبز) ہوتے ہیں جبکہ دایاں پھیپھڑا تین لوبز پر مشتمل ہے۔ پھیپھڑوں کے گرد ایک دوہری ممبرین ہوتی ہے جسے پلیورا



شکل 2.4: پھیپھڑے

(pleura) کہتے ہیں۔ اس کی اندرونی ممبرین پھیپھڑوں کی سطح سے جڑی ہوتی ہے جبکہ بیرونی ممبرین سینے کی دیوار اور ڈایافراگم کی اندرونی سطح کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ پلیورال فلوئڈ (pleural fluid) ہوتا ہے جو پھیپھڑوں اور سینے کی دیوار کے درمیان رگڑ کم کرتا ہے۔

پھیپھڑوں میں خون کی گردش (Blood Circulation in Lungs)



شکل 2.5: پھیپھڑوں میں (ایک ایلو پوس کے گرد) خون کی گردش

پلو موزی آرٹری دل سے ڈی آکسیجینیٹڈ (deoxygenated) خون کو پھیپھڑوں میں لاتی ہے۔ ہر پھیپھڑے کے اندر پلو موزی آرٹری تقسیم ہو کر آرٹریولز (arterioles) بنا دیتی ہے۔ آرٹریولز مزید تقسیم ہوتے ہیں اور ایلو یولائی کے گرد کپلریز بنا دیتے ہیں۔ ایلو یولائی کے گرد لپٹنے کے بعد، کپلریز مل کر وینولز (venules) بناتی ہیں۔ وینولز مل کر پلو موزی وین بناتی ہیں جو آکسیجینیٹڈ (oxygenated) خون کو واپس دل جانب لے جاتی ہے۔

2.2 تنفس کا عمل (THE MECHANISM OF BREATHING)


ہوا کو پھیپھڑوں میں لانے اور پھر اسے پھیپھڑوں سے باہر نکالنے کے لیے کی جانے والی جسمانی حرکات کو تنفس کہتے ہیں۔ تنفس کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔

1- انسپیریشن (انسپیریشن) Inhalation (Inspiration)

ہوا کو پھیپھڑوں میں لے جانا انسپیریشن کہلاتا ہے۔ اس کے دوران مندرجہ ذیل عوامل ہوتے ہیں؛ انٹرا کوسٹل مسلز (inter-costal muscles) سکڑتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پسلیاں (ribcage) پھیل جاتی ہیں۔ اسی دوران ڈایافراگم بھی سکڑتا ہے اور نیچے ہو جاتا ہے۔ ان دو سکڑاؤ کی وجہ سے سینے کے خلا کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پھیپھڑوں کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور باہر کی ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے۔

2- ایکسپیریشن (ایکسپیریشن) Exhalation (Expiration)

ہوا کو پھیپھڑوں سے باہر نکالنا ایکسپیریشن کہلاتا ہے۔ اس کے دوران مندرجہ ذیل عوامل ہوتے ہیں؛ انٹرا کوسٹل مسلز پھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پسلیاں اندر کی طرف دبتی ہیں۔ اسی دوران ڈایافراگم بھی پھیلتا ہے اور اوپر ہو جاتا ہے۔ ان دو حرکات کی وجہ سے سینے کے خلا کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ اس سے سینے کے اندر ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور سینے کی ہوا باہر نکل جاتی ہے۔



شکل 2.6: تنفس (a) انہیلیشن؛ (b) اگزیپیلیشن

تنفس کی رفتار (شرح) The Rate of Breathing

انسان میں نارمل حالات یعنی آرام کے وقت سانس لینے (تنفس) کی رفتار 16 سے 20 مرتبہ فی منٹ ہے۔ مشقت یا سخت کام کے دوران مسلسل زیادہ رفتار سے سیلولر ریسپریشن کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتی ہے۔ دماغ میں موجود ریسپیریٹری سینٹر خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادہ مقدار کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ریز کے مسلسل اور ڈایافرام کو تیز رفتار سے پیغامات بھیجتا ہے۔ ان مسلوں کے سکڑنے اور پھیلنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح، تنفس کی رفتار 30 سے 40 مرتبہ فی منٹ تک بڑھ جاتی ہے۔

سانس لینے کے دوران اندر داخل ہونے والی اور باہر خارج ہونے والی ہوا کا موازنہ


خصوصیت	اندر داخل ہونے والی ہوا	باہر خارج ہونے والی ہوا
آکسیجن کی مقدار (age%)	21	16
کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار (age%)	0.04	4
نائٹروجن کی مقدار (age%)	79	79
پانی کے بخارات	قابل تغیر	سیر شدہ
ٹمپرچر	قابل تغیر	قریباً جسمانی ٹمپرچر کے برابر
گرد کے ذرات	قابل تغیر	قریباً کوئی نہیں

1- برونکائٹس (Bronchitis)

برونکائی یا برونکیولز میں ہونے والی سوزش (انفلمیشن: inflammation) کو برونکائٹس کہتے ہیں۔ برونکائٹس میں برونکیولز کی اندرونی جگہ کم ہو جاتی ہے۔ برونکائٹس ایکیوٹ (acute) یعنی کم عرصہ (دو ہفتے) اور کرائنک (chronic) یعنی لمبے عرصہ (سالوں) کا بھی ہو سکتا ہے۔ کرائنک برونکائٹس میں، برونکائی کی دیواروں میں میوکس پیدا کرنے والے سیلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس سے برونکائی میں زیادہ میوکس رہتا ہے۔ اس سے تنفس میں آنے اور جانے والی ہوا کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے۔

وجوہات: وائرس یا بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن؛ سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز (مثلاً تمباکو کا دھواں)۔

علامات: کھانسی، سانس میں ہلکی خرخراہٹ، بخار، سردی لگنا اور سانس کی تنگی (shortness)۔



شکل 2.7: نارمل اور سوزش والے برونکائی

علاج: ادویات (کھانسی ختم کرنے والی) تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو؛ اینٹی بائیوٹک (اگر برونکائٹس بیکٹیریا کے انفیکشن سے ہو تو)؛ اینٹی وائرل (anti-viral) ادویات (جب یہ کسی وائرس کے انفیکشن سے ہو)؛ جلن پیدا کرنے والی چیزوں (irritants) مثلاً دھواں اور آلودگی سے بچنا۔

2- ایملفی سیما (Emphysema)


ایملفی سیما میں ایلیویولائی کی اندرونی دیواریں نرم ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس طرح بہت سی چھوٹی جگہوں کی بجائے ایک بڑی جگہ بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے گیسوں کے تبادلہ کے لیے سطح کم پڑ جاتی ہے۔ اس طرح مریض کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔

وجوہات: ہوا میں موجود سوزش پیدا کرنے والے کیمیکلز کا زیادہ عرصہ تک سامنا مثلاً تمباکو کا دھواں، کیمیکل خوشبوئیں اور دوسرے ہوائی پالیوٹنٹس (pollutants)۔

علامات: سانس کی تنگی (shortness of breath)، دیرینہ کھانسی (chronic cough) (میوکس کے ساتھ یا بغیر)، سانس میں خرخراہٹ


(wheezing) اور سینے کی جکڑن (chest tightness)۔

علاج: کھانسی کم کرنے والی اور سانس کی تنگی سے آرام کی ادویات۔ ایملفی سیما کا مکمل علاج ممکن نہیں ہوتا۔



شکل 2.8: ایملفی سیما

3۔ نمونیا (Pneumonia)




شکل 2.9: نمونیا

نمونیا پھیپھڑوں میں ایک سوزش ہے جو ایلیولائی میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمونیا سے ایلیولائی میں پس (pus) بھر جاتی ہے۔
وجوہات: بیکٹیریا، وائرس یا فنجائی سے ہونے والے انفیکشن۔
علامات: تیز بخار، سردی لگنا، سانس میں تنگی اور بلغم والی کھانسی کی شکایات۔
علاج: بیکٹیریل نمونیا کا علاج اینٹی بائیوٹکس سے کیا جاتا ہے۔ وائرل اور فنگل نمونیا کے علاج کے لیے اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ بیکٹیریل نمونیا سے بچاؤ کے لیے ویکسینز (vaccines) بھی دستیاب ہوتی ہیں۔

4۔ دمہ (Asthma)

یہ برونکائی میں ایک سوزش (انفلیکشن) ہے جس میں برونکائی اور برونکیولز کی دیواریں سوج جاتی ہیں اور ان نالیوں میں سکڑاؤ آ جاتا ہے۔
علامات: سانس کی تنگی، خرخراہٹ (سانس لینے وقت سیٹی کی آواز)، کھانسی اور سینے میں تنگی کے دورے۔



نارمل برونکس

سکڑا ہوا برونکس

شکل 2.10: دمہ


وجوہات: الرجی پیدا کرنے والے عوامل یعنی الرجنز (allergens) مثلاً گردوغبار کے کیڑے (dust mites)، پولن (pollen)، پھیپھوندی (mold)، اور پالتو جانوروں کی خشکی (pet dander)؛ موسمیاتی تبدیلی خاص طور پر ٹھنڈی ہوا؛ وراثتی عوامل (دمہ یا الرجی کا خاندانی طور پر موجود ہونا)۔

علاج: دمہ کے دورے کے دوران برونکیولز کھولنے والی ادویات یعنی برونکیو ڈائلیٹر (bronchodilators) دی جاتی ہیں۔

5۔ پھیپھڑوں کا کینسر (Lung Cancer)

سرطان یعنی کینسر سے مراد جسم کے کسی حصے میں سیلز کی تعداد میں بے قابو اضافہ ہے۔ جب پھیپھڑوں میں غیر فعلی سیلز کے مجموعے بن جائیں تو اسے پھیپھڑوں کا کینسر کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والا کینسر ہے۔

وجوہات: کینسر کرنے والے کیمیکلز یعنی کارسینوجنز (carcinogens) مثلاً جو جلنے والے تمباکو میں پائے جاتے ہیں؛ آئیونائزنگ (ionizing)



شکل 2.11: پھیپھڑوں کا کینسر

ریڈینیشن اور وائرل انفیکشن۔ پسیو (passive) سموکنگ یعنی کسی دوسرے کی سموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا سانس کے ذریعہ اندر جانا، بھی پھیپھڑوں کے کینسر کی ایک وجہ ہے۔ سگریٹ کے جلتے کنارے سے نکلنے والا دھواں، اس دھوئیں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو سگریٹ پینے والا باہر نکالتا ہے۔

پھیپھڑوں کا کینسر دنیا بھر میں سب سے زیادہ تشخیص ہونے والا کینسر ہے، جو نئے کینسر کیسز کی کل تعداد کا قریباً 12.4% ہے۔ یہ کینسر دنیا میں سالانہ 1.5 ملین سے زیادہ اموات کی وجہ بنتا ہے۔ پاکستان میں، پھیپھڑوں کا کینسر سالانہ نئے کینسر کیسز کی کل تعداد کا قریباً 5.1% ہے۔ ہر سال تقریباً 22,000 پھیپھڑوں کے کینسر کے نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔


ماخذ: (Source) ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن

علامات: اس کی عام علامات سانس کی تنگی، کھانسی (جس میں خون کی کھانسی بھی شامل ہے) اور وزن میں کمی ہونا ہیں۔ علاج: کینسر کے مریض کا علاج ایک یا زیادہ طریقوں سے کیا جاتا ہے جن میں سرجری (surgery)، کیموتھراپی (chemotherapy) اور ریڈینیشن تھراپی (radiation therapy) شامل ہیں۔

سموکنگ کے اثرات (Effects of Smoking)

سموکنگ نہ کرنے والے ایسے لوگوں میں جو دوسروں کی سموکنگ کا دھواں سانس کے ذریعہ اندر لے جاتے ہیں، دل کی بیماریوں اور پھیپھڑوں کے کینسر کے مواقع 30% زیادہ ہوتے ہیں۔

سموکرز میں بہت سی جان لیوا بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ سموکنگ سے پیدا ہونے والے بڑے خطرات میں پھیپھڑوں، گردوں، اورل کیوئیٹی، لیمرکس، چھاتی، مثانہ، ایسوفیجس، پنکریا اور معدہ میں کینسر اور دوسری بیماریاں ہیں۔



شکل 2.12: پھیپھڑوں پر سموکنگ کے اثرات

پاکستان میں 12% بالغ سموکنگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی تمام اموات میں سے 7.6% اموات سموکنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

تंबاكو كے دھوئیں میں 4,000 سے زائد کیمیکلز ہوتے ہیں مثلاً ٹکوٹین اور کاربن مونو آکسائیڈ۔ ان میں سے 69 سے زائد کیمیکلز کارسینوجنز (انسان میں کینسر کرنے والے کیمیکلز) ہیں مثلاً ٹار اور بینزین۔ ٹکوٹین (nicotine) سگریٹ میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کیمیکل ہے۔ یہ کئی آرگنز کو نقصان پہنچاتا ہے، جن میں دماغ بھی شامل ہے۔ یہ آرٹریز کی دیواروں کو بھی سخت کر دیتا ہے اور نتیجہ میں دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔

کاربن مانو آکسائیڈ (Carbon monoxide) سموکنگ کے دوران تمباکو کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک زہریلی گیس ہے۔ یہ ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور آکسیجن کی ترسیل میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ ٹار (tar) یعنی تارکول سگریٹ میں ٹھوس ذرات کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب کہ سانس کے ذریعے جاتا ہے تو یہ پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ گیسوں کے تبادلہ کے لیے سطح کو کم کر دیتا ہے۔

بینزین (benzene) سگریٹ کا اہم جزو ہے۔ یہ ایک کارسینوجن ہے اور بلڈ کینسر (لیوکیمیا: leukaemia) کا باعث بنتا ہے۔ اسی

طرح، سگریٹ میں موجود فارمیڈی ہائیڈ (formaldehyde) کینسر اور ریسپیریٹری سسٹم، جلد اور معدے اور آنتوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔

ویپنگ (vaping) سے مراد ای۔ سگریٹ (e-cigarette) سے پیدا ہونے والے بخارات کو اندر کھینچنا ہے۔ یہ آلات ایک مائع کو گرم کرتے ہیں، جس میں نیکوٹین، ذائقے (flavours)، اور دیگر کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں۔

بہت سے نوجوان ویپنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وہ اسے سگریٹس کا ایک محفوظ متبادل سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ سچ نہیں ہے۔

ویپنگ پھیپھڑوں کی سوزش اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ویپ میں موجود نیکوٹین اور دیگر کیمیائی مادے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافہ کرتے ہیں، جس سے دل کی بیماری ہوتی ہے۔

• امونیا (ammonia)، جو کہ ٹوائلٹ کی صفائی میں استعمال ہوتا ہے، تمباکو سے نیکوٹین کو الگ کرتا ہے اور اس سے ایک گیس بنتی ہے۔ یہ گیس جسم کے لیے زہریلی ہوتی ہے۔

• سگریٹ میں کئی اور سوزش پیدا کرنے والے (irritants) کیمیکلز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہوا کے راستے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ریسپیریٹری سسٹم کی کئی بیماریوں، بشمول کینسر، کا باعث بنتے ہیں۔

ہر سال 31 مئی کو تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن یعنی ورلڈ نو ٹوباکو ڈے (World No Tobacco Day) منایا جاتا ہے۔

سموکنگ کے مزید اثرات

سموکنگ سے خون میں کولیسٹرول (cholesterol) کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے اور خون کی نالیاں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ دانتوں پر داغ کی اہم وجہ بھی سموکنگ ہے۔ سموکرز میں سانس میں بدبو آنا عام ہے۔ سموکرز میں سگریٹ نہ پینے والوں کی نسبت دانت گرنے کا عمل 2 سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سموکنگ سے ٹیوبریکولوسس (tuberculosis) کا خطرہ 2 سے 4 گنا اور نمونیا کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے۔

مشق

A° درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

1- تنفس سے مراد ہے:

- (الف) توانائی خارج کرنے کے لیے C-H بانڈز کا ٹوٹنا
- (ب) جسمانی حرکات، جو ہوا کو جسم کے اندر اور باہر لے جاتی ہیں
- (ج) ہوا سے آکسیجن لینا اور جسم کی کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالنا
- (د) خون کا آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں تک ٹرانسپورٹ

2- لیرنکس سے گزرنے کے فوراً بعد ہوا کون سا راستہ اختیار کرتی ہے؟

- (الف) فیرنکس
- (ب) بروئیکاٹی
- (ج) ٹریکیا
- (د) ایلویولاٹی

3- ایلیولائی کیوں بلڈ کلریز سے گھرے ہوتے ہیں؟

- (الف) پانی جذب کرنے کے لیے (ب) گیسوں کے تبادلہ کے لیے
(ج) میوکس پیدا کرنے کے لیے (د) گرد کے ذرات پکڑنے کے لیے

4- ایلیولائی کی کون سی خصوصیت گیسوں کے تبادلہ کے لیے اُن کی مدد کرتی ہے؟

- (الف) موٹی دیواریں (ب) وسیع ڈایامیٹر (قطر)
(ج) نرم دارسطح (د) مضبوط مسلز

5- کس عمل سے تنفس کے دوران پھیپھڑوں کا حجم بڑھ جاتا ہے؟

- (الف) ڈایافرام کا پھیلنا (ب) انٹراکوسٹل مسلز کا سکڑنا
(ج) ٹریکیا کا بند ہو جانا (د) ایلیولائی کی دیواروں کا سخت ہو جانا

6- سانس کے ذریعے اندر آنے والی ہوا میں 21% آکسیجن ہوتی ہے۔ باہر نکلنے والی ہوا میں یہ کتنی ہے؟

- (الف) 0% (ب) 16%
(ج) 21% (د) 42%

7- مندرجہ ذیل میں سے کون سا عنصر انسان میں تنفس کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے؟

- (الف) خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (ب) خون میں آکسیجن
(ج) مسلز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ (د) مسلز میں آکسیجن

8- کون سی بیماری میں ایلیولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں؟

- (الف) نمونیا (ب) برونکائٹس
(ج) ایبھی سیما (د) دمہ

9- سموکنگ کس طرح کینسر کا باعث بنتی ہے؟

- (الف) آکسیجن لینے کی شرح بڑھ جاتی ہے (ب) سیل ڈویژن بے قابو ہو جاتی ہے
(ج) زخم بھرنے کے رفتار کم ہو جاتی ہے (د) ٹریکیا کا سائز بڑھ جاتا ہے

10- سگریٹ میں موجود کون سا کیمیکل عادی بنا سکتا ہے؟

- (الف) کاربن مانو آکسائیڈ (ب) ٹار
(ج) فلوٹین (د) فارمیڈی ہائیڈ

B مختصر جوابات لکھیں۔

1- گیسوں کے تبادلہ اور تنفس میں فرق بیان کریں۔

- 2- تنفس اور سیلولر میسریشن میں فرق بیان کریں۔
- 3- ٹریکیا اور برونگائی کی دیواروں میں موجود کارٹیج کا کیا کام ہے؟
- 4- آرام اور کام کے وقت انسان میں تنفس کی اوسط رفتار کیا ہے؟
- 5- ایلوولائی کی ساخت کیسے گیسو کے زیادہ تبادلے کا باعث بنتی ہے؟
- 6- برونگائش کی علامات، وجوہات، اور علاج کی فہرست بنائیں۔
- 7- ایفنی سیما کی علامات اور علاج بتائیں۔
- 8- کارسینو جنر کیا ہیں؟ سگریٹ میں موجود کوئی سے دو کارسینو جنر کے نام بتائیں۔
- 9- مندرجہ ذیل ٹیبل کو مکمل کریں:

خصوصیت	اندر داخل ہونے والی ہوا	باہر خارج ہونے والی ہوا
آکسیجن	21%	
کاربن ڈائی آکسائیڈ		4%
نائٹروجن	79%	

C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1- انہیلیشن اور اگزہیلیشن کے مراحل بیان کریں۔
- 2- انسان میں ہوا کے راستے کے مختلف حصوں پر مختصر نوٹ لکھیں۔
- 3- برونگس، ٹریکیا، اور ایلوولائی کے افعال اور مقامات کو بیان کریں۔
- 4- پھیپھڑوں کے کینسر کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں؟ تمباکو نوشی کے پھیپھڑوں کے کینسر کے علاوہ دیگر نقصان دہ اثرات کی وضاحت کریں۔

D انکشافی سوالات

- 1- اگر ڈایافراگم ٹھیک طرح سے کام کرنا چھوڑ دے تو سانس لینے کے عمل کو کیا ہو سکتا ہے؟
- 2- دھوئیں کے ذرات کا پھیپھڑوں کے اندر جمع ہو جانا کیوں خطرناک ہے؟
- 3- ٹریکیا میں C- شکل کے کارٹیج کیوں ہوتے ہیں جبکہ برونگیولز میں یہ نہیں ہوتے؟
- 4- دمہ کے دوروں کے دوران مریضوں کو سانس اندر لینے کی نسبت سانس باہر نکالنے میں زیادہ مشکل محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

3

انسان کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم

(HUMAN BLOOD CIRCULATORY SYSTEM)

حاصلاتِ تعلیم

اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:


- بیان کریں کہ انسانی جسم کے اندر خون کی گردش کیسے ہوتی ہے۔
- وضاحت کریں کہ خون کیسے پورے انسانی جسم میں مواد کی منتقلی کرتا ہے۔
- نظامِ خون سے منسلک مختلف اعضاء اور ان کے کردار کی شناخت کریں۔
- خون کے مختلف اجزاء کی شناخت کریں۔
- خون میں پائے جانے والے سیلز کی اقسام اور ان کے کرداروں کا نام لیں۔
- ڈایاگرام کے ساتھ دل کی ساخت کی وضاحت کریں۔
- دل کی عام بیماریوں کی وضاحت کریں [کورونری دل کی بیماریاں (coronary heart diseases)، مائیوکارڈیئل انفارکشن (myocardial infarction)، آنجائنا (angina)]۔
- دل کی عام بیماریوں سے متعلق تمباکو نوشی کے نقصان دہ اثرات کی وضاحت کریں۔

ٹرانسپورٹ سسٹم (نظام نقل و حمل) دواہم حصوں پر مشتمل ہے یعنی بلڈ سرکولیٹری سسٹم (blood circulatory system) اور لمفٹک سسٹم (lymphatic system)۔ اس باب میں، آپ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی تفصیلات کا مطالعہ کریں گے۔ انسان کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے اہم اجزاء خون، دل، اور خون کی نالیاں یعنی بلڈ ویسلز (blood vessels) ہیں۔

3.1 خون اور اس کے اجزاء (BLOOD AND ITS COMPONENTS)

خون کنیکٹو ٹشو (connective tissue) کی ایک قسم ہے۔ اس کا بنیادی کام جسم میں مادوں کی نقل و حمل کرنا ہے۔ یہ اہم مواد کو وہاں لے جاتا ہے جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کے تمام سیلز تک پہنچاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو واپس پھیپھڑوں تک اخراج کے لیے لے جاتا ہے۔ خون ڈائجسٹو سسٹم سے غذائی اجزاء (نیوٹریئنٹس) کو بھی سیلز تک، گلیٹنڈز سے ہارمونز کو ہدف اعضاء تک اور سیلز سے بے کار مادوں کو ایکسکریشن کے لیے گردوں تک پہنچاتا ہے۔

خون کا تقریباً 55 فیصد ایک سیال مائع یعنی پلازما (plasma) کہتے ہیں۔ جبکہ اس کا 45 فیصد سیلز اور سیلز کی طرح کے اجسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک بالغ انسان کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے۔



شکل 3.1: خون کی فیصدی ترکیب


1- خون کا پلازما (Blood Plasma)

اگر خون کے پلازما سے فائبرینوجن علیحدہ کر لی جائے، تو بقیہ حصے کو سیرم (serum) کہیں گے۔

یہ خون کا مائع حصہ ہے۔ پلازما کا 90 سے 92 فیصد پانی، 7 سے 9 فیصد پروٹینز اور 1 فیصد دوسرے مادوں پر مشتمل ہے۔

- **پروٹینز:** اہم پلازما پروٹینز اینٹی باڈیز (antibodies) ہیں۔ ان کا کام پیتھوجینز (pathogens) کے خلاف جسم کی حفاظت کرنا ہے۔ فائبرینوجن (fibrinogen) بھی ایک پلازما پروٹین ہے۔ یہ پروٹین خون جمانے کی ذمہ دار ہے۔ ایلبیومن (albumin) ایک پلازما پروٹین ہے جو خون کا اوسموتک پریشر (پانی کا توازن) قائم رکھتی ہے۔
- **نمکیات:** پلازما کے اہم نمکیات سوڈیم، کلورائڈ اور بائی کاربونیٹ آئنز کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ، کیلشیم، میگنیشیم، کاپر، پوٹاشیم اور زنک کی بھی بہت کم مقداریں موجود ہوتی ہیں۔

• **نیوٹریئنٹس، بے کار مادے اور ہارمون:** پلازما میں گلوکوز، لیڈ اور ایماٹوائیڈ جیسے نیوٹریئنٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ مادے خون میں



شکل 3.2: خون کی ترکیب

ڈائی جیسٹو سسٹم سے داخل ہوتے ہیں۔ سیلز میں پیدا ہونے والے بے کار مادے بھی پلازما میں موجود ہوتے ہیں۔ پلازما میں اینڈو کرائن گلینڈز (endocrine glands) سے نکلنے والے ہارمون بھی ہوتے ہیں۔

• **ریسرپیریگیسیں:** کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کی قلیل مقدار پلازما میں حل شدہ ہوتی ہیں۔ آکسیجن بنیادی طور پر تو ریڈ بلڈ سیلز کے پاس ہوتی ہے، لیکن آکسیجن کی تقریباً 1.5 فیصد مقدار حل شدہ شکل میں پلازما میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ کی 5 سے 7 فیصد مقدار پلازما میں حل ہوئی ہوتی ہے۔

2- بلڈ سیلز (اور سیلز کی طرح کے اجسام) Blood Cells (and cell-like bodies)

ریڈ بلڈ سیلز (ایریٹھروسائٹس) Red Blood Cells (Erythrocytes)

یہ ڈسک کی طرح کے سرخ سیلز ہیں۔ ریڈ بلڈ سیل کے وسط میں ایک دباؤ ہوتا ہے۔ ان میں ایک سرخ پروٹین ہیموگلوبن (haemoglobin) موجود ہوتی ہے۔ یہ پروٹین آکسیجن اور تھوڑی سی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے۔ خون کے ایک مکعب ملی میٹر (mm^3) میں 4 سے 5.5 ملین ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے اور فوراً بعد ریڈ بلڈ سیلز جگر اور تلی (spleen) میں بنتے ہیں۔

بالغوں میں ریڈ بلڈ سیلز چھوٹی ہڈیوں (سٹرئم، ربز اور ورٹیبری: ribs and vertebrae, sternum) کے سرخ گوڈے یعنی ریڈ بون میرو (red bone marrow) میں بنتے ہیں۔ ریڈ بلڈ سیل بننے کے دوران، اس کا نیوکلیس اور آرگنیلز (organelles) توڑ دیے جاتے ہیں۔ ریڈ بلڈ سیلز کا اوسط دورانیہ حیات 120 دن ہے۔ جب ان کی عمر پوری ہوتی ہے، تو بون میرو، تلی اور جگر انھیں خون سے نکال کر توڑ دیتے ہیں۔

سارے جسم میں 30 ٹریلین سے زیادہ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر سیکنڈ میں تقریباً 2 ملین ریڈ بلڈ سیلز بنائے اور توڑے جاتے ہیں۔

وائٹ بلڈ سیلز (لیوکوسائٹس) White Blood Cells (Leukocytes)

یہ بے رنگ ہوتے ہیں اور بے قاعدہ اشکال رکھتے ہیں۔ یہ بھی ریڈ بون میرو میں بنتے ہیں۔ کچھ وائٹ بلڈ سیلز لمف نوڈز (lymph nodes)، ٹانسلز (tonsils)، تھائیمس (thymus) یا تلی (spleen) میں جا کر بالغ ہوتے ہیں۔ سائز میں یہ ریڈ بلڈ سیلز سے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد ریڈ بلڈ سیلز سے کم ہوتی ہے۔ خون کے ایک مکعب ملی میٹر میں ان کی تعداد تقریباً 7000 ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز بیماریوں کے خلاف جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا دورانیہ حیات ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز کی کئی اقسام ہیں۔


1۔ **گرینولوسائٹس (granulocytes):** ان وائٹ بلڈ سیلز کا سائٹوپلازم دانے دار ہے۔ ان میں نیوٹروفیل (neutrophils)، ایوسینوفیل (eosinophils) اور بیسوفیل (basophils) شامل ہیں۔ ان کے نام سائٹوپلازم پر چڑھنے والے رنگ یعنی سٹین (stain) کی بنیاد پر ہیں۔ نیوٹروفیل انفیکشن کے مقام پر بیکٹیریا کو مارتے ہیں اور وہاں سے مردہ سیلز کے مواد کو صاف کرتے ہیں۔ ایوسینوفیل پیرائٹس (parasites) کے ساتھ لڑتے ہیں اور رد عمل میں الرجی (allergy) کا باعث بنتے ہیں۔ بیسوفیل کے کام کے دوران ہسٹامین (histamine) نکلتے ہیں جس سے انفلیکیشن اور الرجی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔

2۔ **اے گرینولوسائٹس (agranulocytes):** ان کا سائٹوپلازم صاف یعنی غیر دانے دار ہوتا ہے۔ اے گرینولوسائٹس کی دو اقسام ہیں یعنی مونوسائٹس (monocytes) اور لمفوسائٹس (lymphocytes)۔ مونوسائٹس میکرو فاج (macrophage) بناتے ہیں جو جراثیموں اور مردہ سیلز کو نگل لیتے ہیں۔ لمفوسائٹس پتھوجین کے خلاف ایمنٹی باڈیز بناتے ہیں۔


سیل کی طرح کے اجسام یعنی پلیٹ لیٹس (Platelets)

پلیٹ لیٹس مکمل سیل نہیں ہوتے بلکہ یہ بون میرو کے بڑے سیلز کے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ ان میں کوئی نیوکلئیس نہیں ہوتا۔ ان کا دورانیہ حیات 7 سے 12 دن ہے۔ خون کے ایک مکعب ملی میٹر میں 250,000 پلیٹ لیٹس ہوتی ہے۔

جب کوئی بلڈ ویسل کٹی ہے، تو اس مقام پر پلیٹ لیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں اور پلازما پروٹین فائبرینوجن کو فائبرن (fibrin) میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فائبرن کے مالیکیول ایک جال بناتے ہیں جس میں ریڈ بلڈ سیلز پھنس جاتے ہیں۔ فائبرن اور ریڈ بلڈ سیلز کا مجموعہ سخت ہو جاتا ہے اور اب خون کا کلاٹ (clot) کہلاتا ہے۔ کلاٹ اس وقت تک خون بہنے سے روکتا ہے جب تک کٹی ہوئی بلڈ ویسل مرمت نہ ہو جائے۔




شکل 3.3: بیکٹیریا کو نگلتا ہوا میکرو فاج



شکل 3.4: پلیٹ لیٹس کا کلاٹ بنانا

دل کی ساخت (Structure of the Heart)

دل کے گرد ایک سخت تھیلی جیسی ممبرین پیری کارڈیم (pericardium) ہوتی ہے۔ یہ ممبرین دل کے اوپر ایک فلوئڈ خارج کرتی ہے۔ دل دھڑکنے کے دوران یہ فلوئڈ پیری کارڈیم اور دل کے درمیان رگڑ کو کم کرتا ہے۔ پرندوں اور دوسرے میمیلو طرح، انسانی دل میں بھی دو اطراف یعنی سائیڈز (sides) ہوتی ہیں درمیان دیوار کو سپٹم (septum) کہتے ہیں۔ دل کی ہر سائیڈ دو خانوں (chambers) میں تقسیم ہوئی (atrium)، جس کی جمع ایٹریا (atria) ہے، کہلاتا ہے۔ جبکہ ہر زیریں خانہ وینٹریکل (ventricle) کہلاتا ہے جبکہ وینٹریکلز کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں۔



شکل 3.5: انسانی دل؛ ساخت اور خون کا بہاؤ

دل میں خاص پردے موجود ہوتے ہیں جنہیں والوز (valves) کہتے ہیں۔ یہ والوز صرف ایک طرف ہی کھلتے ہیں۔ دائیں ایٹریم اور دائیں وینٹریکل کے درمیان ایک والو ہے جسے ٹرائی کیسپڈ (tricuspid) والو کہتے ہیں۔ یہ تین پردوں کا بنا ہوتا ہے۔ بائیں ایٹریم اور


بائیں وینٹریکل کے درمیان والوکوبائی کسپڈ (bicuspid) والو کہتے ہیں۔ یہ دو پردوں کا بنا ہوتا ہے۔ جب وینٹریکلز سکڑتے ہیں تو یہ ٹرائی کسپڈ اور بائی کسپڈ والوز بند ہوجاتے ہیں۔ اس طرح وینٹریکلز سے نکل کر خون واپس ایٹریا میں نہیں جاسکتا بلکہ صرف بڑی ویسلز میں ہی جاتا ہے۔ ہر وینٹریکل اور بڑی ویسل کے درمیان بھی والو ہوتا ہیں۔ ان والوز کو سیمی لیونز (semilunar) والوز کہتے ہیں۔ وینٹریکلز کے پھیلنے پر یہ والوز بڑی ویسلز سے خون کے وینٹریکلز میں واپسی بہاؤ کو روکتے ہیں۔

دل میں خون کی گردش (Circulation of Blood inside Heart)

دل کی دائیں سائیڈ جسم سے آنے والا خون حاصل کرتی ہے اور اسے پھیپھڑوں کی طرف بھیج دیتی ہے۔ دل کی بائیں سائیڈ پھیپھڑوں سے آنے والا خون حاصل کرتی ہے اور اسے جسم کی طرف بھیج دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ دل ایک ڈبل پمپ (double pump) کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کام مندرجہ ذیل طریقے سے کیا جاتا ہے۔

جسم کے تمام حصوں (پھیپھڑوں کے علاوہ) سے ڈی آکسیجنیٹڈ (deoxygenated) یعنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کم آکسیجن والا خون دو وینز یعنی سپیریئر اور انفیریئر وینا کیوا (superior and inferior vena cava) کے ذریعے دل کے دائیں ایٹریم میں آتا ہے۔ دایاں ایٹریم سکڑتا ہے اور اس خون کو دائیں وینٹریکل سکڑتا ہے اور اس خون کو پلمونری آرٹریز (pulmonary arteries) میں پمپ کر دیتا ہے۔ یہ آرٹریز اس ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو پھیپھڑوں میں پہنچاتی ہیں۔ یہاں، کاربن ڈائی آکسائیڈ خون سے نکل جاتی ہے اور آکسیجن خون میں داخل ہوجاتی ہے۔

پلمونری وینز (pulmonary veins) پھیپھڑوں سے آکسیجنیٹڈ (oxygenated) یعنی کم کاربن ڈائی آکسائیڈ اور زیادہ آکسیجن والا خون پھیپھڑوں سے واپس لاتی ہیں۔ یہ وینز دل کے بائیں ایٹریم میں کھلتی ہیں۔ اس خون کو بائیں وینٹریکل میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر بائیں وینٹریکل سکڑتا ہے اور اس خون کو ایک بڑی آرٹری یعنی اے اورٹا (aorta) میں پمپ کر دیتا ہے۔ اے اورٹا اس خون کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے۔



شکل 3.6: پلمونری اور سسٹمک سرکولیشن

پلمونری وینز (pulmonary veins) پھیپھڑوں سے آکسیجنیٹڈ (oxygenated) یعنی کم کاربن ڈائی آکسائیڈ اور زیادہ آکسیجن والا خون پھیپھڑوں سے واپس لاتی ہیں۔ یہ وینز دل کے بائیں ایٹریم میں کھلتی ہیں۔ اس خون کو بائیں وینٹریکل میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر بائیں وینٹریکل سکڑتا ہے اور اس خون کو ایک بڑی آرٹری یعنی اے اورٹا (aorta)

سسٹمک سرکولیشن میں زیادہ دباؤ کی وجہ سے خون جسم کے تمام حصوں تک پہنچ پاتا ہے۔ دوسری طرف، پلمونری سرکولیشن میں کم دباؤ کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سے خون آہستہ رفتار سے گزرتا ہے۔ اس سے پھیپھڑوں میں گیسوں کے تبادلہ کے لیے مناسب وقت مل جاتا ہے۔

میں پمپ کر دیتا ہے۔ اے اور اس خون کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے۔

پلمونری اور سسٹیمک سرکولیشن (Pulmonary and Systemic Circulation)

خون کا دل سے پھیپھڑوں میں جانا اور وہاں سے واپس دل میں آنا پلمونری سرکولیشن کہلاتا ہے۔ اسی طرح، خون کا دل سے جسمانی ٹشوز میں جانا اور وہاں سے واپس دل میں آنا سسٹیمک سرکولیشن کہلاتا ہے۔

دل کی دھڑکن (ہارٹ بیٹ) (Heartbeat)


دل کے خانوں میں ایک دوسرے کے بعد آنے والا سکڑاؤ (سسٹول: systole) اور پھیلاؤ (ڈایاسٹول: diastole) ایک دھڑکن یعنی ہارٹ بیٹ بناتا ہے۔ انسان کا دل فی منٹ اوسطاً 70 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اسے دل کے دھڑکن کی رفتار (heart rate) بھی کہتے ہیں۔ ایک ہارٹ بیٹ میں دو مراحل ہوتے ہیں۔

- پہلا مرحلہ یعنی سسٹول اس وقت ہوتا ہے جب دونوں وینٹریکل سکڑتے ہیں اور خون کو پلمونری آرٹریز اور اے اور اے میں پمپ کرتے ہیں۔

سسٹول میں، ٹرائکی کسپڈ اور بائی کسپڈ والوز بند ہونے سے ”lub“ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔

- دوسرا مرحلہ یعنی ڈایاسٹول فوراً سسٹول کے بعد آتا ہے جب دونوں ایٹریا پھیلتے ہیں اور خون اُن میں داخل ہوتا ہے۔ ان ایٹریا کے سکڑنے سے وینٹریکل بھر جاتے ہیں۔

ڈایاسٹول میں، سیکی لیونز والوز بند ہونے سے ”dub“ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔




شکل 3.7: ایک ہارٹ بیٹ

3.3 بلڈ ویسلز (BLOOD VESSELS)

1- آرٹریز (Arteries)

آرٹریز خون کو دل سے دُور لے جاتی ہیں۔ بالغوں میں، پلمونری آرٹریز کے سوا، تمام آرٹریز میں آکسیجنیڈ خون ہوتا ہے۔ آرٹریز کی موٹی دیواروں میں تین تہیں ہیں۔ سب سے اندرونی تہ اینڈو تھیلیئم (endothelium) ہے۔ درمیانی تہ سموتھ مسلز اور ایلاستک (elastic)



شکل 3.8: بلڈ ویسلز

ٹشو کی بنی ہوئی ہے۔ بیرونی تہ کنٹیکٹو ٹشو کی بنی ہے۔ آرٹریز کا اندرونی خلا جس میں خون بہتا ہے، لیومن (lumen) کہلاتا ہے۔ آرٹریز مضبوط مگر لچکدار ہوتی ہیں۔ جب آرٹریز جسم کے آرگنز میں داخل ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی ویسلز میں تقسیم ہو جاتی ہیں جنہیں آرٹریولز (arterioles) کہتے ہیں۔ آرٹریولز ٹشوز میں داخل ہو کر کپلریز میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔

2۔ کپلریز (Capillaries)

یہ سب سے چھوٹی بلڈ ویسلز ہیں۔ کپلریز کی دیواریں سیلز کی صرف ایک تہ یعنی اینڈوٹھلیئم (endothelium) پر مشتمل ہیں۔ یہ تہ اتنی باریک ہے کہ پانی، نیوٹریئنٹس (nutrients) اور آکسیجن اس میں سے گزر کر ٹشو فلوئڈ میں جاسکتے ہیں۔ اسی طرح، ٹشو فلوئڈ میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسرے بے کار مادے اس میں سے گزر کر خون میں آسکتے ہیں۔ ٹشوز میں کپلریز مل کر چھوٹی وینز یعنی وینیولز (venules) بناتی ہیں۔ وینیولز مل کر وینز بناتے ہیں۔

3۔ وینز (Veins)


وینز خون کو دل کی جانب لے جاتی ہیں۔ بالغوں میں، پلمونری وینز کے سوا، تمام وینز میں ڈی۔آکسیجنیڈ خون ہوتا ہے۔ وین کی دیواریں بھی ان ہی تین تہوں کی بنی ہیں جو آرٹری میں موجود ہیں؛ یعنی اینڈوٹھلیئم کی اندرونی تہ، سموٹھ مسلز اور ایلاسٹک ٹشو کی درمیانی تہ، اور کنٹیکٹو ٹشو کی بیرونی تہ۔ وینز میں درمیانی تہ آرٹریز کی نسبت باریک ہوتی ہے۔ اس میں سموٹھ مسلز اور ایلاسٹک ٹشو کم ہوتے ہیں۔ وینز کا لیومن آرٹریز کی نسبت زیادہ کھلا ہوتا ہے۔ زیادہ تر وینز میں والوز بھی ہوتے ہیں، جو خون کے واپسی بہاؤ کو روکتے ہیں۔

3.4 آرٹیریل اور وینس سسٹم (ARTERIAL AND VENOUS SYSTEMS)

آرٹیریل سسٹم (Arterial System)

- **پلمونری سرکولیشن کی آرٹریز:** دل کے دائیں وینٹریکل سے ایک بڑی آرٹری پلمونری ٹرنک (trunk) ڈی آکسیجنیڈ خون لے کر نکلتی ہے۔ یہ دو چھوٹی پلمونری آرٹریز (pulmonary arteries) میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر پلمونری آرٹری ایک پھیپھڑے میں جاتی ہے۔
- **سیسٹمک سرکولیشن کی آرٹریز:** دل کے بائیں وینٹریکل سے آکسیجنیڈ خون اے اورٹا (aorta) میں پمپ کیا جاتا ہے۔ اے اورٹا سے آرٹریز نکلتی ہیں جو سر، کندھوں اور بازوؤں کو خون پہنچاتی ہیں۔ اے اورٹا تھوریکس (thorax) میں سے گزر کر نیچے کی طرف جاتا

ہے۔ یہاں یہ ڈارسل اے اورٹا (dorsal aorta) بن جاتا ہے۔ یہ بہت سی آرٹریز نکالتا ہے جو جسم کے نچلے حصوں کو خون پہنچاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ہپٹک (hepatic) آرٹری جگر کو خون پہنچاتی ہے اور رینل (renal) آرٹریز گردوں کو خون پہنچاتی ہیں۔ مزید نیچے جا کر اے اورٹا تقسیم ہو جاتا ہے اور دو فیورل (femoral) آرٹریز بنادیتا ہے۔ یہ آرٹریز ٹانگوں کو خون پہنچاتی ہیں۔



شکل 3.9: انسانی جسم میں اہم آرٹریز اور وینز

وینس سسٹم (Venous System)

وینس نیلی دکھائی دیتی ہیں لیکن دراصل ان کے اندر موجود خون گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔

پلوئر سرکولیشن کی وینز: دو پلوئر وینز (pulmonary veins) آکسیجنیڈ خون

پھیپھڑوں سے دل کے بائیں ایٹریم میں لاتی ہیں۔

سسٹمک سرکولیشن کی ویز: دو بڑی ویز یعنی سپیریئر وینا کیوا (superior vena cava) اور انفیریئر وینا کیوا (inferior vena cava) جسم سے ڈی آکسیجنیڈ خون دائیں ایٹریم میں لاتی ہیں۔ سپیریئر وینا کیوا سر، کندھوں اور بازوؤں سے آنے والی مختلف ویز کے ملنے سے بنتی ہے۔ انفیریئر وینا کیوا جسم کے نچلے حصوں سے آنے والی کئی ویز سے بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، ٹانگوں سے آنے والی وہ فیمورل (femoral) ویز انفیریئر وینا کیوا میں کھلتی ہیں۔ رینل (renal) ویز گردوں سے خون انفیریئر وینا کیوا تک لاتی ہیں۔ ہپٹک (hepatic portal) وین انٹسٹائن سے خون جگر تک پہنچاتی ہے۔ جگر سے ہپٹک (hepatic) وین خون کو انفیریئر وینا کیوا تک لیجاتی ہے۔

3.5 کارڈیو-ویسکولر بیماریاں (CARDIOVASCULAR DISORDERS)

ایسی بیماریاں جن میں دل اور بلڈ ویسلز متاثر ہوں، مجموعی طور پر کارڈیو-ویسکولر بیماریاں (CVDs) کہلاتی ہیں۔

1- کورونری ہارٹ ڈیزیز (Coronary Heart Disease (CHD))

آرٹریو اسکلیروسس (Arteriosclerosis) سے مراد آرٹریز کی دیواروں کا عمومی سخت ہونا اور موٹا ہونا ہے۔ ایٹھروسکلیروسس بھی آرٹریو اسکلیروسس کی ایک مخصوص قسم ہے۔ جوشریانوں کے اندر چربی، کولیسٹرول، اور دیگر مادوں (پلاک) کے جمع ہوجانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

کورونری ہارٹ ڈیزیز سے مراد کورونری آرٹریز کا تنگ ہوجانا یا بند ہوجانا ہے۔ یہ بیماری بنیادی طور پر ایٹھروسکلیروسس (atherosclerosis) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایٹھروسکلیروسس کا مطلب ہے آرٹریز میں چکنائی والے مادوں کا جمع ہوجانا۔ آرٹریز میں ان مادوں کی تہیں بن جاتی ہیں جنہیں پلاک (plaque) کہتے ہیں۔

وجوہات: خون میں کم ڈینسٹی والی لیپو پروٹینز (low-density lipoproteins)

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کارڈیو-ویسکولر بیماریاں تمام دنیا میں ہونے والی اموات میں سے 32 فیصد اموات کی وجہ ہیں۔ پاکستان میں CVDs تمام اموات کی 29 فیصد کی وجہ ہیں۔

مثلاً کولیسٹرول کی زائد مقدار، بلڈ پریشر زیادہ ہونا، سموکنگ، ڈیابٹیز (diabetes)، غیر فعال طرز زندگی (sedentary lifestyle)۔

علامات: ابتدائی مراحل میں غیر علامتی (asymptomatic)؛ حالت بڑھنے پر سینے میں درد یا تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔

خطرہ کے عوامل (risk factors): موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی سطح کا بلند ہونا، اور طرز زندگی کے عوامل نامناسب طرز زندگی۔

بچاؤ: صحت مند خوراک، باقاعدہ ورزش، سموکنگ کا ترک، اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی مناسب سطح کا خیال رکھنا۔


پیچیدگیاں: اگر علاج نہ کیا جائے تو کورونری دل کی بیماری (CHD) مزید شدید حالات جیسے مایوکارڈیئل انفارکشن اور ہارٹ فیلئر (heart failure) کا باعث بن سکتی ہے۔

2- مایوکارڈیئل انفارکشن (Myocardial Infarction)

بعض اوقات مایوکارڈیئل انفارکشن سینے میں درد کی علامات کے بغیر ہوتا ہے۔ اسے خاموش ہارٹ ایکٹ کہتے ہیں۔ یہ اکثر زیادہ عمر کے لوگوں اور ڈیابٹیز کے مریضوں میں ہوتا ہے۔

’مایوکارڈیئل انفارکشن‘ دو الفاظ یعنی ’مایوکارڈیم (myocardium)‘ اور ’انفارکشن (infarction)‘ سے بنی ہے۔ مایوکارڈیم (myocardium) کا مطلب ہے ’دل کے مسلز‘ جبکہ انفارکشن (infarction) کا مطلب ہے ’ڈشوکی‘

موت۔ دل کے کٹشور کی موت کو مائیوکارڈیئل انفارکشن کہتے ہیں۔ اسے عام طور پر دل کا دورہ یعنی ہارٹ ایٹک (heart attack) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل کے مسلز کے کسی حصہ تک کچھ عرصہ کے لیے خون کا بہاؤ نہ ہو جس کے نتیجے میں دل کے اُن مسلز کی موت ہو جائے۔



وجوہات: ایک یا ایک سے زائد کورونری آرٹریز میں رکاوٹ (بلاکج) آ جانا جو عام طور پر ایٹھروسکلیروسس کے پلاک کے اوپر خون کا کلاٹ (clot) بن جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

علامات: سینے میں درد، تنگی، اور دباؤ؛ سانس میں تنگی، پسینہ آنا؛ بازو، گردن اور جبروں میں سرایت کرنے والا درد۔

شکل 3.10: ایٹھروسکلیروسس اور اس کے نتیجے میں مائیوکارڈیئل انفارکشن

علاج: امیرجنسی علاج (کلاٹ کو تحلیل کرنے والی ادویات)؛ انجیوپلاستی (angioplasty) جس میں بندہ جانے والی آرٹریز کو کھولا جاتا ہے اور سٹیٹ (stent) ڈالا جاتا ہے تاکہ آرٹریز کھلی ہی رہیں۔

پہچیدگیاں: ہارٹ فیلیر (heart failure)؛ اے ریمیا (arrhythmias) یعنی بے قاعدہ دھڑکن، اور اچانک قلبی گرفتاری (cardiac arrest)۔

بچاؤ: صحت مند خوراک کے ساتھ وزن کو برقرار رکھنا؛ سموکنگ سے پرہیز کرنا؛ باقاعدگی سے ورزش کرنا؛ بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اور ڈیایٹیز کو کنٹرول کرنا۔

ہر سال 28 ستمبر کو ورلڈ ہارٹ ڈے (World Heart Day) منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو کارڈیو اسکولر بیماریوں کے خدشات سے آگاہی دینا ہے۔

3۔ انجائنا پیکٹورس (Angina Pectoris)

انجائنا پیکٹورس (عام طور پر جسے انجائنا کہتے ہیں) سینے کا درد یا تکلیف ہے جو دل کے مسلز تک خون کے کم بہاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ عموماً کورونری دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انجائنا کورونری دل کی بیماری (CHD) کی ایک علامت ہے اور اکثر یہ ظاہر کرتا ہے کہ دل کو کافی مقدار میں (خون/آکسیجن) نہیں مل رہی ہے۔

علامات: سینے کا درد یا تکلیف، سینے پر دباؤ، جکڑن (squeezing)، یا بھاری پن (fullness)۔ درد کندھوں، گردن، یا بازوؤں تک بھی پھیل سکتا ہے۔

علاج: طرز زندگی میں تبدیلیاں، ادویات، انجیوپلاستی یا سٹیٹ ڈالنے جیسے طریقہ کار کے بندہ ہونے۔


پہچیدگیاں: اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ مائیوکارڈیئل انفارکشن کی طرف بڑھ سکتا ہے اور دل کی ناکامی (ہارٹ فیلیر) کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔

دل کی بیماریوں سے متعلق تمباکو نوشی کے نقصان دہ اثرات

(Harmful Effects of Smoking Related to Heart Diseases)

- 1- سموکنگ دل کی بیماریوں کے لیے ایک بڑا رسک فیکٹر ہے۔ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح تمباکو نوشی دل کی صحت پر منفی اثر ڈالتی ہے:
 - 1- ایٹھروسکلیروسس کے خطرہ میں اضافہ: سموکنگ آرٹریز کی اینڈوٹھیلیئم کو نقصان پہنچا کر ایٹھروسکلیروسس کے عمل کو تیز کرتی ہے۔
 - 2- خون کے لوتھڑوں (کلاٹ) بننے کے خطرہ میں اضافہ: سموکنگ پلیٹ لیٹ کے جگمگھٹے بننے (platelet aggregation) کو فروغ دیتی ہے جس سے خون کے کلاٹ بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کلاٹ کورونری آرٹریز کو بند کر سکتے ہیں اور مایوکارڈیئل انفارکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔
 - 3- بڑھا ہوا بلڈ پریشر: سموکنگ سے نالیوں کا سکڑاؤ (vasoconstriction) ہوتا ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔
 - 4- غیر معمولی دھڑکن اور ردم (rhythm): اے ردمیا (arrhythmia) سے مراد دل کی دھڑکنوں کا غیر معمولی (بے ترتیب) ہو جانا ہے۔ یہ صورت حال خطرناک ہو سکتی ہیں۔ سموکنگ دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھا کر دل کے ردم کو متاثر کرتی ہے۔
 - 5- آکسیجن کی فراہمی میں کمی: سگریٹ کے دھوئیں سے نکلنے والی کاربن مونو آکسائیڈ ریڈ بلڈ سیلز (RBCs) میں ہیموگلوبن کے ساتھ آکسیجن کی نسبت موثر طریقے سے جڑ جاتی ہے جس سے خون کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔
 - 6- دل کی مجموعی صحت پر اثر: سموکنگ ٹانگوں کی شریانوں کے تنگ ہونے میں حصہ ڈالتی ہے، جو دل پر مزید تناؤ (strain) ڈال سکتی ہے۔

سموکنگ آپ کے دل کے ساتھ کیا کرتی ہے؟



شکل 3.11: "دل پر سموکنگ کے اثرات" پر عوامی آگاہی کا پوسٹر


A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

- 1- خون کے کون سے اجزاء آکسیجن ٹرانسپورٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں؟
 (الف) وائٹ بلڈ سیلز (ب) پلیٹ لیٹس (ج) ریڈ بلڈ سیلز (د) پلازما
- 2- خون میں پلیٹ لیٹس کی کمی کا سامنا کرنے والے شخص کو کس کام میں مشکل ہو سکتی ہے؟
 (الف) انفیکشن سے لڑنا (ب) تنفس (ج) خون کا جمنا (د) آکسیجن کی ٹرانسپورٹ
- 3- کون سی یہ تمام بلڈ ویسلز میں ہوتی ہے؟
 (الف) سموٹھ مسلز (ب) اینڈو تھیٹیم (ج) سکلیڈیل مسلز (د) کنیکٹو ٹشو
- 4- بالغ انسان میں کون سے خانے یا ویسل میں ڈی آکسجینیڈ خون ہوتا ہے؟
 (الف) بائیاں ایٹریم (ب) پلمونری آرٹری (ج) پلمونری وین (د) اے اورٹا
- 5- جب فائبرینوجین خون کا کلاٹ بناتی ہے تو یہ خون سے الگ ہو جاتی ہے۔ خون کے بقیہ حصے کو کیا کہتے ہیں؟
 (الف) پلازما (ب) لف (ج) سیرم (د) پس
- 6- انسان کے دل کے کس خانے کی دیواریں سب سے موٹی ہیں؟
 (الف) دایاں ایٹریم (ب) بائیاں ایٹریم (ج) بائیاں وینٹریکل (د) دایاں وینٹریکل
- 7- خون اور ٹشوز کے مابین مادوں کا تبادلہ کہاں سے ہوتا ہے؟
 (الف) آرٹریز (ب) ویز (ج) ویز (د) آرٹریز اور ویز دونوں
- 8- تمام ویز میں ڈی آکسجینیڈ خون ہوتا ہے سوائے _____ وین کے؟
 (الف) وینا کیوا (ب) ہسپیک پورٹل (ج) پلمونری (د) رینل
- 9- خون کے بہاؤ میں کہاں رکاوٹ آنے سے مائیو کارڈیئل انفارکشن ہوتا ہے؟
 (الف) اے اورٹا (ب) پلمونری وین (ج) کورونری آرٹری (د) ہسپیک وین
- 10- اگر بائی کسپڈ والو خراب ہو جائے تو خون کا کون سا بہاؤ متاثر ہوگا؟
 (الف) بائیں ایٹریم سے بائیں وینٹریکل (ب) دائیں ایٹریم سے دائیں وینٹریکل
 (ج) بائیں وینٹریکل سے اے اورٹا (د) پھیپھڑوں سے بائیں ایٹریم

B مختصر جوابات لکھیں۔

- 1- خون میں موجود سیلز کی اقسام اور ان کے افعال کی فہرست بنائیں۔

- 2۔ ایٹریا اور وینٹریکلز میں فرق بیان کریں۔
- 3۔ وینا کیواسے جسم کے مختلف حصوں تک خون کے بہاؤ کا راستہ بیان کریں۔
- 4۔ مائیو کارڈیئل انفارکشن کی وجوہات اور علاج بتائیں۔
- 5۔ دل کی اس ڈایا گرام میں آکسجینیٹڈ اور ڈی آکسجینیٹڈ خون کو دکھانے کے لیے رنگ بھریں۔ مارک شدہ مختلف ساختوں کو لیبل کریں۔




C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1۔ خون کے اجزاء کے افعال کو بیان کریں۔
- 2۔ وضاحت کریں کہ خون انسانی جسم میں مواد کی نقل و حمل (ٹرانسپورٹ) کیسے کرتا ہے۔
- 3۔ دل کی ساخت کو ایک ڈایا گرام کے ساتھ بیان کریں۔
- 4۔ سموکنگ کے دل کی بیماریوں سے متعلق نقصان دہ اثرات کی وضاحت کریں۔
- 5۔ آرٹری، وین اور کپلری کی ساخت اور افعال کا موازنہ کریں۔

D انکشافی سوالات

- 1۔ دل میں آکسجینیٹڈ خون کو ڈی آکسجینیٹڈ خون سے کیوں الگ رکھا جاتا ہے؟
- 2۔ باقاعدہ ورزش بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو کس طرح مضبوط کرتی ہے؟
- 3۔ طرز زندگی کے انتخاب کارڈیو ویکولر بیماریوں سے کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں؟
- 4۔ اگر خون میں کولیٹرسٹرول کی سطح کبھی قابو میں نہ لائی جائے تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ دل اور بلڈ ویسلز پر کیسے اثر ڈال سکتی ہے؟



4

انسان کا یورینری سسٹم (HUMAN URINARY SYSTEM)

❖ حاصلاتِ تعلیم ❖




اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- ❖ یورینری سسٹم کے مختلف آرگنز کی نشاندہی کریں۔
- ❖ گردے کی ساخت کا اس کے فعل سے تعلق بتائیں۔
- ❖ بیان کریں کہ نیفر ون گردے کا ایکسکریٹری یونٹ ہے۔
- ❖ نیفر ونز (nephrons) کے مختلف حصوں کے مقامات بتائیں اور ان کا ان کے فعل سے تعلق بتائیں۔
- ❖ بیان کریں کہ گردے کا بنیادی فعل پیشاب بنانا ہے۔
- ❖ بیان کریں کہ پیشاب بننے کے عمل میں تین مراحل ہیں، یعنی فلٹریشن (filtration)، ریری ایبز اورپشن (reabsorption) اور سیکریشن (secretion)۔
- ❖ وضاحت کریں کہ گردے اوسموریگولیشن (osmoregulation) میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
- ❖ کڈنی سٹونز (kidney stones) کی وجوہات اور علاج کی شناخت کریں۔
- ❖ گردے کے ناکارا ہو جانے (kidney failure) کی وجوہات اور علاج کی نشاندہی کریں۔

یوریزیسٹم جسم کے اندرونی ماحول کو منظم (regulate) کرتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ بے کار مادے اور زائد مواد جسم سے خارج ہو جائیں۔ اس باب میں ہم انسانی یوریزیسٹم کی ساخت اور افعال اور گردے کی متعلقہ بیماریوں کا مطالعہ کریں گے۔

4.1 انسان کا یوریزیسٹم (HUMAN URINARY SYSTEM)



شکل 4.1: انسان کا یوریزیسٹم

انسان کا یوریزیسٹم یعنی ایکسکریٹری (excretory) سسٹم گردوں (kidneys) کے ایک جوڑے، یوریترز (ureters) کے ایک جوڑے، ایک یورینری بلڈر (urinary bladder) اور ایک یوریتھرا (urethra) پر مشتمل ہے۔ گردے خون سے فالتو پانی، نمکیات اور نائٹروجنی بیکار مادے فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب بناتے ہیں، ہر گردے سے ایک ٹیوب یعنی یوریتھرا پیشاب کو یورینری بلڈر تک پہنچاتی ہے۔ یورینری بلڈر پیشاب کو عارضی طور پر سٹور کرتا ہے۔ یوریتھرا ایک نالی ہے جو پیشاب کو یورینری بلڈر سے لے کر جسم سے باہر تک لے جاتی ہے۔


گردے (The Kidneys)

گردے یوریزیسٹم کے مرکزی آرگنز ہیں۔ رینل آرٹریز انھیں ایسا خون فراہم کرتی ہیں جس میں میٹابولزم میں بننے والے بے کار مادے (مثلاً یوریا، اضافی پانی اور نمکیات) موجود ہوتے ہیں۔ گردے ان بے کار مادوں کو خون سے فلٹر (filter) کرتے ہیں اور پھر ان کو پیشاب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس پیشاب کو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔

گردے لوہے (bean) کے بیچ کی شکل کے آرگنز ہیں۔ ہر گردے کی ایک جانب کنوئیکس (convex) اور دوسری کنکاو (concave) ہوتی ہے۔ گردے پیٹ یعنی ایبڈامن (abdomen) میں، ڈایا فرام سے نیچے، وٹیرل کالم (vertebral column) کے اطراف میں لگے ہوتے ہیں۔ ہر گردے کی کنکاو جانب وٹیرل کالم کی طرف ہوتی ہے۔ بایاں گردہ دائیں کی نسبت تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔ گردے گہرے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ہر گردہ 10 سینٹی میٹر لمبا، 5 سینٹی میٹر چوڑا اور 4 سینٹی میٹر موٹا ہوتا ہے۔

گردے کی ساخت (Structure of Kidney)

بیرونی ساخت: گردہ ایک سخت ٹشو یعنی رینل کپسول (renal capsule) میں لپٹا ہوتا ہے۔ گردے کی کنکاو جانب ایک گڑھا ہوتا ہے جسے ہیلکس (hilus) کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے رینل آرٹری گردے میں داخل ہوتی ہے اور رینل وین اور یوریتھرا گردے سے نکلتی ہیں۔




شکل 4.2: گردے کی ساخت

اندرونی ساخت: اندرونی طور پر گردہ دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے۔ بیرونی حصے کو رینل کارٹیکس (renal cortex) جبکہ اندرونی حصے کو رینل میڈولا (renal medulla) کہتے ہیں۔ رینل میڈولا میں بہت سے مخروطی علاقے ہوتے ہیں جنہیں رینل پارائڈز (renal pyramids) کہتے ہیں۔ تمام رینل پارائڈز کی چوڑی بنیاد رینل کارٹیکس کی جانب جبکہ نوکیلا کنارہ ایک کیوٹیٹی میں ہوتا ہے جسے رینل پیلوس (pelvis) کہتے ہیں۔ رینل پیلس آگے کی جانب گردے سے باہر یورین بناتی ہے۔

نفرن (Nephron)

گردے کی فعلیاتی اکائی نفرن ہے۔ ہر گردے میں دس لاکھ سے زیادہ نفرن پائے جاتے ہیں۔ ایک نفرن کے دو بڑے حصے ہیں یعنی رینل کارپسل اور رینل ٹیوبول۔



شکل 4.3: نفرن کی ساخت

1۔ رینل کارپسل (renal corpuscle): یہ نیفر ون کا پہلا حصہ ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے یعنی گلو میرولس (glomerulus) اور بو مین کپسول (Bowman's capsule)۔ گلو میرولس بلڈ کیپریز کا ایک گچھا ہے جبکہ بو مین کپسول ایک پیالے نما ساخت ہے جو گلو میرولس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔

2۔ رینل ٹیوبول (renal tubule): یہ ایک لمبی نالی ہے جو بو مین کپسول کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اس کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ بلدار (convoluted) ہے اور اسے پراگزیمیل (proximal) بلدار نالی کہتے ہیں۔ درمیانہ حصہ ایک "U" شکل کی نالی ہے اور اسے لوپ آف ہینلے (loop of Henle) کہتے ہیں۔ آخری حصہ پھر بلدار ہے اور اسے ڈسٹل (distal) بلدار نالی کہتے ہیں۔ بہت سے نیفر ونز کی ڈسٹل بلدار نالیاں ایک کلکٹنگ ڈکٹ (collecting duct) میں کھلتی ہیں۔ بہت سی کلکٹنگ ڈکٹس آپس میں مل کر رینل پیلوں میں کھلتی ہیں۔

4.2 گردے کا فعل (FUNCTIONING OF THE KIDNEY)

گردے خون کی کیمیائی ترکیب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ گردے خون سے زائد اور بیکار مادے لیتے ہیں اور انہیں پیشاب میں تبدیل کرتے ہیں۔ پیشاب بننے کا کام تین مراحل میں مکمل ہوتا ہے۔

1۔ پریشر فلٹریشن (Pressure Filtration)

خون رینل آرٹری کے ذریعہ گردے میں داخل ہوتا ہے۔ آرٹری بہت سے آرٹریولز میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر آرٹریول تقسیم ہو کر گلو میرولس کی کیپریز بناتی ہے۔ جب خون گلو میرولس میں پہنچتا ہے تو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس زیادہ پریشر کی وجہ سے بہت سے مادے (پانی، نمکیات، گلوکوز اور یوریا وغیرہ) گلو میرولس سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ سارا مواد بو مین کپسول میں چلا جاتا ہے۔ اس مرحلہ کو پریشر فلٹریشن کہتے ہیں اور فلٹر ہونے والے مواد کو گلو میرولس کا فلٹریٹ (glomerular filtrate) کہتے ہیں۔ یہ فلٹریٹ گلو میرولس میں داخل ہونے والے خون کے پلازما کا قریباً 20 فیصد ہوتا ہے۔

2۔ ری ابزورپشن (Reabsorption)


گلو میرولس کا فلٹریٹ نیفر ون کے اگلے حصے یعنی رینل ٹیوبول میں جاتا ہے۔ اس فلٹریٹ میں سے کئی فائدہ مند مادوں کو رینل ٹیوبول کے گرد موجود بلڈ کیپریز میں واپس جذب کر لیا جاتا ہے۔

- زیادہ تر پانی، تقریباً تمام گلوکوز اور امینو ایسڈز، اور زیادہ تر نمکیات کو پراگزیمیل بلدار نالی سے واپس جذب کیا جاتا ہے۔
- کچھ پانی لوپ آف ہینلے کے نیچے جانے والی نالی یعنی ڈیسینڈنگ لمب (descending limb) سے واپس جذب ہوتا ہے۔
- نمکیات کی بڑی مقدار لوپ آف ہینلے کے اسیڈنگ لمب (ascending limb) سے واپس جذب ہوتی ہے۔
- کچھ پانی کو ڈسٹل بلدار نالی اور کلکٹنگ ڈکٹ سے بھی واپس جذب کیا جاتا ہے۔

3۔ ٹیوبولر سیکریشن (Tubular Secretion)

جب گلو میرولس کے فلٹریٹ سے مفید مادے واپس خون میں جذب کیے جا رہے ہوتے ہیں، اسی دوران خون میں رہ جانے والے کچھ

بیکار مادوں کو بلڈ کلریز سے رینل ٹیوبول میں سیکریٹ (secrete) کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ایکٹو ٹرانسپورٹ (active transport) سے کیا جاتا ہے اور اسے ٹیوبول سیکریشن کہتے ہیں۔ ری ایپز اریشن اور ٹیوبول سیکریشن کے بعد رینل ٹیوبول میں موجود فلٹریٹ کو پیشاب کہتے ہیں۔ تمام نیفرز سے پیشاب رینل پیلووس میں آ جاتا ہے۔ رینل پیلووس سے، پیشاب یورینز کے ذریعے یورینری بلیڈر میں جاتا ہے۔ یہاں اسے جمع کیا جاتا ہے۔ جب یورینری بلیڈر بھر جاتا ہے، تو پیشاب کو یورینتھرا کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے۔



شکل 4.4: گردے کا فعل

اوسموریگولیشن میں گردے کا کردار (Role of Kidneys in Osmoregulation)

اوسموریگولیشن (osmoregulation) سے مراد جسم میں پانی کی مقدار کو ضرورت کے مطابق کنٹرول کرنا ہے۔ گردے اوسموریگولیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ خون میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس طرح جسم کے دوسرے فلونڈز میں بھی پانی کی مقدار کنٹرول ہو جاتی ہے۔

• کم مرتکز (dilute) پیشاب: جب خون میں زائد پانی ہو تو گلوبولس سے زیادہ پانی بوین کیپسول میں فلٹر ہوتا ہے۔ رینل ٹیوبولز سے کلریز میں پانی کا واپسی انجذاب کم کیا جاتا ہے۔ اس طرح زیادہ مقدار میں پتلا یعنی کم مرتکز (dilute) پیشاب بنتا ہے اور خون اور جسم میں پانی کی مقدار دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے۔

• مرتکز (concentrated) پیشاب: جب خون میں پانی کی مقدار نارمل سے کم ہو تو گلوبولس سے کم پانی بوین کیپسول میں فلٹر ہوتا ہے۔ رینل ٹیوبولز سے کلریز میں پانی کا واپسی انجذاب زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح مرتکز پیشاب بنتا ہے اور خون میں پانی کی مقدار محفوظ رہتی ہے۔

1۔ گردے میں پتھری (کڈنی سٹونز) (Kidney Stones)


بعض اوقات گردوں میں فلٹر کیے گئے نقصان دہ مادے اور نمکیات مثلاً کیلشیم آکسلیٹ (calcium oxalate)، کیلشیم اور امونیم فاسفیٹ، اور یورک ایسڈ (uric acid) وغیرہ گردوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہاں سخت، قلمی (crystalline) اجسام بن جاتے ہیں۔ یہ اجسام پیشاب میں نہیں نکل سکتے اور گردے کی پتھری کہلاتے ہیں۔ چند پتھریاں گردوں سے نکل کر یورینر اور یورینری بلیڈر میں پھنس سکتی ہیں۔

علامات: گردے یا پیٹ کے نچلے حصہ میں شدید درد؛ یورینتھرا میں جلن؛ بار بار پیشاب آنا؛ بدبودار پیشاب؛ پیشاب میں خون اور پس (pus)؛ متلی، قے، پیٹ پھولنا (bloating)۔

وجوہات: خوراک میں کیلشیم آکسلیٹ، کیلشیم اور امونیم فاسفیٹ شامل ہونا (سبز سبزیوں، چکنائی اور ڈیری مصنوعات)؛ خوراک میں وائٹامن C اور D کا زیادہ ہونا؛ کم پانی پینا؛ خون میں زیادہ یورک ایسڈ ہونا؛ یورینری ٹالیوں میں انفیکشن ہونا؛ الکحل کا استعمال۔

علاج: اگر پتھری کا سائز چھوٹا ہو تو مریض کو زیادہ پانی پینے کا کہا جاتا ہے تاکہ پتھری پیشاب کے ساتھ ہی نکل جائے۔

لیتھوٹریپسی (lithotripsy): گردے کی پتھری نکلانے کا ایک اور طریقہ لیتھوٹریپسی ہے۔ اس طریقہ میں گردے میں موجود پتھریوں پر باہر سے شاک ویوز (shock waves) گرائی جاتی ہیں۔ یہ شعاعیں پتھریوں سے ٹکراتی ہیں اور انھیں چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں جو پیشاب کے رستے باہر نکل جاتے ہیں۔



شکل 4.5: لیتھوٹریپسی

اگر پتھری بڑی ہو اور آسانی سے نہ نکل سکتی ہو تو پتھریاں نکلانے کے لیے مریض کی سرجری (surgery) کی جاتی ہے۔

2۔ گردے کا ناکارہ ہوجانا (کڈنی یارینل فیلیر) (Renal Kidney Failure)

جب ایک یا دونوں گردے اپنا فعل (خون سے بیکار مادے لینا اور انھیں جسم سے باہر نکال دینا) سرانجام دینے کے قابل نہیں رہتے تو

اس حالت کو گردوں کا ناکارہ ہونا کہتے ہیں۔

علامات: خون میں بیکار مادوں کا ارتکاز بڑھ جانا؛ جسم کے فلوئڈز کی مقدار بھی بڑھ جانا؛ وزن میں کمی؛ پیشاب میں خون آنا؛ ٹانگوں، پاؤں اور چہرے پر سوجن ہو جانا۔


وجوہات: زیادہ عرصہ رہنے والی ڈائیالیز اور ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپرٹینشن (hypertension)؛ ڈی ہائیڈریشن (dehydration)؛ گردے میں شدید انفیکشن؛ چند ادویات مثلاً نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز (nonsteroidal anti-inflammatory drugs-NSAIDs) کا بے جا استعمال؛ گردے میں بڑی پتھریاں؛ گردوں کو نقصان؛ دل یا جگر کا ناکام ہو جانا۔

گردوں کے بے کار ہونے کا علاج (Treatment of Kidney Failure)

(الف) ڈائیالیز (Dialysis)


ڈائیالیز ایسا علاج ہے جس میں ڈائیالیز فلوئڈ (dialysis fluid) استعمال کر کے خون میں سے بے کار مادے نکال لیے جاتے ہیں۔ ڈائیالیز کے دو طریقے رائج ہیں۔

1۔ **ہیموڈیالیز (Haemodialysis):** اس طریقہ میں مریض کا خون ایک مشین یعنی ڈیالائزر (dialyzer) میں سے گزرا جاتا ہے۔ ڈیالائزر کے اندر لمبی نالیاں ہوتی ہیں۔ خون ان نالیوں کے اندر سے گزرتا ہے جبکہ ڈائیالیز فلوئڈ ان نالیوں کے گرد بہتا ہے۔ فالتو پانی اور بیکار مادے خون سے نکل کر ڈائیالیز فلوئڈ میں آ جاتے ہیں۔ صاف ہو چکے خون کو دوبارہ جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔



شکل 4.6: ہیموڈیالیز

2۔ **پیریٹونیل ڈائیالیز (Peritoneal dialysis):** اس طریقہ میں ڈائیالیز فلوئڈ کو پیریٹونیل کیوٹی (پیٹ میں ایلیمینٹری کینال یعنی گٹ کے ارد گرد کی جگہ) میں ڈالا جاتا ہے۔ پیریٹونیل کیوٹی کی دیواروں کے ساتھ پیریٹونیل ممبرین لگی ہوتی ہے۔ پیریٹونیل ممبرین کی بلڈ ویسلز کے خون میں موجود بیکار مادے ڈائیالیز فلوئڈ میں نفوذ کر جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ڈائیالیز فلوئڈ کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔



شکل 4.7: پیریٹونیکل ڈایالیز

(ب) کڈنی ٹرانسپلانٹ (Kidney Transplant)

کڈنی فیلچر کے جدید علاج کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہے۔ اس علاج میں مریض کے جسم میں ناکارہ گردے کے ساتھ ڈونر (donor) کا صحت مند گردہ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ گردہ عطیہ کرنے والا کوئی مرحوم بھی ہو سکتا ہے اور زندہ بھی۔ زندہ ڈونر مریض کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ تمام معاملات میں، ٹرانسپلانٹ سے پہلے ڈونر کے گردے کا مریض کے امیون (immune) سسٹم سے موافقت کا

ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جب موافقت والا گردہ مریض کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کے جسم میں 10 سے 15 سال تک نارمل کام کرتا ہے۔

پنجاب میں، آرگن ٹرانسپلانٹیشن کو پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی (Punjab Human Organ Transplant Authority) کنٹرول کرتی ہے۔ یہ یقینی بناتی ہے کہ لوگ حفاظت اور معیار کے ساتھ مناسب ٹرانسپلانٹیشن کروا سکیں۔

مشق

A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

1- جسم کے فلونڈز میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کرنا کیا کہلاتا ہے؟

(الف) فلٹریشن (ب) ری۔ ایپز اپشن (ج) ٹیوبولر سیکریشن (د) اوسموریگولیشن

2- نیفرون کی پراگزیمیل بلڈ رنالی میں کیا ہوتا ہے؟

(الف) گلو میرولس خون کو فلٹر کرتا ہے (ب) پانی اور نیوٹریئنس دوبارہ جذب ہوتے ہیں


(ج) پیشاب ذخیرہ کیا جاتا ہے (د) خون کے دھارے میں پانی ڈالا جاتا ہے

- 3۔ کون سی ساخت خون کو فلٹر کر کے پیشاب بنانے کی ذمہ دار ہے؟
 (الف) نیفر ون (ب) رینل پیلو س (ج) یوریٹر (د) رینل کیپسول
- 4۔ نیفر ون میں کون سی ساخت خون کو فلٹر کرنے کی ذمہ دار ہے؟
 (الف) لوپ آف ہینلے (ب) گلو میر ولس (ج) پراگزیمیل بلدارنالی (د) ڈسٹل بلدارنالی
- 5۔ نیفر ون میں نیوٹرینس کا واپسی انجذاب (reabsorption) کہاں ہوتا ہے؟
 (الف) گلو میر ولس (ب) پراگزیمیل بلدارنالی (ج) لوپ آف ہینلے (د) ڈسٹل بلدارنالی
- 6۔ نیفر ون کے اندر کون سے عمل میں خون سے نیفر ون میں مادوں کی ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے؟
 (الف) فلٹریشن (ب) ری ایبزارپشن (ج) سیکریشن (د) ایکسکریشن
- 7۔ نیفر ون کے بوین کیپسول میں داخل ہونے والے فلٹریٹ میں کیا نہیں ہوتا؟
 (الف) پانی (ب) کیلسیئم آئن (ج) بلڈ سیلز (د) یوریا
- 8۔ کون سے طریقہ کار میں جسم سے باہر خون کو فلٹر کرنے کے لیے مشین استعمال کی جاتی ہے؟
 (الف) پیرویوٹیل ڈائالیز (ب) ہیموڈائالیز (ج) لیٹھوٹریسی (د) رینل سرجری
- 9۔ ہیموڈائالیز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
 (الف) جسم میں پانی کی مقدار پوری کرنا (ب) ضائع ہو جانے والے نیوٹرینس کو پورا کرنا
 (ج) خون سے بے کار مادوں کو فلٹر کرنا (د) بلڈ پریشر کو منظم کرنا
- 10۔ پیرویوٹیل ڈائالیز میں کون سی ساخت فلٹر ممبرین کا کام کرتی ہے؟
 (الف) ڈائالیز مشین (ب) رینل کارٹیکس
 (ج) پیرویوٹیل ممبرین (د) رینل ٹیوبولز


B مختصر جوابات لکھیں۔

- 1۔ انسان کے یورینری سسٹم کے اہم حصوں کے نام بتائیں۔
 - 2۔ مختصر بیان کریں کہ گردے کس طرح خون کی ترکیب کنٹرول کرتے ہیں۔
 - 3۔ نیفر ون کے اہم حصوں کے نام بتائیں۔
 - 4۔ خوراک میں شامل اُن مادوں کا نام بتائیں جو گردوں میں پتھری پیدا کر سکتے ہیں۔
 - 5۔ لیٹھوٹریسی سے کیا مراد ہے؟
 - 6۔ گردے ناکام ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ گردے ناکام ہونے کے علاج کے نام بتائیں۔
 - 7۔ فرق بیان کریں:
- i۔ ایکسکریشن اور اوسموریگولیشن ii۔ رینل کارٹیکس اور رینل میڈولا iii۔ رینل کارپسل اور رینل ٹیوبولز
- iv۔ پریشر فلٹریشن اور ٹیوبولر سیکریشن v۔ ہیموڈائالیز اور پیرویوٹیل ڈائالیز

8۔ ڈایا گرام (A) اور ڈایا گرام (B) کے حصوں کے نام لکھیں:



(A)



(B)

C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1۔ گردے کی ساخت پر نوٹ لکھیں۔
- 2۔ نیفر ون کی ساخت بیان کریں اور ڈایا گرام بنا کر لکھیں۔
- 3۔ گردوں میں پریشر فلٹریشن اور ری۔ ایپز آرپشن کے عمل کو بیان کریں۔
- 4۔ ٹیوبولر سیکریشن سے کیا مراد ہے؟ یہ عمل خون سے بیکار مادوں کے اخراج میں کیسے مدد کرتا ہے؟
- 5۔ گردوں میں پتھری کی وجوہات، علامات اور علاج بتاتے ہوئے اس پر نوٹ لکھیں۔
- 6۔ گردے ناکام ہو جانے کی علامات اور وجوہات لکھیں۔
- 7۔ ڈایالسز کی تعریف لکھیں اور پیری ٹونیکل اور ہیمو ڈیالسز کے اعمال بیان کریں۔

D انکشافی سوالات

- 1۔ ”ایکسکریشن کے ساتھ ساتھ، گردے اوسموریگولیشن میں بھی کردار ادا کرتے ہیں“۔ اس بیان پر تبصرہ کریں۔
- 2۔ نیفر ون کس طرح یقینی بناتا ہے کہ ضروری نیوٹریئنٹس پیشاب میں ضائع نہ ہوں؟
- 3۔ جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے میں لوپ آف ہینلے کا لمبا ہونا کیوں اہم ہے؟
- 4۔ ڈایالیز جیسی دائمی بیماریاں گردے ناکام ہونے کا سبب کیسے بن سکتی ہیں؟



5

کوآرڈی نیشن (COORDINATION)

❖ حاصلاتِ تعلّم ❖




اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- ❖ نروٹس سسٹم اور اس کردار بیان کریں۔
- ❖ سنٹرل نروٹس سسٹم اور پیریفرل نروٹس سسٹم پر بحث کریں۔
- ❖ ڈایاگرامز کے ساتھ نیوران کی اقسام کی نشاندہی کریں۔
- ❖ سیٹیولس کی تعریف مثالوں کے ساتھ کریں۔
- ❖ بیان کریں کہ نروٹو مپلسز (nerve impulses) برقی سگنل ہیں جو نیوران میں سفر کرتے ہیں۔
- ❖ سائپس (synapse) کی تعریف کریں اور خاکہ بنائیں۔
- ❖ نیورو ٹرانسمیٹرز (neurotransmitters) کا تعارف کروائیں۔
- ❖ ڈایاگرام بنا کر وضاحت کریں کہ جب کوئی شخص غلطی سے کسی تکلیف دہ گرم چیز کو چھو جاتا ہے اور ریفلیکس (reflex) کے طور پر اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے تو اس عمل میں نروٹس سسٹم کیسے شامل ہوتا ہے۔
- ❖ اینڈو کرائن سسٹم کی وضاحت کریں۔
- ❖ اہم اینڈو کرائن گلینڈز اور ہارمونز کو ان کے افعال کے ساتھ شناخت کریں۔

پس منظر معلومات (Background Information)

ایک منظم عمل یعنی کوآرڈی نیٹڈ ایکشن (coordinated action) کے پانچ اجزاء ہوتے ہیں:



1- سٹیمولس (Stimulus)

اندرونی اور بیرونی ماحول میں کوئی بھی ایسا عنصر جو جسم میں ریپانس کا آغاز کر سکے، محرک یعنی سٹیمولس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا، روشنی، آواز، حرارت، سردی، دباؤ، انفیکشن سٹیمولائی ہیں۔

2- ریسپنڈرز (Receptors)

دو نیورانز کے درمیان اور ایک نیوران اور دوسرے سیل کے درمیان جوڑ کو سائی نیپس (synapse) کہتے ہیں۔

ایسا آرگن، ٹشویا سیل جو سٹیمولائی کو وصول کرتا ہے، ریسپنڈرز کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آواز کی لہروں (سٹیمولس) کے ریسپنڈرز کان ہیں۔ ریسپنڈرز سٹیمولس کے پیغامات کو آرڈی نیٹرز (coordinators) کی طرف بھیج دیتے ہیں۔

3- کوآرڈی نیٹر (Coordinator)

کوآرڈی نیٹر ریسپنڈرز سے پیغامات وصول کرتا ہے اور پھر مناسب عمل کے لیے مخصوص آرگنیز کو پیغامات بھیجتا ہے۔ نروس کوآرڈی نیٹیشن میں دماغ اور سپائنل کارڈ (spinal cord) کوآرڈی نیٹرز ہیں۔ کیمیکل کوآرڈی نیٹیشن میں اینڈو کرائن گلینڈز کوآرڈی نیٹرز ہوتے ہیں۔

4- ایفیکٹر (Effector)

یہ جسم کے وہ حصے ہیں جو کوآرڈی نیٹرز کے بھیجے ہوئے پیغامات کو وصول کرتے ہیں اور اپنی خصوصیت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نروس کوآرڈی نیٹیشن میں مسلز اور گلینڈز ایفیکٹرز ہیں۔ جبکہ کیمیکل کوآرڈی نیٹیشن میں جسم کے مختلف ٹشوز ایفیکٹرز کا کام کرتے ہیں۔

5- ریپانس (Response)

وہ عمل جو کوآرڈی نیٹرز سے پیغامات ملنے پر ایفیکٹرز سرانجام دیتے ہیں، رد عمل یعنی ریپانس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی بہت گرم چیز سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لینا ایک ریپانس ہے۔

کوآرڈی نیٹیشن سے مراد جسم کے مختلف حصوں کا مل کر کام کرنا اور سٹیمولائی (stimuli) پر رد عمل دکھانا ہے تاکہ ماحول کے ساتھ ہم آہنگی رہے۔ تمام لمبی سیلولر جانداروں میں کوآرڈی نیٹیشن موجود ہوتی ہے۔ جانوروں میں کوآرڈی نیٹیشن کے لیے دو سسٹم کام کرتے ہیں یعنی نروس (nervous) سسٹم اور اینڈو کرائن (endocrine) سسٹم۔

5.1 نیورانز۔ نروس سسٹم کی اکائیاں NEURONS- THE UNITS OF NERVOUS SYSTEM


نیورانز یا نروسیلز (nerve cells) ایسے سیلز ہیں جو جسم میں نروس امپلسز (impulses) کی شکل میں پیغامات پہنچاتے ہیں۔ نروس امپلس: الیکٹرو کیمیکل (electro-chemical) تبدیلیوں کی لہر (wave) ہے جو نیورانز کی ممبرین پر سے گزرتی ہے۔

نیوران کی ساخت (Structure of Neuron)

ایک نیوران کے تین بڑے حصے ہیں یعنی سیل باڈی (cell body)، ڈینڈرائٹس (dendrites) اور ایگزآن (axon)۔ نیوران کی سیل باڈی میں اس کا نیوکلیس، دوسرے آرگنیلز اور زیادہ تر سائٹوپلازم ہوتا ہے۔ سیل باڈی سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی شاخیں ڈینڈرائٹس کہلاتی ہیں۔ ڈینڈرائٹس نروڈامپلس کو سیل باڈی کی طرف منتقل کرتی ہیں۔ سیل باڈی سے نکلنے والی ایک لمبی شاخ ایگزآن ہے۔ اس کا کنارہ مزید شاخ دار ہوتا ہے۔ ایگزآن نروڈامپلس کو سیل باڈی سے دوسرے نیورانز، مسلز یا گلینڈز کو منتقل کرتا ہے۔

خاص سیلز نیوروگلیا (neuroglia) نیورانز کو سہارا دیتے ہیں۔ شوان سیل (Schwann cells) نیوروگلیا کی ایک قسم ہے۔ یہ سیلز کئی نیورانز کے ایگزآنز کے اوپر مائلن شیٹھ (myelin sheath) بناتے ہیں۔ جن ایگزآن پر مائلن شیٹھ لگی ہوتی ہے انھیں مائلن والے (myelinated) نیورانز کہتے ہیں۔ جن نیورانز پر مائلن شیٹھ نہیں لگی ہوتی، مائلن کے بغیر (non-myelinated) نیورانز کہلاتے ہیں۔ مائلن شیٹھ میں کچھ خالی جگہاں ہوتی ہیں۔ ان خالی جگہوں کو نوڈ آف رین ویر (nodes of Ranvier) کہتے ہیں۔ مائلن والے نیورانز میں نروڈامپلسز ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک 'جھپ (jump)' کرتی ہیں۔ اس سے نروڈامپلس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔



سنٹرل نروڈس سسٹم میں مائلن والے ایگزآنز سفید مواد یعنی وائٹ میٹر (white matter) بناتے ہیں۔ مائلن کے بغیر ایگزآنز، ڈینڈرائٹس اور سیل باڈیز سرمئی مواد یعنی گری میٹر (grey matter) بناتے ہیں۔



شکل 5.1: ایک ماڈل نیوران (موثر نیوران)

سائی نیپس اور نیوروٹرانسمیٹرز

(Synapse and Neurotransmitters)





ایک سائی نیپس دو نیورانز کے درمیان یا ایک نیوران اور ایک ایفیکٹر سیل کے درمیان ایک چھوٹا سا گپ (gap) ہے۔ جب نروڈامپلس ایک نیوران کے آخر تک پہنچتی ہے تو یہ براہ راست اگلے نیوران یا ایفیکٹر تک جھپ نہیں کر سکتی۔ نیوروٹرانسمیٹرز خاص کیمیکلز ہیں جو ایک سائی نیپس کے پار پیغامات لے جانے میں مدد کرتے ہیں۔

جب ایک نروڈ امپلس ایک نیوران کے آخر تک پہنچتی ہے تو یہ نیوروٹرانسمیٹر خارج کرتی ہے۔ وہ سائی نیپس کے پار سفر کرتے ہیں اور اگلے نیوران یا ایفیکٹر سیل سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ اس سے نروڈ امپلس کو اپنا سفر جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیوروٹرانسمیٹر کی مثالوں میں ڈوپامائن (dopamine) اور سیروٹونن (serotonin) شامل ہیں۔

جسم کے کچھ حصوں میں نیورانز کی سیل باڈیز مل کر گروپ بناتی ہیں جس پر ایک ممبرین کا غلاف ہوتا ہے۔ سیل باڈیز کے ان گروپس کو گینگلیا (ganglia) واحد گینگلیا (ganglion) کہتے ہیں۔

نیورانز کی اقسام (Types of Neurons)

- 1۔ سینسری نیورانز (sensory neurons) نروڈ امپلسز کو ریسیپٹرز سے سنٹرل نروڈ سسٹم کی طرف لے جاتے ہیں۔
- 2۔ انٹر نیورانز (inter-neurons) دماغ اور سپائنل کارڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سینسری نیورانز سے نروڈ امپلسز وصول کرتے ہیں اور انھیں موٹر نیورانز کو منتقل کرتے ہیں۔
- 3۔ موٹر نیورانز (motor neurons) نروڈ امپلسز کو انٹر نیورانز سے ایفیکٹرز (مسلز یا گلیٹنڈز) تک منتقل کرتے ہیں۔



شکل 5.2: نیوران کی اقسام

نروڈ (Nerve)


نروڈ سے مراد ایگزائنز (axons) کا ایک مجموعہ ہے جو کنیکٹو (connective) نشو کے غلاف میں لپٹا ہوتا ہے۔ نروڈ دماغ اور سپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں اور پیریفیرل نروڈ سسٹم (Peripheral Nervous System: PNS) بناتی ہیں۔ نروڈ کی تین اقسام ہیں جو ان میں موجود ایگزائنز کی بنیاد ہیں۔ سینسری نروڈز (sensory nerves) میں صرف سینسری نیورانز کے ایگزائنز ہوتے ہیں۔ موٹر نروڈز (motor nerves) میں صرف موٹر نیورانز کے ایگزائنز

شکل 5.3: نروڈ

ہوتے ہیں۔ مکسڈ نرووز (mixed nerves) میں سینسری اور موٹر نیورانز کے ایگزائز ہوتے ہیں۔

5.2 نرووس سسٹم کی ڈویژنز (DIVISIONS OF THE NERVOUS SYSTEM)

نرووس سسٹم دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے یعنی سنٹرل نرووس سسٹم (CNS: Central Nervous System) اور پیریفیرل نرووس سسٹم (PNS: Peripheral Nervous System)۔



سنٹرل نرووس سسٹم دماغ اور سپائنل کارڈ پر مشتمل ہے جبکہ پیریفیرل نرووس سسٹم میں وہ نرووز (nerves) شامل ہیں جو دماغ اور سپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں اور جسم کے تمام حصوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ نرووس سسٹم کے یہ تمام حصے نیورانز اور مددگار سیلز (نیوروگلیا: neuroglia) کے بنے ہوئے ہیں۔

1- سنٹرل نرووس سسٹم

(Central Nervous System)

شکل 5.4: سنٹرل اور پیریفیرل نرووس سسٹم

سنٹرل نرووس سسٹم میں دماغ اور سپائنل کارڈ شامل ہیں۔ بالغ انسان کے دماغ کا اوسط وزن 1.4 کلوگرام یا جسم کے وزن کا 2 فیصد ہے۔ چھوٹا سائز ہونے کے باوجود، دماغ میں 100 ارب (billion: بلین) نیورانز پائے جاتے ہیں۔

(الف) دماغ (Brain)

زندگی کے تمام افعال دماغ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ دماغ کھوپڑی کے ایک حصے کریئم (cranium) کے اندر ہوتا ہے۔ کریئم کے اندر دماغ ممبرین کی تین تہوں میں لپٹا ہوتا ہے جنہیں مجموعی طور پر مینن جیز (meninges) کہتے ہیں۔ مینن جیز کا کام نقصان دہ مادوں سے دماغ کی حفاظت کرنا ہے۔ دماغ کے اندر فلوئڈ سے بھری کیوویٹیز (cavities) ہوتی ہیں جنہیں وینٹریکلز (ventricles) کہتے ہیں۔ دماغ کے وینٹریکلز سپائنل کارڈ کے اندر موجود سنٹرل کینال (canal) سے منسلک ہوتے ہیں۔ وینٹریکلز اور سنٹرل کینال میں موجود فلوئڈ کو سیری برو سپائنل فلوئڈ (CSF: cerebrospinal fluid) کہتے ہیں۔ دماغ کے تین بڑے حصے ہوتے ہیں۔ یہ حصے دماغ کا اگلا حصہ یعنی فور برین (forebrain)، درمیانی حصہ یعنی مڈ برین (midbrain) اور پچھلا حصہ یعنی ہائینڈ برین (hindbrain) ہیں۔

1- فور برین (Forebrain)

یہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے مزید اہم حصے یہ ہیں۔


ایک طرف والا ہی سفیر جسم کی مخالف طرف سے پیغام وصول کرتا ہے اسی طرف پیغام بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پر، دائیں ہاتھ پر چھونے کے احساس کو بائیں ہی سفیر وصول کرتا ہے۔

(i) سیربرم (Cerebrum): یہ فور برین کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ لمبائی کے رخ ایک کٹاؤ سیربرم کو دائیں اور بائیں سیربرل ہی سفیرز


(cerebral hemisphere) میں تقسیم کرتا ہے۔ سیربرل بھی سفینر زکی بالائی سطح بہت تہہ دار ہے اور اسے سیربرل کارٹیکس (cerebral cortex) کہتے ہیں۔ یہ گرے میٹر (grey matter) کی بنی ہوئی ہے (سیل باڈیز اور مائلن کے بغیر ایگزائز پر مشتمل ہے)۔ کارٹیکس سے نیچے کا مواد وائٹ میٹر (white matter) ہے (مائلن والے ایگزائز پر مشتمل ہے)۔

ہر سیربرل بھی سفینر میں چار لوبز (lobes) ہوتے ہیں: فرنٹل لوب (frontal lobe) میں وہ حصے شامل ہیں جو مسائل حل کرنا، فیصلہ کرنا، بولنا اور حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ پیرائٹل لوب (parietal lobe) زبان (لینگویج) اور چھونے کے فعل کو کنٹرول کرتا ہے۔ ٹمپورل لوب (temporal lobe) میں وہ حصے شامل ہیں جو یادداشت، سیکھنے، احساسات اور سننے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آکسی پیٹل لوب (occipital lobe) میں دیکھنے اور رنگوں کی پہچان کرنے والے حصے شامل ہیں۔

سیربرم کا اوپر سے منظر
TOP VIEW OF CEREBRUM



سیربرم کا ایک جانب سے منظر
SIDE VIEW OF CEREBRUM



شکل 5.5: سیربرل بھی سفینر اور 4 لوبز


(ii) **تھیلیمس (Thalamus):** یہ سیربرم میں لپٹی ہوئی ایک ساخت ہے۔ یہ ریسپنڈر سے آنے والے پیغامات کو سیربرم تک پہنچاتا ہے۔ تھیلیمس درد کے احساس اور حس آگاہی (consciousness) کا بھی ذمہ دار ہے۔

(iii) **ہائپو تھیلیمس (Hypothalamus):** یہ حصہ مڈ برین سے اوپر اور تھیلیمس سے نیچے واقع ہے۔ انسان میں اس کا سائز تقریباً ایک بادام کے برابر ہے۔ یہ جسم کے ٹمپریچر، بھوک، پیاس، نیند اور جذباتی حالات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک اہم اینڈو کرائن گلینڈ یعنی پچوٹری (pituitary) گلینڈ کی رطوبتوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔

2۔ مڈ برین (Midbrain)

دماغ کا یہ حصہ ہائینڈ برین اور نور برین کے درمیان موجود ہے۔ اس لیے یہ ان دونوں حصوں کے درمیان ایک پل ہے اور دونوں کے درمیان پیغامات بھیجتا ہے۔ اس کی مدد سے جسم اپنی حرکات میں مطابقت (adjustment) پیدا کرتا ہے۔ یہ سونے جاگنے، ہوشیار رہنے اور ٹمپریچر کنٹرول کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔

میڈولا او بلانگیٹا، پانز اور مڈ برین دماغ کے ہقیہ حصوں اور سائٹل کارڈ کے درمیان رابطہ بناتے ہیں۔ انہیں مجموعی طور پر برین سٹیم (brain stem) بھی کہا جاتا ہے۔



شکل 5.6: دماغ کی ساخت

3۔ ہائینڈ برین (Hindbrain)


ہائینڈ برین جسم کے تمام آٹومیٹک (automatic) افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تین بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔

- (i) میڈولا او بلانگیا (Medulla oblongata): یہ حصہ سپائنل کارڈ کے اوپر ہے۔ یہ سپائنل کارڈ اور دماغ کے بڑے حصوں کے درمیان پیغامات منتقل کرتا ہے۔ یہ آٹومیٹک افعال مثلاً دل کا دھڑکنا، دھڑکن کی رفتار، تنفس اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بہت سے ریفلیکس (reflex) مثلاً قے، کھانسی، چھینک وغیرہ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔
- (ii) سیریلیم (Cerebellum): یہ میڈولا او بلانگیا کے پیچھے موجود ہے۔ یہ دماغ کا دوسرا بڑا حصہ ہے۔ اس کی سطح بھی بہت تہہ دار ہے۔ یہ توازن اور مسلسل حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔
- (iii) پانز (Pons): یہ میڈولا کے اوپر موجود ہے۔ یہ سپائنل کارڈ اور سیریلیم کے درمیان اور سیربرم اور سیریلیم کے درمیان رابطہ کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ ہوشیار رہنے، نیند اور جاگنے کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔

(ب) سپائنل کارڈ (Spinal Cord)

یہ نروں کا ایک نالی نما بندل ہے۔ سپائنل کارڈ دماغ سے شروع ہو کر کمر کے نچلے حصے تک جاتی ہے۔ یہ ورٹیبرل کالم (vertebral column) کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بھی میننجز (meninges) کا غلاف ہوتا ہے۔ سپائنل کارڈ جسم کے حصوں اور دماغ کے درمیان پیغامات منتقل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چند سادہ ریفلیکس کے لیے کوآرڈینیٹر (coordinator) کا کام بھی کرتی ہے۔ سپائنل کارڈ کا بیرونی حصہ وائٹ میٹر (white matter) کا بنا ہوتا ہے۔ اس کا مرکزی حصہ گری میٹر (grey matter) کا بنا ہوتا ہے۔ یہ تیلی کی شکل کا ہے اور ایک سینٹرل کینال کے گرد موجود ہے۔ سپائنل کارڈ سے سپائنل نروں کے 31 جوڑے نکلتے ہیں۔ تمام سپائنل نروں میں مکسڈ (mixed) نروں ہیں کیونکہ ہر ایک میں سینسری اور موٹر نیوراز کے ایگزائز ہوتے ہیں۔ سپائنل نروں کے ڈارسل روت (dorsal root)

میں سینٹری نیوران کے ایگزائز ہیں اور ساتھ میں ایک گینگلیا (ganglion) بھی ہے۔ وینٹریل رُوت (ventral root) میں موٹر نیوران کے ایگزائز ہوتے ہیں۔



شکل 5.7: سپائنل کارڈ اور سپائنل نرو

2- پیریفیرل نرو سسٹم (Peripheral Nervous System)


یہ سسٹم نرو اور گینگلیا (ganglia) پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسان میں کریٹینیئل نرو (cranial nerves) کے 12 جوڑے اور سپائنل نرو (spinal nerves) کے 31 جوڑے ہیں۔ کریٹینیئل نرو میں سے چند سینٹری (sensory) ہیں، چند موٹر (motor) اور چند مکسڈ (mixed) نرو ہیں۔ دوسری طرف، تمام سپائنل نرو مکسڈ نرو ہیں۔ کریٹینیئل اور سپائنل نرو دور سے (pathways) بناتی ہیں:

(i) سینٹری رستہ (sensory pathway) جو ریسپنڈرز سے سنٹرل نرو سسٹم تک امپلسز پہنچاتا ہے؛ اور (ii) موٹر رستہ (motor pathway) جو سنٹرل نرو سسٹم سے ایفیکٹرز تک امپلسز پہنچاتا ہے۔ موٹر رستہ دو سسٹمز بناتا ہے۔

i. **سومیک نرو سسٹم (somatic nervous system):** یہ شعوری (conscious) اور ارادی (voluntary) ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں وہ تمام موٹر نیورائز شامل ہیں جو سکیلیٹل مسلز (skeletal muscles) کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔

ii. **آٹونومک نرو سسٹم (autonomic nervous system):** اس میں ایسے موٹر نیورائز شامل ہیں جو کارڈیک (cardiac) مسلز، سموٹھ (smooth) مسلز اور گلینڈز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ شعور کے کنٹرول کے بغیر کام کرتا ہے۔ آٹونومک نرو سسٹم دو سسٹمز

یعنی سمپتھٹک سسٹم (sympathetic system) اور پیراسمپتھٹک سسٹم (parasympathetic system) پر مشتمل ہے۔ سمپتھٹک نرو سسٹم جسم کو ایمرجنسی صورت حال کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس ریسپانس کو ”فائٹ یا فلائٹ (fight or flight)“ کہتے ہیں۔ ایمرجنسی صورت حال میں یہ سسٹم پیوپل (pupil) کو کھولا دیتا ہے، دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار بڑھا دیتا ہے اور ڈائجیشن کے عمل کو روک دیتا ہے۔ جب تناؤ (stress) ختم ہو جائے تو پیراسمپتھٹک سسٹم کام کرتا ہے اور جسم کے تمام افعال کو نارمل کر دیتا ہے۔ اس ریسپانس کو ”ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ (rest and digest)“ کہتے ہیں۔ یہ پیوپل کو واپس سکیر دیتا ہے، ڈائجیشن تیز کر دیتا ہے اور دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار کو نارمل کر دیتا ہے۔



ریفلیکس ایکشن (Reflex Action)

تیز، غیر ارادی ریپانسز کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ ریفلیکس ایکشن کرنے میں دماغ شامل نہیں ہوتا۔ ریفلیکس ایکشن کو ریفلیکس آرک (reflex arc) کنٹرول کرتا ہے۔ ریفلیکس آرک نیورائز کا وہ رستہ ہے جس پر سے ریفلیکس ایکشن کے دوران نرووا مپلسز گزرتی ہیں۔


مثال:

ہم اپنا ہاتھ کسی گرم شعلہ سے دور کھینچتے ہیں، اس کے متعلق سوچے بغیر ہی۔ یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے اور مندرجہ ذیل طریقہ سے وقوع

پزیر ہوتا ہے۔

- 1- جلد کے ریسیپٹرز حرارت کے سٹیمولس کو محسوس کرتے ہیں۔
- 2- سینسری نیوران سپائنل کارڈ کے انٹرنیوران کو نرووا مپلس پہنچاتا ہے۔
- 3- انٹرنیوران نرووا مپلس کو موٹر نیوران تک پہنچاتا ہے۔
- 4- موٹر نیوران نرووا مپلس کو ایفیکٹر (بازو کے مسلز) تک پہنچاتا ہے۔
- 5- ایفیکٹر ریپانس پیدا کرتا ہے اور سکڑ جاتا ہے۔ اس طرح ہاتھ واپس کھینچ جاتا ہے۔

جب ریسیپٹر کو تحریک ملتی ہے تو وہ دماغ کو معلومات پہنچاتا ہے۔ دماغ کے اعلیٰ مراکز (سیربرم کے حصے) ان معلومات کا تجزیہ کرتے ہیں اور مناسب اعمال کے لیے پیغامات بھیج دیتے ہیں۔ ایسے اعمال ہمارے شعوری کنٹرول میں ہوتے ہیں اور ارادی (voluntary) اعمال کہلاتے ہیں۔ دماغ کے کچھ حصے اعمال کو شعوری کنٹرول کے بغیر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسے اعمال کو غیر ارادی (involuntary) اعمال کہتے ہیں۔



شکل 5.9: ایک ریفلکس ایکشن میں ریفلکس آرک

5.3 اینڈوکرائن سسٹم (ENDOCRINE SYSTEM)

جانوروں میں کوآرڈی نیشن کا ذمہ دار یہ دوسرا سسٹم ہے۔ اینڈوکرائن سسٹم مخصوص اینڈوکرائن گلینڈز پر مشتمل ہوتا ہے جو ہارمون (hormone) بناتے اور خارج (secrete) کرتے ہیں۔ ہارمون، اینڈوکرائن گلینڈز سے خارج ہونے والے ایسے کیمیکلز ہیں جو جسم کے مختلف افعال کنٹرول کرتے ہیں مثلاً نشوونما، ریپروڈکشن، خون میں گلوکوز کی سطح برقرار رکھنا وغیرہ۔ اینڈوکرائن گلینڈز کے پاس اپنے ہارمون کسی جگہ پہنچانے کرنے کے لیے نالیاں نہیں ہوتیں۔ اس لیے انہیں ڈکٹ لیس (ductless) گلینڈز کہتے ہیں۔ یہ گلینڈز اپنے ہارمون براہ راست خون میں داخل کرتے ہیں جو انھیں جسم کے مختلف حصوں تک لے جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل اہم اینڈوکرائن گلینڈز اور ان کے اہم ہارمون ہیں۔

سلائیوری گلینڈز سے سلائیوا (saliva) نکلنا ایک غیر ارادی فعل ہے۔ جب ہم منہ میں خوراک چبانا شروع کرتے ہیں تو دماغ سلائیوری گلینڈز کو سلائیوا نکالنے کا پیغام بھیج دیتا ہے۔ ایسا اُس وقت بھی ہو سکتا ہے جب ہم خوراک کو سوکھتے، دیکھتے یا حتیٰ کہ کھانے کا سوچتے بھی ہیں۔

1۔ پچوٹری گلینڈ (Pituitary Gland)

یہ ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جو دماغ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈنڈی (stalk) کی مدد سے ہائپوتھیمس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پچوٹری گلینڈ کے دو بڑے حصے (لوب: lobe) ہیں یعنی انٹیریر لوب (anterior lobe) اور پوسٹیریر لوب (posterior lobe)۔

(الف) پچوٹری کے انٹیریر لوب کے ہارمون (Hormones of Anterior Lobe of Pituitary)

1۔ **گروتھ ہارمون (Growth Hormone):** یہ ہارمون مسلز، ہڈیوں اور دوسرے نشوونما کا آغاز کرتا ہے۔ اگر گروتھ ہارمون نارمل سے زیادہ بنے، تو جسم میں نارمل سے زیادہ نشوونما ہو جاتی ہے۔ اسے جائیگنٹ ازم (gigantism) کہتے ہیں۔ دوسری طرف،



یہ تصویر نصیر سومرو (پاکستان میں لمبا ترین آدمی) کے ایک ایوارڈ وصول کرتے ہوئے کی ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تو نارمل جسامت کا تھا۔ لیکن 10 سال کی عمر میں اس کے پچوٹری گلینڈز میں مسئلہ ہو گیا۔ اس کا پچوٹری گلینڈز ضرورت سے زیادہ گروتھ ہارمون بنائے۔

اگر گروتھ ہارمون نارمل سے کم بنے تو جسم میں نشوونما کم ہوتی ہے۔ اس حالت کو بونا پن یعنی ڈوارف ازم (dwarfism) کہتے ہیں۔

2۔ ایڈرینو-کارتیکو-ٹراپک ہارمون (Adreno Cortico-Tropic Hormone):

یہ ہارمون ایڈرینل کارٹیکس گلینڈز کو اپنے ہارمون بنانے کی تحریک دیتا ہے۔

3۔ تھائی رائیڈ-سٹیمولینگ ہارمون (Thyroid-Stimulating Hormone):


تھائی رائیڈ گلینڈز کو اپنے ہارمون (تھائی رائکسن thyroxine) بنانے کی تحریک دیتا ہے۔

4۔ لیوٹائی نائزنگ ہارمون (Luteinizing Hormone):

یہ ہارمون مادہ (females) میں اووری سے انڈہ (egg cell) نکالنے یعنی اوولیشن (ovulation) عمل کا ذمہ دار ہے۔ نر (males) میں یہ ٹیسٹیز (testes) کو ٹیسٹ ہارمون بنانے کی تحریک دیتا ہے۔ انٹیریر لوب ایک اور ہارمون یعنی فولیکل سٹیمولینگ ہارمون (follicle stimulating hormone) بھی بناتا ہے جو نر اور مادہ میں ریپرڈکٹو سسٹم کے فعل میں کردار ادا کرتا ہے۔

(ب) پچوٹری کے پوسٹیریر لوب کے ہارمون (Hormones of Posterior Lobe of Pituitary)

ہائپوتھیلیمس دو ہارمون بناتا ہے جو پچوٹری کے پوسٹیریر لوب میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔



شکل 5.10: انسانی جسم میں اہم اینڈوکرائن گلینڈز

- 1- اینٹی ڈائیورٹک ہارمون (Anti-Diuretic Hormone): اسے ویسوپریسن (vasopressin) بھی کہتے ہیں۔ یہ ہارمون گردوں میں نیفرن سے پانی کے وابسی انجذاب (ری-ایبز ارپشن) کو تیز کرتا ہے۔
- 2- آکسیٹوسن (Oxytocin): یہ ہارمون بچے کی پیدائش کے دوران بچہ دانی یعنی یوٹرس (uterus) میں سکڑاؤ کی تحریک دیتا ہے۔ یہ ماں کی چھاتی سے دودھ کے نکلنے کی بھی تحریک دیتا ہے۔

2- تھائی رائیڈ گلینڈز (Thyroid Gland)

- یہ گلینڈ گردن میں لیرکس (larynx) کے نیچے موجود ہے۔ یہ دو ہارمون خارج کرتا ہے۔
- 1- تھائی رائکسن (thyroxine): یہ ہارمون ایسے ایذا نگر کو تحریک دیتا ہے جو توانائی کے لیے سیلولر مینابولزم (گلوکوز کی آکسیدیشن) کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ہارمون مینابولزم کی بنیادی رفتار تیز کرتا ہے جس سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔

اگر تھائی رائکسن ضرورت سے کم بنے تو سیلولر مینابولزم کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اس کی نتیجہ میں تھکاوٹ ہوتی ہے، وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور ہارٹ بیٹ اور جسم کا ٹمپرچر کم ہو جاتا ہے۔

اگر تھائی رائکسن ضرورت سے زیادہ بنے تو سیلولر مینابولزم کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس کی نتیجہ میں وزن میں کمی ہوتی ہے، اور بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ اور جسم کا ٹمپرچر بڑھ جاتے ہیں۔

تھائی رائکسن کی تیاری کے لیے آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی غذا میں آئیوڈین کی کمی ہو تو تھائی رائیڈ گلینڈ ہارمون نہیں بناتا۔ اس حالت میں تھائی رائیڈ گلینڈ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو گوائٹر (goitre) کہتے ہیں۔ پاکستان میں اب گوائٹر بہت کم ہوتا ہے کیونکہ پیچھے جانے والے خوردنی نمک میں آئیوڈین ملا یا جاتا ہے۔

- 2- کیلسی ٹونن (Calcitonin): یہ ہارمون کیلشیم آئزنز کا خون سے ہڈیوں میں انجذاب تیز کر دیتا ہے، جہاں کیلشیم آئن ہڈیوں کا نشوونما میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ ہارمون خون میں کیلشیم کی مقدار کو کم کرتا ہے۔

3- پیرا تھائی رائیڈ گلینڈز (Parathyroid Glands)


اگر پیرا تھورمون زیادہ ہو تو نارمل سے ہڈیوں سے زیادہ کیلشیم خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پیرا تھورمون کی کمی سے تو خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس سے ٹینٹنی (tetany) ہو جاتا ہے (جس کی علامات مسلز کا پھڑکننا یعنی twitching، اکڑاؤ یعنی cramps، اور جھٹکے یعنی convulsions ہیں)۔

جسم میں چار پیرا تھائی رائیڈ گلینڈز ہوتے ہیں جو تھائی رائیڈ گلینڈ کے پیچھے گڑے ہوتے ہیں۔ ان گلینڈز سے ایک ہارمون پیرا تھورمون (parathormone) نکلتا ہے۔ یہ ہارمون کیلشیم آئزنز کی ہڈیوں سے خون میں منتقلی کی تحریک دیتا ہے۔ اس طرح یہ ہارمون کیلسی ٹونن ہارمون کے الٹ کام کرتا ہے۔

4- ایڈرینل گلینڈز (Adrenal Glands)

ہر گردے کے اوپر ایک ایڈرینل گلینڈ موجود ہے۔ ہر ایڈرینل گلینڈ کا اندروالا حصہ میڈولا اور باہروالا حصہ کورٹیکس ہے۔ ایڈرینل میڈولا (adrenal medulla) دو ہارمون بناتا ہے۔ ایک کو ایپی نیفرین (epinephrine) یا ایڈرینالین (adrenaline) کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو نار-ایپی نیفرین (nor-epinephrine) یا نار-ایڈرینالین (nor-adrenaline) کہتے ہیں۔ یہ ہارمون سمیٹھیک نروس

سسٹم کے ایمرجنسی ریسپانس میں حصہ لیتے ہیں۔ جب کوئی شخص ایمرجنسی میں ہوتا ہے تو میڈولا اپنے ہارمونز نکالتا ہے تاکہ جسم ”فائٹ اینڈ فلائٹ (fight or flight)“ ریسپانس کے لیے تیار ہو۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، خون میں گلوکوز کا لیول اور دل اور پھیپھڑوں کو خون کا بہاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بروئیکولز (bronchioles) کو بھی کھول دیتے ہیں اور پیوپل پھیلاتے ہیں۔ ایڈرینل کارٹیکس (adrenal cortex) سے کارٹی سول (cortisol) اور ایلنڈوسٹیرون (aldosterone) ہارمون نکلتے ہیں۔ کارٹی سول ہارمون پروٹین سے گلوکوز بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ایلنڈوسٹیرون ہارمون گردوں میں پانی کو روک کر بلڈ پریشر اور خون کے حجم میں اضافہ کرتا ہے۔



شکل 5.12: ایڈرینل گلینڈ کے حصے

5۔ پینکریاز (Pancreas)

پینکریاز کے دو کام ہیں۔ یہ ڈائجیسٹو سسٹم کا بھی حصہ ہے، جہاں یہ ایک نالی (ڈکٹ) والے یعنی ایکسوکرائن (exocrine) گلینڈ کا کام کرتا ہے اور ڈائجیسٹو اینزائمز خارج کرتا ہے۔ لیکن پینکریاز کے اندر خاص سیلز بھی ہوتے ہیں جنہیں آئی لینٹس آف لینگرہینز (islets of Langerhans) کہتے ہیں۔ انہیں 1869 میں ایک جرمن طالب علم پال لینگرہینز (Paul Langerhans) نے دریافت کیا تھا۔ یہ سیلز اینڈوکرائن گلینڈ کا کام کرتے ہیں اور دو ہارمون بناتے ہیں یعنی انسولین (insulin) اور گلوکاگون (glucagon)۔ یہ ہارمون خون میں گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انسولین ہارمون خون میں گلوکوز کا لیول کم کرتا ہے۔ یہ جسم کے سیلز کو گلوکوز ذخیرہ کرنے یا توانائی کے لیے استعمال کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس کے برعکس، گلوکاگون خون میں گلوکوز کا لیول بڑھاتا ہے۔ یہ جگر کو گلوکوز خون میں ڈالنے کی تحریک دیتا ہے۔

انسولین کی کمی سے بیماری ذیابیطس یعنی ڈایابیطس میلنائٹس (diabetes mellitus) میں سیلز گلوکوز حاصل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کا ارتکاز بڑھ جاتا ہے۔ ٹائپ 1 ڈایابیطس میلنائٹس (diabetes mellitus Type-1) میں پینکریاز ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا۔ ایسے مریضوں کا علاج روزانہ انسولین کے انجیکشن دے کر کیا جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈایابیطس میلنائٹس (diabetes mellitus Type-2) میں انسولین تو بنتی ہے لیکن ٹارگٹ سیلز (target cells) اس انسولین پر رد عمل نہیں دیتے گلوکوز نہیں لے سکتے۔ اس ڈایابیطس کو ورزش اور مناسب غذا سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

ڈایابیطس میں، مقررہ مقدار سے زیادہ گلوکوز گردوں میں پانی کے واپسی انجذاب کو روکتا ہے۔ اس سے پیشاب زیادہ بنتا ہے۔ نتیجہ میں جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ زیادہ گلوکوز سے جسم میں پانی اور نمکیات کے ارتکاز کا توازن بھی بگڑ سکتا ہے۔ مریض کو وزن کی کمی، مسلسل کی کمزوری اور تھکاوٹ کی شکایات بھی ہوتی ہیں۔

بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن ٹیسٹ

(Blood Glucose Concentration: BGC Test)

اس ٹیسٹ میں خون میں گلوکوز کی مقدار ماپی جاتی ہے۔ اسے ڈایابیطس کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خون میں گلوکوز کو فاسٹنگ (fasting) یعنی بغیر کچھ کھائے ہوئے (8 سے 10 گھنٹے کھانا کھائے بغیر) ماپا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریئنڈم (randomly) یعنی کسی بھی وقت اور کھانا کھانے کے بعد بھی ماپا جاتا ہے۔ BGC ٹیسٹ کے کچھ نتائج یہاں دیے گئے ہیں۔

بلڈ گلوکوز 10-8 گھنٹے کچھ کھائے بغیر	
تشخیص	بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن (BCG)
نارمل	70 سے 99 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر
ڈایابیطیز سے پہلے	100 سے 125 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر
ڈایابیطیز	126 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر یا اس سے زیادہ

بلڈ گلوکوز 75 گرام گلوکوز ڈرنک پینے کے 2 گھنٹے بعد	
تشخیص	بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن (BCG)
نارمل	140 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر سے کم
ڈایابیطیز سے پہلے	140 سے 200 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر
ڈایابیطیز	200 ملی گرام فی 100 ملی لیٹر سے زیادہ

نیمیل 1.5: اہم اینڈوکرائن گلیٹنڈز اور اُن کے افعال

گلیٹنڈ	ہارمون	افعال
پچوٹری کا انٹیریر لوب	گروتھ ہارمون	مسلز اور ہڈیوں کی نشوونما کو کنٹرول کرتا ہے۔
	ایڈرینوکارٹیکوٹراپک ہارمون	ایڈرینل کارٹیکس سے کارٹی سول اور ایملڈوسٹیرون کا اخراج کرواتا ہے۔
	تھائی رائیڈسٹیمو لیننگ ہارمون	تھائی رائیڈ گلیٹنڈ کو اس کا ہارمون پیدا کرنے کے لیے تحریک دیتا ہے۔
	لیوٹائی نائزنگ ہارمون	اووری کو انڈا (ایگ) نکالنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ٹیسٹیز کو سیکس ہارمونز پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
پچوٹری کا پوسٹیریر لوب	اینٹی ڈائیورٹک ہارمون	نیفروز سے پانی کے دوبارہ انجذاب (ری ایبز آپشن) کو بڑھاتا ہے۔
	آکسی ٹوسن	بچے کی پیدائش کے دوران یوٹرس میں سکڑاؤ شروع کرتا ہے۔ چھاتیوں (بریسٹس) کو دودھ کے بہاؤ کے لیے تحریک دیتا ہے۔
تھائی رائیڈ	تھائی رائکسن	سیلولر میٹابولزم کے اینزائمز کو تحریک دیتا ہے۔
	کیلسی ٹونن	خون میں کیلشیم کنسنٹریشن کو کم کرتا ہے۔
پیراتھائی رائیڈ	پیراتھورمون	خون میں کیلشیم کنسنٹریشن کو بڑھاتا ہے۔
ایڈرینل میڈولا	اپی نیفرین، نوراپی نیفرین	خطرے پر جسم کے تناؤ اور "لڑو یا بھاگو" کے رد عمل کو شروع کرتے ہیں۔
ایڈرینل کارٹیکس	کورٹی سول	پروٹینز سے گلوکوز کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے۔
	الڈوسٹیرون	گردوں میں نمکیات اور پانی کے روکنے کو فروغ دیتا ہے۔

پینگریاز	انسولین	سیلز کو گلوکوز ذخیرہ کرنے یا اسے استعمال کرنے کی ترغیب دے کر خون میں گلوکوز لیول کم کرتا ہے۔
گلوکاگون		گلوکوز کو جگر سے خون میں جاری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
اووریز	ایسٹروجن اور پروجیسٹرون	اووری سے انڈا نکلنے کا سبب بنتے ہیں اور زنانہ ثانوی جنسی خصوصیات کو کنٹرول کرتے ہیں۔
ٹیسٹیز	اینڈروجنز (ٹیسٹوسٹیرون)	مردانہ ثانوی جنسی خصوصیات کو کنٹرول کرتے ہیں۔

6۔ گونیڈز (Gonads)

گونیڈز مادہ میں اووریز (ovaries) اور نر میں ٹیسٹیز (testes) [گیمیٹ بنانے والے آرگنز ہیں۔ وہ جنسی ہارمون یعنی سیکس ہارمون (sex hormones) بھی بناتے ہیں۔

مادہ میں اووریز سے نکلنے والے ہارمون ایسٹروجن (estrogen) اور پروجیسٹرون (progesterone) ہیں۔ یہ ہارمون اووری سے انڈہ نکالتے ہیں اور مادہ کی سیکنڈری جنسی خصوصیات (مثلاً چھاتی کا بڑھنا وغیرہ) کنٹرول کرتے ہیں۔

نر میں ٹیسٹیز سیکس ہارمونز کا ایک گروپ یعنی اینڈروجنز (androgens) بناتے ہیں۔ مثلاً ٹیسٹوسٹیرون (testosterone) ایک اینڈروجن ہے۔ یہ ہارمون نر کی سیکنڈری جنسی خصوصیات (مثلاً چہرے پر بالوں کا اگنا، آواز میں بھاری پن وغیرہ) کنٹرول کرتا ہے۔

مشق

A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

- 1۔ شوان سیلز نیورائز کے سپورٹنگ سیلز ہیں۔ وہ بناتے ہیں:
 - (الف) سیل باڈی
 - (ب) ایگزان
 - (ج) مائیلن شیٹھ
 - (د) ڈینڈرائٹس
- 2۔ سائیکل چلاتے ہوئے کون سا حصہ توازن برقرار رکھتا ہے؟
 - (الف) سیربرم
 - (ب) میڈولا
 - (ج) سیری بلم
 - (د) سپائنل کارڈ
- 3۔ دماغ کا کون سا حصہ ٹیمپل، جھوک، پیاس، اور نیند کا ذمہ دار ہے؟
 - (الف) ہائپو تھیمس
 - (ب) تھیمس
 - (ج) پانز
 - (د) سیری بلم
- 4۔ اگر ایک مریض باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتا تو کون سا حصہ متاثر ہو سکتا ہے؟
 - (الف) سیری برم
 - (ب) سیری بلم
 - (ج) میڈولا
 - (د) سپائنل کارڈ

5۔ خطرے کے دوران کون سا سسٹم فوراً متحرک ہو جاتا ہے؟

(الف) پیرا سمپٹھیک (ب) سکلیپل (ج) اینڈو کرائن (د) سمپٹھیک

6۔ ریفلکس ایکشن نارل عمل سے تیز کیوں ہوتے ہیں؟

(الف) دماغ اُن پر فوری عمل کرتا ہے (ب) ایسے کاموں میں دماغ شامل نہیں ہوتا

(ج) پیغامات آہستہ رفتار سے منتقل ہوتے ہیں (د) ایسے کاموں میں سوچنا شامل ہوتا ہے

7۔ ان میں سے کون ایک سوکرائن اور اینڈو کرائن گلینڈ کے طور پر کام کرتا ہے؟

(الف) پچوٹری (ب) تھائی رائیڈ (ج) ایڈریئل (د) پیٹکریاز

8۔ اینڈو کرائن سسٹم کے پیغام لے جانے والے کیمیکل میسنجر (messengers) کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) نیوروٹرانسمیٹر (ب) ہارمونز (ج) نیورانز (د) اینزائمز

9۔ اگر پیرا تھائی رائیڈ گلینڈ کے ہارمون نہ ہوں تو کیا ہو سکتا ہے؟

(الف) کیلشیم کی کم مقدار (ب) خون میں زیادہ شوگرز

(ج) مسلز کی کمزوری (د) کم ڈائی جیشن

10۔ کون سا اینڈو کرائن گلینڈ جسم کو ”لڑنے یا بھاگ جانے“ کے لیے تیار کرتا ہے؟

(الف) تھائی رائیڈ (ب) پچوٹری

(ج) ایڈریئل (د) پیٹکریاز

B مختصر جوابات لکھیں۔


1۔ سٹیپولس کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں۔

2۔ سینری، موٹر اور انٹرنیوران کے درمیان فرق لکھیں۔

3۔ ریفلکس ایکشن اور ریفلکس آرک کی تعریف لکھیں۔

4۔ مندرجہ ذیل میں فرق لکھیں۔

(الف) ڈینڈرائٹ اور ایگزان (ب) سیری برم اور سیری بلم (ج) تھیلے مس اور ہاپو تھیلے مس




5۔ اس ڈایا گرام کی شناخت

کریں اور مختلف حصوں کو

لیبل کریں۔

6۔ اس ڈایا گرام کی شناخت کریں اور اس میں وائٹ میٹر، گرے میٹر، نیوران کی تین اقسام اور گلینگلیا کی نشاندہی کریں۔



C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1۔ نیوران کی ساخت بیان کریں اور ایک لیبل شدہ ڈایا گرام سے اپنے جواب کو مکمل کریں۔
- 2۔ نیوران کی تین اقسام میں کیا فرق اور مشابہتیں ہیں؟
- 3۔ فوربرین، مدبرین اور ہائینڈبرین کے اہم کام لکھیں۔
- 4۔ ریفلیکس ایکشن سے کیا مراد ہے؟ ریفلیکس ایکشن کی ایک مثال بیان کریں اور اس مثال میں ریفلیکس آرک کی نشاندہی کریں۔
- 5۔ پچوڑی گلینڈ کے ہارمونز بتائیں اور ان کے افعال لکھیں۔
- 6۔ ایڈرینل گلینڈز، پینکریاز، اووریز اور ٹیسٹیز پر نوٹ لکھیں۔

D انکشافی سوالات

- 1۔ ریفلیکس ایکشن کے لیے سائل کارڈا اہم کیوں ہے؟
- 2۔ ایڈرینالین کو ”ایمرجنسی ہارمون“ کیوں کہتے ہیں؟
- 3۔ اگر پینکریاز سے زیادہ انسولین نکلے تو خون میں گلوکوز (شوگر) کے ساتھ کیا ہوگا؟
- 4۔ اگر کسی مریض کا میڈولازیمی ہو تو کون سا فعل خطرے میں ہو سکتا ہے؟



6

ریپروڈکٹو سسٹم (REPRODUCTIVE SYSTEM)



حاصلاتِ تعلیم

اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- ✱ ہارمونز کا اثر اور مادہ سیکشونل ڈویلپمنٹ (sexual development) میں کردار بیان کریں۔
- ✱ گیمیٹوجینیسیس (gametogenesis) اور فرٹیلائزیشن کے عمل کو بیان کریں۔
- ✱ نرری پروڈکٹو سسٹم کے حصوں کی بمعہ ڈایاگرام شناخت کریں اور ان کے افعال بیان کریں۔
- ✱ مادہ ری پروڈکٹو سسٹم کے حصوں کی بمعہ ڈایاگرام شناخت کریں اور ان کے فنکشنز بیان کریں۔
- ✱ ایڈز (AIDS) کی کو سیکشونل ٹرانسمیڈ ڈیز (STD) کی ایک مثال کے طور پر وضاحت کریں۔

تمام جانداروں میں اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سیکسول ریپروڈکشن (sexual reproduction) میں نر اور مادہ گیمیٹس کا ملاپ (fusion) ہوتا ہے۔

6.1 گیمیٹس کا بننا اور فرٹیلائزیشن (FORMATION OF GAMETES AND FERTILIZATION)

جانوروں میں خاص آرگن گونیڈز (gonads) ہوتے ہیں جہاں خاص سیلز بنتے ہیں جنہیں گیمیٹس (gametes) کہتے ہیں۔ نر جانوروں میں گونیڈز کو ٹیسٹیز (testes) کہتے ہیں (واحد: ٹیسٹس testis): ٹیسٹیز میں نر گیمیٹ یعنی سپرم (sperms) بنتے ہیں۔ مادہ جانوروں میں گونیڈز کو اووریز (ovaries) کہتے ہیں جہاں مادہ گیمیٹ یعنی ایک سیل یا اووا (egg cells or ova) بنتے ہیں۔


گیمیش کا بننا (Formation of Gametes)

گیمیش کے بننے کے عمل کو گیمیو جینیسیس (gametogenesis) کہتے ہیں۔ یہ عمل سیل ڈویژن می او سیس (meiosis) کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ می او سیس کے ہر گیمیٹ میں کروموسومز (chromosomes) کی تعداد، جسم کے دوسرے سیلز میں ڈپلائڈ (2n) تعداد کے مقابلے میں کم ہو کر ہپلائڈ (1n) رہ جاتی ہے۔


(الف) نر گیمیش کا بننا (Formation of Male Gametes)

نر گیمیش یعنی سperm بننے کے عمل کو سپرمیو جینیسیس (spermatogenesis) کہتے ہیں۔ یہ عمل نر گونیڈز میں یعنی ٹیسٹیز (testes) کی سیسی نیفرس ٹیوبولز (seminiferous tubules) میں ہوتا ہے۔ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون (follicle stimulating hormone) اور نرکسیس ہارمون ٹیسٹوسٹیرون (testosterone) سperm بننے کا آغاز کرواتے ہیں۔ FSH پچوٹری کے انٹیریلوب میں جبکہ ٹیسٹوسٹیرون ٹیسٹیز میں بنتا ہے۔

سیسی نیفرس ٹیوبولز میں ڈپلائڈ گیمیٹ مدریسلز (gamete mother cells) موجود ہیں۔ انھیں پرائمری سپرمیٹوسائٹس (secondary spermatocytes) کہتے ہیں۔ ہر پرائمری سپرمیٹوسائٹ می او سیس I سے تقسیم ہوتا ہے اور دو سیکنڈری سپرمیٹوسائٹس (primary spermatocytes) بناتا ہے۔ اس کے بعد ہر سیکنڈری سپرمیٹوسائٹ می او سیس II سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح، چار ہپلائڈ سپرمائیڈز (spermatids) بنتے ہیں۔ یہ نابالغ سperm ہوتے ہیں۔ ان سpermائیڈز میں تبدیلیاں آتی ہیں اور نابالغ ہو کر متحرک سperm بن جاتے ہیں۔



شکل 6.1: ایک ٹیسٹس (testis)




شکل 6.2: سپرمیو جینیسیس (spermatogenesis)

(ب) مادہ گیمیش کا بننا (Formation of Female Gametes)


مادہ گیمیش یعنی ایک سیل یا اووم (ovum) کا بننا اوو جینیسیس (oogenesis) کہلاتا ہے۔ یہ عمل مادہ گونیڈ یعنی اووری (ovary) کے

اندر فلونڈ سے بھرے ایک چھوٹی جھلی (sac) میں ہوتا ہے جسے فولیکل (follicle) کہتے ہیں۔ پچھری گینڈ کے انٹیریلوب سے نکلنے والا فولیکل سٹیمولینگ ہارمون (follicle stimulating hormone) میں اووم (ایک سیل) بننے کے عمل کا آغاز کرواتا ہے۔



شکل 6.3: ایک اووری (ovary)

فولیکل میں ایک ڈپلائڈ گیمیٹ مدر سیل موجود ہے جسے پرائمری اووسائٹس (oocytes) کہتے ہیں۔ یہی اووس کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے۔ می اووس-I کے نتیجے میں دو ہپلائڈ سیلز بنتے ہیں۔ ان میں سے بڑے سیل کو سینڈری اووسائٹ جبکہ چھوٹے سیل کو فرسٹ پولر باڈی (first polar body) کہتے ہیں۔ می اووس-II میں سینڈری اووسائٹ سے دو ہپلائڈ سیلز بنتے ہیں یعنی ایک سینڈ پولر باڈی اور ایک ایک سیل۔



شکل 6.4: اوو جینیسیس (oogenesis)

فرٹیلائزیشن (Fertilization)

فرٹیلائزیشن سے مراد ہے نر اور مادہ گیمیٹس کا ملنا اور ایک نیا سیل زائیگوٹ (zygote) بنانا۔ انسان میں فرٹیلائزیشن مادہ میں جسم کے اندر ہوتی ہے۔ یہ عمل اووری میں سے ایک سیل نکلنے کے عمل یعنی اوولیشن (ovulation) کے بعد ہوتا ہے۔ فرٹیلائزیشن کے مندرجہ ذیل مراحل ہیں:

- 1- ایک سیل یا اس کے ارد گرد کے سیلز سے خارج ہونے والے کیمیکیل سنگلز کی وجہ سے سپرمزایگ کی طرف حرکت کرتے ہیں۔
- 2- ایکروسوم (سپرم کے سر پر ایک کیپ نماسٹر کچر) (acrosome) اینزائمز خارج کرتا ہے جو ایک سیل کی بیرونی لیئر کو ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سپرم ایک سیل کی سیل میمبرین تک پہنچ جاتا ہے۔
- 3- سپرم کی میمبرین اور ایک سیل میمبرین فیوز (fuse) ہو جاتی ہیں۔ یہ فیوژن (fusion) ایک سیل میں ری ایکشنز کا آغاز کرواتا ہے۔

سکندری سیکونل خصوصیات کی نمو کا آغاز کرتا اے انھیں کنٹرول کرتا ہے۔ ان خصوصیات میں چھاتی (breast) کی نمو، کولہوں (hips) کا چوڑا ہونا، اور مینسٹرئل سائیکلز (menstrual cycles) کا آغاز شامل ہیں۔ یہ ہارمون زنانہ ریپرڈکٹو سائیکل کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔

2- **پروجیسٹرون (Progesterone):** یہ ہارمون اوولیشن (ovulation) کے بعد اووریز میں بنتا ہے۔ یہ یوٹرس (uterus) کی دیواروں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہاں فرٹیلائزڈ ایگ (fertilized egg) نصب ہو سکے یعنی اسکی ایمپلائنٹیشن (implantation) ممکن ہو۔ یہ یوٹرس کے سکلو نے کورڈ کر حمل (pregnancy) کو برقرار بھی رکھتا ہے۔

3- **فولیکل سٹیملیٹنگ ہارمون (FS):** یہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے۔ خواتین میں، یہ فولیکلز (follicles) کی بڑھوتری کی تحریک دیتا ہے، جن میں ایک سیل ہوتے ہیں۔ یہ ایسٹروجن کی پروڈکشن کی بھی تحریک دیتا ہے۔

4- **لیوٹینائزنگ ہارمون (LH):** خواتین میں یہ ہارمون اوولیشن (ovulation) یعنی اووری سے ایک سیل نکلنے کے عمل کا آغاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ پروجیسٹرون ہارمون بننے کی بھی تحریک دیتا ہے۔

5- **گونڈوٹروپن ریلیزنگ ہارمون (GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone):** خواتین میں، یہ ہارمون پیچوٹری گلینڈ کو LH اور FSH جاری کرنے کے لیے تحریک دیتا ہے۔

6.3 ریپرڈکٹو سسٹمز (REPRODUCTIVE SYSTEMS)

اوسطاً تقریباً 1500 سپرم فی سیکنڈ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک دن میں 100 ملین سے زیادہ بنتے ہیں۔

مرد ریپرڈکٹو سسٹم (Male Reproductive System)


یہ درج ذیل حصوں پر مشتمل ہے:

ٹیسٹس (Testes): یہ بیضوی شکل کے گلینڈز کا جوڑا ہے جو سپرم اور مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون (testosterone) بناتا ہے۔

اپی ڈیڈیمس (Epididymis): یہ ہر ٹیسٹس (testis) کے ساتھ جڑی ہوئی ایک لمبی بلدارٹیوب ہے جہاں سپرم ذخیرہ ہوتے ہیں اور بالغ ہوتے ہیں۔

واس ڈیفرنس (Vas deferens): یہ ایک عضلاتی ٹیوب ہے جو بالغ سپرمز کو اپی ڈیڈیمس سے یوریتھرا (urethra) تک لے جاتی ہے۔

سیمیٹل ویزیکلز (Seminal vesicles): مثانے یعنی یورینری بلڈر (urinary bladder) کے پیچھے دو چھوٹے گلینڈز ہیں جو سپرم کی پرورش کے لیے ایک شوگر والا فلوئڈ (sugary fluid) پیدا کرتے ہیں۔




شکل 6.6: مرد ریپرڈکٹو سسٹم

پراسٹیٹ گلینڈ (Prostate gland): یہ بلیڈر کے نیچے ایک اخروٹ کے سائز کا گلینڈ ہے جو سمن (semen) میں حفاظتی فلوئڈ شامل کرتا ہے۔
یوریتھرا (Urethra): یہ پینس (penis) کے اندر ایک ٹیوب ہے جو سمن اور پیشاب کو جسم سے باہر لے جاتی ہے۔
پینس (Penis): یہ بیرونی نہ عضو ہے جو سپرمز کو مادہ کی ریپروڈکٹو ٹریکٹ (reproductive tract) میں منتقل کرتا ہے۔

مادہ کار پیروڈکٹو سسٹم (Female Reproductive System)

یہ درج ذیل حصوں پر مشتمل ہے:

اوریز (Ovaries): یہ بادام کی شکل کے گلینڈز کا جوڑا ہے جو ایک سیلز یعنی اووا (ova) اور ہارمونز مثلاً ایسٹروجن (oestrogen) اور پروجیسٹرون (progesterone) بناتا ہے۔



فیوین ٹیوبز (Fallopian Tubes): یہ دو نالیاں ہیں جو ایک سیلز کو اوریز سے یوٹرس (uterus) تک لے جاتی ہیں۔
 فرٹلائزیشن (fertilization) یہاں ہوتی ہے۔
یوٹرس (Uterus): یہ ایک کھوکھلا، مسکولر آرگن ہے جہاں ایک فرٹلائزڈ ایک پیوند ہوتا ہے اور حمل (pregnancy) کے دوران ایک فیٹس (foetus) کے طور پر نمو پاتا ہے۔
سروکس (Cervix): یہ یوٹرس کا نچلا، تنگ حصہ ہے۔

وجائنا (Vagina): ایک مسکولر کینال جو سروکس کو باہر کی جانب جوڑتی ہے۔

شکل 6.7: مادہ کار پیروڈکٹو سسٹم

6.4 سیکسوائلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز (SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES)

سیکسوائلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز (STDs) وہ انفیکشنز ہیں جو بنیادی طور پر جنسی رابطہ کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ جینیٹل (genital) آرگنز، یورینری آرگنز، اور ری پروڈکٹو آرگنز کو متاثر کرتی ہیں۔ عام STDs میں ایچ آئی وی/ایڈز (HIV/AIDS)، سفلیس (Syphilis)، ہرپیز (Herpes) وغیرہ شامل ہیں۔ بہت سی STDs غیر علامتی (asymptomatic) ہو سکتی ہیں، یعنی افراد علامات ظاہر کیے بغیر انفیکشن کو اپنے اندر رکھ سکتے ہیں اور پھیلا سکتے ہیں۔ اگر STDs

پاکستان کے خاص طور پر دیہی علاقوں میں STDs کے بارے میں کم معلومات اکثر علاج میں تاخیر اور بانجھ پن (infertility) جیسی سنگین پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے۔

کا علاج نہ کیا جائے تو وہ صحت کی سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہیں جیسے کہ بانجھ پن (infertility)، آرگن کا بے کار (damage) ہو جانا، اور دوسرے انفیکشن۔

ایکوائرڈ امیون ڈیفیٹنسی سنڈروم (ایڈز) (Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS))

ایڈز ایک سنگین اور زندگی کے لیے خطرناک (life-threatening) بیماری ہے اس کا ذمہ دار ہیومن امیونو ڈیفیٹنسی وائرس (HIV: Human Immuno-deficiency Virus) ہے۔ HIV جسم کے مدافعتی یعنی امیون (immune) سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے۔ اس طرح، متاثرہ ہونے والا امیون سسٹم انفیکشنز اور کچھ کینسرز سے نہیں لڑ پاتا۔

وجوہات: بنیادی طور پر جنسی رابطہ (sexual contact)، آلودہ انجیکشن سوئیوں (needles) کا اشتراک، متاثرہ خون کی منتقلی، اور پیدائش یا بریسٹ فیڈنگ (breastfeeding) کے دوران ایک متاثرہ ماں سے اس کے بچے کو پھیلتا ہے۔

پاکستان میں HIV کے کیمز بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر غیر محفوظ انجیکشنز، خون کی بے ضابطہ منتقلی (unregulated blood transfusions)، اور نوجوانوں میں معلومات کی کمی کی وجہ سے۔

علامات: ابتدائی علامات میں بخار، تھکاوٹ (fatigue)، سوجھے ہوئے لمف نوڈز (lymph nodes)، اور جلد پر سرخ دھبے اور خارش والے دانے یعنی ریشز (rashes) شامل ہیں۔ جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی ہے، متاثرہ شخص شدید انفیکشنز، وزن میں کمی، دائمی ڈائریا (chronic diarrhoea)، نمونیا (pneumonia)، اور مخصوص کینسر (cancers) کا شکار ہو جاتے ہیں۔

علاج: ایڈز کا کوئی مکمل علاج (cure) نہیں ہے۔ اینٹی ریٹرو وائرل تھیراپی (ART: Antiretroviral Therapy) وائرس کو کنٹرول کر سکتی ہے، امیون سسٹم کو مضبوط بنا سکتی ہے، اور مریضوں کو زیادہ لمبی، صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہے۔

مشق

A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

- 1۔ اوو جینیسیس جسم کے کس حصے میں ہوتی ہے؟
(الف) اووی ڈکٹ (ب) اووری (ج) یوٹرس (د) فیلوپین ٹیوب
- 2۔ درج ذیل میں سے کون سا نرری پروڈکٹ سسٹم کا حصہ نہیں ہے؟
(الف) ٹیسٹیز (ب) یوٹرس (ج) اپی ڈیڈیمس (د) پروٹیٹ گلینڈ
- 3۔ کون سا ہارمون براہ راست اوولیشن (ovulation) کا آغاز کرتا ہے؟
(الف) ایسٹروجن (ب) پروجیسٹرون (ج) لیوٹینائزنگ ہارمون (LH) (د) فولیکل سٹیملیٹنگ ہارمون
- 4۔ کون سا ہارمون مردانہ سیکنڈری خصوصیات کو بنانے کا ذمہ دار ہے؟
(الف) فولیکل سٹیملیٹنگ ہارمون (ب) ایسٹروجن (ج) ٹیسٹوسٹیرون (د) لیوٹینائزنگ ہارمون (LH)

5۔ ایکروسوم کا کام کیا ہے؟


- (الف) سپرم کو ایک سیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے
 (ب) ایسے ایجنٹ خارج کرتا ہے جو سپرم کو ایک سیل کی بیرونی لیئر میں داخل ہونے میں مدد دیتے ہیں
 (ج) ایک سیل کو فرٹیلائزیشن کے لیے متحرک کرتا ہے
 (د) سپرم اور ایک سیل کے نیوکلئی کی فیوژن میں مدد کرتا ہے

6۔ فیلوپین ٹیوبز کا کیا کام ہے؟


- (الف) وہ جگہ جہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے
 (ب) ایک سیل کو ذخیرہ کرنا
 (ج) ایسٹروجن خارج کرنا
 (د) سپرم کو ٹیٹیز تک ٹرانسپورٹ کرنا
 7۔ کون سا ہارمون بنیادی طور پر مردانہ سیکنڈری خصوصیات بنانے کا ذمہ دار ہے؟
 (الف) ایسٹروجن
 (ب) ٹیسٹوسٹیرون
 (ج) پروجیسٹرون
 (د) فولیکل سٹیموولیٹنگ ہارمون

B مختصر جوابات لکھیں۔

1۔ سپرمیٹوجینیسیس کے چارٹ کو مکمل کریں اور اس میں سیلز کے نام اور کروموسومز کی تعداد ($2n$ or n) کا ذکر کرتے لکھیں:



2۔ اوو جینیسیس کے چارٹ کو مکمل کریں اور اس میں سیلز کے نام اور کروموسومز کی تعداد ($2n$ or n) کا ذکر کرتے لکھیں:



- 3- ٹیسٹس اور اووری کے اُن حصوں کے نام بتائیں جہاں گیمیٹ بنتے ہیں؟
- 4- ایک سیل کے اووری سے خارج ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
- 5- پیدا ہونے والے گیمیٹس کی تعداد کے لحاظ سے سپرمیٹوجینیسیس اور اووجینیسیس کا موازنہ کریں۔
- 6- دو بڑے طریقے بیان کریں جن کے ذریعے ایچ آئی وی (HIV) منتقل ہو سکتا ہے۔
- 7- مندرجہ ذیل میں فرق بیان کریں:

i- ایسٹروجن اور پروجسٹرون (oestrogen and progesterone)

ii- سپرمیٹوجینیسیس اور اووجینیسیس (spermatogenesis and oogenesis)

iii- سپرمیٹوسائٹ اور اووسائٹ (spermatoocyte and oocyte)

C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1- مردانہ سیکسوئل ڈویلپمنٹ (male sexual development) میں ہارمونز کا کردار بیان کریں۔
- 2- زنانہ سیکسوئل ڈویلپمنٹ (female sexual development) میں ہارمونز کا کردار بیان کریں۔
- 3- سپرمیٹوجینیسیس (spermatogenesis) کے عمل کو بیان کریں۔
- 4- نرری پروڈکٹوسٹم (male reproductive system) کے بڑے حصوں کے افعال بیان کریں۔
- 5- مادہ ری پروڈکٹوسٹم (female reproductive system) کے حصوں کے افعال بیان کریں۔
- 6- ایڈز (AIDS) کی وضاحت سیکسوالی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز (Sexually transmitted diseases) کی ایک مثال کے طور پر کریں۔

D انکشافی سوالات

- 1- ایک پرائمری اووسائٹ سے صرف ایک ایک سیل ہی کیوں بنتا ہے؟
- 2- سپرم کی ساخت کا اس کے فعل سے کیا تعلق ہے؟
- 3- HIV کی منتقلی سے بچنے کے لیے ایک شخص کیا اقدامات لے سکتا ہے؟

وراثت (INHERITANCE)

حاصلاتِ تعلّم



اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- کروموسومز کی ساخت کا خاکہ بنائیں۔
- جینوٹائپ اور فینوٹائپ، الیل، ہوموزائگیس، ہیمیروزائگیس، ڈومینٹ، رسیسو کی تعریف کریں۔
- مونو ہائبرڈ کراس اور ڈائی ہائبرڈ کراس کے ذریعے مینڈیلین وراثت کے قوانین کی وضاحت کریں۔
- وراثتی معلومات کے حامل کے طور پر ڈی این اے کے کام کا خاکہ پیش کریں۔
- آراین اے کی ساخت کو مختصر طور پر بیان کریں، کہ یہ نیوکلیوٹائیڈز سے بنایا گیا سٹریکچر ہے جس کے نائٹروجنس بیسز باہر کی طرف لٹکے ہوتے ہیں۔
- مفید پروٹینز میں وراثتی معلومات کو تبدیل کرنے میں معاون کے طور پر آراین اے کے کام کا خاکہ پیش کریں۔
- خاکہ پیش کریں کہ ڈی این اے میں موجود معلومات کو آراین اے پر معلومات میں اور پھر پروٹینز میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔

ہر جاندار ساخت اور طرزِ عمل (behavioural) کی بے شمار خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جاندار اپنی خصوصیات بچوں میں منتقل


کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بچے اپنے والدین میں سے ہر ایک سے کچھ خصوصیات حاصل کرتے ہیں۔ وہ عمل جس کے ذریعے خصوصیات والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، وراثت (inheritance or heredity) کہلاتا ہے۔

7.1 کروموسوم کی ساخت (STRUCTURE OF CHROMOSOME)

کروموسوم جس مادے کا بنا ہوتا ہے، اُسے کرومٹین (chromatin) میٹیریل کہتے ہیں۔ یوکیئرلوس میں کرومٹین ڈی این اے (DNA) اور خاص پروٹینز یعنی ہسٹونز (histones) کا بنا ہوتا ہے۔ کرومٹین ایک دھاگے جیسا میٹیریل ہے۔ اس میں DNA کا ایک لمبا مالیکیول ہسٹون کے بندلز کے گرد لپٹا ہوتا ہے۔ جب ایک سیل تقسیم نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا کرومٹین نیوکلئیس میں بکھرے ہوئے باریک دھاگے کی کرومٹین کی طرح ہوتا ہے۔ سیل ڈویژن کے دوران کرومٹین بل کھاتا ہے اور ٹھوس ساختیں بناتا ہے جنہیں کروموسمز کہتے ہیں۔

پادوہانی:


- ایک سی شیز کے جانداروں کے تمام سیلز میں کروموسومز کی تعداد مستقل ہوتی ہے۔
 جسمانی سیلز ڈپلائڈ (2n) ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کروموسومز جوڑوں
 (ہومولوجس کروموسومز: homologous chromosomes) میں
 ہوتے ہیں۔
 سیل ڈویژن سے پہلے DNA اپنی ایک کاپی بناتا ہے۔ اس طریقے میں
 کرومائیڈز بنتے ہیں۔ جب سیل تقسیم ہوتا ہے تو ہر ڈائریسل میں ہر کروموسوم کا
 ایک کرومائیڈ جاتا ہے۔



شکل 7.1: کروموسوم کی کیمیائی ساخت

کروموسوم ایک سلاخ نما (rod shaped) ساخت ہے۔ یہ ایک جیسے دونصف حصوں پر مشتمل ہے۔ کروموسوم کے ہر نصف حصے کو کرومائیڈ (chromatid) کہتے ہیں۔ کروموسوم کے دونوں کرومائیڈز ایک مقام پر جڑے ہوتے ہیں۔ کروموسوم پر یہ مقام سینٹرومیٹر (centromere) کہلاتا ہے۔ سینٹرومیٹر دونوں کرومائیڈز کو اکٹھا رکھتا ہے، حتیٰ کہ سیل ڈویژن کے دوران وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پروکیریوٹس میں صرف ایک کروموسوم ہوتا ہے جو گول نما DNA کے ایک مالیکیول کا بنا ہوتا ہے۔ اس کے گرد غلاف یعنی نیوکلیئر اینویلوپ (nuclear envelop) نہیں ہوتا اور یہ سائٹوپلازم میں ہی موجود ہوتا ہے۔

7.2 ڈی این اے اور آراین اے (DNA AND RNA)



شکل 7.2: ڈی این اے اور آراین اے

ڈی این اے (DNA) یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ (Deoxyribonucleic Acid) ایک دوہری لڑی جیسا یعنی ڈبل سٹرینڈڈ (double-stranded) مالیکیول ہے۔ یہ ایک پیچ دار (helical) مالیکیول ہے۔ ڈی این اے نیوکلیوٹائیڈز (nucleotides) سے بنا ہے۔ ہر نیوکلیوٹائیڈ (nucleotide) تین حصوں پر مشتمل ہے یعنی ڈی آکسی رائبوز (deoxyribose) شوگر، ایک فاسفیٹ (phosphate) گروپ، اور ایک نائٹروجنس بیس (nitrogenous base)۔ ایک نیوکلیوٹائیڈ میں نائٹروجنس بیس (adenine)، تھائمین (thymine)، سائٹیوسین (cytosine)، یا گوانین (guanine) میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ ڈی این اے کی دونوں لڑیاں (strands) بیس پیئرنگ (base pairing) کے ذریعے آپس میں جڑی ہوتی ہیں یعنی A کے ساتھ ہمیشہ T ہوتی ہے۔ اسی طرح، C کے ساتھ G ہوتی ہے۔


آراین اے یعنی رائبو نیوکلیک ایسڈ (Ribonucleic Acid) نیوکلیوٹائیڈز کی ایک سینگل لڑی والی یعنی سینگل سٹرینڈڈ (single-stranded) چین ہے۔ اس کے ایک نیوکلیوٹائیڈ میں ایک رائبوز (ribose) شوگر، ایک فاسفیٹ گروپ، اور ایک نائٹروجنس بیس (nitrogenous base) یعنی ایڈینین، یوراسل (uracil)، سائٹیوسین، یا گوانین ہوتے ہیں۔

ڈی این اے اور آراین اے کا کام (Functioning of DNA and RNA)

ایک جین سے مراد DNA کا ایسا ٹکڑا ہے جس کے پاس ایک مخصوص پروٹین بنانے کی ہدایات ہوتی ہیں۔ جین میں موجود ہدایات کے مطابق ایک پروٹین تیار کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اعمال ہوتے ہیں:

1- DNA کا ٹکڑا یعنی جین ایک سانچے (template) کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس سانچے پر رائبو نیوکلیک ایسڈ (ribonucleic acid) کی ایک قسم یعنی میسنجر آراین اے (mRNA: messenger RNA) تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح DNA اپنی ہدایات

mRNA کو منتقل کر دیتا ہے۔ اس مرحلہ کو ٹرانسکرپشن (transcription) کہتے ہیں۔ اس طرح DNA کی ہدایات کو پروٹینز میں تبدیل کرنے میں mRNA ایک معاون کے طور پر کام کرتا ہے۔



شکل 7.3: جین کے کام کا طریقہ (مرکزی اصول: Central Dogma)

2- mRNA سائٹوپلازم میں آجاتا ہے۔

یہاں mRNA کے ساتھ راہبوسوم لگ جاتا

ہے۔ راہبوسوم mRNA پر موجود ہدایات

کے مطابق ایمائوایڈز جوڑتا ہے۔ اس

طرح پروٹین تیار ہو جاتی ہے۔ اس مرحلہ کو

ٹرانسلیشن (translation) کہتے ہیں۔

جین کے کام کرنے کے طریقے کو مرکزی اصول

(central dogma) کہتے ہیں اور اسے اس

طرح ظاہر کیا جاتا ہے؛

ڈی این اے ← mRNA ← پروٹین

جین اور ایل (Gene and Allele)

ایک جین DNA کا ایسا ٹکڑا ہے جس میں ایک موروثی خصوصیت کے لیے معلومات ہوتی ہیں۔ مثلاً آنکھوں کی رنگت کا جین، کان کی لوب کی شکل کا جین، اور بالوں کی بناوٹ (texture) کا جین۔ جینز کروموسومز پر لگے ہوتے ہیں۔ کروموسومز پر جینز کے مقامات کو لوسائی (loci)؛ واحد لوکس (locus) کہتے ہیں۔ کروموسومز کی طرح، جینز بھی جوڑوں میں ہوتے ہیں۔

ایسا لازمی نہیں ہوتا کہ کروموسومز کے جوڑے پر موجود دونوں جین ایک جیسے ہوں۔ ہومولوجس کروموسومز پر ایک ہی جین کی مختلف حالتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ ایک جین کی یہ متبادل (مختلف) حالتیں، اس کی ایلو (alleles) کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، بالوں کی رنگت کے جین کے دو ایلو ہو سکتے ہیں۔ ایک ایلو بالوں میں پگمنت بناتا ہے، جبکہ دوسرا ایلو پگمنت نہیں بناتا۔


جینوٹائپ (Genotype)

ایلوز کی ترتیب یعنی کمینیشن (combination) کو جینوٹائپ (genotype) کہتے ہیں۔ جب جوڑے میں دونوں ایلو ایک جیسے ہوں تو جینوٹائپ ہوموزائگس (homozygous) ہوتی ہے۔ جبکہ ایسی جینوٹائپ جس میں دونوں ایلو مختلف ہوں، ہیٹروزائگس (heterozygous) کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر (شکل 7.4) ایک سیل میں آنکھوں کی رنگت، بالوں کی شکل اور کان کی شکل کے جین موجود ہیں۔ تمام جین جوڑوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔

ایک خصوصیت یعنی 'آنکھوں کی رنگت' کے جین کے دونوں ایلو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 'آنکھوں کی رنگت' کی

جینوٹائپ ہوموزائگس ہے۔ اسی طرح، ایک اور خصوصیت 'بالوں کی شکل' کے دونوں الیل بھی جیسے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 'بالوں کی شکل' کی جینوٹائپ بھی ہوموزائگس ہے۔

• 'کان کی شکل' کے جین کے دونوں الیل مختلف ہیں۔ ایک الیل کان کی آزادلوب (free earlobe) بناتا ہے جبکہ دوسرا الیل جڑی ہوئی لوب (attached earlobe) بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 'کان کی شکل' کی جینوٹائپ ہیٹروزائگس ہے۔



شکل 7.4: الیل اور جینوٹائپ

ہیٹروزائگس جینوٹائپ میں ایک الیل دوسرے الیل کے کام کو چھپا سکتا ہے۔ ایسے الیل کو غالب یعنی ڈومینٹ (dominant) الیل کہتے ہیں۔ وہ الیل جو چھپ جاتا ہے (ظاہر نہیں ہو سکتا)، مغلوب یعنی ریسیسو (recessive) الیل کہلاتا ہے۔ الیز کو لکھتے وقت ڈومینٹ الیل کو بڑے حرف (capital letter) سے لکھا جاتا ہے جبکہ ریسیسو الیل کے لیے چھوٹا حرف (small letter) استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، الیز کے جوڑے Tt میں موجود ڈومینٹ الیل T لمبے پودے (tall plant) کا ذمہ دار ہے جبکہ ریسیسو الیل t چھوٹے پودے (dwarf plant) کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے اگر کسی پودے کی جینوٹائپ Tt ہو تو یہ پودا ایک لمبا پودا ہوگا۔ جینوٹائپ کے قابل مشاہدہ نتیجے کو فینوٹائپ (phenotype) کہتے ہیں۔

7.3 وراثت کے متعلق مینڈل کے قوانین (MENDEL'S LAWS OF INHERITANCE)



شکل 7.5: گرگر مینڈل

گرگر مینڈل (Gregor Mendel) ایک آسٹرین راہب (Austrian monk) تھے۔ اس نے 1856 اور 1863 کے درمیان مٹر (garden pea) کے پودے پر تجربات کیے۔ ان تجربات کے نتائج نے وراثت کے متعلق لوگوں کے نظریات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔

تجربات کے لیے مٹر کے پودے کا انتخاب (Selection of Garden Pea for Experiments)


مینڈل نے اپنے تجربات کے لیے مٹر کے پودے کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب کئی وجوہات کی بنا پر درست تھا۔ مثلاً؛

- 1۔ مٹر کے پودے کی نسل کا دورانیہ کم ہوتا ہے۔
- 2۔ مٹر کے پودے میں آسانی سے قابل شناخت سات خصوصیات موجود ہوتی ہیں مثلاً گول بمقابلہ جھری دار بیج اور جامنی بمقابلہ سفید پھول۔

پودے کا قد	پھول کی پوزیشن	پھلی کی شکل	پھلی کا رنگ	بیج کی شکل	بیج کا رنگ	پھول کا رنگ
لمبا	ایگزیکل (جانبی شاخ پر)	پھولی ہوئی	سبز	گول	زرد	جامنی
چھوٹا (dwarf)	ٹرمینل (بڑی شاخ کے کنارے پر)	چھپی ہوئی	زرد	جھری دار	سبز	سفید

شکل 7.6: مٹر کے پودے کی قابل شناخت خصوصیات جن کا مینڈل نے مطالعہ کیا

- 3۔ عام طور پر مٹر کے پھولوں میں سیلف پولینیشن (self-pollination) ہوتی ہے۔ لیکن ان پودوں میں کراس پولینیشن (cross pollination) کرنے کی اہلیت بھی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے، ایک پھول کے سٹیمن (stamen) اتارے جاتے ہیں اور ان کے پولن گرینز (pollen grains) کو دوسرے پودے کے پھول پر منتقل کیا جاتا ہے۔




شکل 7.7: مٹر کے پودوں میں سیلف اور کراس پولینیشن

مینڈل کے تجربات (Mendel's Experiments)

مینڈل نے ہر خصوصیت کے مطالعہ کے لیے خالص النسل یعنی ٹرو بریڈنگ (true-breeding) پودے حاصل کیے۔ جب کوئی

مخصوص صفت والا پودا سیلف پولی نیشن کے بعد اسی خصوصیت والے پودے پیدا کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پودا اس خصوصیت کے لیے خالص النسل ہے۔ مثال کے طور پر، جب ایک خالص النسل لمبا پودا سیلف پولی نیشن کرتا ہے تو تمام پودے لمبے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ خالص النسل اقسام چنے کے بعد مینڈل نے مونو ہائی بریڈ (monohybrid) کر اس کروائے۔ یہ ایسا کر اس ہوتا ہے جس میں ایک ہی خصوصیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

تجربہ 1: مینڈل نے ایک خالص النسل لمبے پودے کا کر اس خالص النسل چھوٹے پودے سے کروایا۔ اس نے ان خالص النسل والدین کو P نسل اور اس کر اس سے بننے والے نئے پودوں کو بچوں کی پہلی نسل (first filial generation) یا F_1 نسل کہا۔ F_1 نسل میں تمام پودے لمبے قد کے تھے۔



شکل 7.8: مینڈل کے تجربات

مزید برآں مینڈل نے F_1 نسل کے لمبے پودوں کو سیلف پولی نیشن کرنے دی۔ اس نے دیکھا کہ نئے بننے والے 75% پودے (جسے F_2 نسل کہا گیا) لمبے تھے جبکہ 25% چھوٹے تھے۔ مینڈل نے تمام خصوصیات کے لیے بار بار یہی نتائج دیکھے۔

نتائج (Conclusions)


ڈومیننس (dominance) کا تصور: مینڈل نے اپنے نتائج کی وضاحت کی کہ مٹر کے پودے میں قد کی خصوصیت کے جین کی دو متبادل حالتیں (الیل) تھیں۔ جب ایک جاندار میں دو مختلف الیل اکٹھے آ جاتے ہیں تو ایک الیل دوسرے الیل کے ظاہر ہونے کو چھپا

(mask) سکتا ہے۔ وہ ایل جو اپنا اثر دکھاتا ہے، اسے ڈومینٹ ایل کہتے ہیں جبکہ دوسرا جس کا اظہار چھپ جاتا ہے ریسیسو کہلاتا ہے۔ اسے ڈومیننس کا تصور کہتے ہیں۔

لاء آف سیکرگیٹیشن (segregation): مینڈل نے وضاحت کی کہ والدین میں سے ہر ایک کے پاس ایک جین کے دو ایل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بچے کو دو میں سے ایک ہی ایل دے سکتا ہے۔ گیمیٹ بننے کے دوران ایل ایک دوسرے سے جدا (segregate) ہو جاتے ہیں اور ہر گیمیٹ میں ایک ہی ایل ہوتا ہے۔ جب فریلازیشن ہوتی ہے تو نتیجہ میں بننے والے جاندار میں دوبارہ دو ایل آ جاتے ہیں۔ اسے لاء آف سیکرگیٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے مطابق ”گیمیٹ بننے کے دوران ایل علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ہر گیمیٹ دو میں سے ایک ایل وصول کرتا ہے، دونوں نہیں۔“

مڑ کے پودے میں لمبے قد کا ایل ڈومینٹ ہے۔ والدین کی نسل (P) میں ایک کے پاس TT ایل تھے۔ اس پودے کے ہر گیمیٹ نے T ایل وصول کیا۔ اسی نسل کے دوسرے پودے کے پاس tt ایل تھے اور اس کے ہر گیمیٹ نے t ایل وصول کیا۔ جب یہ دونوں گیمیٹ (T اور t والے) آپس میں ملے تو F₁ کے ہر پودے کے پاس ایل کا جوڑا Tt کی شکل میں آیا۔ اس لیے F₁ کے تمام پودے لمبے تھے۔ جب F₁ کے پودوں کو سیلف پولی نیشن کرنے دی گئی تو یہ نتائج آئے:

- ✱ F₂ نسل کے 25% پودوں میں دونوں ایل چھوٹے قد کے آئے یعنی tt۔ اس لیے وہ چھوٹے تھے۔
- ✱ F₂ نسل کے 50% پودوں نے ایک ایل لمبے قد کا (T) اور ایک چھوٹے قد کا (t) وصول کیا۔ اس لیے وہ لمبے (Tt) تھے۔
- ✱ F₂ نسل کے 25% پودوں نے دونوں لمبے قد کے ایل وصول کیے یعنی TT۔ اس لیے وہ بھی لمبے تھے۔




شکل 7.9: ایل کی سیکرگیٹیشن

تجربہ 2: اپنے اگلے تجربات میں مینڈل نے ڈائ ہائی بریڈ (diybrid) کراس کیے۔ ڈائ ہائی بریڈ کراس میں ایک ہی وقت میں دو خصوصیات کی وراثت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایسے تجربات میں اس نے دو خصوصیات یعنی بیج کی شکل (گول یا جھری دار) اور بیج کا رنگ (زرد یا سبز) کا مطالعہ کیا تھا۔ پہلے اس نے مٹر کے پودوں کی خالص النسل اقسام پیدا کیں۔ ایک پودے کے بیج گول (round) اور زرد (yellow) تھے اور دوسرے کے بیج جھری دار (wrinkled) اور سبز (green) تھے۔

مینڈل نے ان خالص النسل پودوں میں کراس کروایا۔ F_1 نسل کے تمام پودوں کے بیج گول اور زرد تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ گول بیج کا ایل (R) ڈومینٹ ہے جبکہ جھری دار بیج کا ایل (r) ریسیسو ہے۔ اسی طرح، زرد بیج کا ایل (Y) ڈومینٹ ہے جبکہ سبز بیج کا ایل (y) ریسیسو ہے۔ F_1 نسل کے تمام پودے دونوں خصوصیات کے لیے ہیٹرو زائگیس (RrYy) تھے۔

مینڈل نے F_1 کے پودوں میں سیلف پولی نیشن ہونے دی اور F_2 نسل حاصل کی۔ F_2 نسل میں یہ چار فینو ٹائپس تھیں:

- 9/16 بیج گول اور زرد تھے۔ (جینو ٹائپس: RRYy, RrYY, RrYy اور RrYy)
- 3/16 بیج گول اور سبز تھے۔ (جینو ٹائپس: RRyy اور Rryy)
- 3/16 بیج جھری دار اور زرد تھے۔ (جینو ٹائپس: rrYY اور rrYy)
- 1/16 بیج جھری دار اور سبز تھے۔ (جینو ٹائپ: rryy)



شکل 7.10: ایلو کی انڈی پنڈنٹ اسورٹمنٹ

لاء آف انڈی پنڈنٹ اسورٹمنٹ (Law of Independent Assortment)

F_1 نسل کے پودوں ($RrYy$) نے چار اقسام کے گیٹھس بنائے یعنی Ry, RY, rY, ry ۔ جب ان پودوں نے سیلف پولی نیشن کی تو F_2 نسل میں الیگز کے 16 اقسام کے جوڑے بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیل R اور الیل r کی سیرگیٹھن (علیحدہ ہو کر گیٹھس میں جانا) الیگز Y اور y کی سیرگیٹھن سے آزادانہ ہوتی ہے۔ مینڈل کی اس دریافت کو لاء آف انڈی پنڈنٹ اسورٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق ”گیٹھس بننے کے دوران الیگز ایک دوسرے سے آزادانہ علیحدہ ہوتے ہیں“۔

مشق

A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

1۔ یوکر یوٹس کا کروموسوم بنا ہوتا ہے:

- (الف) لیڈز اور پروٹین
(ب) لیڈز اور ڈی این اے
(ج) RNA اور پروٹینز
(د) DNA اور پروٹینز

2۔ جین اور الیل کے درمیان کیا تعلق ہے؟

- (الف) جین کی متبادل حالتیں الیل کہلاتی ہیں
(ب) الیل کی متبادل حالتیں جین کہلاتی ہیں
(ج) جین دوسرے جین کے اثرات کو چھپا دیتے ہیں
(د) الیل اور جین کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا

3۔ ٹرانسکرپشن میں کون سا مالیکیول بنتا ہے؟

- (الف) ڈی این اے
(ب) پروٹین
(ج) mRNA
(د) رائبوسوم

4۔ مالیکیولر بائیولوجی کا مرکزی اصول کس سے ظاہر کیا جاتا ہے؟

- (الف) $RNA + DNA =$ پروٹین
(ب) $DNA \leftarrow RNA +$ پروٹین
(ج) $DNA \leftarrow RNA \leftarrow$ پروٹین
(د) $DNA \leftarrow RNA \leftarrow$ پروٹین

5۔ ٹرانسکرپشن میں کیا ہوتا ہے؟

- (الف) ایک نئی پولی پیپٹائڈ بنائی جاتی ہے
(ب) RNA رائبوسوم کی جانچ کرتا ہے
(ج) DNA کی نئی نقل تیار کی جاتی ہے
(د) RNA کی نقل تیار کی جاتی ہے

6۔ پروٹین کی تیاری میں DNA کا کیا کردار ہے؟

- (الف) ایمائنو ایسڈ کو بناتا ہے
(ب) mRNA بنانے کے لیے سانچہ فراہم کرتا ہے
(ج) پروٹینز کو دوسری جگہ منتقل کرتا ہے
(د) پروٹینز کا ذخیرہ کرتا ہے

7۔ جب دو مختلف ایلیز موجود ہوں تو ظاہر ہونے والا ایلیل کہلاتا ہے؛

- (الف) ڈومینٹ (ب) ریسیسو
(ج) ہوموزائگیس (د) ہیٹروزائگیس

8۔ ان میں سے کون سی وجہ تھی جس کے باعث مٹر کے پودے مینڈل (Mendel) کے تجربات کے لیے موزوں تھے؟

- (الف) لائف سائیکل طویل ہے
(ب) آسانی سے کراس پولی نیشن ہو جاتی ہے
(ج) فی پودا کم بیج پیدا ہوتے ہیں
(د) خواص (traits) میں کوئی تنوع (variation) نہیں ہے

9۔ مینڈل کا سیکرگیٹیشن کا قانون کیا بیان کرتا ہے؟

- (الف) جینز آپس میں جڑے ہوتے ہیں
(ب) گیمیٹ بننے کے دوران ہر ایلیل الگ ہو جاتا ہے
(ج) ڈومینٹ خصوصیات تمام نسلوں میں ظاہر ہوتی ہیں
(د) ایلیز آپس میں گھل مل جاتے ہیں

10۔ مٹر میں جامنی (purple) پھول کا ایلیل (P)، سفید پھول کے ایلیل (p) پر ڈومینٹ ہے۔ اگر ایک سفید پھول کا کراس ایک ہیٹروزائگیس جامنی پھول (Pp) سے کروایا جائے تو اولاد کا تناسب کیا ہوگا؟

- (الف) 100% جامنی
(ب) 75% جامنی اور 25% سفید

- (ج) 50% جامنی اور 50% سفید
(د) 100% سفید

B مختصر جوابات لکھیں۔

1۔ ایک پودے کی جینوٹائپ Rryy ہے۔ اس کے گیمیٹس میں ایلیز کے مختلف کمبائنیشن (combinations) لکھیں۔

2۔ مینڈل کا لاء آف سیکرگیٹیشن بیان کریں۔

3۔ مینڈل کا لاء آف انڈی پنڈنٹ اسورٹمنٹ بیان کریں۔


4۔ مونو ہائیبریڈ اور ڈائی ہائیبریڈ کراس کی تعریف کریں۔ دونوں کی ایک مثال دیں۔

5۔ مٹر کے دو پودوں کے درمیان کراس بنائیں۔ ان میں ایک کے بیج گول سبز ہیں (RRyy) جبکہ دوسرے کے بیج چھری دار زرد ہیں (rrYY)۔


6۔ مندرجہ ذیل میں فرق لکھیں:

- جین اور ایلیل
- جینوٹائپ اور فینوٹائپ
- F_2 اور F_1 نسلیں
- ڈومینٹ اور ریسیسو
- ہوموزائگیس اور ہیٹروزائگیس

7۔ سیل کی اس ڈایا گرام میں تمام حصوں کو لیبل کریں اور اعمال کے نام بھی لکھیں:



8۔ اس ڈایا گرام میں تمام حصوں کو لیبل کریں:



C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1۔ کروموسوم کی ساخت اور کیمیائی ترکیب پر نوٹ لکھیں۔
- 2۔ مینڈل نے اپنے وراثت کے تجربات کے لیے مٹر کے پودے کا انتخاب کیوں کیا؟
- 3۔ مینڈل کا وہ تجربہ بیان کریں جس میں اس نے دو خصوصیات کی وراثت کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ قانون بھی بیان کریں جو اس نے تجویز کیا۔
- 4۔ مینڈل کا سیکریگیشن کا قانون بیان کریں۔ ایک مثال بھی دیں۔
- 5۔ بیان کریں کہ DNA اور RNA کس طرح پروٹین کی تیاری میں حصہ لیتے ہیں۔

D انکشافی سوالات

- 1۔ جین کس طرح جاندار کے خواص اور خصوصیات کو کنٹرول کرتے ہیں؟
- 2۔ ایک ہی جین کے مختلف الیل کیوں مختلف جسمانی خواص بنا سکتے ہیں؟

بائیو ٹیکنالوجی (BIOTECHNOLOGY)

حاصلاتِ تعلّم

اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- ❖ بائیو ٹیکنالوجی کا تعارف کرائیں۔
- ❖ بریڈ (روٹی) اور استھانول (ethanol) کی تیاری میں پیسٹ (yeast) کے کردار کی وضاحت کریں۔
- ❖ بیان کریں کہ بیکٹیریا یا بائیو ٹیکنالوجی اور جینیٹک موڈیفیکیشن (genetic modification) میں مفید ہیں۔
- ❖ جینیٹک انجینئرنگ (genetic engineering) یا جینیٹک موڈیفیکیشن کے بنیادی طریقے کو بیان کریں۔
- ❖ جینیٹک موڈیفیکیشن کے ممکنہ فوائد اور خطرات (Risks) پر بات کریں۔



بائیو ٹیکنالوجی بائیو لو جی کی نئی شاخ ہے۔ اس میں انسانی فلاح کے لیے جانداروں کو مائیکروب یا سیلولر لیول پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خدمات حاصل کی جائیں اور پروڈکٹس (products) تیار کی جائیں۔ یہ شعبہ انسانی صحت، زراعت، صنعت، اور ماحول کے میدانوں میں فوائد دیتا ہے۔ اس باب میں ہم بائیو ٹیکنالوجی اور اس کے اطلاق کی بنیادی معلومات حاصل کریں گے۔

1919 میں ہنگری (Hungary) کے ایک انجینئر کارل ایریکی (Karl Ereky) نے اصطلاح ”بائیوٹیکنالوجی“ متعارف کروائی۔ مخصوص مقاصد کے لیے پروڈکٹس بنانے یا اعمال کرنے کے لیے زندہ سیلز یا جانداروں کا استعمال بائیوٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے؛ جاندار کی وراثتی خصوصیات تبدیل کی جاتی ہیں۔



سر آیان ولٹ (Sir Ian Wilmut) برطانوی ایمبریالوجسٹ (embryologist) ہیں۔ وہ ایک تحقیقی ٹیم کے سربراہ تھے جس نے 1997 میں ایک بالغ جسمانی سیل سے ایک میمل (ایک بھیڑ جس کا نام ڈولی تھا) بنایا۔

کسی جاندار کے سیل یا اس کے کسی حصے سے مطلوب خصوصیات والے نئے جاندار بنائے جاتے ہیں۔

تبدیل کردہ (modified) جاندار سے مطلوبہ مواد تیار کروایا جاتا ہے۔

1953 میں DNA کی ساخت اور فعل کی دریافت کے ساتھ ماڈرن

بائیوٹیکنالوجی ابھری۔ ماڈرن بائیوٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی تکنیکوں میں فرمنٹیشن (fermentation)، ری کمینٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی، سیل کلچر، جین ایڈیٹنگ، جنٹیک انجینئرنگ اور ٹشو کلچر شامل ہیں۔

فرمنٹیشن میں خمیر یعنی پیسٹ کی اہمیت (Importance of Yeast in Fermentation)

پیسٹ (yeast) ایک مائکروسکوپک فنگس (fungus) ہے جو روٹی بنانے اور استھانول (ethanol) کی تیاری، دونوں میں فرمنٹیشن (fermentation) کے عمل کے ذریعے اہم کردار ادا کرتا ہے۔

بریڈ بنانے میں پیسٹ کا کردار (Role in Bread Making)

پیسٹ گندھے ہوئے آٹے یعنی ڈو (dough) میں موجود شوگرز کی فرمنٹیشن کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس (CO₂) پیدا کرتا ہے۔ یہ گیس ڈو میں بلبلے (bubbles) بناتی ہے، جس سے یہ پھول کر نرم (soft) اور ہوا دار (airy) ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران پیدا ہونے والا الکحل (alcohol) بیکنگ کے دوران بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔

فرمنٹیشن بائیوٹیکنالوجی کی سب سے پرانی شکل ہے۔ یہ ہزاروں سال پہلے روٹی، شراب (beer) اور دہی (yogurt) بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔

استھانول تیار کرنے میں پیسٹ کا کردار (Role in Ethanol Production)

پیسٹ گنے (sugarcane) یا مکئی جیسی فصلوں سے حاصل کردہ شوگرز کی فرمنٹیشن کرتا ہے۔ اس فرمنٹیشن سے استھانول (ethanol) (الکوحل) اور کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتے ہیں۔ اس کے بعد استھانول کو صاف کر کے الگ کر لیا جاتا ہے اور اسے بطور ایک بائیو فیول (biofuel) یا الکوحلک مشروبات (alcoholic beverages) میں استعمال کیا جاتا ہے۔

بائیوٹیکنالوجی میں بیکٹیریا کی اہمیت (Importance of Bacteria in Biotechnology)

بیکٹیریا بائیوٹیکنالوجی میں ضروری ٹولز (tools) ہیں کیونکہ وہ سادہ ہوتے ہیں، تیزی سے تعداد بڑھاتے ہیں، اور آسانی سے نیا

جینیٹک میٹریل (genetic material) قبول کر سکتے ہیں۔ سائنسدان بیکٹیریا کو ادویات تیار کرنے، جین کا مطالعہ کرنے، اور جینیاتی طور پر بہتر تبدیل شدہ جاندار (GMO: Genetically Modified Organisms) بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

بائیو ٹیکنالوجی میں کردار (Role in Biotechnology)

بعض بیکٹیریا اہم مادے جیسے کہ اینٹی بائیوٹکس (antibiotics) پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سٹرپٹو مائیسز (Streptomyces) بیکٹیریا ایک اینٹی بائیوٹک سٹرپٹو مائیسین (Streptomycin) بناتے ہیں۔ بہت سے بیکٹیریا ایسے اینزائم بناتے ہیں جنہیں سائنسدان پنیر (cheese) اور ڈیٹرجنٹ (detergent) بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح، بہت سے بیکٹیریا وٹامن (vitamin) بناتے ہیں، جیسے وٹامن بی 12 (Vitamin B12)۔ سائنسدان ماحول میں (خاص طور پر سمندروں میں) تیل کے رساؤ (oil spills) اور فضلہ یعنی ویسٹ (waste) کو صاف کرنے کے لیے بھی بیکٹیریا کا استعمال کرتے ہیں۔ اس عمل کو بائیو ریمیڈیشن (bioremediation) کہتے ہیں۔ خوراک کی صنعت (food industry) میں لیکٹوبیسلیس (Lactobacillus) جیسے بیکٹیریا دودھ کی فرمیشن کر کے دہی اور پنیر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔

جینیاتی تبدیلی میں کردار (Role in Genetic Modification)

سائنسدان بیکٹیریا میں موجود خاص ساخت یعنی پلازمڈ (plasmid) کو کیریئر (carrier) کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ پلازمڈ بیکٹیریا میں پائے جانے والے DNA کے چھوٹے گول ٹکڑے (loops) ہوتے ہیں۔ انھیں کیریئر کے طور پر استعمال کر کے بیکٹیریا کے سیل میں نئے جین داخل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح، تبدیل شدہ یعنی موڈیفائیڈ بیکٹیریا بیرونی جین (foreign gene) سے پروٹین پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ مندرجہ ذیل چیزیں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے:

- ذیابیطس (diabetes) کے علاج کے لیے انسانی انسولین (insulin)
 - نشوونما کی خرابی (growth disorders) کے علاج کے لیے انسانی نشوونما کا ہارمون (human growth hormone)
 - کئی بیماریوں کے خلاف ویکسینز (vaccines)
- کچھ بیکٹیریا کو استعمال کر کے جینیاتی طور پر بہتر تبدیل شدہ فصلیں (genetically modified crops) تیار کی جاتی ہیں۔ اس عمل میں بیکٹیریا کی مدد سے پودے کے سیلز میں نئے جین داخل کیے جاتے ہیں۔

8.2 جینیٹک انجینئرنگ (GENETIC ENGINEERING)

جینیٹک انجینئرنگ سے مراد جاندار کے جینز (genes) میں ترمیم کرنا (editing) یا ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں جینز منتقل کرنا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ میں خاص اینزائم استعمال کیے جاتے ہیں جو مخصوص مقامات سے ڈی این اے کو کاٹنے اور جوڑتے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ کے نتیجے میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جاندار (GMO: Genetically Modified Organism) بنتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جینیٹک انجینئرنگ کی دو بڑی مثالیں ہیں۔

1- جین میں ترمیم کرنا (Gene Editing)

جین میں ترمیم (gene editing) ایڈیٹنگ ایک ایسی تکنیک ہے جس میں سائنسدان کسی جاندار کے DNA (جینز) میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں DNA میں مخصوص جینز شامل کرنا، ہٹانا یا ان کا اول بدل (replace) کرنا شامل ہے۔ یہ کام جینیاتی خرابیوں (genetic abnormalities) کو درست کرنے اور خصوصیات کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔

جین ایڈیٹنگ بہت احتیاط سے کی جاتی ہے کیونکہ DNA میں کی گئی تبدیلیوں کے غیر متوقع اثرات ہو سکتے ہیں۔


جین میں ترمیم کی مثالیں (Examples of Gene Editing)

- 1- وراثتی بیماریوں کا علاج: سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جین ایڈیٹنگ سے خراب (abnormal) جینز کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایسی بیماریوں کی مثالیں خون کی ایک بیماری سکل سیل اینیمیا (sickle cell anemia) اور پھیپھڑوں کی ایک بیماری سسٹک فائبروسس (cystic fibrosis) ہیں۔
- 2- فصلوں کو بہتر بنانا: جین ایڈیٹنگ سے ایسی فصلیں تیار کی جاسکتی ہیں جو تیزی سے بڑھیں، نقصان دہ حشرات یعنی پیسٹ (pest) اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کریں، اور خشک سالی (droughts) برداشت کر سکیں۔ مثال کے طور پر، ٹماٹر اور تمباکو (tobacco) کی وائرس کے خلاف مزاحمت رکھنے والی (virus resistant) اقسام تیار کی گئی ہیں۔ سویا بینز (soybeans)، مکئی، ٹماٹر، اور کاٹن (cotton) کی تبدیل شدہ بہتر اقسام تیار کی گئی ہیں جو جڑی بوٹی کش ادویات (herbicides) کے خلاف مزاحمت ظاہر کرتی ہیں۔
- 3- بہتر ادویات تیار کرنا: جین ایڈیٹنگ ایسے بیکٹیریا بنانے میں مدد کرتی ہے جو اہم ادویات تیار کرتے ہیں، جیسے ذیابیطس (diabetes) کے لیے انسولین (insulin)۔

2- جین کی منتقلی (Gene Transfer)

کسی جاندار میں جینز منتقل کرنے کے لیے جینیٹک انجینئر مخصوص ویکٹرز (vectors) استعمال کرتے ہیں۔ بیکٹیریا میں جینز منتقل کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ویکٹرز پلازمڈز (plasmids) اور بیکٹیریو فیج (bacteriophage) ہیں۔ پلازمڈ کچھ بیکٹیریا میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے، گول شکل کے DNA مالیکیول ہیں۔ بیکٹیریو فیج ایسے وائرس ہوتے ہیں جو بیکٹیریا میں داخل ہوتے ہیں۔ کسی جاندار مثلاً بیکٹیریا میں جین کی منتقلی کے مراحل مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- ڈونر جاندار کے جین کی شناخت کی جاتی ہے اور اُسے کروموسوم سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔
- 2- بیکٹیریا کے سیل میں سے پلازمڈ نکالا جاتا ہے۔ پلازمڈ کے DNA کو کاٹا جاتا ہے۔ ڈونر کے جین کو پلازمڈ کے ٹوٹے ہوئے کناروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب پلازمڈ اپنے DNA اور نئے DNA (ڈونر کا جین) کا مجموعہ بن چکا ہوتا ہے۔ اسے ری کمبی نیٹ DNA (recombinant DNA) کہتے ہیں۔
- 3- ری کمبی نیٹ DNA کو بیکٹیریا کے ایک سیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جب بیکٹیریا کا سیل تقسیم ہو کر سیلز کی ایک کالونی (colony) بناتا ہے تو جینیاتی طور پر تبدیل شدہ تمام نئے بیکٹیریا میں ری کمبی نیٹ DNA موجود ہوتا ہے۔ اس طرح، بیکٹیریا کی کالونی میں ڈونر کے جین کی بہت سی نقول ہوتی ہیں۔ اس مرحلے کو جین کی کلوننگ (gene cloning) بھی کہتے ہیں۔



شکل 8.1: بیکیٹیریا میں جین کی منتقلی اور اس کی کلوننگ

جین کی منتقلی کی مثالیں (Examples of Gene Transfer)

- 1- انسانی انسولین کا جین ایک بیکیٹیریم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تبدیل شدہ بیکیٹیریا انسولین بناتے ہیں، جسے حاصل کر کے ذیابیطس (diabetes) کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2- جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیکیٹیریا میں انسانی گروتھ ہارمون تیار کیا جاتا ہے۔ گروتھ ہارمون کو بونا پن (dwarfism) کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 3- جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیکیٹیریا سے اینٹی وائرس (anti-virus) پروٹین انٹرفیرون (interferon) بنائی جاتی ہے۔
- 4- جین تھیراپی (gene therapy) میں مریض کے سیلز میں مطلوبہ جینز داخل کیے جاتے ہیں۔ یہ تھیراپی خون کی وراثی بیماریوں مثلاً تھیلیسیمیہ (thalassaemia) کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

کووڈ-19 (COVID-19) کی کچھ ویکسینز ایم آر این اے (mRNA) استعمال کر کے بنائی جاتی ہیں۔ یہ ایم آر این اے جسم کو کورونا وائرس (Corona Virus) کی ایک غیر نقصان دہ پروٹین بنانے کی ہدایت دیتا ہے۔ ایسی پروٹین بنانے سے ہمارے مدافعتی نظام (immune system) کی اصل وائرس سے لڑنے کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔

- 5- بیسٹ میں جینیاتی تبدیلی کر کے ہیپاٹائٹس بی وائرس (Hepatitis B virus) کے خلاف ویکسین تیار کی گئی ہے۔
- 6- بیکٹیریم سے جین کپاس اور مکئی کی فصلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جینیاتی طور پر تبدیل شدہ یہ فصلیں ایک قدرتی زہر (toxin) پیدا کرتی ہیں جو کیڑوں کو مار دیتا ہے لیکن انسانوں کے لیے محفوظ ہے۔
- 7- بیکٹیریم سے جین چاول کے پودوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ چاول بیٹا کیروٹین (Beta-carotene) پیدا کرتے ہیں، جسے جسم وٹامن اے (Vitamin A) میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح کے تبدیل شدہ چاول وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہونے والے اندھے پن (blindness) کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔



شکل 8.2: گولڈن چاول اور سفید چاول

نیمبل 8.1: جین ٹرانسفر کے ذریعے تیار کردہ پروڈکٹس

پروڈکٹ	ٹرانسفر کیا گیا جینیاتی مواد	جاندار یا استعمال شدہ تکنیک	مقصد
انسولین (Insulin)	انسانی انسولین جین	بیکٹیریا	ذیابیطس کا علاج
گروتھ ہارمون	انسانی گروتھ ہارمون جین	بیکٹیریا	نشو و نما میں خرابی کا علاج
انٹرفیرون	انسانی انٹرفیرون جین	بیکٹیریا	وائرسز کا علاج اور قوت مدافعت کو بڑھانا
ہیپاٹائٹس بی ویکسین	ہیپاٹائٹس بی وائرس کی سطحی پروٹین کا جین	پیسٹ سیلز	ہیپاٹائٹس بی سے بچاؤ
بی ٹی فصل	بی ٹی ٹاکسن جین	کپاس، مکئی	کیڑوں کے خلاف مزاحمت
گولڈن رائس	بیٹا کیروٹین (Beta-carotene) بنانے والے جینز	چاول کے پودے	وٹامن اے کی کمی سے بچاؤ

8.3 بائیوٹیکنالوجی کے اطلاقی (APPLICATIONS OF BIOTECHNOLOGY)

بائیوٹیکنالوجی کے اطلاقی مندرجہ ذیل ہیں:

1- فوڈ بائیوٹیکنالوجی (Food Biotechnology)

پاکستان میں ریسرچ کی بدولت چاول کی ایسی وراثی تیار کی گئی ہیں جو مخصوص بیماریوں اور کیڑوں (pests) کے خلاف مزاحم ہیں۔

پاکستان نے نشو و نما کی بائیوٹیکنالوجی (tissue culture technology) کو بھی ترقی دی ہے تاکہ زیادہ پیداوار دینے والی پھلوں کی فصلوں جیسے آم اور سٹرس (Citrus) کی بڑی مقدار میں تولید (propagation) کی جاسکے۔

- بائیوٹیکنالوجسٹس نے کئی فصلی پودوں کی ایسی وراثی تیار کی ہیں جو وائرس، کیڑوں (pest) اور خشک سالی کے خلاف مزاحم (resistant) ہیں۔
- مخصوص خوردبینی جانداروں (microbes) سے نکالے گئے

ایزائم مختلف صنعتوں میں الکحل (alcohol) کی تیاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

2- میڈیکل بائیوٹیکنالوجی (Medical Biotechnology)

میڈیکل کے میدان میں، بائیوٹیکنالوجی مندرجہ ذیل طریقوں سے مدد کر رہی ہے:

- مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے ہارمونز اور انسانوں میں، 3500 سے زیادہ بیماریاں (disorders) جینز میں خامیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بائیوٹیکنالوجسٹس بائیوٹیکنالوجی کے ذریعے ایسی بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
- وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار کرنا۔
- موروثی بیماریوں کے ذمہ دار خراب جینز کو درست کرنا۔
- بیماری کی تشخیص (diagnosis) اور علاج کے لیے مطلوبہ اینٹی باڈیز (antibodies) تیار کرنا۔
- موروثی بیماریوں اور جینیٹک صورت حال (genetic conditions) کی جلد شناخت کرنا۔

3- ماحولیاتی بائیوٹیکنالوجی (Environmental Biotechnology)

- انوائرمینٹل بائیوٹیکنالوجی سے مراد ماحول کی حفاظت اور بہتری کے لیے بائیولوجیکل جاندار کا استعمال ہے۔
- بائیوریمیڈی ایشن (bioremediation) سے مراد مختلف جانداروں جیسے کہ بیکٹیریا، پودے، یا فنجائی کا استعمال کرتے ہوئے ماحول سے آلودہ کار (pollutants) کو ہٹانا یا ان کے اثر کو زائل (neutralize) کرنا ہے۔ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیکٹیریا بے کار مواد اور صنعتوں سے نکلنے والے پانیوں (industrial discharge) میں موجود نقصان دہ کیمیکلز کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
- نشوونما (tissue culture) کے ذریعے بڑی تعداد میں مختلف پودوں کے نہال پودے (saplings) تیار کی جاتی ہیں۔ یہ سپلانگ محدود وقت میں نئے جنگلات اگانے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔
- تبدیل شدہ بیکٹیریا مختلف منزلاً کا پر (copper) اور یورینیم (uranium) نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔
- خوردبینی جاندار جیسے کہ بیکٹیریا۔ بلیو گرین الگی (blue green algae) اور فنجائی کو کھاد (manure) تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



شکل 8.2: جنگل اگانے کے لیے سپلانگ

4- سمندری بائیوٹیکنالوجی (Marine Biotechnology)

- اس میں نئے پروڈکٹس، علاج (treatments)، اور ٹیکنیکس (technologies) تیار کرنے کے لیے سمندری جانداروں کا استعمال شامل ہے۔ مثال کے طور پر:
- بہت سی مچھلیوں میں جینیاتی تبدیلیوں موڈیفیکیشنز (genetic modifications) سے اُن کی تیز نشوونما ممکن ہوئی ہے۔
- سمندری جاندار مثلاً سپونجز (sponges)، کورلز (corals)، اور سمندری بیکٹیریا (marine bacteria) سے نکالے گئے
- مَرکبات کو کینسر کی نئی ڈرگز (cancer drugs)، اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی وائرل ادویات تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- مخصوص سمندری بیکٹیریا سمندری رُسے والے تیل یعنی آئل سپلز (oil spills) کو توڑنے (degrade) کرنے کے لیے استعمال

ہوتے ہیں۔ اس سے جو سمندری ماحول کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے۔

- بڑی مقدار میں سمندری ایلگی (marine algae) کو کاشت کیا جاتا ہے۔ اس الگی پر مختلف عمل کر کے ان سے بائیوڈیزل (biodiesel)، استھانول (ethanol)، اور دیگر قسم کی قابل تجدید توانائی (renewable energy) حاصل کی جاتی ہے۔
- سمندری جانداروں سے نکالے گئے اینزائمز مختلف صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، سمندری بیکٹیریا سے حاصل کیا گیا ایک اینزائم استعمال کر کے زیادہ فرکٹوز والا کارن سیرپ (High-Fructose Corn Syrup) بنایا جاتا ہے جو فوڈ انڈسٹری میں ایک عام استعمال کی جانے والی مٹھاس (sweetener) ہے۔

5- صنعتی بائیوٹیکنالوجی (Industrial Biotechnology)

- صنعتی بائیوٹیکنالوجی (Industrial Biotechnology) کے اہم استعمالات (Applications) مندرجہ ذیل ہیں:
- استھانول، بائیوڈیزل (biodiesel)، اور بائیوگیس (Biogas) جیسے بائیو فیولز (biofuels) تیار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، پیسٹ کا استعمال کر کے فصلوں (کئی، گنا) سے حاصل کردہ شوگرز کی استھانول میں فرمینٹیشن کی جاتی ہے۔ یہ استھانول پٹرول کے ساتھ ملا کر ایک زیادہ صاف ایندھن تیار کیا جاسکتا ہے۔
- پودے (عام طور پر کئی یا گنے) کی فرمینٹیشن کی گئی سٹارچ کو استعمال کر کے بائیوڈیگریڈیبل (biodegradable) پلاسٹک تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے بائیو پلاسٹک (bioplastic) کہتے ہیں۔
- خوردبینی جانداروں (microbes) کے ذریعے فرمینٹیشن اور جینیٹک انجینئرنگ کر کے فارماسیوٹیکل (pharmaceutical) پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اینٹی بائیوٹکس جیسے پینسلین (penicillin) کی تیاری میں مخصوص مولڈز (molds) جیسے "پینسیلیم" (Penicillium) کی فرمینٹیشن شامل ہے۔ اسی طرح، بیکٹیریا سے انسانی انسولین تیار کی جاتی ہے۔

8.4 بائیوٹیکنالوجی کے ممکنہ خطرناک (POTENTIAL RISKS OF BIOTECHNOLOGY)

صحت سے متعلق خدشات (Health Concerns): کچھ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خوراک کھانے سے الرجک ری ایکشنز (allergic reactions) یا صحت کے طویل مدتی مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ تشویش بھی ہے کہ نئے جینز انسانی سیلز کے ساتھ غیر متوقع طریقوں سے باہمی عمل کر سکتے ہیں۔

ماحولیاتی اثرات (Environmental Impact): جینیاتی طور پر تبدیل شدہ پودے (Genetically Modified Plants) بعض اوقات جنگلی پودوں کے ساتھ کراس پولی نیشن کر سکتے ہیں۔ اس طرح، تبدیل شدہ جینز قدرتی ماحولیاتی نظام (ecosystem) میں پھیل سکتے ہیں۔ یہ ایسی سی شیز (species) کی تخلیق کا باعث بن سکتا ہے جو ماحول کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔

بائیوڈائیورسٹی کا نقصان (Loss of Biodiversity): اگر کاشتکارز زیادہ تر جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلیں اگائیں گے تو روایتی اور قدرتی طور پر متنوع اقسام نایاب یا ناپید (extinct) ہو سکتی ہیں۔ اس سے بائیوڈائیورسٹی میں کمی آ سکتی ہے۔

مزاحم کیڑوں اور خورد روپوں کی نمو (Development of Resistant Pests and Weeds): ایسے کیڑے

(pests) جو تبدیل شدہ فصلوں پر بار بار حملہ کریں وہ ارتقا پا کر ”طافور کیڑوں“ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایسے کیڑے فصلوں کے اندر موجود مدافعتی سسٹم سے مزید متاثر نہیں ہوتے ہیں۔

اخلاقی مسائل (Ethical Issues): بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ زندہ جانداروں کے قدرتی جینز کو تبدیل کرنا اخلاقی طور پر غلط ہے۔

مشق

A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں۔

- 1- جینیٹک انجینئرنگ میں پروڈکٹس تیار کرنے کے لیے عام طور پر بیکٹیریا کو ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟
 (الف) وہ قدرتی طور پر مطلوبہ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں (ب) وہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور انسانی جینز کو قبول کرتے ہیں
 (ج) وہ تمام انفیکشنز کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں (د) ان کا امیون سسٹم انسانوں جیسا ہوتا ہے
- 2- جینیٹک انجینئرنگ میں پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟
 (الف) DNA کو جاندار میں داخل کرنا (ب) DNA میں سے مطلوبہ جین کا ٹکڑا
 (ج) تبدیل شدہ جاندار کی ٹیو کرانا (د) جین سے پروٹینز بنوانا
- 3- ان میں سے کون جینیٹک انجینئرنگ میں ویکٹر کے طور پر اکثر استعمال ہوتا ہے؟
 (الف) وائرس (ب) فنجائی (ج) پیسٹ (د) خون کا (بلڈ) سیل
- 4- جینیٹک انجینئرنگ میں، مطلوبہ جین کو عام طور پر بیکٹیریم میں کس چیز کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے؟
 (الف) پروٹین (ب) ایک اور بیکٹیریم (ج) ویکٹر (د) اینزائمز
- 5- جینیٹک انجینئرنگ میں، جین ڈالنے کے بعد میزبان سیل (host cell) کو اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ:
 (الف) بے ترتیب طور پر اپنے جینز میں تبدیلی (mutation) کرے (ب) قدرتی طور پر مرجائے
 (ج) تقسیم ہو اور جین کا اظہار کرے (د) بے کار مادے پیدا کرے
- 6- جینیٹک انجینئرنگ میں ”ری کومبینینٹ ڈی این اے“ (recombinant DNA) کا کیا مطلب ہے؟
 (الف) قدرتی ڈی این اے (ب) غلطی سے کاپی کیا گیا ڈی این اے
 (ج) دو ذرائع سے جوڑا گیا ڈی این اے (د) اینزائمز کے ذریعے توڑا گیا ڈی این اے
- 7- زہر (toxin) پیدا کرنے والا جین کسی پودے میں کس لیے ڈالا جاتا ہے؟
 (الف) پانی کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے (ب) وٹامن کی مقدار بڑھانے کے لیے
 (ج) کیڑوں کے حملوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے (د) پھول آنے کی رفتار تیز کرنے کے لیے
- 8- جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیکٹیریا یا مندرجہ ذیل پروڈکٹس میں سے کون سی چیز تیار نہیں کرتے؟
 (الف) ہیپاٹائٹس بی ویکسین (ب) گروتھ ہارمون (ج) انسولین (د) انٹرفیرون

9۔ بائیو ٹیکنالوجی کی کون سی پروڈکٹس وائرل انفیکشنز کے خلاف مدد کرتی ہیں؟


(الف) اینٹی بائیوٹکس (ب) ویکسینز (ج) کلائنگ فیکٹرز (د) گروتھ ہارمون

10۔ گولڈن چاول ایک جینیاتی طور پر تبدیل شدہ پودا ہے۔ یہ پودا کس چیز کو بڑھانے کے لیے ہے؟

(الف) پروٹین (ب) وٹامن اے (ج) آئرن (د) کیلشیم

B مختصر جوابات لکھیں۔

- 1۔ بائیو ٹیکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ میں کیا تعلق ہے؟
- 2۔ پلازمڈ کیا ہے؟ بائیو لوجسٹس جینیٹک انجینئرنگ میں پلازمڈز کہاں استعمال کرتے ہیں؟
- 3۔ مندرجہ ذیل ڈایا گرام ظاہر کرتی ہے کہ ایک جین کو بیکٹیریا کے سیل میں کیسے منتقل کیا جاتا ہے۔ ان ساختوں کو پہچانیے جن پر 1 سے 5 تک لیبل لگا ہوا ہے۔



- 4۔ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جاندار سے کیا مراد ہے؟
- 5۔ دو طرح کی طبی مصنوعات لکھیں جو جینیٹک انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے تیار کی جاسکتی ہیں۔
- 6۔ دو طریقوں کے نام بتائیں جن کے ذریعے جینیٹک انجینئرنگ فصلوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔

C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1۔ مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں کہ فوڈ بائیو ٹیکنالوجی نے زراعت کو ترقی دی ہے۔
- 2۔ مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں کہ میڈیکل بائیو ٹیکنالوجی نے ذیابیطس (diabetic) اور کینسر کے معاملہ میں حفظانِ صحت کو ترقی سی ہے۔
- 3۔ بریڈ اور ایتھانول کی تیاری میں بیسٹ کے کردار کی وضاحت کریں۔
- 4۔ ایک انسانی جین کو بیکٹیریا کے ایک سیل میں منتقل کرنے کے مراحل کی فہرست بنائیں۔
- 5۔ جین ایڈیٹنگ کے فوائد بیان کریں۔
- 6۔ جینیاتی موڈیفیکیشن کے ممکنہ خطرات پر بحث کریں۔

D انکشافی سوالات

- 1۔ کسی پودے میں جین داخل کرنے سے اسے کیڑوں کے خلاف مزاحم (pest-resistant) کیسے بنایا جاسکتا ہے؟
- 2۔ بائیو ٹیکنالوجی کس طرح تیزی سے ویکسینز تیار کرنے میں مدد کر سکتی ہے، جیسا کہ کووڈ-19 (COVID-19) کے لیے کیا گیا؟
- 3۔ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ غذاؤں کے صحت پر پڑنے والے اثرات کا احتیاط سے مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے؟

بیماریاں اور امیونٹی (DISEASES AND IMMUNITY)

حاصلاتِ تعلّم



اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- متعدی (Infections) اور غیر متعدی (non-infectious) بیماریوں اور ان کی اقسام کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔
- حیوانوں سے انسانوں میں منتقل ہونے والے یعنی زونوٹک بیماریوں (zoonotic diseases) کی تعریف کریں اور ان کی اقسام بتائیں۔
- ویکٹر سے پھیلنے والے بیماریوں (vector borne diseases) کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔
- الرجیز (allergies) اور ان کی چند عام اقسام کی فہرست بنائیں۔

انسانی جسم ایک پیچیدہ نظام ہے جسے صحت اور افعال کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ یہ مسلسل ممکنہ خطرات کا سامنا کرتا ہے۔ یہ خطرات مختلف شکلوں میں آتے ہیں جن میں مائیکرو آرگنزمز، موروٹی بیماریاں، ماحولیاتی اثرات اور لائف۔ اسٹائل چوائسز شامل ہیں۔ اس باب میں، ہم بیماریوں کی نوعیت اور بیماریوں کے عالمی ادارہ صحت (ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن) کے مطابق، "صحت سے مراد مکمل جسمانی، ذہنی اور معاشرتی بہتری (well-being) کی ایک حالت ہے نہ کہ محض بیماری یا اعلاّت کی عدم موجودگی۔"

9.1 بیماری (DISEASE)

بیماری سے مراد ایک مخصوص حالت ہے جو جسم یا ذہنی کے عام (normal) فعل کو متاثر کرے۔ بیماری جسمانی حالات کے ایک وسیع سلسلہ کا احاطہ کرتی ہے جو مختلف سسٹمز کو متاثر کرتے ہیں۔ بیماریوں کی مثالوں میں انفیکشنز، میٹابولک (metabolic) بیماریاں، آٹو-امیون (autoimmune) بیماریاں، اور وراثتی (genetic) بیماریاں شامل ہیں۔ اصطلاح "علاقت (illness)" کا مطلب بیماری کی وجہ سے غیر صحت مند ہونے کا ذاتی (subjective) تجربہ ہے۔ اس میں فرد کا اپنی صحت کی حالت کے بارے میں تصور اور رد عمل شامل ہے۔

بیماری کی بنیادی اقسام (Basic Types of Diseases)

1- متعدی بیماریاں (انفیکشنز) Infectious Diseases (Infections)

یہ قابل انتقال یعنی متعدی (جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں یا ماحول سے شخص میں پھیل سکتی ہیں) ہیں۔ انفیکشن والی بیماریاں نقصان دہ جاندار یعنی پتھوجنز (pathogens) کے جسم میں داخل ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔

عام پتھوجنز میں وائرسز، بیکٹیریا، فنجائی، پیراسائٹک پروٹوزوز (protozoans) مثلاً، انفیکشن مقامی (localized) بھی ہو سکتے ہیں مثلاً چلد کے انفیکشن اور سسٹمک (systemic) بھی مثلاً ایسے انفیکشن جو ایک سے زیادہ آرگنز کو متاثر کرتے ہیں۔

• **وائرس سے پیدا شدہ بیماریاں (viral infections):** مثلاً ہیپاٹائٹس (hepatitis)، فلو (flu)، ڈینگی (dengue)، خسرہ (measles)، ایچ آئی وی (HIV)، اور کوویڈ-19 (Covid-19)۔

• **بیکٹیریا سے پیدا شدہ بیماریاں (bacterial infections):** مثلاً ٹائیفائیڈ (typhoid)، حلق کی سوزش (strep throat)، ہیضہ (cholera)، ٹی بی (tuberculosis)۔

• **فنجائی سے پیدا شدہ بیماریاں (fungal infections):** مثلاً کینڈی ڈیاس (candidiasis) جس کا ذمہ دار ایک پیسٹ (yeast) ہے۔

• **پیراسائٹک پروٹوزوز سے پیدا شدہ بیماریاں (parasitic protozoans infections):** مثلاً ملیریا، امیبائیس (amoebiasis)۔

• **پیراسائٹک کیڑوں سے تیار شدہ بیماریاں (parasitic worms infections):** مثلاً راؤنڈ ورم (round worm)، ٹیپ ورم (tapeworm) انفیکشنز۔

2- غیر متعدی بیماریاں (Non-Infectious Diseases)

ڈیابیطس اور کینسر صرف لائف-سٹائل چوائسز کی وجہ سے نہیں ہوتیں۔ ان بیماریوں کی وراثی بنیاد بھی ہوتی ہے۔ تاہم، لائف-سٹائل چوائسز ایسی بیماریوں کے آغاز میں تاخیر کر سکتی ہیں۔

یہ ناقابل انتقال یعنی غیر متعدی بیماریاں ہیں (جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتیں)۔ ایسی بیماریاں موروثیت (heredity)، غیر صحت بخش رہن سہن، ماحولیاتی عوامل اور عمر رسیدگی (aging) وغیرہ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کی مثالیں یہ ہیں:

- بہت سی غیر متعدی بیماریاں غیر صحت بخش رہن سہن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں دل کی بیماریاں، ہائپرٹینشن (hypertension)، ذیابیطس (diabetes)، کینسر (cancer)، اور سٹروک (stroke) شامل ہیں۔ ذہنی بیماریاں (mental health diseases) جیسے کہ ڈپریشن (depression) بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔
- وراثی بیماریاں جینز یا کروموسومز میں خرابی (abnormality) کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مثلاً ہیمو فیلیا (hemophilia)، تھیلیمیسیا (thalassemia)، اور مسکولر ڈسٹروفی (muscular dystrophy)۔
- کچھ غیر متعدی بیماریاں عمر رسیدگی یا دیگر عوامل کی وجہ سے جسمانی آرگنز یا ٹشوز کے تدریجی زوال (gradual decline) کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً آلزائمرز (Alzheimer's disease)، پارکینسنز (Parkinson's disease)، اور آرٹھرائٹس (arthritis)۔

دوسری اقسام کی بیماریاں (Other Types of Diseases)

1- زونوٹک بیماریاں (Zoonotic Diseases)

ایک متعدی بیماری جو قدرتی طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے، زونوٹک بیماری (zoonotic disease) کہلاتی ہے۔ زونوٹک پتھوجنز میں بیکٹیریا، وائرس یا دیگر پیراسائٹس شامل ہو سکتے ہیں۔ انسان میں زونوٹک پتھوجنز جانوروں کے ساتھ براہ راست رابطے سے یا خوراک، پانی یا ماحول کے ذریعے منتقل ہو سکتے ہیں۔ زونوٹک بیماریوں کی مثالوں میں شامل ہیں:

- (الف) **اینٹھراکس (Anthrax):** یہ انفیکشن ایک بیکٹیریئم بیسیلیس اینٹھریس (*Bacillus anthracis*) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انفیکشن کا مقام جلد، پھیپھڑے یا ڈائجسٹو سسٹم ہو سکتا ہے۔ اینٹھراکس آلودہ جانوروں کی مصنوعات (مثلاً، کھالیں، اون) کے ساتھ رابطے کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ عام طور پر، اینٹھراکس کے بیکٹیریا جلد کے زخم کے ذریعے، آلودہ گوشت کھانے سے یا بیکٹیریا کے سپورز (spores) کو سانس کے ذریعے اندر لینے سے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔

- (ب) **برڈ فلو یعنی ایوین انفلوئنزا (Bird flu or Avian Influenza):** یہ انفیکشن انفلوئنزا اے (influenza A) وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ناک، گلا اور پھیپھڑوں میں ہوتا ہے۔ انسانوں میں برڈ فلو متاثرہ (infected) پرندوں کے ساتھ قریبی رابطے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔


(ج) ایبولا (Ebola): یہ انفیکشن ایبولا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو جسم میں جگر، امیون سسٹم، اور بلڈ ویسلز سمیت مختلف مقامات کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ وائرس متاثرہ انسانوں یا جانوروں کے جسمانی فلوئڈز، جیسے کہ خون سے براہ راست رابطے کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ آلودہ اشیاء سے رابطے کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔



میسلس اینتھریس



انفلوئنزا وائرس



ایبولا وائرس

شکل 9.1: انتھراکس، برڈ فلو، اور ایبولا کے سبب بننے والے جاندار

2- ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریاں (Vector-Borne Diseases)

یہ وہ بیماریاں ہیں جو ویکٹرز کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ ویکٹرز ایسے جاندار ہیں جو پتھرو جنس کو ایک میزبان سے دوسرے میزبان تک لے جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں بیکٹیریا، وائرسز یا دیگر پیراسائٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ مثلاً:



اینوفلیز مچھر



ایڈیز مچھر



چمڑی



ہیماگوگس مچھر

- 1- ملیریا (Malaria): یہ ایک پیراسائٹک پروٹوزون یعنی پلازموڈیم (Plasmodium) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جگر اور پھر ریڈ بلڈ سیلز کو متاثر کرتا ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ آرگن کو بے کار کر سکتا ہے۔ یہ اینوفلیز (Anopheles) مچھر کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے۔
- 2- ڈینگی بخار (Dengue Fever): یہ ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈینگی وائرس ایڈیز (Aedes) مچھر کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار جلد، بلڈ ویسلز، اور لمف نوڈز (lymph nodes) سمیت کئی آرگنز کو متاثر کرتا ہے۔

3- لائم کی بیماری (Lyme Disease): یہ انفیکشن بیکٹیریا بورلیا برگنڈورفیری (Borrelia burgdorferi) کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا پیراسائٹ چمڑی (tick) کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ انفیکشن جلد، جوڑوں اور نروس سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔

- 4- زرد بخار (Yellow Fever): یہ بخار وائرس کی وجہ سے ہونے والا ایک انفیکشن ہے۔ اس کا وائرس ایڈیز (Aedes) یا ہیماگوگس (Haemagogus) مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ انفیکشن ابتدائی طور پر جگر کو متاثر کرتا ہے، پھر گردوں، دل، اور نروس سسٹم کو بھی متاثر کرتا ہے۔

شکل 9.2: بیماریاں پھیلانے والے چند ویکٹرز

3۔ الرجیز (Allergies)

الرجی جسم کا ایک ابنا بل مدافعتی رد عمل ہے یہ رد عمل ایسے بیرونی مادے (foreign substance) کے خلاف ہوتا ہے جو عام طور پر جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ بیرونی مادے جو الرجی کا سبب بنتے ہیں الرجین (allergen) کہلاتے ہیں۔ عام الرجینز میں پالین (pollen)، ڈسٹ مائش (dust mites)، کچھ مخصوص غذائیں، کیڑوں کے ڈنک، اور کچھ مخصوص ادویات شامل ہیں۔

الرجینز کے خلاف مدافعتی نظام کے رد عمل کے دوران سوزشی (inflammatory) کیمیکلز جیسے کہ ہسٹامین (histamine) خارج ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایسی علامات پیدا ہوتی ہیں جو جلد، ریسپریٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، اور کارڈیو ویکسٹری سسٹم کو متاثر کرتی ہیں۔

الرجیز کی اقسام (Types of Allergies)

1۔ ریسپریٹری الرجیز (Respiratory Allergies)

- **الرجک رائٹائس یا یہ فیور (Allergic Rhinitis or Hay Fever):** یہ ہوا میں موجود الرجینز جیسے کہ پالین، ڈسٹ مائش وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علامات میں چھینک، خارش، ناک بند ہو جانا، اور بہتی ہوئی ناک شامل ہیں۔
- **دمہ (Asthma):** یہ ایک دائمی حالت ہے جس میں مختلف الرجینز کا سامنا ہونے پر سانس کی نالیوں میں سوزش اور تنگی ہو جاتی ہے۔
- الرجینز میں امونیا، دھوئیں لیکس (latex)، پیسٹی سائڈز (pesticides)، دھات یا لکڑی کی دھول (dust) وغیرہ شامل ہیں۔
- الرجینز میں امونیا، دھوئیں لیکس (latex)، پیسٹی سائڈز (pesticides)، دھات یا لکڑی کی دھول (dust) وغیرہ شامل ہیں۔
- دمہ کے حملہ میں گھر گھر اہٹ (wheezing)، سانس کی قلت، سینے میں جکڑن اور کھانسی ہوتی ہے۔

2۔ جلد کی الرجیز (Skin Allergies)

- **ایگزیم یا یعنی ایٹوپک ڈرماٹائس (Eczema or Atopic Dermatitis):** جلد کی ایک دائمی حالت ہے جس میں جلد پر خارش دار، سوزشی دھبے (inflamed patches) سے ہوتے ہیں۔ کئی الرجینز ایگزیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ڈسٹ مائش، پالین، پالتو جانوروں کی جلد کے چھلکے، مولڈ (mold) کے سپورز، مخصوص کپڑے (فیبرکس)، دھاتیں وغیرہ۔
- **کانٹیکٹ ڈرماٹائس (Contact Dermatitis):** یہ جلد کا رد عمل ہے جو مختلف الرجینز جیسے کہ نکل (nickel)، لیکس، یا مخصوص پودوں کے ساتھ براہ راست رابطے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ علامات میں سرخی، خارش، اور چھالے شامل ہیں۔

3۔ غذائی الرجیز (Food Allergies)

- **عام غذائی الرجیز (Common Food Allergies):** یہ ہلکی علامات (جیسے خارش اور سوجن) سے لے کر شدید علامات (جیسے سانس لینے میں دشواری، ہوش و حواس کا کھو جانا وغیرہ) تک ہو سکتی ہیں۔ الرجینز میں مونگ پھلی، گری دار پھل (tree nuts)، شیل فیش (shellfish)، مچھلی، دودھ، انڈے، سویا، اور گندم ہو سکتے ہیں۔

4۔ حشرات کے ڈنک سے ہونے والی الرجیز (Insect Sting Allergies)

زہر کے الرجیز (Venom Allergens): شہد کی مکھی، بھڑ، اور چیونٹی کے ڈنک سے بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ ان الرجیز میں مقامی درد اور سوجن، چھپا کی (hives) اور شدید کیسز میں، اینا فلکسیسز (anaphylaxis) ہوتے ہیں۔

5۔ ادویات سے ہونے والی الرجیز (Drug Allergies)

ادویات سے ہونے والی عام الرجیز (Common Drug Allergies): یہ ہلکے دھبے (rashes) اور خارش سے لے کر شدید انا فائلک ری ایکشنز تک ہو سکتی ہیں۔ الرجیز مخصوص اینٹی بائیوٹکس، ایسپرین (aspirin)، اور نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز (NSAIDs: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) ہو سکتے ہیں۔

9.2 پتھوجن (PATHOGENS)

پتھوجن ایک مائیکرو آرگنزم یا اینٹ ہے جو اپنے میزبان میں بیماری کا سبب بنتا ہے۔ پتھوجن جنز میں وائرسز، بیکٹیریا، فنجائی، اور دیگر پیراسائٹس (مثلاً پلازموڈیم) شامل ہیں۔ پتھوجن کی ہر قسم جسم کے ساتھ ایک منفرد انداز میں تعامل کرتی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف اقسام کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

پتھوجن پانچ بڑے طریقوں سے انسانوں میں پھیل سکتے ہیں، یعنی ہوا، خوراک، پانی، شخص بہ شخص رابطہ، اور جانوروں کے کاٹنا۔

پتھوجن کی اقسام مندرجہ ذیل ٹیبل میں درج ہیں۔

ٹیبل 9.1: پتھوجن کی اقسام		
عام منتقلی کا طریقہ	ہونے والی بیماری	پتھوجن کی قسم اور مثالیں
وائرسز (Viruses)		
ہوا میں موجود قطروں؛ براہ راست رابطہ	فلو یعنی انفلوئنزا (Influenza)	انفلوئنزا وائرس (Influenza virus)
جنسی رابطہ؛ خون کی منتقلی؛ سوئیوں کا اشتراک	ایڈز (AIDS)	ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس Human Immuno-deficiency Virus
ہوا میں قطروں؛ جلد کا رابطہ	کووڈ-19 (Covid-19)	سارس کوو-2 (SARS-Cov-2)
بیکٹیریا (Bacteria)		
سانس کے قطروں؛ براہ راست رابطہ	حلق کی سوزش (Strep Throat)	سٹرپٹوکوکس پاروڈینز (Streptococcus pyogenes)
ہوا میں موجود قطروں	تپ دق یعنی ٹیوبریکولوسس (ٹی بی)	مائیکو بیکٹیریم ٹیوبریکولوسس (Mycobacterium tuberculosis)
آلودہ خوراک/پانی	فوڈ پوائزنگ (Food Poisoning)	ایشریکیا کولائی (Escherichia coli)

فنجائی (Fungi)

کینڈیڈا ایلبی کینز (Candida albicans)	پیٹ کا انفیکشن یعنی کینڈیڈیا سس (Candidiasis)	گرم مرطوب علاقہ میں فنجائی کی نمو؛ براہ راست رابطہ
ٹینیا پیڈیز (Tinea pedis)	ایٹھلیٹ فٹ (Athlete's Foot)	آلودہ سطح (مٹی وغیرہ)
ایسپر جیلز فیومی گیس (Aspergillus fumigatus)	ایسپر جیلوس (Aspergillosis)	فنجائی کے سپورز کا سانس میں لے جانا

پیراسٹک پروٹسٹس (Parasitic protists)

پلازموڈیم فیلپسیرم (Plasmodium falciparum)	ملیریا (Malaria)	اینوفلیز مچھر کا کاٹنا
جیارڈیا لیمبلیا (Giardia lamblia)	جیارڈیا سس (Giardiasis)	آلودہ خوراک/پانی
اینٹامیبا ہسٹولائیٹیکا (Entamoeba histolytica)	امیبائیس (Amoebiasis)	آلودہ خوراک/پانی

نوٹ: بہت سے ان ورتھیرس بھی پتھوجن کے طور پر رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ٹیپ وارم اور راءنڈ وارم ایسے ان ورتھیرس ہیں جو انسانی آنت (انٹسٹائن) میں رہتے ہیں اور انفیکشنز کا سبب بنتے ہیں۔

9.3 قوت مدافعت (IMMUNITY)

قوت مدافعت (immunity) بیماری پیدا کرنے والے آرگنزمز کے خلاف جسم کی اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہے۔ امیونٹی کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں:

- 1- **پیدائشی قوت مدافعت (Innate Immunity):** یہ امیونٹی پیدائش کے وقت سے ہی جسم میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس (first line of defence) اور سیکنڈ لائن آف ڈیفنس (second line of defence) شامل ہیں۔
- 2- **حاصل شدہ امیونٹی (Acquired Immunity):** یہ امیونٹی زندگی کے دوران حاصل کی جاتی ہے۔ اس میں تھرڈ لائن آف ڈیفنس (third line of defence) شامل ہے۔

فرسٹ لائن آف ڈیفنس (First Line of Defence)


یہ کسی بھی پتھوجن کے خلاف غیر مخصوص دفاع ہے، قطع نظر اس کے کہ پتھوجن کی شناخت کیا ہے۔ اس میں جلد اور میوکس میمبرین (mucous membrane) شامل ہیں۔

- 1- جلد پتھوجن کے لیے ایک فزیکل بیریز (barrier) کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، جلد میں موجود آئل اور پسینہ کے گلینڈز بہت سے مائیکروبز کی نشوونما کو روکتے ہیں۔
- 2- میوکس میمبرینز مخصوص اپی تھیلیل ٹشوز (epithelial tissues) ہیں۔ یہ میمبرینز جسم کی اندرونی سطحوں مثلاً ریسپریٹری اور ڈائجسٹو

سسٹمز، یوریتھر اوغیرہ کی حفاظت کرتی ہیں۔ میوکس میمبرینز میوکس خارج کرتی ہیں جو پتھو جنز کو پھنسا لیتا ہے۔

سیکنڈ لائن آف ڈیفنس (Second Line of Defence)

سیکنڈ لائن بھی ایک غیر مخصوص دفاع ہے۔ مثلاً:



شکل 9.3: مائیکروبز پر حملہ کرتا ہوا ایک میکروفج

1۔ خون کے قاتل سیلز (کھریسلرز killer cells): خون میں گشت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

• میکروفج (Macrophages): یہ وائٹ بلڈ سیلز کی ایک قسم مونوسائٹس (monocytes) سے ٹوپا تے ہیں۔ ان کا کام نقصان دہ بیکٹیریا کو کھالینا اور انہیں ماردینا ہے۔

• نیوٹروفیلز (Neutrophils): یہ وائٹ بلڈ سیلز کی ایک قسم ہیں۔ یہ فیکوسائٹوسس (phagocytosis) کرتے ہیں یعنی پتھو جن کو نگل

کرماتے ہیں۔ یہ پتھو جنز پر مارنے والے کیمیکلز بھی خارج کرتے ہیں۔ یہ فائبرز کا ایک جال بھی خارج کرتے ہیں جو پتھو جنز کے ساتھ بندھ جاتا ہے اور انہیں ماردیتا ہے۔

• نیچرل کھریسلرز (Natural Kill Cells): یہ ٹی۔ لمفوسائٹس (T-lymphocytes) کی ایک قسم ہیں۔ یہ جسم کے ان سیلز کو مار دیتے ہیں جن میں پتھو جنز کا انفیکشن ہو چکا ہو۔ یہ کینسر سیلز کا بھی پتہ لگاتے ہیں اور انہیں ماردیتے ہیں۔

2۔ حفاظتی یعنی پروٹیکٹو (protective) پروٹینز بھی غیر مخصوص دفاع فراہم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر:

• مخصوص پروٹینز ایک رنگ کی شکل (ring-shaped) کی ساخت بناتی ہیں جو انفیکٹڈ سیلز کی میمبرینز میں سوراخ کر دیتی ہے۔ اس سے سیلز مر جاتے ہیں۔

• انٹرفیرون (interferon) ایک اور پروٹیکٹو پروٹین ہے۔ یہ ان سیلز میں سے خارج ہوتا ہے جن میں وائرس کا انفیکشن ہو چکا ہو۔ انٹرفیرون آس پاس کے سیلز کو ایسی پروٹین بنانے پر مجبور کرتا ہے جو انہیں وائرس انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرنے میں مدد کرتی ہے۔

3۔ سوزش (Inflammation): متاثرہ یا زخمی سیلز میں سے مخصوص کیمیکل ہسٹامین (histamine) نکلتے ہیں۔ ہسٹامین بلڈ ویسلز میں مقامی پھیلاؤ (expansion) پیدا کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گرمی، سرفی اور سوجن (swelling) پیدا ہوتی ہے۔ اس حالت کو سوزش یعنی انفلمیشن کہتے ہیں۔ یہ رد عمل اکثر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ مائیکروبز کے پھیلاؤ کو روک دیتا ہے۔

4۔ بخار (Fever): بخار بھی دفاع کی سیکنڈ لائن ہے۔ جب میکروفج پتھو جنز پر حملہ کرتے ہیں، تو وہ خون میں پائیروجینز (pyrogens) نامی کیمیکلز خارج کرتے ہیں۔ یہ پائیروجینز جب دماغ میں پہنچتے ہیں تو دماغ کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا حصہ جسم کے درجہ حرارت کو نارمل 37°C یعنی 98.6°F سے اوپر کر دیتا ہے۔ اس طرح جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نارمل سے زیادہ جسمانی درجہ حرارت کو فیور کہتے ہیں۔ یہ فیکوسائٹس کی سرگرمی بڑھاتا ہے اور بیکٹیریل اور وائرس کو تھکست کرتا ہے۔

تھرڈ لائن آف ڈیفنس (Third Line of Defence)


تھرڈ لائن آف ڈیفنس یا ایکوائزڈ امیونٹی (acquired immunity) کی دو قسم ہیں:

- 1- ایکٹو امیونٹی (active immunity) میں، لمفوسائٹس کی ایک قسم یعنی بی-سیلز (B-cells) پیتھوجن کو مارنے کے لیے اینٹی باڈیز (antibodies) تیار کرتی ہے۔ ایکٹو امیونٹی قدرتی یا مصنوعی (یعنی ویکسینیشن vaccination) ہو سکتی ہے۔
- 2- پیسیو امیونٹی (passive immunity) میں، فرد کو مخصوص مائیکروبز کا مقابلہ کرنے کے لیے اینٹی باڈیز دی جاتی ہیں۔ پیسیو امیونٹی مختصر مدت کی ہوتی ہے۔

خون کا جمنا (بلڈ کلائنگ) (Blood Clotting)

خون کا جمنا یا کواگولیشن (coagulation) وہ عمل ہے جو خون کی نالی (بلڈ ویسل) کے زخمی ہونے پر ضرورت سے زیادہ خون بہنے سے روکتا ہے۔ کلائنگ کے مراحل مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- جب ایک بلڈ ویسل زخمی ہوتی ہے، تو اس کے نمایاں ہونے والے کولجین (collagen) فائبرز بلڈ پلیٹ لیٹس (platelets) کو فعال کرتے ہیں۔ فعال پلیٹ لیٹس کولجین اور بلڈ ویسل کی خراب شدہ دیواروں سے چپک جاتے ہیں۔ اس طرح، ایک عارضی "پلیٹ لیٹ پلگ" (platelet plug) بن جاتا ہے۔
- 2- پلیٹ لیٹس خاص پروٹینز خارج کرتے ہیں جنہیں کلائنگ فیکٹرز (clotting factors) کہتے ہیں۔ یہ پروٹینز پلازما کی ایک پروٹین پروتھرومبین (prothrombin) کو تھرومبین (thrombin) میں تبدیل کر دیتی ہیں۔



شکل 9.4: خون کا کلاٹ بننا

- 3- تھرومبن ایک اور پلازما پروٹین یعنی فائبرینوجن (fibrinogen) کو فائبرن (fibrin) کی بیٹوں (سٹرینڈز) میں تبدیل کرتی ہے۔ فائبرن سٹرینڈز پلیٹ لیٹ پلگ میں سے بٹن جاتے ہیں، جس سے ایک بلڈ کلاٹ بنتا ہے۔
- 4- کلاٹ کے اندر موجود پلیٹ لیٹس سکڑتے ہیں اور زخم کے سائز کو کم کر دیتے ہیں۔
- جب بلڈ ویسل کی مرمت ہو جاتی ہے تو ایک پلازما پروٹین فائبرن کے جال کو توڑ دیتی ہے۔ اس سے کلاٹ حل ہو جاتا ہے اور نارمل بلڈ فلو بحال ہو جاتا ہے۔

مشق

A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں:

- 1- ایک ڈاکٹر کو مریض کے بلڈ سیپل میں بیکٹیریا ملتے ہیں۔ مریض کس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے؟
(الف) متعدی بیماری (ب) غیر متعدی بیماری (ج) وراثتی بیماری (د) غذائیت کی کمی
- 2- مندرجہ ذیل میں سے کون سی متعدی بیماریوں کی ایک مثال ہے؟
(الف) ذیابیطس (ب) ہائپر ٹینشن (ج) انفلوئنزا (د) اوسٹیوپوروسس
- 3- ایک شخص کو کتے کے کاٹنے کے بعد رے بیز (rabies) ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی ایک مثال ہے؟
(الف) غیر متعدی بیماری (ب) غذا سے ہونے والی بیماری (ج) زونوٹک بیماری (د) وراثتی بیماری
- 4- مندرجہ ذیل میں سے کون سی ایک ویکسین ہونے والی بیماری ہے؟
(الف) ایڈز (ب) ملیریا (ج) ٹیوبرکیولوسس (د) ذیابیطس
- 5- ایک شخص کو چھھر کے کاٹنے کے بعد ڈیپٹیجی فیور ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں، چھھر کس طور پر کام کرتا ہے؟
(الف) میزبان (ب) پتھوجن (ج) ویکسین (د) ذخیرہ
- 6- مندرجہ ذیل میں سے کون سی پتھوجن کے خلاف فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے؟
(الف) اینٹی باڈیز (ب) جلد اور میوکس میمبرین (ج) ٹی سیلز (د) بی سیلز
- 7- جلد کو کس میں شامل کریں گے؟
(الف) غیر مخصوص دفاع (ب) مخصوص دفاع (ج) ایکوارڈامیوٹی (د) پیسیو امیوٹی
- 8- کون سی چیز الرجک رد عمل (ری-ایکشن) کا آغاز کرتی ہے؟
(الف) پتھوجن (ب) الرجن (ج) اینٹی جین (د) اینٹی باڈی

B مختصر جوابات لکھیں۔

- 1- متعدی بیماری (انفیکشن) کی تعریف کریں۔
- 2- زونوٹک بیماریوں کی تعریف کریں۔ مثالیں بھی دیں۔

- 3۔ الرجیز کو ان کی کچھ عام اقسام کے ساتھ درج کریں۔
- 4۔ پیدائشی امیونٹی اور حاصل شدہ یعنی ایکوائزڈ امیونٹی کے درمیان فرق بتائیں۔
- 5۔ امیون سسٹم کے ایک جزو کے طور پر جلد کا کردار بیان کریں۔
- 6۔ دفاع میں میوکس میمبرینز کا کردار بیان کریں۔

C تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1۔ متعدی اور غیر متعدی بیماریاں اور ان کی اقسام کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔
- 2۔ ویکٹر سے ہونے والی بیماریوں کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔
- 3۔ امیونٹی میں ٹی۔ سیلز اور بی۔ سیلز کا کردار بیان کریں۔
- 4۔ بلڈ کلائنگ پر ایک نوٹ لکھیں۔

D انکشافی سوالات

- 1۔ متعدی بیماریاں ہجوم والے مقامات میں تیزی سے کیوں پھیلتی ہیں؟
- 2۔ وراثت کسی شخص کے غیر متعدی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خطرہ کو کس طرح بڑھا سکتی ہے؟
- 3۔ کچھ لوگوں میں الرجیز کیوں پیدا ہوتی ہیں جبکہ دوسروں میں نہیں ہوتی ہیں؟

ارتقا (EVOLUTION)

❖ حاصلاتِ تعلّم ❖



اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہوں گے کہ:

- ❖ قدرتی چناؤ کے ذریعے ارتقا کے نظریہ کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔
- ❖ پس شیئر (species) کی تعریف کریں۔
- ❖ ایچ۔ ایم۔ ایس بیگل (HMS Beagle) پر اپنے بحری سفر کے دوران ڈارون نے جو مشاہدات کیے، اُن پر مختصر بحث کیجیے۔
- ❖ تغیرات (variations) کے وہ ذرائع بیان کریں جو پس شیئر بننے یعنی سپیسی ایشن (speciation) اور ارتقا کا باعث بن سکتے ہیں۔
- ❖ درج ذیل کے حوالے سے ارتقا کے شواہد کو بیان کریں:
 - ☆ پیلا اوئٹولوجی (فوسل ریکارڈ)
 - ☆ مواز ناتی ایناٹومی (ہومولوگس ساختیں اور وِسٹِجِل vestigial ساختیں)
 - ☆ سیلکلو بریڈنگ

ارتقا (evolution) آبادی کی وراثتی خصوصیات میں تبدیلی ہے جو نسل در نسل وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس عمل میں خصوصیات میں آہستہ آہستہ آنے والی وہ تبدیلیاں شامل ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہیں۔ ایسی تبدیلیاں جانداروں کو اپنے ماحول کے

مطابق ڈھلنے کے قابل بناتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ تبدیلیاں جمع ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں نئی پس شیز (species) بنتی ہیں۔ 1850 کی دہائی میں، چارلس ڈارون (Charles Darwin) نے ارتقا کے طریقہ کار کی ایک جامع انداز میں وضاحت کی۔

10.1 ڈارون کے مشاہدات (DARWIN'S OBSERVATIONS)


انگریز ماہر فطرت چارلس ڈارون (1809-1882) نے ایک بحری جہاز ہزمیٹی شپ (His Majesty's Ship) پر دنیا بھر کا پانچ سالہ سفر کیا۔ اس جہاز کا نام ایچ ایم ایس بیگل (HMS Beagle) تھا۔ اس سفر کے دوران، ڈارون نے بہت سے اہم مشاہدات کیے۔ ان مشاہدات نے ڈارون کے نظریہ کی بنیاد رکھی۔ ڈارون کے نظریہ ارتقا کا نام ہے ”قدرتی چناؤ کے ذریعے ارتقا کا نظریہ“ Theory of Evolution by Natural Selection۔



شکل 10.1: چارلس ڈارون اور HMS بیگل پر اس کا بحری سفر

درج ذیل ڈارون کے چند اہم مشاہدات ہیں:

✱ **منفرد پس شیز (species):** ڈارون نے مختلف علاقوں میں پودوں اور جانوروں کی منفرد پس شیز کے تنوع کا مشاہدہ کیا۔ انھوں نے دیکھا کہ مختلف جزیروں اور ماحول میں پس شیز کے اپنے الگ، مخصوص مجموعے موجود تھے۔



✱ **ایک ہی پس شیز میں تغیرات (variations):** ڈارون نے مختلف ماحول میں رہنے والے ایک ہی پس شیز کے جانداروں کے درمیان تغیرات کا مشاہدہ کیا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ یہ تغیرات دراصل مطابقتیں (adaptations) تھیں۔ مطابقتوں سے مراد ہے جاندار کے جسم یا رویے میں وہ خصوصی تبدیلیاں جو اسے اپنے ماحول میں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس مشاہدہ کے بعد ڈارون مطابقت کے اُس کردار کے قائل ہو گئے جو وہ پس شیز کی بقا میں ادا کرتی ہیں۔

شکل 10.2: منج جزایا کی چونچ کے مختلف سائز اور اشکال

- **فنج (finches) کی چونچیں:** گیلپاگوس (Galapagos) جزائر پر، ڈارون نے دیکھا کہ فنج پرندوں کی مختلف پسی شیز کی چونچوں کے سائز اور شکلیں مختلف جزیروں پر مختلف تھیں۔ اُس نے یہ محسوس کیا کہ مختلف جزیروں پر مختلف قسم کی خوراک، مثلاً بیج، کیکلش (cactus) اور کیڑے مکوڑے دستیاب تھے۔ فنج پرندوں کی چونچیں مخصوص جزیروں پر دستیاب خوراک کے ذرائع کے مطابق موزوں تھیں۔


کچھ وہیل (whales) کے جسم کے بہت اندر ٹانگوں کی چھوٹی ہڈیاں مدفون ہوتی ہیں! یہ ہڈیاں اب تیرنے میں کوئی مدد نہیں کرتیں۔ یہ ہڈیاں وہیل کے ارتقائی ماضی کے لیے طاقتور اشارے ہیں۔ یہ جسم کے اندر موجود فوسلز کی مانند ہیں۔

- **ناپید جانوروں کے فوسلز (fossils):** جب انھوں نے ناپید ہو چکے جانوروں کے فوسلز کا مشاہدہ کیا، تو انھوں نے ان کی جدید پسی شیز کے ساتھ مماثلت پائی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پسی شیز وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہیں۔

اپنے سفر سے واپسی کے بعد، ڈارون نے اپنے مشاہدات کا تجربہ کیا اور اپنے خیالات کی تائید کے لیے مزید شواہد اکٹھے کیے۔ بالآخر 1859 میں ڈارون نے اپنا کام ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا۔ اس کی کتاب کا نام "آن دی اورجین آف پسی شیز" (On the Origin of Species) تھا۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنا "قدرتی چناؤ کے ذریعے ارتقاء کا نظریہ" (theory of evolution by natural selection) پیش کیا۔

10.2 نیچرل سیلیکشن کے ذریعے ارتقاء کا نظریہ

(THEORY OF EVOLUTION BY NATURAL SELECTION)



شکل 10.3: ارتقاء کا طریقہ کار

نظریہ 'نیچرل سیلیکشن' (قدرتی چناؤ) کے ذریعے ارتقاء کے مطابق "جاندار وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ جاندار جن میں مددگار خصوصیات (تغیرات/ variations) موجود ہوتی ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، اور یہ خصوصیات اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں۔ کئی نسلوں کے بعد، یہ سازگار خصوصیات آبادی میں زیادہ عام ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل نئی پسی شیز کے ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔"

نیچرل سیلیکشن (قدرتی چناؤ) (Natural Selection)

نیچرل سیلیکشن وہ عمل ہے جس میں بہتر خصوصیات (تغیرات) رکھنے والے افراد کے زندہ رہنے، افزائش نسل کرنے، اور تغیرات کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ قدرتی چناؤ کا عمل ان مراحل میں کام کرتا ہے۔

- 1- **تغیرات (Variations):** ہر پسی شیز میں جاندار ایک دوسرے سے معمولی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فرق رنگت، جسامت، رفتار، طاقت، یا خوراک تلاش کرنے کی صلاحیت میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر:


کچھ بھنورے (beetle) سبز ہوتے ہیں، اور کچھ بھورے۔

2- **بقا کے لیے جدوجہد (Struggle for Survival):** جاندار محدود وسائل کے لیے مقابلہ کرتے ہیں جیسے خوراک، پانی، جگہ، اور ساتھی۔ اس کے علاوہ، انھیں شکاریوں، بیماریوں، اور سخت ماحول سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر: پرندے بھنوروں کو کھاتے ہیں، لہذا بھنوروں کو چھپ کر یا ماحول میں گھل مل کر زندہ رہنا پڑتا ہے۔

3- **بہترین خصوصیات والے کی بقا (Survival of the Fittest):** وہ جاندار جن میں بہتر تغیرات ہوتے ہیں، ان کے زندہ رہنے اور افزائش نسل کرنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ "فٹسٹ" (Fittest) کا مطلب ہے بہترین موزوں، ضروری نہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور۔ مثال کے طور پر: سبز بھنوروں کی نسبت بھورے بھنورے مٹی کے ساتھ بہتر طور پر گھل مل جاتے ہیں۔ لہذا، پرندوں کے لیے ان کا شکار کرنا مشکل ہوگا۔

4- **افزائش نسل اور تغیرات کی منتقلی (Reproduction and Passing on Variations):** زندہ بچ جانے والے افراد افزائش نسل کرتے ہیں اور اپنے مفید تغیرات اولاد میں منتقل کر دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ مددگار تغیرات آبادی میں زیادہ عام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر: زیادہ بھورے بھنورے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ سبز بھنورے زیادہ کھائے گئے تھے۔

5- **وقت کے ساتھ تدریجی ارتقا (Gradual Evolution Over Time):** کئی نسلوں کے بعد، چھوٹی تبدیلیاں جمع ہوتی جاتی ہیں۔ یہی شیز آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے۔ اگر ماحول مسلسل کچھ مخصوص تغیرات کے حق میں رہتا ہے تو بالآخر نئی یہی شیز بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر: اگر صرف بھورے بھنورے ہی زندہ رہتے اور کئی نسلوں تک افزائش نسل کرتے ہیں تو بھنوروں کی پوری آبادی بھوری ہو سکتی ہے۔



شکل 10.4: قدرتی چناؤ (نیچرل سلیکشن) کا عمل

نیچرل سلیکشن کی مثالیں (Examples of Natural Selection)

1- **زرافہ کی لمبی گردن کا ارتقا (Evolution of Giraffe's Long Neck):**

(i) **تغیرات (Variations):** کچھ زرافوں کی گردنیں دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ لمبی تھیں۔

- (ii) بقا کے لیے جدوجہد (Struggle for Survival): خوراک (اونچے درختوں کے پتے) تک پہنچنا مشکل تھا، خاص طور پر خشک موسموں کے دوران۔
- (iii) بہترین خصوصیات والوں کی بقا (Survival of the Fittest): لمبی گردن والے زرافے اونچے درختوں سے پتے کھا سکتے تھے اور سخت حالات میں بہتر طور پر زندہ رہے۔
- (iv) افزائش نسل اور خصوصیات کی منتقلی (Reproduction and Passing on Traits): ان لمبی گردن والے زرافوں نے افزائش نسل کی اور لمبی گردن کی خصوصیت اپنی اولاد میں منتقل کر دی۔
- (v) وقت کے ساتھ تدریجی ارتقا (Gradual Evolution Over Time): کئی نسلوں کے دوران، آبادی میں زیادہ تر زرافوں کی گردنیں لمبی تھیں۔

2۔ پیپر ڈموٹھ یعنی پتنگے کا ارتقا (انگلینڈ میں صنعتی انقلاب کے دوران)

(Evolution of Peppared Moth During Industrial Revolution in England)

- (i) تغیرات (Variations): کچھ پتنگے (moths) ہلکے رنگ کے تھے، اور کچھ گہرے رنگ کے تھے۔
- (ii) بقا کے لیے جدوجہد (Struggle for Survival): پرندے دن کے وقت درختوں کی چھال پر بیٹھے پتنگوں کا شکار کرتے تھے۔
- (iii) بہترین خصوصیات والوں کی بقا (Survival of the Fittest): آلودگی کی وجہ سے درختوں کی چھالیں سیاہ ہو گئیں۔ اس کے بعد گہرے رنگ کے پتنگے ان چھالوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ہلکے رنگ والوں کی نسبت بہتر زندہ رہے۔
- (iv) افزائش نسل اور خصوصیات کی منتقلی (Reproduction and Passing on Traits): گہرے رنگ کے پتنگوں نے زیادہ افزائش نسل کی اور گہرے رنگ کی خصوصیت اپنی اولاد میں منتقل کر دی۔
- (v) وقت کے ساتھ تدریجی ارتقا (Gradual Evolution Over Time): وقت کے ساتھ، آبادی میں ہلکے رنگ کے پتنگوں کے مقابلے میں گہرے رنگ کے پتنگے زیادہ ہو گئے۔

10.3 نئی شیز اور ”نئی شیز کا ظہور“ (سپیشی ایشن) (SPECIES AND SPECIATION)

نئی شیز (Species)

نوع یعنی شیز (species) جانداروں کا ایک ایسا گروہ ہے جو قدرتی حالات میں آپس میں نسل کشی (interbreed) کر سکتا ہے اور فرائل (fertile) اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ ایک ہی شیز کے ارکان آپس میں مماثل رکھتے ہیں اور دوسری شیز سے تولیدی طور پر الگ تھلگ (isolated) ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، شیر (Panthera leo) اور چیتا (Panthera tigris) الگ الگ شیز ہیں۔ وہ قدرتی طور پر آپس میں نسل کشی نہیں کرتے۔

نئی شیز کا ظہور (سپیشی ایشن) (Speciation)


ارتقا کے نتیجہ میں نئی شیز کے بننے کو سپیشی ایشن (speciation) کہتے ہیں۔ سپیشی ایشن کے عمل کی دو اقسام ہیں:

1- ایلو پیٹرک سپیسی ایشن (Allopatric Speciation)

ایلو پیٹرک (جغرافیائی علیحدگی سے) سپیسی ایشن عمل تب ہوتی ہے جب کوئی آبادی جغرافیائی طور پر دو یا دو سے زیادہ آبادیوں میں جدا ہو جاتی ہے۔ جغرافیائی رکاوٹ (جیسے پہاڑی سلسلہ، دریا، یا سمندر) مختلف گروہوں کے جانداروں کو آپس میں افزائش نسل کرنے سے روکتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ الگ تھلک آبادیاں مختلف طریقے سے ارتقا پذیر ہوتی ہیں اور منفرد سپیٹیز بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، گیلپاگیوس جزائر کے فینچ (finches) پرندوں کے معاملے میں، مختلف جزائر نے منفرد ماحول فراہم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ، ان پرندوں کی آبادیوں نے اپنے اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیا، اور بالآخر وہ الگ الگ سپیٹیز بن گئیں۔

2- سم پیٹرک سپیسی ایشن (Sympatric Speciation)

سم پیٹرک (ہم مکان) سپیسی ایشن تب ہوتی ہے جب ایک ہی جغرافیائی علاقے میں تولیدی علیحدگی (isolation) ہو جاتی ہے۔ یہ تولیدی علیحدگی مسکن کی ترجیح یا رویہ کی وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ہی سپیٹیز کی مچھلیوں کے گروہ ایک ہی جھیل میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ گروہ غذائی ترجیحات یا ساتھی کے انتخاب کی وجہ سے تولیدی طور پر الگ تھلک ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ گروہ تولیدی طور پر الگ تھلک رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں نئی سپیٹیز کا ظہور ہوتا ہے۔



شکل 10.5: سپیسی ایشن کی بڑی اقسام

10.4 تغیرات کے ذرائع (SOURCES OF VARIATIONS)

تغیرات آبادی میں جانداروں کے درمیان وہ وراثتی اختلافات (فرق) ہیں جن پر نیچرل سلیکشن عمل کر سکتا ہے۔ درج ذیل تغیرات کے اہم ذرائع ہیں۔

1- میوٹیشن (Mutations)

میوٹیشن کسی جاندار کے ڈی این اے میں ایسی مستقل تبدیلی ہے جو اس کی اولاد میں منتقل ہو سکتی ہو۔ میوٹیشن خود بخود یا ماحولیاتی عوامل جیسے ریڈی ایشن یا کیمیکلز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ میوٹیشن جاندار میں نئی خصوصیات (تغیرات) کا نتیجہ بنتی ہیں۔ زیادہ تر میوٹیشنز غیر موثر (neutral) یا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ چند میوٹیشنز فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور جاندار کو بہتر تغیرات فراہم کر سکتی ہیں۔

مثال: بیکٹیریا کی ایک آبادی میں، ایک میوٹیشن کچھ بیکٹیریا میں اینٹی بائیوٹک کے خلاف مزاحمت (resistance) پیدا کر سکتی ہے۔ اینٹی

بائیوٹیکس کی موجودگی میں، ان مزاحم بیکٹیریا کے زندہ رہنے اور افزائش نسل کرنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ وہ اس تغیر کو آئندہ نسلوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔

2- جینیٹک ری کمبیشن (Genetic Recombination)

سیکسول ری پروڈکشن کرنے والے جانداروں میں، می اوسس کے ذریعے گیمیٹس بنتے دوران جینیٹک ری کمبیشن ہوتی ہے۔ دو والدین سے جینیٹک میٹیریل کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس میں جینز کے نئے امتزاج ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اولاد میں خصوصیات کے بھی نئے امتزاج بنتے ہیں۔ اس سے تغیرات پیدا ہوتا ہے۔

مثال: انسانی، بہن بھائیوں میں خصوصیات کے مختلف امتزاج ہوتے ہیں مثلاً، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ وغیرہ۔ یہ امتزاج والدین میں گیمیٹس بنتے دوران جینیٹک ری کمبیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

کیلو (bananas) میں بے شمار میوٹیشنز ہو چکی ہیں! بہت سے کیلے ٹریپلائڈ (triploid) ہوتے ہیں، یعنی ان میں کروموسومز کے تین سیٹ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیلے بانجھ (sterile) ہوتے ہیں۔ وہ عام طریقے سے ری پروڈکشن نہیں کر سکتے۔ لہذا، کیلے کا ہر پودا ایک کلون (clone) ہوتا ہے، یعنی اسے کیلے کے دوسرے پودے کی قلم (cutting) سے اُگایا جاتا ہے۔

3- جینیاتی بہاؤ (مائیگریشن) (Migration Gene Flow)

جینیاتی بہاؤ تب ہوتا ہے جب ایک آبادی کے افراد دوسری آبادی میں ہجرت کرتے ہیں اور اس نئی آبادی میں نئے جینز متعارف کراتے ہیں۔ اس سے آبادی کے اندر نئے تغیرات متعارف ہوتے ہیں۔ اگر یہ نئے تغیرات نئی آبادی میں بہتر ثابت ہوں تو وہ پوری آبادی میں پھیل سکتے ہیں۔

مثال: جب ایک علاقے کے پودے کسی مختلف علاقے کے پودوں کے ساتھ کراس پولی نیشن کرتے ہیں تو وہ آبادی میں نئی خصوصیات متعارف کراتے ہیں، جیسے خشک سالی کے خلاف بہتر مزاحمت والی اقسام۔

4- گیمیٹس کا بے ترتیب ملاپ (Random Pairing of Gametes)

سیکسول ری پروڈکشن کے دوران، ایگ سیل (egg cell) اور سپرم کا ملاپ (فیوژن) بے ترتیب (random) ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سپرم کسی بھی ایگ سیل کو فرٹیلائز (fertilize) کر سکتا ہے۔ اس سے دونوں والدین سے ملنے والے جینز کے منفرد امتزاج والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں تغیرات میں اضافہ ہوتا ہے۔

مثال: انسانوں میں، لاکھوں امکانات میں سے ایک ایگ سیل اور ایک سپرم کا بے ترتیب ملاپ ایک ہی خاندان میں بچوں کے مختلف خصوصیات رکھنے کا باعث بنتا ہے، حالانکہ ان کے والدین ایک ہی ہوتے ہیں۔

10.5 ارتقا کے شواہد (EVIDENCES OF EVOLUTION)

بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ پسی شیز وقت کے ساتھ بدلی ہیں اور بدلتی جا رہی ہیں۔ ارتقا کے اہم شواہد درج ذیل ہیں۔

یا دودھانی!
فوسلز ماضی میں رہنے والے جانداروں کی باقیات، نقوش، یا نشانات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر فوسلز تہہ دار چٹانوں (sedimentary rocks) میں پائے جاتے ہیں۔

1- پیلے اونٹولوجی (فوسلز کا ریکارڈ) (Fossil Record Palaeontology)

فوسلز ارتقا کا ایک بصری ریکارڈ فراہم کرتے ہیں۔ پیلے اونٹولوجسٹس (Palaeontologists) فوسلز کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے جانداروں میں ارتقا کی تبدیلیوں کی ترتیب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ورٹیبریٹس (vertebrates) کی مختلف کلاسز کے فوسلز نے ظاہر کیا کہ مچھلیاں قدیم ترین ورٹیبریٹس ہیں۔ مچھلیوں کے ارتقا کے بعد امفی بی اینز (amphibians)، رپٹائلز (reptiles)، اور پھر پرندوں اور میملز (mammals) کا ارتقا ہوا۔




شکل 10.6: آرکیو پٹیرکس (Archaeopteryx)

جانداروں کے فوسلز آباؤ اجداد اور ان کی نئی نسلوں کی خصوصیات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فوسلز مختلف پسی شیز کی ارتقا کی تاریخ میں موجود خلاء کو پُر کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ تدریجی تبدیلی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آرکیو پٹیرکس (Archaeopteryx) پرندوں جیسا ایک ڈائنوسار (dinosaur) تھا۔ اس کے فوسلز یہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ پرندے ایک رپٹائل سے ارتقا پذیر ہوئے جو کہ ایک ٹیٹرا پوڈ (چار ٹانگوں والے) ڈائنوسار تھا۔

2- موازناتی اناٹمی (Comparative Anatomy)

موازناتی اناٹمی میں مختلف جانداروں کی ساختوں میں مماثلتیں اور اختلافات شامل ہیں۔

ہومولوجس ساختیں (Homologous Structures)



انسان کا بازو
Arm of Human

بلی کی ٹانگ
Leg of Cat

وہیل کا فلپر
Flipper of Whale

چمگادڑ کا پر
Wing of Bat

مختلف پسی شیز میں موجود ایک جیسی ساختیں جو مختلف افعال سرانجام دیتی ہیں، ہومولوجس ساختیں کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، میملز (mammals) کی اگلی ٹانگیں (forelimbs) یعنی انسان کے بازو، بلی کی ٹانگیں، وہیل کے فلپرز، اور چمگادڑ کے پر وغیرہ سب کی بنیادی ساخت ایک جیسی ہے لیکن افعال مختلف ہیں۔ ان اگلی ٹانگوں کی ساخت میں یہ بنیادی مماثلت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک مشترکہ آباؤ اجداد (ancestor) سے ارتقا پذیر ہوئے ہیں۔

شکل 10.7: ہومولوجس ساختیں

ویسٹیجیل ساختیں (Vestigial Structures)

ہومولوجس آرگنز ساخت کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن فعل کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اینالوگس (analogous) آرگنز فعل کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن ساخت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً چمگادڑ، پرندوں اور حشرات کے پروغیرہ۔


ویسٹیجیل یعنی زائل شدہ ساختیں جسم کے وہ حصے ہوتے ہیں جن کا بظاہر کوئی فعل نہیں ہوتا لیکن وہ جاندار کے آباؤ اجداد (ancestors) میں مکمل طور

پر فعال تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ایسی ساختوں نے وقت کے ساتھ ارتقا کے ذریعے اپنا اصل فعل ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر:

- **انسانی اپینڈکس (Appendix):** یہ ایک چھوٹی، نالی نما ساخت ہے جو سکیم (cecum) کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ انسانوں میں، یہ ایک ویسٹی جینیل ساخت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آباؤ اجداد (ancestors) کے ڈائی جیسٹو سسٹم میں اس کا زیادہ اہم کردار رہا ہو۔
- **انسانوں میں کان کے مسلز (Ear muscles):** بہت سے جانوروں، جیسے بلیوں اور کتوں میں، کان کے مسلز کانوں کو حرکت دیتے ہیں تاکہ وہ مختلف سمتوں سے آوازیں سن سکیں۔ تاہم انسانوں میں، یہ کان کے مسلز زیادہ تر غیر فعال ہوتے ہیں۔ لہذا، یہ انسانوں میں ویسٹی جینیل ساختیں ہیں۔
- **وہیل میں پیلوک ہڈیاں (Pelvic bones):** جدید وہیل میں چھوٹی، غیر فعال پیلوک ہڈیاں ہوتی ہیں حالانکہ ان کی ٹانگیں نہیں ہوتیں۔
- **اڑنے سے قاصر پرندوں میں پر (Wings):** شتر مرغ جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے پروں کو اڑنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔



انسان میں اپینڈکس
Human Appendix



وہیل میں پیلوک ہڈیاں
Pelvic bones in whale

شکل 10.8: ویسٹی جینیل (Vestigial) ساختیں

3۔ سیلیکٹو بریڈنگ (Selective Breeding)

سیلیکٹو بریڈنگ یعنی انتخابی افزائش سے مراد وہ عمل ہے جس میں انسان پودوں یا جانوروں کی مختلف اقسام کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی افزائش نسل کرواتے ہیں تاکہ مطلوبہ خصوصیات کے ساتھ اولاد پیدا ہو سکے۔ اس طریقے سے وہ پودوں میں خصوصیات کو بہتر بنا سکتے ہیں، جیسے اناج کی پیداوار یا بیماریوں کے خلاف مزاحمت۔ اسی طرح، وہ جانوروں میں نشوونما کی رفتار یا دودھ کی پیداوار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جانداروں کی وہ اقسام جن کی سیلیکٹو بریڈنگ کی جاتی ہے، انھیں بریڈ (breeds) کہتے ہیں۔ پودوں کی وہ اقسام جن کی سیلیکٹو بریڈنگ کی جاتی ہے، انھیں ورائٹی یا کلتی وار (varieties or cultivars) کہتے ہیں۔ سیلیکٹو بریڈنگ کے ذریعے بھیڑ، بکری، گائے، مرغی وغیرہ کی بہت سی بریڈز تیار کی گئی ہیں تاکہ گوشت، دودھ، انڈے، اون وغیرہ کی پیداوار بڑھائی جائے۔



شکل 10.9: مرغی کی مختلف بریدز (breeds)

اسی طرح، بہتر مقدار اور معیار کی خوراک کے لیے پودوں کی بہت سی ورائٹیز (کٹی وائز) پیدا کی گئی ہیں۔ یہ عمل گندم، چاول، آلو، اور سیب وغیرہ جیسے اقتصادی طور پر اہم پودوں میں پیداوار کی بہتری کے لیے بہت کامیاب ثابت ہوا ہے۔



شکل 10.10: آلو اور سیب کی مختلف ورائٹیز یعنی کٹی وائز (cultivars)

سیلیکٹو بریڈنگ پسی شیز کے درمیان قدرتی طور پر پائے جانے والے تغیرات (variations) اور ان کے قدرتی چناؤ یعنی ارتقا کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔

مشق

A درج ذیل سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں:

- 1۔ فائدہ مند خصوصیات والے جانداروں کا زندہ رہنا اور افزائش نسل کرنا کیا کہلاتا ہے؟
(الف) میوٹیشنز (ب) جینیاتی بہاؤ (ج) نیچرل سیلیکشن (د) اے سیکسول ریپروڈکشن
- 2۔ ایک آبادی دریا کی وجہ سے دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ کئی نسلوں کے بعد، دونوں آبادیاں ارتقا پذیر ہو کر مختلف پسی شیز بن جاتی ہیں۔ یہ کس قسم کی سپیسی ایشن (speciation) ہو سکتی ہے؟

- (الف) سم پیٹرک (sympatric) (ب) جینیاتی تبدیلی (genetic drift)
(ج) میوٹیشن (د) ایلو پیٹرک (allopatric)

3۔ وہیل میں کون سی خصوصیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ان کے آباء خشکی (زمین) پر رہتے تھے؟

(الف) بڑا جسم (ب) فینز (fins) (ج) پیلوک ہڈیاں (pelvic bones) (د) دھارا نما جسم

4۔ کسان افزائش نسل کے لیے بہترین گائیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے:

(الف) نیچرل سلیکشن (ب) سیلیکٹو بریڈنگ (ج) مطابقت (adaptation) (د) جینیٹک میوٹیشن

5۔ ڈارون کا فنچ پرندوں (finches) کے بارے میں مشاہدہ ثابت کرتا ہے کہ:

(الف) تمام جزیروں پر آب و ہوا یکساں تھی

(ب) تمام فنچ پرندے ایک جیسے تھے

(ج) انھوں نے مختلف جزیروں پر مختلف غذاؤں کے مطابق خود کو ڈھال لیا

(د) فنچ پرندوں نے کبھی ہجرت نہیں کی تھی

6۔ ایک نیا تغیر (variation) اچانک ظاہر ہوتا ہے اور بقا (survival) میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟

(الف) یہ غائب ہو جاتا ہے (ب) یہ آبادی میں پھیل جاتا ہے

(ج) یہ بیماری کا سبب بنتا ہے (د) اسے نیچرل سلیکشن کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے

7۔ ان میں سے کون سی ایک زائل شدہ یعنی ویسٹیجیل (vestigial) ساخت ہے؟

(الف) انسان کے کان کے مسلز (ب) چڑیا کے پر (wings) (ج) لٹخ کی چونچ (د) بلی کی دم (tail)

8۔ کون سا جوڑا ہومولوجس ساختیں (homologous structures) ہیں؟

(الف) پرندوں کے پر اور تلی کے پر (ب) ڈالفن کے فینز اور شارک کے فینز

(ج) انسان کے بازو اور ڈالفن کے فینز (د) چگادڑ کے پر اور پرندوں کے پر

9۔ انسانی اپنڈیکس ایک ویسٹیجیل آرگن ہے کیونکہ:

(الف) یہ ڈائیجنیشن میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے (ب) یہ امیون سسٹم کا حصہ ہے

(ج) یہ اب ڈائیجنیشن کے لیے کوئی کام نہیں کرتا (د) یہ غذائی اجزاء جذب کرنے میں مدد کرتا ہے

10۔ مصنوعی چناؤ یعنی آرٹیفیشل (artificial) سلیکشن اور نیچرل سلیکشن میں مشابہت ہے کیونکہ:

(الف) دونوں میں ماحولیاتی حالات اپنا کردار ادا کرتے ہیں

(ب) دونوں لاکھوں سالوں کے دوران ہوتے ہیں

(ج) دونوں انسانوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں

(د) دونوں کا انحصار افراد کے درمیان تغیرات (variations) پر ہوتا ہے

- 1۔ سیلیکٹو بریڈنگ (selective breeding) پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔
- 2۔ نئی پسی شیز کے ظہور یعنی سپیسی ایشن (speciation) کی دو اقسام کون سی ہیں؟
- 3۔ ہومولوجس ساختوں (homologous structures) کی مثالیں دیں۔
- 4۔ نیچرل سیلیکشن کے مراحل کی فہرست بنائیں۔

- 1۔ ”نیچرل سیلیکشن (natural selection) کے ذریعے ارتقا“ کے نظریہ کی وضاحت کریں۔
- 2۔ ڈارون نے اپنے سفر کے دوران جو مشاہدات کیے، ان پر ایک نوٹ لکھیں۔
- 3۔ تغیرات (variation) کے ذرائع بیان کریں۔
- 4۔ جواز پیش کریں کہ فوسل ریکارڈ کس طرح ارتقا کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔
- 5۔ ہومولوجس ساختوں (homologous structures) پر ارتقا کے ثبوت کے طور پر ایک نوٹ لکھیں۔
- 6۔ ویسٹی جینیل ساختیں (vestigial structures) کیا ہیں؟ وضاحت کریں کہ وہ کس طرح ارتقا کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔

- 1۔ ارتقا کے لیے جانداروں کے درمیان تغیرات ہونا کیوں ضروری ہے؟
- 2۔ فوسلز سائنس دانوں کو زمین پر زندگی کی تاریخ کو سمجھنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟
- 3۔ علیحدگی (isolation) نئی پسی شیز کے بننے کا سبب کیوں بن سکتی ہے؟



- ایکسکریشن (Excretion): جسم سے میٹابولک بے کار مادوں (metabolic waste products) کو نکالنے کا عمل۔
- ایکوائزڈ امیونٹی (Acquired Immunity): کسی شخص کی زندگی کے دوران بیماریوں یا ویکسین کا سامنا ہونے پر پیدا ہونے والی امیونٹی۔
- اے گریگولوسائٹس (Agranulocytes): وائٹ بلڈ سیلز جن کے سائٹوپلازم میں گرینولز (granules) نہیں ہوتے، مثلاً لمفوسائٹس (lymphocytes) اور مونوسائٹس (monocytes)۔
- ایلڈوسٹیرون (Aldosterone): ایک ہارمون جو جسم میں نمک اور پانی کو منظم کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- ایلو پیٹریک سپیسی ایشن (Allopatric speciation): جغرافیائی علیحدگی (geographic isolation) کی وجہ سے نئی پسی شیز (species) کا بننا۔
- ایلو لائی (Alveoli): پھیپھڑوں میں موجود ہوا کے ننھی تھیلیاں جہاں ہوا اور خون کے درمیان آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔
- ایلیلز (Alleles): ایک ہی جین کی مختلف شکلیں جو کروموسومز پر ایک ہی جگہ یعنی لوکانی (loci) پر پائی جاتی ہیں۔
- ایلیمنٹری کینال (Alimentary canal): ذئی جیسٹو (digestive) سسٹم کی منہ سے لے کر اینس (anus) تک مسکولری نالی۔
- ایمائی لیز (Amylase): ایک انزائم جو نشاستہ (starch) کو مالٹوز (maltose) میں توڑتا ہے۔
- اینٹی باڈیز (Antibodies): امیون سسٹم کے ذریعے پیدا ہونے والے پروٹینز جو مخصوص اینٹی جنز (antigens) کے خلاف لڑتی ہیں۔
- اینٹی جنز (Antigens): بیرونی مادے، جیسے پتھو جنز (pathogens)، جو جسم میں امیون رد عمل کو تحریک کرتے ہیں۔
- اینٹی ڈائیورٹک ہارمون (Antidiuretic hormone): ایک ہارمون جو جسم میں پانی بچانے کے لیے پیشاب (urine) کی پیداوار کو کم کرتا ہے۔
- ارتقا (Evolution): وہ عمل جس کے ذریعے آبادیوں (populations) اور پسی شیز (species) میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے۔
- ایمیونٹی (Immunity): جسم کی بیماریوں کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت۔
- انسولین (Insulin): ایک ہارمون جو سیلز کو خون سے گلوکوز جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- اوو جینیسیس (Oogenesis): خواتین میں ایک سیل (egg) بننے کا عمل۔
- اووری (Ovary): مادہ ریپر وڈ کلو آرگن جو ایک سیلز (eggs) اور ہارمونز پیدا کرتا ہے۔
- اووولیشن (Ovulation): اووری (ovary) سے ایک سیل (egg) کا نکلنا۔
- اپی گلائس (Epiglottis): نشوز کا ایک پردہ (flap) جو خوراک کو ہوا کی نالی (windpipe) میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔
- اپی نیفرین (Epinephrine): جسے ایڈرینالین (adrenaline) بھی کہا جاتا ہے، ہنگامی صورتحال کے رد عمل (fight or flight) کے لیے ایک ہارمون ہے۔
- ایٹریئم (Atrium/Atria): دل کا اوپری خانہ (چیمبر) جو ویز (veins) سے خون وصول کرتا ہے۔
- ایڈریٹل گینڈ (Adrenal gland): ہر گردے کے اوپر موجود ایک گینڈ جو ایڈرینالین (adrenaline) اور کورٹی سول (cortisol) جیسے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔
- ایڈرو کورٹیکو ٹروپک ہارمون (Adreno-cortico-tropic hormone): پچوٹری گینڈ سے نکلنے والا ایک ہارمون جو ایڈریٹل گینڈ کو کورٹی سول (cortisol) خارج کرنے کا سگنل دیتا ہے۔
- ایسٹروجن (Oestrogen): ایک ہارمون جو مادہ کی تولیدی ٹیو اور افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔
- ایسوفیگس (Oesophagus): مسکولر نالی جو خوراک کو منہ سے معدے (stomach) تک پہنچاتی ہے۔

(competition)۔

✱ **بلڈ پلازما (Blood plasma):** خون کا مائع حصہ جس میں سیلز، غذائی اجزاء (nutrients)، اور بے کار مادے ہوتے ہیں۔

✱ **بلوغت (Puberty):** نشوونما کا وہ مرحلہ جب ایک شخص جنسی طور پر بالغ (sexually mature) ہو جاتا ہے۔

✱ **بہترین خصوصیات والے کی بقا (Survival of the fittest):** ماحول کے لیے بہترین موافقت (adaptation) رکھنے والے جانداروں کا زندہ رہنا اور پھر وڈکشن کے قابل ہونا۔

✱ **بیکٹیریو فیج (Bacteriophage):** ایسے وائرس جو بیکٹیریا پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے اندر پھر وڈکشن کرتے ہیں۔

✱ **پراسٹیٹ گلینڈ (Prostate gland):** ایک گلینڈ جو سمن (semen) میں مزید فلوئڈ (fluid) کا اضافہ کرتا ہے۔

✱ **پرائمری اووسائٹ (Primary oocyte):** ایک نابالغ ایگ سیل (egg) جو اپنی نمو کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے۔

✱ **پرائمری سپرمیٹوسائٹ (Primary spermatocyte):** ایک ڈیپلائڈ (diploid) سیل جو سپرم بنانے کا عمل شروع کرتا ہے۔

✱ **پروٹین کی تیاری (Protein synthesis):** ڈی این اے (DNA) اور آراین اے (RNA) کا استعمال کرتے ہوئے پروٹین بنانے کا عمل۔

✱ **پروجیسٹرون (Progesterone):** ایک ہارمون جو یوٹرس (uterus) کو حمل (pregnancy) کے لیے تیار کرتا ہے۔

✱ **پلازمڈ (Plasmid):** بیکٹیریا میں پایا جانے والا ڈی این اے (DNA) کا ایک چھوٹا حلقہ، جو جینیٹک انجینئرنگ میں استعمال ہوتا ہے۔

✱ **پلیٹ لیٹس (Platelets):** خون میں موجود سیلز کے ٹکڑے جو خون جمنے (clotting) میں مدد کرتے ہیں۔

✱ **پلیسنٹا (Placenta):** ایک آرگن جو نمو پاتے ہوئے فیٹس (foetus) کو یوٹرس (uterus) سے جوڑتا ہے اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔

✱ **پولیوشن یعنی آلودگی (Pollution):** ماحول میں نقصان دہ مادوں کی موجودگی۔

✱ **پتھوجن (Pathogen):** ایک مائیکروسکوپک جاندار

✱ **اینڈروجنز (Androgens):** مردانہ ہارمونز جو مردوں کی خصوصیات اور تولیدی افعال (reproductive functions) کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

✱ **اینڈوکرائن سسٹم (Endocrine system):** گلینڈز (glands) کا وہ سسٹم جو جسمانی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارمونز خارج کرتا ہے۔

✱ **اینزائم (Enzyme):** ایک پروٹین جو زندہ جانداروں میں کیمیائی تعاملات (chemical reactions) کو تیز کرتی ہے۔

✱ **آٹونومک نروس سسٹم (Autonomic nervous system):** نروس سسٹم کا وہ حصہ جو غیر ارادی افعال (involuntary actions) جیسے دل کی دھڑکن اور ڈیجیشن کو کنٹرول کرتا ہے۔

✱ **آراین اے (Ribonucleic Acid - RNA):** ایک مالیکیول جو پروٹین کی تیاری اور جین کے اظہار (gene expression) میں مدد کرتا ہے۔

✱ **آرٹیریو سکلیروسس (Arteriosclerosis):** آرٹریز (arteries) کی دیواروں کا سخت اور موٹا ہو جانا۔

✱ **آکسیٹوسن (Oxytocin):** ایک ہارمون جو بچے کی پیدائش کے دوران یوٹرس (uterus) کے سکڑاؤ (contractions) اور دودھ پلانے کے دوران دودھ کے اخراج کا سبب بنتا ہے۔

✱ **بائل (Bile):** جگر سے پیدا ہونے والا ایک ڈائیجیسٹو فلوئڈ (digestive fluid) جو چکنائی (fats) کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔

✱ **بائیو ٹیکنالوجی (Biotechnology):** عملی مقاصد کے لیے زندہ جانداروں یا بائیولوجیکل سسٹمز (biological systems) کا استعمال۔

✱ **بائیوریمیڈیشن (Bioremediation):** ماحولیاتی آلودگی کو صاف کرنے کے لیے زندہ جانداروں کو استعمال کرنے کا عمل۔

✱ **برونکائٹس (Bronchitis):** برونکائی کی سوزش یعنی انفلمیجیشن (inflammation)، جو اکثر انفیکشن یا جلن کی وجہ سے ہوتی ہے۔

✱ **برونکائی (Bronchi):** ٹریکیا (trachea) کی دو اہم شاخیں؛ ہر برونکس اپنی طرف والے پھیپھڑے میں ہوالے جاتی ہیں۔

✱ **بقا کے لیے جدوجہد (Struggle for survival):** محدود وسائل (resources) کے لیے جانداروں کے درمیان مقابلہ

- ✱ جگر (Liver): ایک بڑا آرگن جو بہت سے اہم افعال انجام دیتا ہے جن میں زہر کو ختم کرنا (detoxification) اور ہائل (bile) پیدا کرنا شامل ہیں۔
- ✱ جین (Gene): وراثت کی ایک اکائی (unit of heredity) جو کسی جاندار کی خصوصیات کا تعین کرتی ہے۔
- ✱ جین ایڈیٹنگ (Gene editing): جینز میں مخصوص ڈی این اے (DNA) کی ترتیب کو تبدیل کرنے کی ایک تکنیک۔
- ✱ جین کلوننگ (Gene cloning): ایک مخصوص جین کی بہت سی نقلیں (copies) بنانا۔
- ✱ جینز کا بہاؤ (Gene flow) (مائگریشن): ہجرت (migration) کی وجہ سے آبادیوں (populations) کے درمیان جینز کی نقل و حرکت۔
- ✱ جینوٹائپ (Genotype): کسی جاندار کا جینیاتی میک اپ (genetic makeup)۔
- ✱ جینیٹک انجینئرنگ (Genetic engineering): بائیو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کسی جاندار کے جینز میں براہ راست تبدیلی (manipulation)۔
- ✱ جینیٹک ری کمبیشن (Genetic recombination): ریپروڈکشن کے دوران جینز کا ملنا (mixing) تاکہ تغیرات (variation) پیدا ہوں۔
- ✱ جینیٹکلی موڈیفائیڈ آرگنزم (Genetically modified organism): ایک جاندار جس کا ڈی این اے (DNA) بائیو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تبدیل کیا گیا ہو۔
- ✱ ڈیابٹیز (Diabetes): ایک بیماری جو نا کافی انسولین کی پیداوار یا استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے خون میں شوگر کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔
- ✱ ڈیالیزس (Dialysis): ایک طبی علاج جو گردوں کے فیل ہونے کی صورت میں خون سے بے کار مادوں (waste products) کو نکالتا ہے۔
- ✱ ڈائجیشن (Digestion): پیچیدہ غذائی مادوں کا سادہ، قابل جذب مادوں میں ٹوٹنا۔
- ✱ ڈی ہائبرڈ کراس (Dihybrid cross): ایک جینیاتی کراس جس
- ✱ (microorganism) جو بیماری کا سبب بنتا ہے۔
- ✱ پیدائشی امیونٹی (Innate Immunity): وہ قدرتی امیونٹی جس کے ساتھ جانداروں میں پیدائش کے وقت سے موجود ہوتی ہے۔
- ✱ پیراتھارمون (Parathormone): ایک ہارمون جو خون میں کالشیم کی سطح کو بڑھاتا ہے۔
- ✱ پیری سٹالسس (Peristalsis): مسلسل کا تال دار سکڑاؤ (rhythmic muscle contractions) جو خوراک کو ڈاگی جیسٹو سسٹم میں آگے بڑھاتا ہے۔
- ✱ پینکریاز (Pancreas): ایک آرگن جو ہارمونز (جیسے انسولین) اور ڈائی جیسٹو اینزائمز (digestive enzymes) بناتا ہے۔
- ✱ تغیرات (Variations) (جینیٹکس میں): ایک سی شیز (species) کے افراد کے درمیان خصوصیات (traits) میں فرق۔
- ✱ تھائی رائیڈ سٹیمولیشن ہارمون (Thyroid-stimulating hormone): ہارمون جو تھائی رائیڈ گلینڈ اور اس کے ہارمون کی پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے۔
- ✱ تھائی روکسن (Thyroxine): تھائی رائیڈ گلینڈ سے نکلنے والا ایک ہارمون جو جسم کے مینابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔
- ✱ ٹرانسپیریشن (Transpiration): پودوں کے پتوں کی سطح سے پانی کے بخارات کا ضیاع (loss)۔
- ✱ ٹرانسکرپشن آف ڈی این اے (Transcription of DNA): ڈی این اے (DNA) سے آر این اے (RNA) بنانے کا عمل۔
- ✱ ٹرانسلیشن (Translation) (جینیٹکس میں): آر این اے (RNA) سے پروٹین بنانے کا عمل۔
- ✱ ٹروبریڈنگ یعنی خالص نسل (True-breeding): وہ جاندار جو نسل در نسل یکساں خصوصیات (same traits) کے ساتھ اولاد پیدا کرتے ہیں۔
- ✱ ٹریکیا (Trachea): ہوا کی نالی (windpipe): ایک نالی جو باہر سے ہوا کو پیچھڑوں میں اور وہاں سے باہر لے جاتی ہے۔
- ✱ ٹیسٹوسٹیرون (Testosterone): اہم مردانہ ہارمون جو مردانہ خصوصیات اور ریپروڈکشن کے لیے ذمہ دار ہے۔
- ✱ ٹیسٹیز (Testes): مردانہ ریپروڈکٹو آرگنز جو سپرم اور ٹیسٹوسٹیرون (testosterone) پیدا کرتے ہیں۔

میں دو خصوصیات (traits) کا مطالعہ شامل ہو۔

• ڈومینٹ الیل (Dominant allele): ایک الیل جو صرف

ایک کاپی (copy) موجود ہونے پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔

• ڈی امینیشن (Deamination): جگر میں امائنو ایسڈز سے امائنو

گروپ کا ہٹایا جانا۔

• ڈی این اے (Deoxyribonucleic Acid-DNA): ایک

مالیکیول جو نیلے میں جینیاتی (جینیٹک) ہدایات رکھتا ہے۔

• الرجنز (Allergens): ایسے مادے جو الرجی کا رد عمل پیدا کرتے

ہیں۔

• الرجی (Allergy): بے ضرر مادوں جیسے پلن، دھول، یا مخصوص

غذاؤں کے خلاف امیون سسٹم کا رد عمل۔

• ریڈ بلڈ سیلز (Red blood cells): خون کے سیلز جن میں

ہیموگلوبن (haemoglobin) ہوتی ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے

آکسیجن لے جاتے ہیں۔

• ریسیسو الیل (Recessive allele): ایک الیل جو اپنا اثر صرف

اس وقت دکھاتا ہے جب اس کی دو کاپیاں (copies) موجود ہوں۔

• ریفلکس آرک (Reflex arc): نرۂ کا رستہ یعنی اعصابی راستہ

(nerve pathway) جس کے ذریعے ایک تیز، خودکار ریپانس

(ریفلکس) دماغ کو شامل کیے بغیر سینس آرگنز (sense organ)

سے ایک مسل (muscle) یا گیلنڈ (gland) تک سفر کرتا ہے۔

• ریفلکس ایکشن (Reflex action): ایک سٹیبولس

(stimulus) پر ایک تیز، خودکار (automatic) رد عمل۔

• ریکومبی نٹ ڈی این اے (Recombinant DNA): مختلف

ذرائع (sources) سے جینز کو ملا کر بننے والا ڈی این اے

(DNA)۔

• زائگوٹ (Zygote): پھلا سیل جو سپرم کے ایک سیل (egg) کو

فرٹیلائز (fertilize) کرنے پر بنتا ہے۔

• زونٹک بیماریاں (Zoonotic diseases): وہ بیماریاں جو

جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں۔

• سائی نیپس (Synapse): دو نیوراز کے درمیان کا فاصلہ (gap)

جہاں سے نرۂ آپلسز (nerve impulses) منتقل ہوتی ہیں۔

• سپائنل کورڈ (Spinal cord): دماغ سے نیچے نرۂ کا گچھا

(bundle of nerves) جو ریفلکس ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور

پیغامات بھیجتا ہے۔

• سپرم (Sperm): نرگیمیٹ (male gamete) یعنی ریپروڈکٹو

سیل۔

• سپرمائیڈ (Spermatid): ایک نابالغ سپرم سیل جو سپرم میں نمونپاتا

ہے۔

• سپرمیوجینیسیس (Spermatogenesis): مردوں میں سپرم سیلز

کے بننے کا عمل۔

• سپیسی ایشن یعنی نئی پس شیڈ کا ظہور (Speciation): ارتقا

(evolution) کے ذریعے نئی پس شیڈ (species) کا بننا۔

• سلائیوری گیلنڈز (Salivary glands): اوورل کیوٹیٹی میں موجود

گیلنڈز جو سلائیوا (saliva) خارج کرتے ہیں تاکہ خوراک کی ڈائی

جشن میں مدد ہو۔

• سم پیٹریک سپیسی ایشن (Sympatric speciation):

جغرافیائی علیحدگی کے بغیر نئی پس شیڈ (species) کا بننا۔

• سیکسول ریپروڈکشن (Sexual reproduction): ریپروڈکشن

کی وہ قسم جس میں نر اور مادہ گیمیٹ کا ملاپ (fusion) شامل ہوتا

ہے۔

• سیکنڈ پولر باڈی (Second polar body): ایک سیل (egg) کی

نمون کے دوران بننے والا ایک اور چھوٹا سیل، جو عام طور پر غیر فعال ہوتا

ہے۔

• سیکنڈری اووسائٹ (Secondary oocyte): اوو جینیسیس

(oogenesis) میں پہلی تقسیم کے بعد بننے والا ایک ایگ (egg)

سیل۔

• سیکنڈری سپرمیٹوسائٹ (Secondary spermatocyte):

سپرمیوجینیسیس میں پہلی تقسیم کے بعد بننے والا ایک ہپلائڈ

(haploid) سیل۔

• سمن (Semen): وہ فلوئڈ (fluid) جس میں سپرم اور نر گیلنڈز

(male glands) کی سیکریشن (secretions) شامل ہوتی ہیں۔

• سیمینل ویزیکل (Seminal vesicle): ایک گیلنڈ جو سمن بنانے

کے لیے سپرم میں فلوئڈ شامل کرتا ہے۔

• سینٹرومیر (Centromere): کروموسوم کا وہ حصہ جہاں دو کرومائیڈز

- کیپیلریز (Capillaries): خون کی سب سے چھوٹی نالیاں جہاں گیسوں، غذائی اجزاء (nutrients)، اور فضلے (waste) کا تبادلہ ہوتا ہے۔
- کیلسیٹونین (Calcitonin): ایک ہارمون جو خون میں کیلشیم کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- گروتھ ہارمون (Growth hormone): ایک ہارمون جو جسم کی نشوونما (growth) اور نمو (development) میں مدد کرتا ہے۔
- گلوکاگون (Glucagon): ایک ہارمون جو جگر کو ذخیرہ شدہ گلوکوز جاری کرنے کا کہہ کر خون میں شوگر کی سطح کو بڑھاتا ہے۔
- گلو میرولس (Glomerulus): گردے میں کیپیلریز کا ایک جھرمٹ جو خون کی فیلٹریشن کرتا ہے۔
- گیمیٹوجینیسیس (Gametogenesis): نر یا مادہ یکس سیلز یعنی گیمیٹس (gametes) کے بننے کا عمل۔
- لارج انٹسٹائن (Large intestine): ڈائی جیسٹو سسٹم (digestive system) کا وہ حصہ جہاں غیر ہضم شدہ مواد (waste) سے پانی جذب ہوتا ہے۔
- لمف (Lymph): ایک فلوئڈ (fluid) جو وائٹ بلڈ سیلز کو لے جاتا ہے اور خون کے بہاؤ (bloodstream) میں شامل ہوتا ہے۔
- لمفوسائٹ (Lymphocyte): وائٹ بلڈ سیلز کی ایک قسم جو مخصوص امیون رد عمل میں شامل ہوتی ہے۔
- لوکس (Locus/loci): ایک کروموسوم پر جین کا مخصوص مقام (location)۔
- لیوٹائیٹائزنگ ہارمون (Luteinizing hormone): ایک ہارمون جو مادہ میں ایک سیل (egg) کے اخراج اور مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون (testosterone) کی پیداوار میں مدد کرتا ہے۔
- لیوکوسائٹس (Leucocytes): وائٹ بلڈ سیلز جو انفیکشن کے خلاف جسم کا دفاع کرنے میں شامل ہوتے ہیں۔
- متعدی بیماریاں (Infectious diseases): پتھو جنز (pathogens) جیسے بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں۔
- مونو ہائبرڈ کراس (Monohybrid cross): ایک جینیاتی کراس جس میں صرف ایک خصوصیت (trait) کا مطالعہ شامل ہو۔

- آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔
- غیر متعدی بیماریاں (Non-Infectious disease): ایسی بیماریاں جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں نہیں پھیلتی ہیں، جیسے ڈائیابٹیز۔
- فرٹلائزیشن (Fertilization): نر (male) اور مادہ (female) گیمیٹ کا مل کر زائگوٹ (zygote) بنانا۔
- فرسٹ پولر باڈی (First polar body): سیکنڈری اووسائٹ (secondary oocyte) کے ساتھ بننے والا ایک چھوٹا غیر فعال سیل۔
- فرمینٹیشن (Fermentation) (بائیو ٹیکنالوجی میں): وہ عمل جس میں مائکروبز (microbes) مفید مصنوعات تیار کرنے کے لیے مادوں کو توڑتے ہیں۔
- فلوئم (Phloem): پودوں میں موجود شوجو خوراک کو منتقل کرتا ہے۔
- فولیکل (Follicle): اووری (ovary) کے اندر ایک ساخت جہاں ایک سیل (egg) نمونہ پاتا ہے۔
- فیلوپین ٹیوب (Fallopian tube): وہ نالی جہاں سے ایک سیل (egg) اووری (ovary) سے یوٹروس (uterus) تک جاتا ہے۔
- فینوٹائپ (Phenotype): کسی جاندار کی قابل مشاہدہ خصوصیات (observable traits or characteristics)۔
- کارڈیو ایک اریسٹ (Cardiac arrest): دل کے فنکشن کا اچانک ختم ہو جانا۔
- کارڈیو ویکسکولر سسٹم (Cardiovascular system): جسم کا وہ نظام جو دل، خون اور خون کی نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
- کروماٹڈ (Chromatid): ایک دوہرے ہو چکے (duplicated) کروموسوم کا ایک آدھا حصہ۔
- کروماٹن (Chromatin): نیوکلیئس میں ڈی این اے (DNA) اور پروٹینز کا آمیزہ، جو کروموسومز بناتا ہے۔
- کروموسوم (Chromosome): ڈی این اے (DNA) سے بنا ہوا دھانگے نما ڈھانچہ جو جینیاتی یونٹی جینیٹک معلومات رکھتا ہے۔
- کوآرڈینیشن (Coordination): نروس اور اینڈو کرائن سسٹمز کے ذریعے جسمانی افعال کا کنٹرول اور ریگولیشن۔
- کورٹیسول (Cortisol): ایک ہارمون جو جسم کو تناؤ (stress) کا جواب دینے میں مدد کرتا ہے اور مینا یوزم کو منظم کرتا ہے۔

- می اوسس (Meiosis): سبز کی تقسیم کی ایک قسم جو نصف تعداد میں کروموسومز کے ساتھ ڈائریکٹ پیدا کرتی ہے۔
- مینڈل کے قوانین (Mendel's Laws): وہ اصول جو بیان کرتے ہیں کہ خصوصیات (traits) والدین سے اولاد میں کیسے منتقل ہوتی ہیں۔
- مینسٹریشن (Menstruation): خواتین میں یوٹرائن (uterine) کی اندرونی تہ کا ماہانہ گرنا۔
- میوٹیشن (Mutation): ایک جین کے ڈی این اے (DNA) کی ترتیب میں تبدیلی۔
- نار اپنی نیفرین (Nor-epinephrine): ایک ہارمون جو تناؤ (stress) کے دوران دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔
- نچرل سلیکشن یعنی قدرتی چناؤ (Natural selection): وہ عمل جس کے ذریعے موافق خصوصیات (favourable traits) رکھنے والے جاندار زندہ رہتے ہیں اور پیر وڈکشن کرتے ہیں۔
- نیزل کیوٹی (Nasal cavity): ناک کا اندرونی حصہ، جہاں ہوا کو فلٹر کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، اور مرطوب (moistened) کیا جاتا ہے۔
- نیفرن (Nephron): گردے کی فعلیاتی اکائی (functional unit) جو خون کو فلٹر کرتی ہے اور پیشاب (urine) بناتی ہے۔
- نیوٹریٹ (Nutrient): ایک مادہ جو نشوونما (growth) اور صحت کے لیے ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے۔
- نیوران (Neuron): ایک نرو سیل (nerve cell) جو الیکٹریکل سگنلز کے طور پر پیغامات کو منتقل کرتا ہے۔
- ہارمون (Hormone): اینڈوکرائن گلینڈ سے پیدا ہونے والا ایک کیمیائی پیغام رساں جو جسمانی افعال کو منظم کرتا ہے۔
- ہسٹون (Histone): وہ پروٹینز جن کے گرد ڈی این اے (DNA) لپیٹ کر کروماتین بناتا ہے۔
- ہوموزائگس (Homozygous): کسی جین کے لیے دو یکساں ایللیلز کا ہونا۔
- ہیٹروزائگس (Heterozygous): کسی جین کے لیے دو مختلف ایللیلز کا ہونا۔
- ہیموڈائالسیس (Haemodialysis): ڈیالسیس کی ایک قسم جو خون کو

- صاف کرنے کے لیے ایک مشین استعمال کرتی ہے۔
- ہیموگلوبن (Haemoglobin): ریڈ بلڈ سیلز میں موجود ایک سرخ پروٹین جو آکسیجن لے جاتی ہے۔
- واس ڈیفرنس (Vas deferens): وہ نالی جو سپرم کو ٹیسٹیز سے یوریتھرا تک لے جاتی ہے۔
- والو (Valve): دل اور وینز (veins) میں موجود ساختیں جو خون کے اگلے بہاؤ (backflow) کو روکتی ہیں۔
- وراث (heredity / Inheritance): والدین سے اولاد میں خصوصیات (traits) کی منتقلی۔
- ولائی (Villi): سال اشعاع (small intestine) میں انگلی نما چھوٹے ابھار جو جذب (absorption) کے لیے سطح کے رقبے میں اضافہ کرتے ہیں۔
- ویکٹر کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں (Vector-Borne Diseases): مچھروں یا کس جیسے کیریئرز (carriers) کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں۔
- ویکٹرز (Vectors) (جینیٹک انجینئرنگ میں): وہ کیریئرز جو جینز (genes) کو جانداروں میں منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
- ویکسین (Vaccine): ایک مادہ جو امیون سسٹم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے متحرک (stimulates) کرتا ہے۔
- وینٹریکلز (Ventricles): دل کے نچلے دو خانے (جیمبرز) جو خون کو دل سے باہر پمپ کرتے ہیں۔
- یوٹرس (Uterus): ایک مسکولر آرگن جہاں حمل (pregnancy) کے دوران بچہ نمونہ پاتا ہے۔
- یوریتھرا (Urethra): وہ نالی جس کے ذریعے پیشاب (urine) جسم سے نکلتا (exits) ہوتا ہے۔
- یوریتھر (Ureter): وہ نالی جو گردے سے پیشاب (urine) کو مٹانے یعنی بلیڈر (bladder) تک لے جاتی ہے۔
- یورینری بلیڈر (Urinary bladder): ایک مسکولر تھیلا جو اخراج سے پہلے پیشاب (urine) کو ذخیرہ کرتا ہے۔

پیرنگ سکیم / امتحانی پیپر تیار کرنے کے لیے ہدایات

بائیولوجی برائے جماعت دہم

بائیولوجی کلاس-10 کا پیپر 60 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس پیپر کا وقت دو (02) گھنٹے ہے۔ یہ پیپر درج ذیل ہدایات کے مطابق تیار کیا جائے گا:

حصہ - اول
(معروضی طرز)

$$1 \times 12 = 12$$

سوال 1: کتاب کے تمام متن میں سے دس (12) کثیر الانتخابی سوالات پوچھے جائیں گے۔

باب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCQS	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2

$$2 \times 5 = 10$$

سوال 2: یہ حصہ مختصر جوابات کے سوالات پر مشتمل ہے۔ 8 میں سے 5 مختصر سوالات کے جوابات دیں۔

باب	1	2	5
مختصر سوالات	2	4	2

$$2 \times 5 = 10$$

سوال 3: یہ حصہ مختصر جوابات کے سوالات پر مشتمل ہے۔ 8 میں سے 5 مختصر سوالات کے جوابات دیں۔

باب	3	4	6	7
مختصر سوالات	2	3	1	2

حصہ - دوم
(انشائیہ طرز)

$$2 \times 5 = 10$$

سوال 4: یہ حصہ مختصر جوابات کے سوالات پر مشتمل ہے۔ 8 میں سے 5 مختصر سوالات کے جوابات دیں۔

باب	8	9	10
مختصر سوالات	2	2	4

$$2 \times 9 = 18$$

یہ حصہ تین (03) تفصیلی سوالات پر مشتمل ہوگا، جس میں سے دو (02) سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ ہر سوال کے نو (09) نمبر ہیں۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے:

سوال 5:

باب	1	3
حصہ	الف	ب

سوال 6:

باب	6	5
حصہ	الف	ب

سوال 7:

باب	9	8
حصہ	الف	ب

حصہ - سوم
(انشائیہ طرز)

MODEL PAPER OF BIOLOGY FOR CLASS-10

Objective Type

Time allowed: 15 Min.

Max. Marks: 12

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جو انتخاب آپ کے خیال میں درست ہے، اس سوال کے سامنے والے دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھریں۔ دو یا دو سے زیادہ دائروں کو کاٹنے یا بھرنے کی صورت میں جواب غلط تصور ہوگا۔

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle with marker or pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

(i) خوراک کی نالی کے فوراً بعد معدے کا حصہ کہلاتا ہے۔

(i) The part of the stomach just after the oesophagus is called:

- (a) Fundus (b) Pyloric end
(c) Cardiac end (d) Body

(ii) ان میں سے کون سا ترتیب اس راستے کو درست طور پر ظاہر کرتا ہے جس سے ہوا سانس لینے (Inhalation) کے دوران گزرتی ہے؟

(ii) Which of these correctly orders the structures through which air passes during inhalation?

- (a) Pharynx → trachea → larynx → bronchi
(b) Pharynx → larynx → trachea → bronchi
(c) Larynx → pharynx → bronchi → trachea
(d) Larynx → pharynx → trachea → bronchi

(iii) ناگہانوں سے ڈی آکسی جینیٹڈ (deoxygenated) خون کے دل تک واپس آنے کا درست راستہ بتائیں:

(iii) Trace the correct pathway for deoxygenated blood from legs back to the heart:

- (a) Femoral veins → Inferior vena cava → Right atrium
(b) Femoral arteries → Inferior vena cava → Right atrium
(c) Femoral veins → Superior vena cava → Right atrium
(d) Femoral arteries → Superior vena cava → Right atrium

(iv) Ureter leaves the kidney through:

- (a) pelvis (b) hilus
(c) papillary duct (d) collecting duct

(v) Tubular secretion is a/an:

- (a) active transport (b) diffusion
(c) osmosis (d) passive transport

(vi) The function of glucagon is to:

- (a) accelerates protein synthesis within cells
(b) stimulates release of glucose from liver
(c) decrease release of glucose from liver
(d) slow down glucose formation from lactic acid

- (vii) Fertilization usually occurs in the: عام طور پر فرٹیلائزیشن کہاں ہوتی ہے؟ (vii)
- (a) uterus یوٹرس (b) vagina ویجائنا
(c) fallopian tube فیلوپین ٹیوب (d) cervix سروکس
- (viii) If transcription is blocked, what will NOT form? اگر ٹرانسکرپشن رک جائے تو کون سی چیز تشکیل نہیں پائے گی؟ (viii)
- (a) mRNA ایم آر این اے (b) Amino acids امینو ایسڈز
(c) Proteins پروٹینز (d) Ribosome رائبوسوم
- (ix) If a gene from bacteria is transferred into corn, the advantage is: اگر بیکٹیریا کا جین کئی میں منتقل کیا جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ (ix)
- (a) larger corn کئی کے سائز میں اضافہ (b) production of natural toxin قدرتی زہر (ٹاکسن) کی پیداوار
(c) more vitamins زیادہ وٹامنز (d) faster growth تیزی سے نشوونما
- (x) Arrange the following in correct order: درج ذیل کو درست ترتیب میں لگائیں: (x)
1. Thrombin converts fibrinogen 1- تھرومبین فائبروجن کو تبدیل کرتا ہے
 2. Platelets form a temporary plug 2- پلیٹ لیٹس عارضی پلگ بناتے ہیں
 3. Clotting factors convert prothrombin 3- کلوٹنگ فیکٹرز پروتھرومبین کو تبدیل کرتے ہیں
 4. Platelets contract to reduce wound size 4- پلیٹ لیٹس زخم کے سائز کو کم کرنے کے لیے سکڑتے ہیں
- (a) 2 → 3 → 1 → 4 (b) 1 → 2 → 3 → 4
(c) 3 → 2 → 4 → 1 (d) 4 → 3 → 2 → 1
- (xi) What does "fittest" mean in evolution? ارتقاء میں "فٹسٹ" سے کیا مراد ہے؟ (xi)
- (a) Strongest سب سے زیادہ طاقتور (b) Largest سب سے بڑا
(c) Best suited سب سے زیادہ موزوں (d) Fastest سب سے تیز
- (xii) In allopatric speciation, the main factor preventing gene flow is: ایلوپاٹریک اسپیشی ایشن میں جین فلو کو روکنے والا بنیادی عنصر کون سا ہے؟ (xii)
- (a) climate آب و ہوا (b) predation پریڈیشن
(c) physical barrier جسمانی رکاوٹ (d) competition مقابلہ

Subjective Type (Part I)

Time allowed: 1.45 Hrs.

Max. Marks: 48

- Q. 2: Write short answers to any five (05) questions: کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے: (4)
- (i) State two functions of the liver other than digestion. ہائے کے علاوہ جگر کے دو افعال بیان کریں۔ (i)
- (ii) Differentiate between bolus and chyme. بولس اور کائم میں فرق بیان کریں۔ (ii)
- (iii) What is pleura? Write its function. پلیورا کیا ہے؟ اس کا فعل لکھیں۔ (iii)
- (iv) Write about the blood circulation in lungs. پیچھےڑوں میں خون کی گردش کے بارے میں لکھیں۔ (iv)
- (v) Mention the events during exhalation. ایگزالیٹیشن (Exhalation) کے دوران ہونے والے واقعات بیان کریں۔ (v)
- (vi) What are the causes and symptoms of emphysema? امفیسیما کی وجوہات اور علامات کیا ہیں؟ (vi)
- (vii) Compare the functions of thalamus and hypothalamus. تھالیس اور ہائپوٹھالیس کے افعال کا موازنہ کریں۔ (vii)
- (viii) Name any four hormones secreted by anterior lobe of pituitary gland. پیچھوٹری گلینڈ کے لائنٹریٹریوب سے خارج ہونے والے کسی چار ہارمونز کے نام لکھیں۔ (viii)
- (viii) Name any four hormones secreted by anterior lobe of pituitary gland.

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

Q. 3: Write short answers to any five (05) questions:

(5X2=10)

- (i) خون کے پلازما میں موجود کسی دو پروٹینز کے نام اور ان کے افعال لکھیں۔
- (ii) Give the names and functions of any two proteins present in blood plasma.
- (iii) آگے گرینولوسائٹس کیا ہیں؟ ان کی اقسام لکھیں۔
- (iv) What are agranulocytes? Write its types.
- (v) پریشر فلٹریشن اور ٹیوبیولر سیکریشن میں فرق بیان کریں۔
- (vi) Differentiate between pressure filtration and tubular secretion.
- (vii) لیٹھوٹریپسی سے کیا مراد ہے؟
- (viii) What do you mean by lithotripsy?
- (ix) رینل پیلوس کی تعریف کریں۔
- (x) Define renal pelvis.
- (xi) الیٹروجن اور پروجیسٹرون کے افعال میں موازنہ کریں۔
- (xii) Compare the functions of estrogen and progesterone.
- (xiii) یوکاریوٹک کرومیتن کی ترکیب کیا ہے؟
- (xiv) What is the composition of eukaryotic chromatin?
- (xv) مینڈل نے مٹر کے پودے کو تجرباتی طور پر کیوں منتخب کیا؟ دو وجوہات لکھیں۔
- (xvi) Why did Mendel choose pea plant as an experimental material? Give two reasons.

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے:

Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:

(5X2=10)

- (i) جینیاتی تبدیلی میں بیکٹیریا کا کردار بیان کریں۔
- (ii) Mention the role of bacteria in Genetic Modification.
- (iii) بائیو ٹیکنالوجی کے دو ممکنہ خطرات لکھیں۔
- (iv) Write any two potential risks of biotechnology.
- (v) فنگس اور پیراسائٹک پروٹوزوا سے ہونے والی بیماریوں کے نام لکھیں۔
- (vi) Name the infections caused by fungi and parasitic protozoan.
- (vii) زونوٹک بیماریاں کیا ہیں؟ دو مثالیں دیں۔
- (viii) What are zoonotic diseases? Give two examples.
- (ix) غیر فعال (vestigial) ساختوں کی تعریف کریں۔ انسانوں میں مثالیں دیں۔
- (x) Define vestigial structures. Give examples in humans.
- (xi) تغیر (Variation) کے بنیادی ذریعہ کے طور پر میوٹیشن کیسے کام کرتا ہے؟
- (xii) How does mutation act as the main source of variation?
- (xiii) سمپٹریک اسپیشیشن کیا ہے؟ ایک مثال دیں۔
- (xiv) What is Sympatric Speciation? Give an example.
- (xv) نیچرل سلیکشن کے مختلف مراحل بیان کریں۔
- (xvi) List the steps in the process of natural selection.

Subjective Type (Part II)

Note: Attempt any two questions.

(2x9=18)

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیے۔

Q.5. (a) Describe the absorption of food in small intestine.

(الف) چھوٹی آنت میں غذائی اجزاء کے جذب (Absorption) ہونے کی وضاحت کریں۔

(b) How does blood circulate in human heart?

(ب) انسانی دل میں خون کیسے گردش کرتا ہے؟

Q.6. (a) What are sexually transmitted diseases? Explain with an example of AIDS.

(الف) جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں (STDs) کیا ہیں؟ AIDS کی مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔

(b) Describe the hormones with functions of the adrenal gland.

(ب) ایڈرینل گینڈ کے ہارمونز اور ان کے افعال کی وضاحت کریں۔

Q.7. (a) In what ways do killer cells and protective proteins contribute to the second line of defence?

(الف) کلر خلیے (Killer cells) اور حفاظتی پروٹین دوسری دفاعی لائن میں کس طرح کردار ادا کرتے ہیں؟

(b) How does biotechnology help in medical field?

(ب) طب (Medical field) کے میدان میں بائیو ٹیکنالوجی کس طرح مدد کرتی ہے؟