


اس پونٹ کو مکمل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- سائن (sine) اور کوسائن (cosine) تقاضوں کو 90° اور 180° کے درمیان والے زاویوں تک وسعت دے سکیں۔
- کسی بھی مثلث کے لیے سائن کا قانون، کوسائن کا قانون اور رقبہ کے کلیوں کا استعمال کرتے ہوئے سوالات مسائل حل کر سکیں۔
- سردی میں سادہ تکونیاتی مسائل حل کر سکیں۔
- تکونیات کے تصورات کو حقیقی دنیا کے مسائل (جیسے ویڈیو گیمز، فلائٹ انجینئرنگ، نیویگیشن اور صوتی لہریں) پر لاگو کر سکیں۔
- سہ بندی پیرنگ کی تشریح اور استعمال کر سکیں۔
- پیرنگ سے متعلق حقیقی زندگی کے مسائل حل کر سکیں۔
- پیرنگ کے تصورات کو حقیقی دنیا کے مسائل پر لاگو کر سکیں۔

تکونیاتی نسبتیں یا تقاضے (Trigonometric Ratios or Functions) 7.1



ایک قائمہ الزاویہ مثلث POM کے زاویہ θ پر مبنی نسبتیں، جہاں کا قائمہ زاویہ M پر ہے۔ جہاں OM کو متعلقہ ضلع، PM کو مخالف ضلع، اور PO کو وتر کہا جاتا ہے،

$$(i) \sin \theta (\sin \theta) = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}} \quad (ii) \cos \theta (\cos \theta) = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$$

$$(iii) \csc \theta (\csc \theta) = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$$

$$(iv) \sec \theta (\sec \theta) = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}} \quad (v) \tan \theta (\tan \theta) = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$$

$$(vi) \cot \theta (\cot \theta) = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$$

اوپر دی گئی چھ تکونیاتی نسبتوں کو تکونیاتی تقاضے بھی کہا جاتا ہے۔

نوٹ:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

یاد رکھیے!

$\sin \theta$ کا مطلب $\sin$ اور 0 کی ضرب نہیں ہے۔ $\sin \theta$ کو زاویہ θ کا سائن پڑھا جاتا ہے۔

مخصوص زاویوں کے لیے تکونیاتی قدریں (Trigonometric Values for Special Angles)

خاص زاویوں کے لیے تکونیاتی قدریں درج ذیل جدول میں دی گئی ہیں:


180°	90°	60°	45°	30°	0°	نسبتیں θ زاویہ
0		$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	$\sin \theta$

-1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\cos \theta$
0	غیر تعریف شدہ	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\tan \theta$

مکونیاتی تقاطعوں کی علامات (Signs of Trigonometric Function)

علامتیں اس ربع پر منحصر ہوتی ہیں جس میں زاویہ کا اختتامی سرا واقع ہوتا ہے۔ ہم ایک دائرہ پر غور کرتے ہیں جس کا رداس 1 ہے اور مرکز نقطہ O پر ہے۔

پہلے ربع میں: $x > 0, y > 0$



$$\sin \theta = \frac{y}{r} > 0, \cos \theta = \frac{x}{r} > 0, \tan \theta = \frac{y}{x} > 0,$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{r}{y} > 0, \sec \theta = \frac{r}{x} > 0, \cot \theta = \frac{x}{y} > 0$$

پس، پہلے ربع میں تمام مکونیاتی تقاطع مثبت ہوتے ہیں۔

دوسرے ربع میں: $x < 0, y > 0$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} > 0, \cos \theta = \frac{-x}{r} < 0, \tan \theta = \frac{y}{-x} < 0, \operatorname{cosec} \theta = \frac{r}{y} > 0, \sec \theta = \frac{-r}{x} < 0, \cot \theta = \frac{-x}{y} < 0$$

پس، دوسرے ربع میں $\sin$ اور cosec تقاطع مثبت ہوتے ہیں اور باقی تمام مکونیاتی تقاطع منفی ہوتے ہیں۔

تیسرے ربع میں: $x < 0, y < 0$


$$\sin \theta = \frac{-y}{r} < 0, \cos \theta = \frac{-x}{r} < 0, \tan \theta = \frac{-y}{-x} > 0, \operatorname{cosec} \theta = \frac{-r}{y} < 0, \sec \theta = \frac{-r}{x} < 0, \cot \theta = \frac{-x}{-y} > 0$$

پس، تیسرے ربع میں $\tan$ اور $\cot$ تقاطع مثبت ہوتے ہیں اور باقی تمام مکونیاتی تقاطع منفی ہوتے ہیں۔

چوتھے ربع میں: $x > 0, y < 0$

$$\sin \theta = \frac{-y}{r} < 0, \cos \theta = \frac{x}{r} > 0, \tan \theta = \frac{-y}{x} < 0, \operatorname{cosec} \theta = \frac{-r}{y} < 0, \cot \theta = \frac{x}{-y} < 0, \sec \theta = \frac{r}{x} > 0$$

پس چوتھے ربع میں $\cos$ اور $\sec$ تقاطع مثبت ہوتے ہیں اور باقی تمام مکونیاتی تقاطع منفی ہوتے ہیں۔



0°, 90°, اور 180° کی ٹریگونیومیٹرک نسبتیں

(Trigonometric Ratio of 0°, 90° and 180°)

-i 0° کی ٹریگونیومیٹرک نسبتیں (Trigonometric Ratios of 0°)

فرض کیا ایک اکائی دائرہ جس کا مرکز O ہے اور اس پر نقطہ P(x, y) اس طرح لیں کہ $m\angle AOP = 0^\circ$ ہو۔ چونکہ P(x, y) محور پر واقع ہے۔

اس لیے $x = 1, y = 0, r = 1$

$$\sin 0^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0, \quad \operatorname{cosec} 0^\circ = \frac{1}{\sin 0^\circ} = \frac{1}{0} = \text{غیر تعریف شدہ}$$

$$\cos 0^\circ = \frac{x}{r} = \frac{1}{1} = 1, \quad \sec 0^\circ = \frac{1}{\cos 0^\circ} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\tan 0^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{1} = 0, \quad \cot 0^\circ = \frac{1}{\tan 0^\circ} = \frac{1}{0} = \text{غیر تعریف شدہ}$$

-ii 90° کی ٹریگونیومیٹرک نسبتیں (Trigonometric Ratios of 90°)

فرض کیا ایک اکائی دائرہ جس کا مرکز O ہے اور اس پر P(x, y) اس طرح لیں کہ $m\angle AOP = 90^\circ$ ہو۔ چونکہ P(x, y) -y محور پر واقع ہے اس لیے $x = 0, y = 1, r = 1$

$$\sin 90^\circ = \frac{y}{r} = \frac{1}{1} = 1, \quad \operatorname{cosec} 90^\circ = \frac{1}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\cos 90^\circ = \frac{x}{r} = \frac{0}{1} = 0, \quad \sec 90^\circ = \frac{1}{\cos 90^\circ} = \frac{1}{0} = \text{غیر تعریف شدہ}$$

$$\tan 90^\circ = \frac{y}{x} = \frac{1}{0} = \text{غیر تعریف شدہ}, \quad \cot 90^\circ = \frac{1}{\tan 90^\circ} = \frac{1}{\text{غیر تعریف شدہ}} = 0$$

$$\tan 90^\circ = \frac{y}{x} = \frac{1}{0} = \text{غیر تعریف شدہ}, \quad \cot 90^\circ = \frac{1}{\tan 90^\circ} = \frac{1}{\text{غیر تعریف شدہ}} = 0$$

-iii 180° کی ٹریگونیومیٹرک نسبتیں (Trigonometric Ratios of 180°)

فرض کیا ایک اکائی دائرہ جس کا مرکز O ہے اور اس پر P(x, y) اس طرح لیں کہ $m\angle AOP = 180^\circ$ ہو۔ چونکہ P(x, y) -x' محور پر واقع ہے، اس لیے $m\angle AOP = 180^\circ$

اس لیے $m\angle AOP = 180^\circ$


$$\sin 180^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0, \quad \operatorname{cosec} 180^\circ = \frac{1}{\sin 180^\circ} = \frac{1}{0} = \text{غیر تعریف شدہ}$$

$$\cos 180^\circ = \frac{x}{r} = \frac{-1}{1} = -1, \quad \sec 180^\circ = \frac{1}{\cos 180^\circ} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\tan 180^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{-1} = 0, \quad \cot 180^\circ = \frac{1}{\tan 180^\circ} = \frac{1}{0} = \text{غیر تعریف شدہ}$$

90° اور 180° کے درمیان والے زاویوں کے لیے سائن اور کوسائن تقاطعوں کو وسعت دینا

(Extending sine and cosine Functions to Angles Between 90° and 180°)



فرض یہ کارتیسی محدوداتی نقطہ میں ایک اکائی دائرہ لایا جس کا مرکز O(0,0) اور رداس 1 ہے۔
P(cos θ, sin θ) دائرے کے محیط پر پہلے ربع میں کوئی بھی نقطہ ہے، جہاں
m/MOP = θ m/YOP

m/OP'M' = لیے m/MOP' = (90° + θ) اور m/POP' = 90°
m/YOI (متبادلہ زاویے) لہذا، زاویہ (90° + θ) زاویہ θ کو 90° کے ذریعے مخالف
حرکی وارست گھمانے سے حاصل ہوتا ہے۔

۱ کے محدودات (sin θ, cos θ) ہوں گے یعنی P' کا نیا x-محدہ، P کے y-محدہ کی منفی قدر بن جاتا ہے اور P' کا نیا y-محدہ، P کا x-محدہ بن جاتا ہے۔
جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اکائی دائرہ میں کسی بھی زاویہ کے کوسائن (cosine) اور سائن (sine) کو بالترتیب x-محدہ اور y-محدہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ لہذا،

نوٹ:

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tan(-\theta) = -\tan \theta$$

$$\cos(90^\circ + \theta) = \text{محدہ } x \text{ کا } (90^\circ + \theta) = \sin \theta$$

$$\sin(90^\circ + \theta) = \text{محدہ } y \text{ کا } (90^\circ + \theta) = \cos \theta$$


$$\sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta, \csc(90^\circ + \theta) = \sec \theta$$

$$\cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta, \sec(90^\circ + \theta) = -\csc \theta$$

$$\tan(90^\circ + \theta) = -\cot \theta, \cot(90^\circ + \theta) = -\tan \theta$$

(b) (180° - θ) کی شکل کے زاویوں کی مجموعی نسبتیں۔

فرض کریں θ اور m/MOP = (180° - θ) اور m/MOP' = θ ہیں۔
یہاں ΔPOM اور ΔP'OM' ایک دوسرے کے متماثل ہیں، اس طرح کہ:
mP'M' = PM اور mOM' = mOM، mOP' = mOP
ΔPOM میں، mPM = mP'M' اور mOM = mOM'، mOP = mOP'،



$$\cos \theta = \frac{a}{mOP} \text{ اور } \sin \theta = \frac{b}{mOP}$$

$$\sin(180^\circ - \theta) = \frac{\text{محدہ } y \text{ کا } P'}{mOP'} = \frac{b}{mOP'} = \sin \theta \text{ میں } \Delta P'OM'$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = \frac{\text{محدہ } x \text{ کا } P'}{mOP'} = \frac{-a}{mOP} = -\cos \theta$$

$$\csc(180^\circ - \theta) = \csc \theta$$

$$\sec(180^\circ - \theta) = -\sec \theta$$

$$\cot(180^\circ - \theta) = -\cot \theta$$

$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta$$

مثال 1: درج ذیل کی علامات معلوم کیجیے۔

- (i) cos 75° (ii) cot 250°
حل: (i) 75° پہلے ربع میں واقع ہے جہاں cos مثبت ہوتا ہے۔
(ii) 250° تیسرے ربع میں واقع ہے جہاں cot مثبت۔

مثال 2: کیمکولیسر کا استعمال کیے بغیر، درج ذیل کونیاتی تقاطعوں کی درست قدریں معلوم کیجیے:

$$\cot 150^\circ \quad (ii) \quad \sin 120^\circ \quad (i)$$

$$\sin 120^\circ \quad (i) \quad \text{حل:}$$

120° دوسرے ربع میں واقع ہے، جہاں $\sin$ مثبت ہوتا ہے۔

$$\therefore \sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ$$

$$\therefore \sin(180^\circ - 0) = \sin 0$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cot 150^\circ \quad (ii)$$

150° دوسرے ربع میں واقع ہے، جہاں $\cot$ منفی ہوتا ہے۔

$$\therefore \cot 150^\circ = \cot(180^\circ - 30^\circ) = -\cot 30^\circ \therefore \cot(180^\circ - 0) = -\cot 0$$

$$= -\sqrt{3}$$

حل مشق 7.1

1- درج ذیل کی علامات معلوم کیجیے:

$$\sin 55^\circ \quad (i)$$

حل: $\sin 55^\circ$ پہلے ربع میں واقع ہے جہاں $\sin$ مثبت ہوتا ہے۔

$$\cos 145^\circ \quad (ii)$$

حل: $\cos 145^\circ$ دوسرے ربع میں واقع ہے جہاں $\cos$ منفی ہوتا ہے۔

$$\tan 111^\circ \quad (iii)$$

حل: $\tan 111^\circ$ دوسرے ربع میں واقع ہے جہاں $\tan$ منفی ہوتا ہے۔

$$\sec 179^\circ \quad (iv)$$

حل: $\sec 179^\circ$ تیسرے ربع میں واقع ہے جہاں $\sec$ منفی ہوتا ہے۔

$$\operatorname{cosec} 88^\circ \quad (v)$$

حل: $\operatorname{cosec} 88^\circ$ پہلے ربع میں واقع ہے جہاں cosec مثبت ہوتا ہے۔

$$\sin 14^\circ \quad (vi)$$

حل: $\sin 14^\circ$ پہلے ربع میں واقع ہے جہاں $\sin$ مثبت ہوتا ہے۔

2- خالی جگہیں پُر کیجیے۔

$$\cos(90^\circ + \theta) = \dots \sin \theta \quad (iv)$$

$$\cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta \quad \text{حل}$$

$$\operatorname{cosec}(180^\circ - \theta) = \dots \operatorname{cosec} \theta \quad (v)$$

$$\operatorname{cosec}(180^\circ - \theta) = + \operatorname{cosec} \theta \quad \text{حل}$$

$$\sec(90^\circ - \theta) = \dots \operatorname{cosec} \theta \quad (vi)$$

$$\sec(90^\circ - \theta) = + \operatorname{cosec} \theta \quad \text{حل}$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = \dots \tan \theta \quad (i)$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = -\tan \theta \quad \text{حل}$$

$$\sin(180^\circ - \theta) = \dots \sin \theta \quad (ii)$$

$$\sin(180^\circ - \theta) = + \sin \theta \quad \text{حل}$$

$$\tan(90^\circ + \theta) = \dots \cot \theta \quad (iii)$$

$$\tan(90^\circ + \theta) = -\cot \theta \quad \text{حل}$$

3- کیلکولیٹر کا استعمال کیے بغیر درج ذیل ٹریگونیومیٹری تفاعلوں کی درست قدر معلوم کیجیے:

$\sin 150^\circ$ (i)

$\sin 150^\circ = \sin (180^\circ - 30^\circ) = + \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \therefore \sin (180^\circ - \theta) = \sin \theta$ حل:

$\tan 150^\circ$ (ii)

$\tan 150^\circ = \tan (180^\circ - 30^\circ) = - \tan 30^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}} \therefore \tan (180^\circ - \theta) = - \tan \theta$ حل:

$\sec 150^\circ$ (iii)

$\sec 150^\circ = \sec (180^\circ - 30^\circ) = - \sec 30^\circ = -\frac{2}{\sqrt{3}} \therefore \sec (180^\circ - \theta) = - \sec \theta$ حل:

$\operatorname{cosec} 120^\circ$ (iv)

$\operatorname{cosec} 120^\circ = \operatorname{cosec} (180^\circ - 60^\circ) = + \operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{2}{\sqrt{3}} \therefore \operatorname{cosec} (180^\circ - \theta) = \operatorname{cosec} \theta$ حل:

$\cos 120^\circ$ (v)

$\cos 120^\circ = \cos (180^\circ - 60^\circ) = - \cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \therefore \cos (180^\circ - \theta) = - \cos \theta$ حل:

$\cot 120^\circ$ (vi)

$\cot 120^\circ = \cot (180^\circ - 60^\circ) = - \cot 60^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}} \therefore \cot (180^\circ - \theta) = - \cot \theta$ حل:

$\sin 135^\circ$ (vii)

$\sin 135^\circ = \sin (180^\circ - 45^\circ) = + \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \therefore \sin (180^\circ - \theta) = \sin \theta$ حل:



$\sec 135^\circ$ (viii)

$\sec 135^\circ = \sec (180^\circ - 45^\circ) = - \sec 45^\circ = -\sqrt{2} \therefore \sec (180^\circ - \theta) = - \sec \theta$ حل:

$\cot 135^\circ$ (ix)

$\cot 135^\circ = \cot (180^\circ - 45^\circ) = - \cot 45^\circ = -1 \therefore \cot (180^\circ - \theta) = - \cot \theta$ حل:

7.2 غیر قائمہ الزاویہ مثلثیں (Oblique Triangles)



غیر قائمہ الزاویہ مثلث ایسی مثلث ہوتی ہے جس میں کوئی بھی قائمہ زاویہ نہ ہو۔ نہ یا تو حادہ زاویہ مثلث (تمام زاویے 90° سے کم) یا منفرجہ زاویہ مثلث (ایک زاویہ 90° سے بڑا) ہو سکتی ہے۔ درج ذیل مثلثیں غیر قائمہ الزاویہ مثلثیں ہیں:

سائن کا قانون (The Law of Sines)

اگر a, b, c کسی مثلث کے اضلاع اور α, β, γ ان اضلاع کے مخالف زاویے ہوں تو سائن کا قانون درج ذیل ہے:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

سائن کا قانون مثلث کے زاویوں اضلاع کے درمیان ایک تعلق ہے۔ مثلث کو حل کرتے وقت، سائن کا قانون ایک ایسی مثلث کو حل کرنے

کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جب دو زاویے اور ایک ضلع جو کسی ایک زاویہ کے مخالف ہو دیے گئے ہوں۔
مثال 3: ایک مثلث ABC میں، $\alpha = 45^\circ$ ، $\beta = 30^\circ$ اور $a = 6\text{cm}$ ہوں تو b اور c معلوم کیجیے۔


حل: جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ:

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - \beta - \gamma$$

$$= 180^\circ - 45^\circ - 30^\circ = 105^\circ$$

اب سائن کے قانون کے مطابق



$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{a}{\sin 150^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$$

$$\frac{a}{\sin 75^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$$

$$\frac{a}{\sin 75^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ} \quad \text{اب}$$

$$b = \frac{a \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} = \frac{6 \times (0.71)}{0.97} = \frac{4.26}{0.97} = 4.4\text{cm}$$

$$\frac{a}{\sin 75^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ} \quad \text{اب}$$

$$c = \frac{a \sin 30^\circ}{\sin 75^\circ} = \frac{6 \times (0.5)}{0.97} = \frac{3.0}{0.97} = 3.1\text{cm}$$

$$\frac{0.9135 \times 2}{0.9744} = b$$

$$1.87 = b$$

$$b = 1.87\text{cm}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{2}{\sin 77^\circ} = \frac{c}{\sin 37^\circ}$$

$$\frac{\sin 37^\circ \times 2}{\sin 77^\circ} = c$$

$$\frac{0.6018 \times 2}{0.9744} = c$$

$$1.24 = c$$

$$c = 1.24\text{cm}$$

$$\gamma = 37^\circ, b = 1.87\text{cm}, c = 1.24\text{cm} \quad \text{لہذا}$$

خود آزمائی

ΔABC کو حل کیجیے جس میں $\alpha = 77^\circ$ ، $\beta = 66^\circ$ ، $a = 2\text{cm}$

$$\alpha = 77^\circ, \beta = 66^\circ, a = 2\text{am}$$

حل:

ہم جانتے ہیں

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$$

$$= 180^\circ - 77^\circ - 66^\circ$$

$$= 37^\circ$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\frac{2}{\sin 77^\circ} = \frac{b}{\sin 66^\circ}$$

$$\sin 66^\circ \times \frac{2}{\sin 77^\circ} = b$$

چیلنج! جب کسی مثلث کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ یا تینوں اضلاع دیے گئے ہوں تو کیا ہم سائن کا قانون استعمال کر سکتے ہیں؟
جواب: جی نہیں اگر ہمارے پاس دو اضلاع a اور b اور ان کا درمیانی زاویہ بھی ہو تو ہمارے پاس ان کے سامنے والے اضلاع کے متعلقہ زاویے α اور β نہیں ہوتے جس سے جوڑا نہیں بنتا اگر ہمارے پاس کسی تین اضلاع a، b اور c ہوں تو ہمارے پاس شروع کرنے کے لیے زاویہ نہیں ہوگا۔

کوسائن کا قانون (The Law of cosines)

اگر a، b اور c کسی مثلث کے اضلاع ہوں اور α، β اور γ بالترتیب ان اضلاع کے مخالف زاویے ہوں، تو کوسائن کا قانون درج ذیل ہے:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad \text{یا} \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \quad \text{یا} \quad \cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos \beta \quad \text{یا} \quad \cos \beta = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

مثال 4: ΔABC میں a = 3، b = 5، c = 7 ہوں تو α، β اور γ کیا قیمتیں معلوم کیجیے۔

حل: a = 3، b = 5، c = 7، کوسائن کا قانون استعمال کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5^2 + 7^2 - 3^2}{2 \times 5 \times 7} = \frac{25 + 49 - 9}{70} = \frac{13}{14}$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{13}{14} \right) = 21.8^\circ$$

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{3^2 + 7^2 - 5^2}{2 \times 3 \times 7} = \frac{9 + 49 - 25}{42} = \frac{11}{14}$$

$$\beta = \cos^{-1} \left(\frac{11}{14} \right) = 38.2^\circ$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

جیسا کہ

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta = 180^\circ - 21.8^\circ - 38.2^\circ = 120^\circ$$

مثلث کا رقبہ (Area of a Triangle)

(a) جب کسی مثلث کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ دیا گیا ہو، تو

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{1}{2} bc \sin \alpha = \frac{1}{2} ac \sin \beta = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

مثال 5: مثلث ABC کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں a = 4.2، b = 3.2 اور γ = 70° ہو۔

حل: a = 4.2، b = 3.2، γ = 70°

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{1}{2} ab \sin \gamma = \frac{1}{2} (4.2)(3.2) \sin 70^\circ$$

$$= \frac{1}{2} (4.2)(3.2)(0.94) = 6.31 \text{ مربع یونٹس}$$

(b) جب مثلث کے تینوں اضلاع دیے گئے ہوں، تو

$$s = \frac{a+b+c}{2} \quad \Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

مثال 6: ΔABC کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں $a = 4\text{cm}$, $b = 3\text{cm}$, $c = 5\text{cm}$ ہے۔

$$s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{4+3+5}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

$$s - a = 6 - 4 = 2$$

$$s - b = 6 - 3 = 3$$

$$s - c = 6 - 5 = 1$$

$$\text{رقبہ of } \Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{6(2)(3)(1)} = \sqrt{36}$$

$$= 6\text{cm}^2$$

خود آزمائی

ΔABC کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں

$$a = 6.1\text{ cm}, b = 2.3\text{ cm}, \gamma = 80^\circ \quad (\text{ii})$$

$$a = 8\text{cm}, b = 9\text{cm}, c = 10\text{cm} \quad (\text{i})$$

$$(i) s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{8+9+10}{2} = \frac{27}{2} = 13.5\text{cm}$$

$$\text{رقبہ } \Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{13.5(13.5-8)(13.5-9)(13.5-10)}$$

$$= \sqrt{13.5(5.5)(4.5)(3.5)}$$

$$= \sqrt{1169.4375} = 34.20\text{cm}^2$$

$$(ii) a = 6.1\text{cm}, b = 2.3\text{cm}, \gamma = 80^\circ$$

$$\text{رقبہ } \Delta ABC = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

$$= \frac{1}{2} \times (6.1) (2.3) \sin (80^\circ)$$

$$= (7.015) (0.984)$$

$$= 6.91\text{cm}^2$$

(c) جب مثلث کے دو زاویے اور ایک ضلع دیا گیا ہو، تو

$$\text{رقبہ } \Delta ABC = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$

مثال 7: مثلث ABC کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں $\alpha = 35^\circ$, $\beta = 65^\circ$ اور $a = 2\text{cm}$ ہے۔

حل: جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ:

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$35^\circ + 65^\circ + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ = 80^\circ$$

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha}$$

$$= \frac{(2)^2 \sin 65^\circ \sin 80^\circ}{2 \sin 35^\circ}$$

$$= \frac{4(0.91)(0.98)}{2 \sin 35^\circ} = 3.13 \text{ m}^2$$

ΔABC کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں $\beta = 50^\circ$, $\gamma = 40^\circ$, $c = 10 \text{ cm}$

خود آزمائی
حل:

$$\beta = 50^\circ, \gamma = 40^\circ, c = 10 \text{ cm}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - \beta - \gamma$$

$$= 180^\circ - 50^\circ - 40^\circ = 90^\circ$$

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{c^2 \sin(\alpha) \sin(\beta)}{2 \sin(\gamma)}$$

$$= \frac{10^2 \sin(90^\circ) \sin(50^\circ)}{2 \sin(40^\circ)}$$

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{100 \times 1 \times 0.766^\circ}{2 \sin(40^\circ)}$$

$$= \frac{76.60}{1.2856} = 59.58 \text{ cm}^2$$

حل مشق 7.2

1- مثلث ABC کو حل کیجیے جس میں

$$a = 6.1 \text{ cm}, b = 8.4 \text{ cm}, \alpha = 42^\circ \quad (i)$$

$$a = 6.1 \text{ cm}, b = 8.4 \text{ cm}, \alpha = 42^\circ$$

سائین کا قانون

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\frac{6.1}{\sin 42^\circ} = \frac{8.4}{\sin \beta}$$

$$\sin \beta = \frac{8.4 \times \sin 42^\circ}{6.1}$$

$$\sin \beta = 0.92$$

$$\beta = \sin^{-1} 0.92$$

$$\beta = 67.1^\circ$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

حل:

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$$

$$= 180^\circ - 42^\circ - 67.1^\circ = 70.9^\circ$$

سائین کا قانون

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\sin \gamma \times \frac{b}{\sin \beta} = c$$

$$\frac{\sin 70.9^\circ \times 8.4}{\sin 67.1^\circ} = c$$

$$\frac{0.94 \times 8.4}{0.92} = c$$

$$8.6 = c$$

لہذا: $c = 8.6 \text{ cm}$, $\beta = 67.1^\circ$, $\gamma = 70.9^\circ$

(ii) $a = 12.2 \text{ cm}$, $c = 15.8 \text{ cm}$, $\gamma = 50^\circ$

$a = 12.2 \text{ cm}$, $c = 15.8 \text{ cm}$, $\gamma = 50^\circ$

سائن کا قانون

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{12.2}{\sin \alpha} = \frac{15.8}{\sin 50^\circ}$$

$$\sin 50^\circ \times \frac{12.2}{15.8} = \sin \alpha$$

$$\frac{0.76 \times 12.2}{15.8} = \sin \alpha$$

$$0.59 = \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = 0.59$$

$$\alpha = \sin^{-1}(0.59)$$

$$\alpha = 36.3^\circ$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\beta = 180 - \alpha - \gamma$$

$$\beta = 180 - 36.3^\circ - 50^\circ$$

$$\beta = 93.7^\circ$$

سائن کا قانون

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{b}{\sin 93.7^\circ} = \frac{15.8}{\sin 50^\circ}$$

$$b = \frac{15.8}{\sin 50^\circ} \times \sin 93.8^\circ$$

$$b = \frac{15.8}{0.76} \times 0.998$$

$$b = 20.6 \text{ cm}$$

$$b = 20.6 \text{ cm}, \alpha = 36.3^\circ, \beta = 93.7^\circ$$

(iii) $b = 5.2 \text{ cm}$, $c = 5 \text{ cm}$, $\gamma = 48^\circ$

$b = 5.2 \text{ cm}$, $c = 5 \text{ cm}$, $\gamma = 48^\circ$

سائن کا قانون

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{5.2}{\sin \beta} = \frac{5}{\sin 48^\circ}$$

$$\frac{\sin 48^\circ \times 5.2}{5} = \sin \beta$$

$$\sin \beta = \frac{\sin 48^\circ \times 5.2}{5}$$

$$\sin \beta = \frac{0.74 \times 5.2}{5}$$

$$\sin \beta = 0.77$$

$$\beta = \sin^{-1} 0.77$$

$$\beta = 50.6^\circ$$

جیسا کہ ہم جانتے ہیں

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - \beta - \gamma$$

$$180^\circ - 50.4^\circ - 48^\circ$$

$$81.4^\circ$$

سائن کا قانون

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{a}{\sin 81.4^\circ} = \frac{5}{\sin 48^\circ}$$

$$a = \frac{5}{\sin 48^\circ} \times \sin 81.4^\circ$$

$$a = \frac{5}{0.74} \times 0.99$$

$$a = 6.7 \text{ cm}$$

$$a = 6.7 \text{ cm}, \alpha = 81.4^\circ, \beta = 50.6^\circ$$

(iv) $b = 4.8 \text{ cm}$, $a = 4 \text{ cm}$, $\beta = 71^\circ$

$b = 4.8 \text{ cm}$, $a = 4 \text{ cm}$, $\beta = 71^\circ$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\frac{4}{\sin \alpha} = \frac{4.8}{\sin 71^\circ}$$

$$\frac{\sin 71^\circ \times 4}{4.8} = \sin \alpha$$

$$\frac{0.95 \times 4}{4.8} = \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = 0.79$$

$$\alpha = \sin^{-1} 0.79$$

$$\alpha = 52^\circ$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$$

$$= 180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$$

$$= 57^\circ$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{4.8}{\sin 71^\circ} = \frac{c}{\sin 57^\circ}$$

$$\sin 57^\circ \times \frac{4.8}{\sin 71^\circ} = c$$

$$\frac{0.8 \times 4.8}{0.9} = c$$

$$4.3 = c$$

$$c = 4.3 \text{ cm}, \alpha = 52^\circ, \gamma = 57^\circ$$

$$(v) \beta = 70^\circ, b = 8 \text{ cm}, \alpha = 100^\circ$$

$$\beta = 70^\circ, b = 8 \text{ cm}, \alpha = 100^\circ$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\frac{a}{\sin 100^\circ} = \frac{8}{\sin 70^\circ}$$

$$a = \frac{8}{\sin 70^\circ} \times \sin 100^\circ$$

$$a = \frac{8}{0.94} \times 0.99$$

$$a = 8.4 \text{ cm}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$$

$$\gamma = 180^\circ - 100^\circ - 70^\circ$$

$$\gamma = 10^\circ$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{8}{\sin 70^\circ} = \frac{c}{\sin 10^\circ}$$

$$\sin 10^\circ \times \frac{8}{\sin 70^\circ} = c$$

$$0.17 \times \frac{8}{0.94} = c$$

$$1.5 = c$$

$$c = 1.5 \text{ cm}$$

$$a = 8.4 \text{ cm}, c = 1.5 \text{ cm}, \gamma = 10^\circ$$

$$(vi) a = 6 \text{ cm}, \alpha = 55^\circ, \gamma = 60^\circ$$

$$a = 6 \text{ cm}, \alpha = 55^\circ, \gamma = 60^\circ$$

حل:

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\beta = 180^\circ - \alpha - \gamma$$

$$\beta = 180^\circ - 55^\circ - 60^\circ$$

$$\beta = 65^\circ$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\frac{6}{\sin 55^\circ} = \frac{b}{\sin 65^\circ}$$

$$\sin 65^\circ \times \frac{6}{\sin 55^\circ} = b$$

$$0.91 \times \frac{6}{0.82} = b$$

$$6 = b$$

$$b = 6 \text{ cm}$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{6}{\sin 65^\circ} = \frac{c}{\sin 60^\circ}$$

$$\sin 60^\circ \times \frac{6}{\sin 65^\circ} = c$$

$$\frac{0.87 \times 6}{0.91} = c$$

$$6.3 = c$$

$$c = 6.3 \text{ cm}$$

$$c = 6.4 \text{ cm}, b = 6.7 \text{ cm}, \beta = 65^\circ$$

(vii) $c = 7 \text{ cm}$, $\beta = 34^\circ$, $\gamma = 64^\circ$

$c = 7 \text{ cm}$, $\beta = 34^\circ$, $\gamma = 64^\circ$: حل

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - \beta - \gamma$$

$$\alpha = 180^\circ - 34^\circ - 64^\circ$$

$$\alpha = 82^\circ$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{b}{\sin 34^\circ} = \frac{7}{\sin 64^\circ}$$

$$b = \frac{7}{\sin 64^\circ} \times \sin 34^\circ$$

$$b = \frac{7}{0.89} \times 0.56$$

$$b = 4.4 \text{ cm}$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\frac{a}{\sin 82^\circ} = \frac{4.4}{\sin 34^\circ}$$

$$a = \frac{4.4}{\sin 34^\circ} \times \sin 82^\circ$$

$$a = \frac{4.4}{0.56} \times 0.99$$

$$a = 7.7 \text{ cm}$$

لہذا، $a = 7.7 \text{ cm}$, $b = 4.4 \text{ cm}$, $\alpha = 82^\circ$

(viii) $b = 12 \text{ cm}$, $\alpha = 92^\circ$, $\beta = 77^\circ$

$b = 12 \text{ cm}$, $\alpha = 92^\circ$, $\beta = 77^\circ$: حل

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - 92^\circ - 77^\circ$$

$$= 11^\circ$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\frac{a}{\sin 92^\circ} = \frac{12}{\sin 77^\circ}$$

$$a = \frac{12}{\sin 77^\circ} \times \sin 92^\circ$$

$$a = \frac{12}{0.97} \times 0.999$$

$$a = 12.3 \text{ cm}$$

سائن کے قانون سے

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{12}{\sin 77^\circ} = \frac{c}{\sin 11^\circ}$$

$$\frac{\sin 11^\circ \times 12}{\sin 77^\circ} = c$$

$$\frac{0.19 \times 12}{0.97} = c$$

$$c = 2.4 \text{ cm}$$

لہذا، $a = 12.3 \text{ cm}$, $c = 2.4 \text{ cm}$, $\gamma = 11^\circ$

2. مثلث ABC کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(i) $a = 7 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $\gamma = 38^\circ$

$a = 7 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $\gamma = 38^\circ$: حل

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

$$= \frac{1}{2} (7) (8) (\sin 38^\circ)$$

$$= 28 (0.6157)$$

$$= 17.24 \text{ cm}^2$$

$a = 11 \text{ cm}$, $c = 14 \text{ cm}$, $\beta = 51^\circ$ (ii)

$a = 11 \text{ cm}$, $c = 14 \text{ cm}$, $\beta = 51^\circ$: حل

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{1}{2} ac \sin \beta$$

$$= \frac{1}{2} (11) (14) (\sin 51^\circ)$$

$$= 77 (0.7771)$$

$$= 59.84 \text{ cm}^2$$

(iii) $b = 3 \text{ m}$, $c = 9 \text{ cm}$, $\alpha = 78^\circ$

$b = 3 \text{ m}$, $c = 9 \text{ cm}$, $\alpha = 78^\circ$: حل

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} b c \sin \alpha$$

$$= \frac{1}{2} (3) (9) (\sin 78^\circ)$$

$$= 13.5 (0.9781)$$

$$= 13.20 \text{ cm}^2$$

$$(iv) a = 10 \text{ cm}, \alpha = 62^\circ, \beta = 69^\circ$$

$$a = 10 \text{ cm}, \alpha = 62^\circ, \beta = 69^\circ : \text{حل}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180 - \alpha - \beta$$

$$= 180 - 62^\circ - 69^\circ = 49^\circ$$

$$\Delta ABC = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha}$$

$$= \frac{(10)^2 (\sin 69^\circ) (\sin 49^\circ)}{2 \sin 62^\circ}$$

$$= \frac{100 (0.9336) (0.7547)}{2 (0.8829)}$$

$$= \frac{70.4588}{1.7658} = 39.90 \text{ cm}^2$$

$$(v) c = 4 \text{ cm}, \beta = 36^\circ, \gamma = 80^\circ$$

$$c = 4 \text{ cm}, \beta = 36^\circ, \gamma = 80^\circ : \text{حل}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - \beta - \gamma$$

$$= 180^\circ - 36^\circ - 80^\circ = 64^\circ$$

$$\Delta ABC = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$

$$= \frac{(4)^2 (\sin 64^\circ) (\sin 36^\circ)}{2 (\sin 80^\circ)}$$

$$(16) (0.8988) (0.5878)$$

$$2 (0.9848)$$

$$8.4530$$

$$1.9696$$

$$4.29 \text{ cm}^2$$

$$(vi) c = 6.6 \text{ cm}, \alpha = 23^\circ, \gamma = 89^\circ$$

$$c = 6.6 \text{ cm}, \alpha = 23^\circ, \gamma = 89^\circ : \text{حل}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\beta = 180^\circ - \alpha - \gamma$$

$$= 180^\circ - 23^\circ - 89^\circ = 68^\circ$$

$$\Delta ABC = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$

$$= \frac{(6.6)^2 (\sin 23^\circ) (\sin 68^\circ)}{2 (\sin 89^\circ)}$$

$$= \frac{43.56 (0.3907) (0.9272)}{2 (0.9998)}$$

$$15.7799$$

$$1.9996$$

$$7.89 \text{ cm}^2$$

$$(vii) a = 5.3 \text{ cm}, b = 4.7 \text{ cm}, c = 8.2 \text{ cm}$$

$$a = 5.3 \text{ cm}, b = 4.7 \text{ cm}, c = 8.2 \text{ cm} : \text{حل}$$

$$a = 5.3, b = 4.7, c = 8.2$$

$$S = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\frac{5.3+4.7+8.2}{2}$$

$$\frac{18.2}{2} = 9.1$$

$$\Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{9.1(9.1-5.3)(9.1-4.7)(9.1-8.2)}$$

$$= \sqrt{9.1(3.8)(4.4)(0.9)}$$

$$= \sqrt{136.93}$$

$$a = 6.12 \text{ cm}, b = 8.34 \text{ cm}, c = 7.12 \text{ cm} (viii)$$

$$a = 6.12 \text{ cm}, b = 8.34 \text{ cm}, c = 7.12 \text{ cm} : \text{حل}$$

$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$s = \frac{6.12+8.34+7.12}{2} = \frac{21.58}{2} = 10.79 = 11.70 \text{ cm}^2$$

$$\Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{10.79(10.79-6.12)(10.79-8.34)(10.79-7.12)}$$

$$= \sqrt{10.79(4.67)(2.45)(3.67)}$$


$$= \sqrt{453.33} = 21.29 \text{ cm}^2$$

سُرخی میں سادہ ٹریگونیٹری مسائل حل کرنا

7.3

(Solve Simple Trigonometric Problems in Three Dimensions)

مثال 8: دی گئی شکل ایک منشور کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلث PQR منشور کا کراس سیکشن ہے، جہاں وہ زاویہ معلوم کیجیے جو خط MR مستوی RQIM کے ساتھ بناتا ہے۔



$$m\overline{PR} = 20 \text{ cm}, \quad m\overline{MP} = 12 \text{ cm}$$

$$m\angle PRQ = 30^\circ, \quad m\angle PQR = 90^\circ$$

حل: قائمہ الزاویہ مثلث PQR میں،

$$\frac{m\overline{PQ}}{20} = \sin 30^\circ$$

$$m\overline{PQ} = 20 \times \frac{1}{2}$$

$$= 10 \text{ cm}$$

قائمہ الزاویہ مثلث MPR میں

$$m\overline{MR} = \sqrt{(m\overline{PR})^2 + (m\overline{MP})^2} = \sqrt{(20)^2 + (12)^2} = \sqrt{400 + 144} = \sqrt{544}$$

$$= 23.3238 \text{ cm}$$


قائمہ الزاویہ مثلث MPR میں

$$\sin x = \frac{\text{opp.}}{\text{hyp.}} = \frac{10}{23.3238} = 0.4287$$

$$\therefore x = \sin^{-1}(0.4287)$$

$$= 25.4^\circ$$

مثال 9: شکل ایک مکعب نما ABCDEFGH کو ظاہر کرتی ہے جس میں $m\overline{FC} = 16 \text{ cm}$, $m\overline{AF} = 6 \text{ cm}$, $m\overline{AB} = 8 \text{ cm}$ کی لمبائی معلوم کیجیے۔



$$m\overline{AC} = \sqrt{(m\overline{FC})^2 - (m\overline{AF})^2} = \sqrt{(16)^2 - (6)^2}$$


$$= \sqrt{256 - 36} = \sqrt{220} = 14.83 \text{ cm}$$

قائمہ الزاویہ مثلث ABC میں

$$m\overline{BC} = \sqrt{(m\overline{AC})^2 - (m\overline{AB})^2} = \sqrt{(14.83)^2 - (8)^2}$$

$$= \sqrt{156} = 12.5 \text{ cm}$$

مثال 10: ایک ہوائی جہاز 12° کے زاویہ صعود پر پرواز شروع کرتا ہے اور اس راستے پر 2000 میٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہوائی جہاز کتنی بلندی پر ہے؟
حل: $\triangle ABC$ مثلث میں



$$\sin 12^\circ = \frac{m\overline{BC}}{2000}$$

$$(0.2079)2000 = m\overline{BC}$$

$$m\overline{BC} = 415.8 \text{ m}$$

جہاز زمین سے تقریباً 415.8 میٹر بلندی پر ہے۔

مثال 11: ایک ساؤنڈ لیب میں، دو مائیکروفون $c = 3\text{m}$ کے فاصلے پر رکھے گئے ہیں۔ ایک آواز کے سورس سے ایک مائیکروفون $a = 2\text{m}$ اور دوسرے سے $b = 2.5\text{m}$ کے فاصلے پر ہے۔ ان آواز کے راستوں a اور b کے درمیان زاویہ معلوم کیجیے۔
حل: یہاں $a = 2\text{m}$, $b = 2.5\text{m}$, $c = 3\text{m}$

کوسائن کا قانون پیش کرتے ہوئے

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{2^2 + (2.5)^2 - 3^2}{2 \times 2 \times 2.5} = \frac{4 + 6.25 - 9}{10} = 0.125$$


$$\gamma = \cos^{-1}(0.125)$$

$$= 82.8^\circ$$

حل مشق 7.3

1- مثلثی منشور میں معلوم کیجیے۔

(i) $\overline{CF}$ کی لمبائی (ii) $\overline{BF}$ کی لمبائی (iii) زاویہ BFC ، میں جواب ایک درجہ اعشاریہ تک درست ہو۔



حل: (i) $\overline{BC} = 3\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\text{cm}$, $\overline{FE} = 5\text{cm}$

قائمہ الزاویہ مثلث CEF میں

$$\begin{aligned} \overline{CF} &= \sqrt{(\overline{CE})^2 + (\overline{FE})^2} \\ &= \sqrt{(4)^2 + (5)^2} = \sqrt{16 + 25} \\ &= \sqrt{41} = 6.4\text{cm} \end{aligned}$$

(ii) قائمہ الزاویہ مثلث BCF میں

$$\begin{aligned} \overline{BF} &= \sqrt{(\overline{BC})^2 + (\overline{CF})^2} \\ &= \sqrt{(3)^2 + (\sqrt{41})^2} = \sqrt{9 + 41} \\ &= \sqrt{50} = 7.1\text{cm} \end{aligned}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قائمہ}}$$


$$\tan \theta = \frac{BC}{CE}$$

$$\tan \angle BFC = \frac{3}{\sqrt{41}}$$

$$\angle BFC = \tan^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{41}} \right)$$

$$\angle BFC = \tan^{-1} \left(\frac{3}{6.403} \right)$$

$$= 25.1^\circ$$



2- شکل ایک مثلثی مخروط کو ظاہر کرتی ہے جس کا افقی مستطیلی قاعدہ PQRS ہے، جس میں $m\overline{PQ} = 16 \text{ cm}$ اور $m\overline{QR} = 10 \text{ cm}$ ہے۔ خط PR کا درمیانی نقطہ ہے۔ راس T سے عمودی طور پر M کے اوپر ہے اور $m\overline{MT} = 15 \text{ cm}$ خط TP اور قاعدہ PQRS کے درمیان زاویہ معلوم کیجیے۔ اپنا جواب ایک درجہ اعشاریہ تک درست دیں۔

PR کا وسطی نقطہ M ہے۔

$$\overline{PM} = \frac{\overline{PR}}{2} = \frac{18.868}{2} = 9.434 \text{ cm}$$

قائمہ الزاویہ مشابہت TMP میں

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قائمہ}}$$

$$\tan \theta = \frac{TM}{PM}$$

$$\tan \angle TMP = \frac{15}{9.434}$$

$$\angle TMP = \tan^{-1} (1.590)$$

$$= 57.8^\circ$$

حل: مستطیلی قاعدہ PQRS

$$\overline{PQ} = 16 \text{ cm}$$

$$\overline{QR} = 10 \text{ cm}$$

$$\overline{MT} = 15 \text{ cm}$$

PR وتر کا وسطی نقطہ M ہے۔


قائمہ الزاویہ مشابہت PQR میں

$$\overline{PR} = \sqrt{(\overline{PQ})^2 + (\overline{QR})^2}$$

$$= \sqrt{(16)^2 + (10)^2}$$

$$= \sqrt{256 + 100}$$

$$\overline{PR} = \sqrt{356} = 18.868 \text{ cm}$$



3- شکل مخروط کو ظاہر کرتی ہے جس کا قاعدہ PQRS، 10 سینٹی میٹر ضلع کا ایک افقی مربع ہے۔ راس V، قاعدہ کے وسطی نقطہ M سے عمودی طور پر اوپر ہے اور $m\overline{VM} = 12 \text{ cm}$ ہے۔ زاویہ VPM معلوم کیجیے۔

حل: قائمہ الزاویہ مشابہت PQR میں

$$\overline{PR} = \sqrt{(\overline{PQ})^2 + (\overline{QR})^2}$$

$$= \sqrt{(10)^2 + (10)^2}$$

$$= \sqrt{100 + 100}$$

$$= \sqrt{200}$$

$$= \sqrt{4 \times 50}$$

$$= 2\sqrt{50}$$

$$\overline{PM} = \frac{\overline{PR}}{2} = \frac{2\sqrt{50}}{2} = \sqrt{50} \text{ cm}$$


∠VPM قائمہ الزاویہ مثلث میں ہم Tan کی نسبت استعمال کریں۔

$$\tan \angle VPM = \frac{\overline{VM}}{\overline{PM}}$$

$$\tan \angle VPM = \frac{12}{\sqrt{50}}$$

$$\angle VPM = \tan^{-1} \left(\frac{12}{7.071} \right)$$

$$\angle VPM = 59.5^\circ$$



4- ABCDE ایک مربعی قاعدہ والا مخروط ہے۔ جس میں اور $\overline{AB} = 15 \text{ cm}$

معلوم $\overline{EA} = \overline{EB} = \overline{EC} = \overline{ED} = 12 \text{ cm}$ زاویہ DEB

کیجیے اور اپنا جواب ڈگری میں دیجیے۔ (مکمل عدد)

حل: DEB مساوی الساقین مثلث میں

$$\overline{EB} = \overline{ED} = 12 \text{ cm}$$

$$\overline{AB} = 15 \text{ cm}$$

$$\overline{BD} = \sqrt{(\overline{BA})^2 + (\overline{AD})^2}$$

$$= \sqrt{(15)^2 + (15)^2}$$

$$= \sqrt{225 + 225}$$

$$= \sqrt{450} = 21.21 \text{ cm}$$

کوسائن کا قانون استعمال کریں

$$(\overline{BD})^2 = (\overline{BE})^2 + (\overline{DE})^2 - 2(\overline{BE})(\overline{DE})\cos(\angle BED)$$

$$450 = (12)^2 + (12)^2 - 2(12)(12)\cos(\angle BED)$$

$$450 = 144 + 144 - 288\cos(\angle BED)$$

$$288\cos\angle BED = 288 - 450$$


$$288\cos\angle BED = -162$$

$$\cos\angle BED = \frac{-162}{288}$$

$$\cos\angle BED = -0.5625$$

$$\angle BED = \cos^{-1}(-0.5625)$$

$$\angle BED = 124^\circ$$



5- دی گئی شکل ایک مشقی مخروط کو ایک افقی مستطیلی قاعدہ ABCD کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ $mBC = 7\text{cm}$, $mAB = 10\text{cm}$ ہے۔ نقطہ M AD کا وسطی ہے۔ $mMT = 6\text{cm}$ ہے اور M کے اوپر ہے۔ نقطہ T اس سے عمودی طور پر M کے اوپر ہے۔ TB اور قاعدہ کے درمیان زاویہ معلوم کیجیے۔

حل: AD کا وسطی نقطہ M ہے۔

$$mMA = 3.5\text{ cm}, mAB = 10\text{ cm}$$

BMA قائمہ الزاویہ مثلث میں

$$mMB = \sqrt{(MA)^2 + (AB)^2}$$

$$= \sqrt{(3.5)^2 + (10)^2}$$

$$= \sqrt{12.25 + 100}$$

$$= \sqrt{112.25} = 10.59\text{ cm}$$


$$\tan \theta = \frac{TM}{MB}$$

$$\tan \angle TBM = \frac{6}{10.59}$$

$$\angle TBM = \tan^{-1} \left(\frac{6}{10.59} \right)$$

$$\angle TBM = 29.5^\circ$$

6- ایک آئیسو میٹرک ٹرک گیم میں کیمرو زمین سے 45° کے زاویہ پر رکھا گیا ہے۔ اگر کھلاڑی سامنے سے 10 یونٹ اور اوپر 10 یونٹ پر ہو تو دیکھنے کے خط کا فاصلہ معلوم کیجیے۔
حل: فرض کیا



(10) یونٹ
10 یونٹ
BC (وتر) دیکھنے کے خط کا فاصلہ
مسند فیثاغورث کی رو سے

$$mBC = \sqrt{(mAB)^2 + (mAC)^2}$$


$$= \sqrt{(10)^2 + (10)^2}$$

$$= \sqrt{100 + 100}$$

$$= \sqrt{200}$$

$$= 14.14\text{ یونٹ}$$

7- ایک سرویٹر ایک ٹاور کی چوٹی کو 28° کے زاویہ صعود پر دیکھتا ہے وہ قاعدہ سے 60 میٹر کے فاصلہ پر کھڑا ہے، ٹاور کی اونچائی معلوم کیجیے۔
حل:



ٹاور کی اونچائی
قاعدہ سے فاصلہ
زاویہ صعودی

$$\frac{x}{60} = \tan 28^\circ$$

$$\tan \theta$$

$$\frac{\text{مخالف}}{\text{قاعدہ}}$$

$$\tan 28^\circ = \frac{x}{60}$$

$$60 \times \tan 28^\circ = x$$


$$60 \times 0.5317 = x$$

$$31.9 = x$$

$$x = 31.9m$$

$$\text{ٹاور کی اونچائی} = 31.9m$$

8- ایک کشتی 80 میٹر چوڑے دریا کو روانی سے 60° کے زاویہ پر عبور کرتی ہے۔ کشتی حقیقت میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟



$$\text{دریا کی چوڑائی} = 80m$$

$$\text{لہر کا زاویہ} = 60^\circ$$

$$\text{فرض کیا کشتی سے طے کردہ فاصلہ} = x m \text{ (وتر)}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{80}{x}$$

$$0.5 = \frac{80}{x}$$

$$x = \frac{80}{0.5} = 160m$$

$$\text{لہذا کشتی کا اصل میں طے کردہ فاصلہ} = 160$$

9- ایک سامع دو سپیکروں سے آنے والی آواز سنتا ہے۔ ایک سپیکر بالکل سامنے 6 میٹر کے فاصلے پر ہے اور دوسرا 30° کے

زاویہ پر 6 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ سپیکرز کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔

حل: یہ ایک مثلث بناتی ہے جس کے مربعاضلاع 6m، 6m اور زاویہ کی پیمائش 30° ہے۔

$$\text{فرض کیا سپیکر A اور B کے درمیان کا فاصلہ} = d$$

کوسائن کے قانون کا استعمال

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 30^\circ$$

$$d^2 = (6)^2 + (6)^2 - 2(6)(6)(0.866)$$

$$d^2 = 36 + 36 - 72(0.866)$$


$$d^2 = 72 - 62.35$$

$$d^2 = 9.65$$


$$\sqrt{d^2} = \sqrt{9.65}$$

$$d = 3.1m$$

$$\text{لہذا سپیکروں کے درمیان کا فاصلہ} = 3.1m$$



10- 10 میٹر کی بحری ایک دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ جو زمین کے ساتھ 75° کا زاویہ بناتی ہے۔ وہ دیوار پر کتنی اونچائی تک پہنچتی ہے؟



$$\sin \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{وتر}}$$

$$\sin 75^\circ = \frac{x}{10}$$

$$0.966 = x$$


$$(0.966)(10) = x$$

$$9.66 = x$$

$$x = 9.66 \text{ m}$$

بحری دیوار پر پہنچنے والی اونچائی 9.66m ہے۔

11- ایک لائٹ ہاؤس سطح سمندر سے 80 میٹر اونچی چٹان پر واقع ہے۔ ایک بحری جہاز 12° کے زاویہ نزول پر دیکھا جاتا ہے۔ جہاز چٹان کی بنیاد سے کتنا دور ہے۔



حل: 80 m لائٹ ہاؤس کی سمندر سے بلندی

12° زاویہ نزول

زاویہ صعودی

12° نزولی صعودی

فرض کیا جہاز اور چوٹی کے قاعدہ کا فاصلہ

تکو نیاتی نسبتوں سے tan کا استعمال

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{وتر}}$$

$$\tan(12^\circ) = \frac{80}{d}$$

$$0.21256 = \frac{80}{d}$$

$$d = \frac{80}{0.21256}$$

$$d = 376.4 \text{ m}$$

$$376.4 \text{ m} = \text{جہاز کا چٹان کی بنیاد سے فاصلہ}$$

کیا آپ جانتے ہیں؟



سمتی نقاط پر چار بنیادی نقاط ہوتے ہیں: شمال، جنوب مشرق اور مغرب۔ عام سمتیں کیا جاتا ہے: شمال مشرق (NE)، جنوب

مشرق (SE)، جنوب مغرب (SW) اور شمال مغرب (NW)۔

بیرنگ ایک زاویہ ہے جو شمالی سمت سے شروع ہوتا ہے اور کسی وار سمت میں ڈگریوں میں ماپا جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ سہ ہندسی زاویہ کے طور پر 000° اور 360° کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ یہ نیوٹیشن، ہوا جہاز کی راہ کے اور نقطہ پر پہنچنے میں درست سمت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، مشرق کی طرف اڑانے والے ہوائی جہاز کا بیرنگ 090° ہے۔

مثال 12: شکل میں Q کا P سے بیرنگ 060° ہے۔ P کا Q سے بیرنگ معلوم کیجیے۔




حل: خط NQ کو پُر حاصل میں 180° NQW زاویہ حاصل ہوتا ہے۔

چونکہ متبادل زاویے برابر ہوتے ہیں اس لیے

$$060^\circ = m\angle PQW$$

$$\text{لہذا، } 180^\circ + 060^\circ = \text{P کا Q سے بیرنگ}$$

$$240^\circ$$



مثال 13: جہاز ایک بحری جہاز میں نقطہ A سے نقطہ B تک 080° کے بیرنگ سے سفر کرتا ہے۔ نقطہ

B سے نقطہ A پر واپس آنے کے لیے اسے کونسا بیرنگ لینا چاہیے؟

حل: دی گئی شکل سفر کو نقطہ A سے B تک ظاہر کرتی ہے۔

سفر کے خط کو پُر حاصل میں تو ہمیں B پر 80° کا زاویہ حاصل ہوتا ہے۔

$$A \text{ کا } B \text{ سے بیرنگ} = 080^\circ + 180^\circ = 260^\circ$$

مثال 14: ایک ہوائی جہاز ایک ہوائی اڈے سے روانہ ہوتا ہے اور 40 کلومیٹر مشرق کی طرف سے سفر طے کرتا ہے، جس کے بعد 50 کلومیٹر

شمال کی طرف جاتا ہے۔ پھر بالکل ممکنہ مختصر راستہ اختیار کرتے ہوئے ہوائی اڈے پر واپس آتا ہے۔ مختصر ترین راستہ کا بیرنگ اور فاصلہ کیا ہے؟

حل: 0 معلوم کرنے کے لیے

$$\tan \theta = \frac{40}{50} = 0.8$$

$$\theta = \tan^{-1}(0.8)$$

$$= 38.66^\circ$$

$$\text{بیرنگ} = 180^\circ + 38.66^\circ = 218.66^\circ$$

فرض کیا x مختصر ترین راستہ ہے۔

$$x^2 = 40^2 + 50^2$$

$$= 1600 + 2500$$

$$= 4100$$

$$x = \sqrt{4100}$$


$$= 64.03 \text{ km}$$




پاکت ہوائی اڈے پر واپس آنے کے لیے 218.66° کے بیرنگ پر پرواز کرتے ہوئے 64.03 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔

حل مشق 7.4


1- درج ذیل میں سے ہر ایک میں نقطہ P کا بیرنگ معلوم کیجیے۔



حل: شمال میں موجود جنوب تک کا زاویہ (ایک سیدھی لکیر) 180° ہے۔
چونکہ نقطہ P جنوبی لکیر سے گھڑی کی سوئیوں کے مخالف رخ پر 40° پر ہے،
لہذا ہم اس کو 180° سے تفریق کریں گے
 $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ لہذا نقطہ P کی بیرنگ




حل: شمال مغرب = نقطہ P کا بیرنگ
 020° پیمائش کا زاویہ مغربی خط سے
گھڑی وار سمت شمال سے مغربی خط کی طرف
 270° چونکہ P نقطہ 020° اور گھڑی سمت ہے
مغربی خط 270° میں جمع کریں گے
لہذا، نقطہ P کی بیرنگ $270^\circ + 020^\circ = 290^\circ$



حل: جنوب مغرب = نقطہ P کا بیرنگ
 050° مغربی لکیر سے دیے گئے زاویے کی پیمائش

شمال سے گھڑی کی سوئیوں کے رخ پر مغربی خط تک کا فاصلہ = 270°
 چونکہ مغربی خط پر سے پہنچے ہیں اس لیے ہم اسے 270°P میں تفریق کریں گے
 لہذا نقطہ P کی بیرنگ = 270° - 050° = 220°




حل:

جنوب مغرب = نقطہ P کا ریلج
 = 075° مغربی لکیر سے دیے گئے زاویے کی پیمائش
 = 90° شمال سے گھڑی کی سوئیوں کے رخ پر مشرقی لکیر تک کا زاویہ
 چونکہ مشرقی خط مجزہ 075° پہنچے ہیں اس لیے ہم اسے مغربی خط والے خط 90° سے تفریق کریں گے۔

$$\text{لہذا نقطہ P کی بیرنگ} = 090^\circ - 075^\circ = 015^\circ$$

2- شکل دو جہازیں P اور Q کی پوزیشن ظاہر کرتی ہے۔



(i) جہاز P کا جہاز Q سے بیرنگ کیا ہے؟

$$= 060^\circ \text{ شمال سے بیرنگ جہاز P کا بیرنگ}$$

$$= 360^\circ \text{ پورے دائرے کا بیرنگ}$$

چونکہ گھڑی وار سمت ہے

$$\text{جہاز P کا جہاز Q سے بیرنگ} = 360^\circ - 060^\circ = 300^\circ$$

(ii) جہاز Q کا جہاز P سے بیرنگ کیا ہے؟


$$= 060^\circ \text{ چونکہ یہ شمالی خط کے متوازی ہے}$$

$$m\angle P + m\angle Q = 180^\circ$$

$$m\angle Q = 060^\circ$$

$$\text{جہاز P کا جہاز Q سے بیرنگ} = 180^\circ - 060^\circ = 120^\circ$$

3- شکل تین مقامات A، B اور C کو ظاہر کرتی ہے۔ درج ذیل کا بیرنگ معلوم کیجیے:



(i) A کا C سے

خط A کا C سے 50° گھڑی کی مخالف سمت شمال میں ہے۔

$$= 360^\circ \text{ ایک پورے دائرہ کی پیمائش}$$

$$\text{A کا بیرنگ C سے} = 360^\circ - 050^\circ = 310^\circ$$

(ii) C کا A سے

حل: اب ہمارا شروعاتی نقطہ ہے

A کی شمالی خط اور عمودی ہے C کی شمالی خط ہے

لہذا تمام زاویوں کا مجموعہ 180°

$$\text{B کا بیرنگ C سے} = 180^\circ - 050^\circ = 130^\circ$$

(iv) B کا C سے

(iii) C کا B سے

حل: اب ہمارا شروعاتی نقطہ ہے۔

حل: B ہمارا شروعاتی نقطہ ہے۔

C کا شمالی خط اور B کے شمالی سرے خط کی شروعات ہے

B کا شمالی خط اور C کا شمالی خط آپس میں عمودی ہیں تو لہذا


ان کے زاویے 180 میں جمع ہو کے

$$40^\circ = \text{بیرنگ}$$

$$180^\circ + 040^\circ = 220^\circ = \text{بیرنگ B-C ہے}$$

-4- عبدالہادی 100 میٹر شمال کی طرف اور پھر 300 میٹر مشرق کی طرف چلتا ہے۔

(i) وہ اپنی ابتدائی پوزیشن سے کتنا دور ہے؟



حل: 100m فاصلہ شمال کی طرف اور پھر 300m مشرق کی طرف کا فاصلہ ایک قائمہ

الزاویہ مثلث بناتا ہے۔

مسئلہ فیثاغورث سے

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$\text{فاصلہ} = \sqrt{(100)^2 + (300)^2}$$

$$= \sqrt{10000 + 90000}$$

$$= \sqrt{100,000}$$

$$= 316.2 \text{ m}$$

(ii) اپنی ابتدائی پوزیشن پر واپس جانے کے لیے اسے کس بیرنگ پر چلنا چاہیے۔

حل: اپنی ابتدائی پوزیشن پر واپس جانے کے لیے اسے (شمال-مشرق) میں واپس جانا ہوگا اپنی سابقہ پوزیشن ہے۔

پہلے ہم θ نکالیں گے


$$\tan(\theta) = \frac{300}{100}$$

$$\theta = \tan^{-1}(3)$$

$$\theta = 71.6^\circ$$

$$\text{سابقہ پوزیشن} = 71.6^\circ$$

$$252^\circ \text{ یا } 251.6^\circ = 71.6^\circ + 180^\circ = \text{واپسی کی بیرنگ}$$



-5- تین جہاز L، M، N شکل میں دکھائی گئی پوزیشن میں ہیں۔ جہاز M جہاز

N کے شمال مشرق میں ہے۔ M سے L کا بیرنگ معلوم کیجیے۔

حل: شکل سے

L، M ایک افقی خط ہے (مشرق = مغرب)

شمالی خط LM سے عمود ہے

بیرنگ گھڑی داؤ سمت شمال سے کی جاتی ہے لہذا یہ خط M سے LM کی

طرف ہے

L، M مغرب کی طرف ہے M سے، جس کا زاویہ 270°

270° سے M کی طرف کی بیرنگ

-6 ایک بحری جہاز 120° کے بیرنگ پر 20 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ جہاز اپنی ابتدائی پوزیشن سے کتنی دور جنوب میں گیا ہے؟
حل:

$$\text{جہاز کی بیرنگ} = 120^\circ$$

$$\text{جنوب سے زاویہ} = 180^\circ - 120^\circ$$

$$= 60^\circ$$

$$\text{جنوب کی طرف فاصلہ} = 20 (\cos 60^\circ)$$

$$= 20 \times 0.5$$

$$= 10 \text{ km}$$

-7 فاصلہ 5.5 کلومیٹر جنوب کی طرف چلی اور پھر 1.3 کلومیٹر مغرب کی طرف مڑ گئی۔ اس کے ابتدائی نقطہ سے حوریہ کا بیرنگ معلوم کیجیے۔
حل:

$$\text{جنوب کی طرف چلنا} = 5.5 \text{ km}$$

$$\text{مغرب کی طرف چلنا} = 1.3 \text{ km}$$

$$\text{ربع کی پوزیشن} = \text{III}$$

$$(\alpha) \text{ اندرونی زاویہ}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{مغرب مخالف}}{\text{جنوب قاعدہ}}$$

$$= \frac{1.3}{5.5}$$

$$\alpha \tan(\alpha) = 0.236$$

$$\alpha = \tan^{-1}(0.236)$$

$$\alpha = 13.3$$

$$\text{سرابتدائی نقطہ سے بیرنگ} = 180^\circ + 13.3^\circ$$

$$= 193.3^\circ$$

-8 ایک ہوائی جہاز 150 کلومیٹر مشرق کی طرف پھر 100 کلومیٹر شمال مشرق (45° مشرق سے) کی طرف پرواز کرتا ہے۔
کل ہٹاؤ معلوم کیجیے۔

حل: 100 km کے فاصلوں کو اس کے حصوں میں توڑنا

$$\text{مشرق} = 100 (\cos 45^\circ)$$

$$= 100 (0.7071) = 70.71 \text{ km}$$

$$\text{شمال} = 100 (\sin 45^\circ)$$

$$= 100 (0.7071) = 70.71 \text{ km}$$

$$\text{کل فاصلہ مشرق کی طرف} = 150 + 70.71 = 220.71 \text{ km}$$

$$\text{کل فاصلہ شمال کی طرف} = 70.71 \text{ km}$$

کل فاصلہ

$$\begin{aligned} \text{نتیجہ} &= \sqrt{(220.71)^2 + (70.71)^2} \\ &= \sqrt{48712.9 + 4999.9} = \sqrt{53712.8} \\ &= 231.76 \text{ km یا } 231.8 \text{ km} \end{aligned}$$

- 9- ایک بحری جہاز 045° کے بیرنگ پر 100 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے پھر راستہ بدلتا ہے اور 135° کے بیرنگ پر 120 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ ابتدائی نقطہ سے آخری پوزیشن کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجیے۔

حل:

$$\begin{aligned} 100 \text{ km} &= 045^\circ \text{ کی بیرنگ} \\ 120 \text{ km} &= 135^\circ \text{ کی بیرنگ} \\ \text{بیرنگ میں فرق} &= 135^\circ - 045^\circ = 090^\circ \end{aligned}$$

اس کا مطلب ہے فاصلہ ایک قائمہ الزاویہ مثلث بناتا ہے مسئلہ فیثاغورث کی رو ہے۔

$$\begin{aligned} \text{فاصلہ} &= \sqrt{(100)^2 + (120)^2} \\ &= \sqrt{10000 + 14400} = \sqrt{24400} \\ &= 156.2 \text{ km} \end{aligned}$$

حل اعادہ مشق 7

- 1- درج ذیل سوالات کے دیے گئے چار ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔

(i) $\cot 60^\circ$ کی قیمت ہے:

(a) 0 (b) 1 (c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(ii) تمام کونیاں متبت ہوتی ہیں:

(a) پہلا ربع (b) دوسرا ربع (c) تیسرا ربع (d) چوتھا ربع

(iii) $\cos \theta$ مثبت ہوتا ہے۔

(a) پہلے اور تیسرے ربع میں (b) دوسرے اور چوتھے ربع میں (c) پہلے اور دوسرے ربع میں (d) پہلے اور چوتھے ربع میں

(iv) $\sin (90^\circ + \theta) =$

(a) $\sin \theta$ (b) $-\sin \theta$ (c) $\cos \theta$ (d) $-\cos \theta$

(v) $\tan (180 - \theta) =$

(a) $\tan \theta$ (b) $\cot \theta$ (c) $-\cot \theta$ (d) $-\tan \theta$

(vi) سائن کا قانون ہے:

(a) $\frac{b}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$ (b) $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \beta} = \frac{b}{\sin \gamma}$

(c) $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$ (d) $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin \beta} = \frac{a}{\sin \gamma}$

(vii) کوسائن کا قانون ہے:

(a) $\cos \alpha = \frac{b^2 + a^2 - c^2}{2ab}$ (b) $\cos \beta = \frac{c^2 + b^2 - a^2}{2ab}$

(c) $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ (d) $\cos \gamma = \frac{ca^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

(viii) $\triangle ABC$ کا رقبہ برابر ہے:

(a) $\frac{1}{2} ab \sin a$ (b) $\frac{1}{2} bc \sin \beta$ (c) $\frac{1}{2} \sin \gamma$ (d) $\frac{1}{2} ac \sin \beta$

- (ix) حرکت سے اُپا جاتا ہے۔
 (a) مشرق (b) مغرب (c) شمال (d) جنوب
 (x) حرکت سے لکھا جاتا ہے۔
 (a) 1 ہندسہ (b) 2 ہندسے (c) 3 ہندسے (d) 4 ہندسے

- (i) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ii) پہلا ربع (iii) پہلے اور دوسرے ربع میں
 (iv) $\cos \theta$ (v) $-\tan \theta$
 (vi) $\frac{b}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin \gamma}$ (vii) $\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ (viii) $\frac{1}{2} ac \sin \beta$ (ix) شمال
 (x) 3 ہندسے

2- ΔABC کا رقبہ معلوم کیجیے، جس میں:

(i) $a = 4 \text{ cm}, b = 6 \text{ cm}, c = 8 \text{ cm}$

حل: $s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{4+6+8}{2} = \frac{18}{2} = 9$

ΔABC کا رقبہ $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
 $= \sqrt{9(9-4)(9-6)(9-8)}$
 $= \sqrt{9(5)(3)(1)} = \sqrt{135}$
 $= 11.62 \text{ cm}^2$

(ii) $b = 2.1 \text{ cm}, c = 5 \text{ cm}, \gamma = 45^\circ$

حل: $\Delta ABC = \frac{1}{2} b c \sin \gamma$

$= \frac{1}{2} \times 5 \times 2.1 \times \sin 45^\circ$
 $= 5.25 \times (0.7071)$
 $= 3.71 \text{ cm}^2$

(iii) $c = 3.1 \text{ cm}, \gamma = 44^\circ, \alpha = 36^\circ$

حل: ہم جانتے ہیں

$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$

$\beta = 180^\circ - \alpha - \gamma$

$= 180^\circ - 36^\circ - 44^\circ$

$= 100^\circ$

ΔABC کا رقبہ $= \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin(\gamma)}$

$= \frac{(3.1)^2 \times \sin(36^\circ) \times \sin(100^\circ)}{2 \sin(44^\circ)}$

$= \frac{9.61 \times 0.5878 \times 0.9844}{2(0.6947)}$

$= \frac{5.5606}{1.3894} = 4.01 \text{ cm}$

3- ΔABC کا رقبہ معلوم کیجیے، جس میں:

(i) $a = 5.4 \text{ cm}, b = 3.4 \text{ cm}, \alpha = 49^\circ$

حل: $a = 5.4 \text{ cm}, b = 3.4 \text{ cm}, \alpha = 49^\circ$

سائن کا قانون استعمال کرنے سے

$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$

$\frac{5.4}{\sin 49^\circ} = \frac{3.4}{\sin \beta}$

$\sin \beta = \frac{3.4}{5.4} \times \sin 49^\circ$

$$\sin \beta = 0.629 \times 0.7547$$

$$\sin \beta = 0.475$$

$$\beta = \sin^{-1}(0.475)$$

$$= 28.37^\circ$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$$

$$\gamma = 180^\circ - 49^\circ - 28.37^\circ$$

$$\gamma = 102.63^\circ$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{5.4}{\sin 49^\circ} = \frac{c}{\sin 102.63^\circ}$$

$$\sin 102.63^\circ \times \frac{5.4}{0.7547} = c$$

$$0.9758 \times \frac{5.4}{0.7547} = c$$

$$c = 6.98 \text{ cm}$$

$$c = 6.98 \text{ cm}, \beta = 28.37^\circ,$$

$$\gamma = 102.63^\circ \text{ لہذا}$$

$$(ii) \alpha = 32^\circ, \gamma = 48^\circ, c = 81 \text{ cm}$$


$$\alpha = 32^\circ, \gamma = 48^\circ, c = 81 \text{ cm: حل}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\alpha + \beta + \gamma = 180$$

$$\beta = 180^\circ - \alpha - \gamma$$

$$= 180^\circ - 32^\circ - 48^\circ = 100^\circ$$



$$AG = \sqrt{(AB)^2 + (BC)^2 + (AE)^2}$$

$$= \sqrt{5^2 + 7^2 + 3^2}$$

$$= \sqrt{83} = 9.11 \text{ cm}$$

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{b}{\sin 100^\circ} = \frac{81}{\sin 48^\circ}$$

$$b = \frac{81}{\sin 48^\circ} \times \sin 100^\circ$$

$$b = \frac{81}{0.743} \times 0.985$$

$$b = 107.3 \text{ cm}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{a}{\sin 32^\circ} = \frac{81}{\sin 48^\circ}$$

$$a = \frac{81}{\sin 48^\circ} \times \sin 32^\circ$$

$$a = \frac{81}{0.743} \times 0.5299$$

$$a = 57.8 \text{ cm}$$

$$\beta = 100^\circ, a = 57.8 \text{ cm},$$

$$b = 107.3 \text{ cm} \text{ لہذا}$$

4- کل ایک مکعب نما ABCDEFGH کو بنا رہی کرتی ہے۔

$$m\overline{AB} = 5 \text{ cm}, m\overline{BC} = 7 \text{ cm}, m\overline{AE} = 3 \text{ cm}$$

(i) $\overline{AG}$ کی لمبائی معلوم کیجیے۔ اپنے جواب کو 3 ہندسوں تک درست

دیجیے۔

حل: $\overline{AG}$ کی لمبائی ہے

(ii) AG اور مستوی ABCD کے درمیان زاویہ معلوم کیجیے۔ جواب کو 1 درجہ اعشاریہ تک درست دیں۔

حل: $\overline{AC} \cdot \overline{AG}$ قاعدہ کا مستط ہے

$$\overline{AC} = \sqrt{5^2 + 7^2}$$

$$= \sqrt{25 + 49} = \sqrt{74}$$

$$= 8.60 \text{ cm}$$

$$\tan Q = \frac{\overline{AE}}{\overline{AC}}$$

$$\tan Q = 0.348$$

$$Q = \tan^{-1}(0.348)$$

$$Q = 19.2^\circ$$

5- مثلثی مخروط ABCDEF کو ظاہر کرتی ہے۔

$$m \overline{AB} = 8 \text{ cm}, m \overline{BF} = 14 \text{ cm}, m \overline{EF} = 19 \text{ cm}.$$

(i) A اور F کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔

حل: $\angle ABF$ قائمہ الزاویہ کو دیکھتے ہوئے


$$\overline{AF} = \sqrt{(\overline{AB})^2 + (\overline{BF})^2}$$

$$= \sqrt{8^2 + 14^2}$$

$$= \sqrt{64 + 196}$$

$$= \sqrt{260}$$

$$= 16.1 \text{ cm}$$



(ii) $\overline{AF}$ اور مستوی BCEF کے درمیان زاویہ معلوم کیجیے۔

حل: چونکہ $\overline{AB} \cdot \overline{BCEF}$ قاعدہ کے عمودی ہے تو بننے والا زاویہ $\angle AFB$ ہے۔

$$\tan \angle AFB = \frac{\overline{AB}}{\overline{BF}}$$

$$\tan \angle AFB = \frac{8}{14}$$

$$\tan \angle AFB = 0.5714$$

$$\angle AFB = \tan^{-1}(0.5714)$$

$$\angle AFB = 29.7^\circ$$

6- ہاشم 4 کلومیٹر شمال کی طرف چلتا ہے پھر مڑتا ہے اور 3 کلومیٹر مشرق کی طرف چلتا ہے۔ اس کے ابتدائی نقطہ سے آخری

پوزیشن کا بیرنگ معلوم کیجیے۔

$$\text{شمال کی طرف چلنا} = 4 \text{ km}$$

$$\text{مشرق کی طرف چلنا} = 3 \text{ km}$$

یہ ایک قائمہ الزاویہ مثلث جہاں پر شمال زاویہ (θ) ہے۔

$$\tan(\theta) = \frac{\text{مخالف}}{\text{قائمہ (شمال)}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{3}{4}$$

$$(\theta) = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$(\theta) = 36.9^\circ$$

$$= 036.9^\circ = \text{بیرنگ کو ہم تین ہندسی شکل میں لکھتے ہیں۔}$$

7- ایک پائلٹ 045° کے ہیرنگ پر 200 کلومیٹر پرواز کرتا ہے، پھر مڑتا ہے اور 135° کے ہیرنگ پر 150 کلومیٹر پرواز کرتا ہے۔ طیارہ اپنی ابتدائی پوزیشن سے کتنا دور ہے؟

حل: $200 \text{ km} = 045^\circ$ کی اڑان کی ہیرنگ

$150 \text{ km} = 135^\circ$ کی اڑان کی ہیرنگ

$135^\circ - 045^\circ = 090^\circ$ ہیرنگ کے درمیان کا فرق

اس کا مطلب ہے یہ دونوں سفر ایک دوسرے کے عمودی ہیں۔

لہذا $\text{فاصلہ} = \sqrt{200^2 + 150^2}$

$= \sqrt{40000 + 22500}$

$= \sqrt{62500}$

$= 250 \text{ km}$

معروضی طرز سوالات


اضافی کثیر الانتخابی سوالات

ہر سوال میں ایک یا زیادہ صحیح جواب ہوں گے (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں منتخب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات


تکوینیاتی نسبتیں یا تعامل

7.1

درست جواب کا انتخاب کریں۔



- (a) θ (b) $\overline{OM}$ (c) $\overline{OP}$ (d) $\overline{MP}$



- (a) $\frac{\overline{OM}}{\overline{OP}}$ (b) $\frac{\overline{PM}}{\overline{OP}}$ (c) $\frac{\overline{OP}}{\overline{OM}}$ (d) $\frac{\overline{OP}}{\overline{PM}}$

3- $\sin \theta =$

- (a) $\tan \theta$ (b) $\frac{1}{\cot \theta}$ (c) $\frac{1}{\operatorname{cosec} \theta}$ (d) $\frac{1}{\cos \theta}$

4- $\cot \theta =$

- (a) $\frac{1}{\sin \theta}$ (b) $\frac{1}{\cos \theta}$ (c) $\sin \theta \times \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta}$ (d) $\frac{1}{\tan \theta}$

5- $\tan \theta =$

- (a) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ (b) $\frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ (c) $\frac{\sin \theta}{\tan \theta}$ (d) $\frac{1}{\cos \theta}$

$$\frac{1}{\tan \theta} \quad (d)$$

$$\sec \theta \quad (c)$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (b)$$

$$\cot \theta \quad (a)$$

$$\frac{\text{متعلقہ}}{\text{مخالف}} =$$

-7

$$\frac{1}{\sin \theta} \quad (d)$$

$$\frac{1}{\cot \theta} \quad (c)$$

$$\tan \theta \quad (b)$$

$$\cot \theta \quad (a)$$

مخصوص زاویوں کے لیے کونیاتی قدریں

7.1.1

-8 $\tan 45^\circ$ کی قیمت ہوگی۔

$$1 \quad (d)$$

$$\frac{1}{2} \quad (c)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \quad (b)$$

$$\sqrt{3} \quad (a)$$

-9 $\sin 180^\circ$ کی قیمت ہے:

$$\sqrt{2} \quad (d)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \quad (c)$$

$$0 \quad (b)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (a)$$

-10 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ کس کی قیمت ہے:

$$\tan 180^\circ \quad (d)$$

$$\cos 45^\circ \quad (c)$$

$$\cot 60^\circ \quad (b)$$

$$\sin 60^\circ \quad (a)$$

-11 کس کی قیمت غیر تعریف شدہ ہے:

$$\tan 180^\circ \quad (d)$$

$$\tan 60^\circ \quad (c)$$

$$\tan 90^\circ \quad (b)$$

$$\tan 45^\circ \quad (a)$$

-12 0 ان میں کس کی قیمت ہے:

$$\tan 180^\circ \quad (d)$$

$$\tan 90^\circ \quad (c)$$

$$\sin 30^\circ \quad (b)$$

$$\cos 45^\circ \quad (a)$$

کونیاتی تقاطوں کی علامت

7.1.2

-13 دوسرے ربع میں ہوتا ہے:

$$\sin \theta > 0 \text{ اور } \cos \theta < 0 \quad (b)$$

$$\sin \theta < 0 \text{ اور } \cot \theta > 0 \quad (a)$$

$$\cos \theta < 0 \text{ اور } \tan \theta < 0 \quad (d)$$

$$\tan \theta > 0 \text{ اور } \cot \theta < 0 \quad (c)$$

-14 تیسرے ربع میں ہوتا ہے:

$$\sin \theta < 0 \quad (d)$$

$$\tan \theta < 0 \quad (c)$$

$$\sec \theta > 0 \quad (b)$$

$$\cot \theta < 0 \quad (a)$$

-15 چوتھے ربع میں ہوتا ہے۔

$$\sec \theta < 0 \quad (d)$$

$$\cot \theta > 0 \quad (c)$$

$$\tan \theta < 0 \quad (b)$$

$$\sin \theta > 0 \quad (a)$$

-16 کس ربع میں صرف $\tan \theta$ اور $\cot \theta$ مثبت ہوتے ہیں۔

$$IV \quad (d)$$

$$III \quad (c)$$

$$II \quad (b)$$

$$I \quad (a)$$

-17 کس ربع میں $\cos \theta$ منفی ہوتا ہے۔

$$IV \text{ اور } III \quad (d)$$

$$IV \text{ اور } I \quad (c)$$

$$III \text{ اور } II \quad (b)$$

$$II \text{ اور } I \quad (a)$$

- 18- $\tan 0^\circ$ کی قیمت ہوتی ہے۔ (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) $\frac{1}{2}$
- 19- $\operatorname{cosec} 90^\circ$ کی قیمت ہے: (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) $\frac{1}{2}$
- 20- $\sec 180^\circ$ کی قیمت ہے: (a) 1 (b) 0 (c) $\sqrt{3}$ (d) -1
- 21- $\cot 180^\circ$ کی قیمت ہے: (a) 1 (b) -1 (c) غیر تعریف شدہ (d) -2
- 22- $\sin 0^\circ$ کی قیمت ہے: (a) 0 (b) -1 (c) غیر تعریف شدہ (d) -2

7.1.4 90° اور 180° کے درمیان والے زاویوں کے لیے سائن اور کوسائن کو وسعت دیں

- 23- $\sec (90^\circ + \theta)$ کے متعلق کون سا بیان درست ہے: (a) $-\sin \theta$ (b) $-\operatorname{cosec} \theta$ (c) $\cos \theta$ (d) $\cot \theta$
- 24- $\tan (90^\circ + \theta)$ کے بارے میں درست ہے: (a) $-\cot \theta$ (b) $\cot \theta$ (c) $\cos \theta$ (d) $\cot \theta$
- 25- $\sin (180^\circ - \theta)$ کے بارے میں درست ہے: (a) $-\cos \theta$ (b) $\cos \theta$ (c) $-\tan \theta$ (d) $-\sin \theta$
- 26- $\sec (180^\circ - \theta)$ کے بارے میں درست ہے: (a) $\sec \theta$ (b) $-\sec \theta$ (c) $\cot \theta$ (d) $\sin \theta$
- 27- $\operatorname{cosec} (180^\circ - \theta) =$ (a) $\sec \theta$ (b) $\operatorname{se} \theta$ (c) $\tan \theta$ (d) $-\tan \theta$

7.2.1 سائن کا قانون

- 28- سائن کا قانون ایک ایسی مثلث کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب معلوم ہو: (a) صرف تین اضلاع (b) دو زاویے اور ضلع (c) رقبہ اور ایک ضلع (d) دو اضلاع اور ایک زاویہ
- 29- $\sin 105^\circ =$ (a) $\sin 75^\circ$ (b) $\cos 50^\circ$ (c) $\sin 95^\circ$ (d) -2
- 30- $\sin 105^\circ =$ (a) $\cos 105^\circ$ (b) $\cos 90^\circ$ (c) $\cos 15^\circ$ (d) $\tan 105^\circ$
- 31- درج ذیل سے کونسا سائن کے قانون کے مترادف ہے: (a) $a \sin \alpha = b \sin \beta$ (b) $\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$ (c) $\frac{a}{b} = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ (d) $a^2 + b^2 + c^2 = 2bc \cos \beta$

32- درج ذیل میں سے کونسا سائن کے قانون کے بارے میں درست نہیں ہے:

$$\frac{a}{\sin \beta} = \frac{b}{\sin \alpha} \quad (d) \quad \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} \quad (c) \quad \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{c}{\sin \gamma} \quad (b) \quad \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} \quad (a)$$

33- کونسا سائن کے قانون کے مطابق درست ہے:

$$c \sin \alpha = b \sin \gamma \quad (d) \quad b \sin \gamma = c \sin \beta \quad (c) \quad a \sin \alpha = b \quad (b) \quad a \sin \beta = bc \quad (a)$$

کونسا سائن کا قانون

7.2.2

34- ذیل میں سے کونسا کوسائن کے قانون کے لیے درست ہے:

$$\cos \beta = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{2ca} \quad (b) \quad \cos \beta = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} \quad (a)$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \quad (d) \quad \cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \quad (c)$$

35- ذیل میں سے کونسا کوسائن کے قانون کے مطابق درست ہے:

$$\cos \beta = \frac{b^2 - c^2 + a^2}{2ca} \quad (b) \quad \cos \alpha = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2bc} \quad (a)$$

$$\cos \beta = \gamma \frac{b^2 - b^2 + c^2}{2ab} \quad (d) \quad \cos \gamma = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc} \quad (c)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \quad -36$$

37- ذیل میں سے کونسا کوسائن کے قانون کے مطابق درست نہیں ہے:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad (b) \quad b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos \beta \quad (a)$$

$$\cos \beta = \frac{c^2 - a^2 + b^2}{2ca} \quad (d) \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \quad (c)$$

38- اگر $\gamma = 40^\circ$ ، $\alpha = 70^\circ$ ہو تو $\beta =$:

$$90^\circ \quad (d) \quad 60^\circ \quad (c) \quad 70^\circ \quad (b) \quad 80^\circ \quad (a)$$

مثالت کا رقبہ

7.2.3

39- مثلث کے رقبہ کا کونسا کلیہ درست ہے۔ جب کسی مثلث کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ دیا گیا ہو:

$$\frac{1}{2} ac \sin \gamma \quad (d) \quad \frac{1}{2} ac \sin \alpha \quad (c) \quad \frac{1}{2} bc \sin \beta \quad (b) \quad \frac{1}{2} bc \sin \alpha \quad (a)$$

40- مثلث کے رقبہ کا کونسا کلیہ درست ہے۔

$$\frac{1}{2} ab \sin \gamma \quad (d) \quad \frac{1}{2} ac \sin \alpha \quad (c) \quad \frac{1}{2} ac \sin \beta \quad (b) \quad \frac{1}{2} bc \sin \alpha \quad (a)$$

41- اگر a, b, c مثلث کے تین اضلاع ہوں تو رقبہ معلوم کرنے کے لیے $S =$ ہے:

$$\frac{a-b-c}{2} \quad (d) \quad 2S = a-b+c \quad (c) \quad \frac{a+b+c}{2} \quad (b) \quad \frac{a+b-c}{2} \quad (a)$$

42- مثلث ABC کا رقبہ ہے:

$$\sqrt{s(s+a)(s+b)(s+c)} \quad (b)$$

$$\sqrt{s(s-b)(s-a)(s+a)} \quad (a)$$

$$\sqrt{(a-b)(a-c)(a+b)} \quad (d)$$

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (c)$$

43- مثلث کے رقبہ کے لیے کون سا درست ہے۔

$$\frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma} \quad (d)$$

$$\frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} \quad (c)$$

$$\frac{b^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \beta} \quad (b)$$

$$\frac{b^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \beta} \quad (a)$$

44- کونسا کلیہ مثلث کے رقبہ کا نہیں ہے:

$$\frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma} \quad (d)$$

$$\frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} \quad (c)$$

$$\frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} \quad (b)$$

$$\frac{b^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \beta} \quad (a)$$

7.5 سہ ہندی بیرنگ اور اس کے اطلاق

45- بیرنگ ہمیشہ کس سمت میں مانی جاتی ہے:

- (a) گھڑی کی مخالف سمت (b) قریبی پول کی طرف (c) گھڑی وار سمت (d) حالت پر منحصر ہے

46- ان میں سے کون سی ثانوی سمت تصور کی جاتی ہے:

- (a) شمال (b) جنوب (c) مغرب (d) جنوب مغرب

47- ان میں سے کون سی بنیادی سمت خیال کی جاتی ہے:

- (a) مشرق (b) شمال مشرق (c) جنوب مشرق (d) شمال مغرب

48- سہ ہندی بیرنگ کی بڑی سے بڑی مقدار جوں پی جاتی ہے وہ ہے:

- (a) 090° (b) 180° (c) 270° (d) 360°

49- اگر کوئی نقطہ y نقطہ x سے 200° کی بیرنگ پر ہو تو آپ x سے y کی بیرنگ کیسے ماپیں گے۔

- (a) $200^\circ + 180^\circ$ (b) $200^\circ - 180^\circ$ (c) $360^\circ + 180^\circ$ (d) $360^\circ + 200^\circ$

ذرا بات

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad -5$$

$$\frac{1}{\tan \theta} \quad -4$$

$$\frac{1}{\operatorname{cosec} \theta} \quad -3$$

$$\frac{\overline{OM}}{\overline{OP}} \quad -2$$

$$\overline{OP} \quad -1$$

$$\sin 60^\circ \quad -10$$

$$0 \quad -9$$

$$1 \quad -8$$

$$\cot \theta \quad -7$$

$$\sec \theta \quad -6$$

$$\sin \theta < 0 \quad -14$$

$$\sin \theta > 0 \text{ اور } \cos \theta < 0 \quad -13$$

$$\tan 180^\circ \quad -12$$

$$\tan 90^\circ \quad -11$$

$$1 \quad -19$$

$$0 \quad -18$$

$$\text{III اور II} \quad -17$$

$$\text{III} \quad -16$$

$$\tan \theta < 0 \quad -15$$

$$-\cot \theta \quad -24$$

$$-\operatorname{cosec} \theta \quad -23$$

$$-1 \quad -22$$

$$\text{غیر تعریف شدہ} \quad -21$$

$$-1 \quad -20$$

$$\sin 75^\circ \quad -29$$

$$\text{دو زاویے اور ضلع} \quad -28$$

$$\sec \alpha \quad -27$$

$$-\sec \theta \quad -26$$

$$\sin \theta \quad -25$$

$$b \sin \gamma = c \sin \beta \quad -33$$

$$\frac{a}{\sin \beta} = \frac{b}{\sin \alpha} \quad -32$$

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c} \quad -31$$

$$\cos 15^\circ \quad -30$$

36- کوسائن کا قانون

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \quad -35$$

$$\cos \beta = \frac{c^2 - a^2 + b^2}{2ca} \quad -34$$

$$\frac{1}{2} ac \sin \alpha -40$$

$$\frac{1}{2} ac \sin \alpha -39$$

$$70^\circ -38$$

$$\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} -37$$

$$\frac{b^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \beta} -44$$

$$\frac{b^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \beta} -43$$

$$\frac{s(s-a)(s-b)(s-c)}{4} -42$$

$$S = \frac{a+b+c}{2} -41$$

$$200^\circ - 180^\circ -49$$

$$360^\circ -48$$

$$-47$$

$$-46$$

$$-45$$

$$-45$$

اضافی مختصر سوالات

نیا تعلیمی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

تکوینیاتی نسبتیں یا تفاعل

7.1

مختصر جواب دیں۔



1- زاویہ θ کے لیے تین بنیادی تکوینیاتی نسبتیں لکھیں:

3- تمام تکوینیاتی نسبتیں لکھیں:

$$\sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$$

$$\sec \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$$

$$\cot \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}, \quad \csc \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$$

$$\text{جواب: مخالف ضلع} \sin \theta$$

$$\text{جواب: مجامع ضلع} \cos \theta$$

$$\text{جواب: مخالف ضلع} \tan \theta$$

$$\text{جواب: مجامع ضلع} \cot \theta$$

2- کس تکوینیاتی تفاعل میں تینوں بنیادی تکوینیاتی نسبتیں استعمال ہوتی ہیں۔

جواب: تینوں بنیادی تکوینیاتی نسبتیں ذیل کے تفاعل میں استعمال ہوتی ہیں۔

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

مخصوص زاویوں کے لیے تکوینیاتی قدریں

7.1.1

$$= 0 - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

7- حاصل ضرب معلوم کریں

$$(\sin 45^\circ)(\cos 30^\circ)(\tan 45^\circ)$$

$$\text{حل: } \sin 45^\circ \times \cos 30^\circ \times \tan 45^\circ$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 1$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$

4- $\sin 30^\circ$ اور $\cos 60^\circ$ کی قدر کیا ہوتی ہے۔

جواب: $\sin 30^\circ$ کی قدر $\frac{1}{2}$ اور $\cos 60^\circ$ کی قدر بھی $\frac{1}{2}$ ہے۔

5- $\sin 90^\circ$ ، $\cos 0^\circ$ اور $\tan 45^\circ$ کی قدروں کو جمع کریں:

$$\sin 90^\circ + \cos 0^\circ + \tan 45^\circ$$

$$\text{حل: } \sin 90^\circ + \cos 0^\circ + \tan 45^\circ = 1 + 1 + 1 = 3$$

6- $\cos 30^\circ$ کی قدر کو $\sin 180^\circ$ کی قدر سے تفریق کریں:

$$\sin 180^\circ - \cos 30^\circ$$

$$\text{حل: } \sin 180^\circ - \cos 30^\circ = 0 - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

- 8- $\sin \theta > 0$ اور $\cos \theta < 0$ کس ربع میں ہیں۔
 حل: $\sin \theta > 0$ اور $\cos \theta < 0$ دوسرے ربع میں ہے۔ دوسرے ربع میں صرف $\sin \theta$ مثبت ہوتا ہے۔
- 9- اگر $\tan \theta > 0$ اور $\sin \theta < 0$ سے تو θ کہاں واقع ہے۔
 حل: $\tan \theta > 0$ کا مطلب ہے $\tan \theta$ ہے اور $\sin \theta < 0$ کا مطلب ہے $\sin \theta$ منفی ہے۔ اس لیے یہ III ربع میں واقع ہے۔
- 10- $\sin 315^\circ$ کی علامت کا تعین کریں۔
 حل: $\sin 315^\circ$ چوتھے ربع میں واقع ہے۔ جہاں صرف $\cos$ مثبت ہے پس $\sin 315^\circ$ کی علامت منفی ہے۔
- 11- $\sin 210^\circ$ کی علامت کیا ہے۔
 حل: $\sin 210^\circ$ کی علامت منفی ہے۔ کیونکہ 210° تیسرے ربع میں واقع ہے۔ جہاں صرف $\tan \theta$ ہی مثبت ہوتا ہے۔
- 12- $\cot 19^\circ$ کی علامت کا تعین کریں۔
 حل: $\cot 19^\circ$ کی علامت مثبت ہے کیونکہ 19° پہلے ربع میں واقع ہے جہاں تمام تفاعل مثبت ہیں۔

7.1.3 90,0 اور 180 کی تکوینیاتی نسبتیں

7.1.3

- 13- $P(x, y)$ کے محضات معلوم کریں جبکہ ایک اکائی دائرے میں زاویہ 90° کا ہو۔
 جواب: کیونکہ یہ مثبت y محور پر واقع ہے۔ پس $x=0$ اور $y=1$ ہیں۔

- 14- $\tan 90^\circ$ کو غیر تعریف شدہ کیوں کہا گیا ہے۔

- جواب: کیونکہ $\tan \theta = \frac{y}{x}$ اور $x=0$ پر تقسیم غیر تعریف شدہ ہوتی ہے۔

- 15- $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ$ کی قدر معلوم کریں۔

حل: $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ = 1 + 1 = 2$

- 16- $\cos 90^\circ \times \tan 180^\circ - \operatorname{cosec} 90^\circ$ کی قدر معلوم کریں۔

حل: $\cos 90^\circ \times \tan 180^\circ - \operatorname{cosec} 90^\circ = 0 \times 0 - 1 = 0 - 1 = -1$

7.1.4 90 اور 180 کے درمیان والے زاویوں کے لیے سائن اور کوسائن تفاعلوں کو وسعت دینا۔

- 17- کیلکولیٹر کے بغیر $\tan 120^\circ$ کی قدر معلوم کریں:

حل: $\tan 120^\circ = \tan (180^\circ - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$

- 18- کیلکولیٹر کے بغیر $\operatorname{cosec} 135^\circ$ کی قدر معلوم کریں:

حل: $\operatorname{cosec} 135^\circ = \operatorname{cosec} (180^\circ - 135^\circ) = \operatorname{cosec} 45^\circ = \sqrt{2}$

- 19- کیلکولیٹر کے بغیر $\sec 120^\circ$ کی قدر معلوم کریں۔

حل: $\sec 120^\circ = \sec (90^\circ + 30^\circ) = -\operatorname{cosec} 30^\circ = -2$

- 20- کیلکولیٹر کے بغیر $\sec 150^\circ$ کی قدر معلوم کریں۔

حل: $\cos 150^\circ = \cos (90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

- 21- غیر قائمہ الزاویہ مثلث کی تعریف کریں۔
 جواب: غیر قائمہ الزاویہ مثلث ایسی مثلث ہوتی ہے جس میں کوئی بھی زاویہ قائمہ نہ ہو۔
- 22- سائن کے قانون کا کلیہ لکھیں۔

جواب: اگر a, b اور c مثلث کے اضلاع α, β اور γ مثلث کے تین زاویے ان کے اضلاع مخالف ہوں تب سائن کا قانون یہ ہے۔

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

- 23- سائن کا قانون کب استعمال کیا جاتا ہے؟
 جواب: سائن کا قانون مثلث کو حل کرنے کے لیے اس وقت استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب دو زاویے اور ان میں سے ایک کے مخالف ضلع کی مقدار دی ہوئی ہو۔

- 24- اگر ایک مثلث میں ضلع $a = 10$ ، زاویہ $\alpha = 30^\circ$ اور زاویہ $\beta = 45^\circ$ ہو تو ضلع b کی مقدار معلوم کریں۔
 حل: سائن کے قانون سے

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta}$$

$$\frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{b}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{10}{0.5} = \frac{b}{0.707}$$

$$0.707 \times \frac{10}{0.5} = b$$

$$14.14 = b$$

$$b = 14.14$$

- 25- اگر ایک مثلث میں $c = 3$ cm، $\beta = 60^\circ$ اور $\gamma = 30^\circ$ ہو تو ضلع b کی مقدار معلوم کریں۔
 حل: سائن کے قانون سے

$$\frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

$$\frac{b}{\sin 60^\circ} = \frac{3}{\sin 30^\circ}$$

$$\frac{b}{0.866} = \frac{3}{0.5}$$

$$b = \frac{3}{0.5} \times 0.866$$

$$b = 5.16 \text{ cm}$$

26- آپ زاویہ α کے کوسائن کو حل کرنے کے لیے کوسائن کے قانون کو کس طرح ترتیب دیں گے؟

حل: ترتیب شدہ کلیہ یوں ہوگا۔

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

27- اگر $a = 4$, $b = 7$ اور $c = 9$ ہوں تو $\cos \beta$ کی قدر معلوم کریں۔

$$\cos \beta = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(9)^2 + (4)^2 - (7)^2}{2(9)(4)} \\ &= \frac{81 + 16 - 49}{72} \\ &= \frac{48}{72} = 0.67 \end{aligned}$$

28- ایک مثلث میں اگر $b = 7$ اور $c = 5$ اور $\sin \alpha = 22^\circ$ کی قدر معلوم کریں۔

حل: کوسائن کا قانون استعمال کرنے سے

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$a^2 = (7)^2 + (5)^2 - 2(7)(5) \cos 22^\circ$$

$$a^2 = 49 + 25 - 70(0.93)$$

$$a^2 = 74 - 65.1$$

$$a^2 = 8.9$$

$$\sqrt{a^2} = \sqrt{8.9}$$

$$a = 2.98 \approx 3$$

29- جب مثلث کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ دیا گیا ہو تو تب مثلث کا رقبہ معلوم کرنے کا کلیہ لکھیں۔

حل: جب مثلث کے دو اضلاع اور ان کا درمیانی زاویہ دیا گیا ہو تب مثلث کا رقبہ درج ذیل کلیہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$$

30- مثلث ABC کا رقبہ معلوم کریں جس میں $b = 3.5\text{cm}$, $a = 4\text{cm}$ اور $\gamma = 60^\circ$ ہو۔

$$\Delta ABC \text{ کا رقبہ} = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times 3.5 \times \sin 60^\circ$$

$$= 2 (13.5) \times 0.866$$

$$= 7 \times 0.866$$

$$= 6.1 \text{ cm}^2$$

31- مثلث کا رقبہ معلوم کرنے کا کلیہ لکھیں۔ جب مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں دی گئی ہوں۔

حل: جب مثلث کے تین اضلاع کی لمبائیاں دی گئی ہوں تب مثلث کا رقبہ معلوم کرنے کا کلیہ یوں ہوگا۔

$$\Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

32- مثلث ABC کا رقبہ معلوم کریں جس میں $a = 6 \text{ cm}$, $b = 9 \text{ cm}$, اور $c = 11 \text{ cm}$ ۔

حل: معلوم: $a = 6 \text{ cm}$, $b = 9 \text{ cm}$, $c = 11 \text{ cm}$

$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$s = \frac{6+9+11}{2} = \frac{26}{2} = 13$$

$$\Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{13(13-6)(13-9)(13-11)} = \sqrt{728}$$

$$= 26.99 \text{ cm}^2$$

33- مثلث ABC کا رقبہ معلوم کریں جبکہ $\alpha = 65^\circ$ اور $\beta = 75^\circ$, $b = 6 \text{ cm}$ ۔

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$$

$$\gamma = 180^\circ - 75^\circ - 65^\circ = 40^\circ$$

$$\Delta ABC = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta}$$

$$= \frac{(6)^2 (\sin 65^\circ)(\sin 40^\circ)}{2 (\sin 75^\circ)}$$

$$= \frac{36(0.91)(0.65)}{2 (0.97)}$$

$$= \frac{21.294}{1.94} = 10.98 \text{ cm}^2$$

سہ ہندی بیرنگ اور اس کے اطلاعات

7.5

34- بیرنگ کی پیمائش کے دو بنیادی اصول کیا ہے؟

جواب: وہ دو اصول درج ذیل ہیں۔

1- اصل کی پیمائش ہمیشہ شمال (North) کی سمت سے شروع کرنی چاہیے۔

2- اس کی پیمائش ہمیشہ گھڑی کی وارست میں ہونی چاہیے۔

35- بیرنگ کو عددی طور پر ہمیشہ کیسے لکھا جاتا ہے؟

جواب: اسے ہمیشہ تین ہندسوں والے زاویے کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

000° سے 360° کے درمیان

36۔ کیا دی سمتیں کیا ہیں؟

جواب: بنیادی سمتیں قطب نما پر موجود چار سمتیں ہیں۔

شمال، جنوب، مشرق اور مغرب

37۔ ثانوی سمتیں کیا ہیں؟

جواب: ثانوی سمتیں قطب نما کے چار درمیانی نکات ہیں۔ NE (شمال، مشرق)، SE (جنوب، مشرق)، SW (جنوب، مغرب) اور NW (شمال، مغرب)

38۔ ایک شکل میں مقام x سے y کا بیرنگ 045° ہے۔ مقام y سے x کا بیرنگ معلوم کریں؟

حل: چونکہ بیرنگ 180° سے کم ہے۔ اس لیے واپسی کی سمت معلوم کرنے کے لیے ہم اس میں 180° جمع کریں گے۔

$$225^\circ = 180^\circ + 045^\circ \text{ بیرنگ}$$

39۔ ایک ہائیکر مقام C سے مقام D تک 290° کے بیرنگ پر چلتا ہے مقام D سے C تک واپسی کے لیے ہائیکر کو کس بیرنگ پر چلنا چاہیے؟

حل: چونکہ بیرنگ 180° سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہم 180° کو بیرنگ سے تفریق کر دیں گے

$$180^\circ \text{ بیرنگ} \quad 290^\circ$$

40۔ ایک کشتی گھاٹ سے روانہ ہوتی ہے اور مشرق کی جانب 30 کلومیٹر سفر کرتی ہے، جس کے بعد وہ شمال کی جانب 40° کلومیٹر کی جاتی ہے؟

گھاٹ تک واپسی کے مختصر ترین راستے کا فاصلہ اور بیرنگ کیا ہے۔

حل: مسئلہ فیثاغورث استعمال کرتے ہوئے۔

$$d = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ km}$$

واپس آنے کے لیے کشتی کو جنوب اور مغرب کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ جنوبی خط سے اندرونی زاویہ 0 ہے۔

$$\tan \theta = \frac{30}{40}$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{30}{40} \right) = 36.9^\circ$$

$$\text{بیرنگ} = 180^\circ + 36.9^\circ = 216.9^\circ$$

