

اس یونٹ کو مکمل کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- ◀ مشترکہ واقعات کا احتمال معلوم کرتے ہوئے جہاں مناسب ہو وہاں سیمپل اسپیس خاکہ، امکانی خاکہ، شجری خاکہ اور وین اشکال استعمال کر سکیں۔
- ◀ باہمی متنافی واقعات (جیسے بائیں اور دائیں جانب سکے اچھالنا، ڈائی پر طاق اور جفت اعداد، کوئی کھیل جیتنا یا ہارنا) پر مشتمل مسائل کو حل کرنے کے لیے احتمال کا قانون جمع لاگو کر سکیں۔
- ◀ آزاد اور منحصر واقعات (جیسے تجارت، سکے اچھالنا، دو پتوں کا یکے بعد دیگرے مع واپسی اور بلا واپسی وغیرہ) پر مشتمل مسائل کو حل کرنے کے لیے احتمال کا قانون ضرب لاگو کر سکیں۔

احتمال (Probability)

12.1

احتمال ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ کسی چیز کے رونما ہونے کا کتنا امکان ہے۔ ہم اسے روز استعمال کرتے ہیں، بے شک یہ نہیں جانتے کہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے یہ اندازہ لگانا کہ آیا بارش ہوگی اور چمچتری لے کر جانا چاہیے یا نہیں۔ ہمیں اس وقت اچھا اندازہ لگانے کا طریقہ فراہم کرتا ہے جب ہم یقین سے نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ سادہ الفاظ میں، جب بھی ہم غیر یقینی صورتحال سے نمٹتے ہیں تو احتمال کار آمد ہوتا ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

شماراتی تجربہ (Statistical Experiment) ایک قسم کا بلا ترتیب تجربہ (Random Experiment) ہوتا ہے جہاں نتائج کو عددی طور پر پایا جاتا ہے۔ اور شماراتی طریقوں کے استعمال سے تجربہ کیا جاتا ہے۔
تمام شماراتی تجربات بلا ترتیب تجربات ہوتے ہیں، لیکن تمام بلا ترتیب تجربات شماراتی تجربات نہیں ہوتے۔

بلا ترتیب تجربہ (Random Experiment)

بلا ترتیب تجربہ وہ تجربہ ہے جس میں:

- تمام ممکنہ نتائج کا سیٹ معلوم ہوتا ہے۔
- درست نتیجہ معلوم نہیں ہوتا۔

مثال کے طور پر سکہ اچھالنا، ڈائی اچھالنا، گول اچھالنا وغیرہ۔


نتائج اور سیمپل اسپیس (Outcomes and Sample Space)

ایک بلا ترتیب تجربے کے ممکنہ نتیجے کو حاصل (نتیجہ) کہتے ہیں۔

ایک بلا ترتیب تجربے میں تمام ممکنہ نتائج کا مجموعہ سیمپل اسپیس کہلاتا ہے۔ اسے S سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر، جب ہم ڈائس پھینکتے ہیں تو ممکنہ نتائج 1، 2، 3، 4، 5، 6 ہوتے ہیں۔

لہذا سیمپل اسپیس $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ہے۔



واقعہ (Event)

ایک بلا ترتیب تجربے میں، ہر ممکنہ نتیجہ ایک واقعہ (Event) کہلاتا ہے۔ ہند واقعہ ایک تجربے کو ایک بار آزمانا آزمائش (Trial) کہلاتا ہے۔ سیپل اسپیس کا تختی سیٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب ہم دو سکے اچھالتے ہیں تو دو ہیڈ حاصل کرنا ایک واقعہ ہے۔

یاد رکھیے!

ایک تجربے کو ایک بار آزمانا آزمائش (Trial) کہلاتا ہے۔ ہند واقعہ ایک تجربے کو ایک بار اچھالتے ہیں تو سکے کا ہر بار اچھالنا ایک واقعہ کہلاتا ہے۔

مثال	وضاحت	واقعات
دو یا دو سے زیادہ واقعات کو مساوی امکانی جب ہم ایک ڈس پھیلتے ہیں تو، اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 مساوی امکانی واقعات ہیں۔	دو یا دو سے زیادہ واقعات کو مساوی امکانی کہاجاتا ہے اگر ان میں سے ہر ایک کے رونما ہونے کا مساوی موقع ہو۔	مساوی امکانی واقعات (Equally Likely Events)
ایک تجربے میں، وہ واقعہ جو یقینی طور پر رونما ہوتا ہے اسے یقینی واقعہ کہاجاتا ہے۔	ایک تجربے میں، وہ واقعہ جو یقینی طور پر رونما ہوتا ہے اسے یقینی واقعہ کہاجاتا ہے۔	یقینی واقعات (Certain Events)
ایک ناممکن واقعہ وہ واقعہ ہے جو کسی بھی دی ہوئی حالت میں رونما نہیں ہو سکتا۔	ایک ناممکن واقعہ وہ واقعہ ہے جو کسی بھی دی ہوئی حالت میں رونما نہیں ہو سکتا۔	ناممکن واقعات (Impossible Events)
دو یا دو سے زیادہ واقعات کو باہمی متنافی واقعات کہاجاتا ہے اگر ان میں کوئی مشترکہ سیپل پوائنٹ نہ ہو، یعنی واقعات A اور B کو باہمی متنافی واقعات کہاجاتا ہے اگر $A \cap B = \emptyset$ ہو۔	دو یا دو سے زیادہ واقعات کو باہمی متنافی واقعات کہاجاتا ہے اگر ان میں کوئی مشترکہ سیپل پوائنٹ نہ ہو، یعنی واقعات A اور B کو باہمی متنافی واقعات کہاجاتا ہے اگر $A \cap B = \emptyset$ ہو۔	باہمی متنافی واقعات (Mutually Exclusive Events)
جامع واقعات (Exhaustive Events) جب ہم ایک سکے دو بار اچھالتے ہیں تو دو ہیڈز، صرف ایک ہیڈ اور کوئی ہیڈ نہیں حاصل کرنے کے واقعات جامع واقعات ہیں۔	جامع واقعات (Exhaustive Events) جب ہم ایک سکے دو بار اچھالتے ہیں تو دو ہیڈز، صرف ایک ہیڈ اور کوئی ہیڈ نہیں حاصل کرنے کے واقعات جامع واقعات ہیں۔	جامع واقعات (Exhaustive Events)
تکمیلی واقعات (Complementary Events) کسی واقعہ A کا مکملیمٹ وہ واقعہ ہوتا ہے جو ان سیپل پوائنٹس کے مجموعے کی نمائندگی کرتا ہو جو A میں شامل نہ ہوں۔ اسے A^c یا $\bar{A}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ واقعہ A اور اس کا مکملیمٹ A^c باہمی متنافی اور جامع واقعات ہوتے ہیں۔	کسی واقعہ A کا مکملیمٹ وہ واقعہ ہوتا ہے جو ان سیپل پوائنٹس کے مجموعے کی نمائندگی کرتا ہو جو A میں شامل نہ ہوں۔ اسے A^c یا $\bar{A}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ واقعہ A اور اس کا مکملیمٹ A^c باہمی متنافی اور جامع واقعات ہوتے ہیں۔	تکمیلی واقعات (Complementary Events)

مشترکہ واقعات (Combined Events)

مشترکہ واقعہ، جسے مرکب واقعہ (Compound Event) بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ سادہ واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سادہ واقعہ وہ واقعہ ہے جس میں سیپل اسپیس کا صرف ایک نقطہ شامل ہو۔ مثال کے طور پر ایک سکے کو دو بار اچھالنا اور کم از کم ایک

ہیڈ حاصل کرنا مشترکہ واقعات کی اقسام (Types of Combined Events)


آزاد واقعات (Independent Events)

(a) دو یا دو سے زیادہ واقعات کو آزاد کہا جاتا ہے، اگر ایک کا نتیجہ دوسرے کے نتیجے پر اثر انداز ہوتا ہو۔
مثال کے طور پر، ایک سکہ کا متعدد بار اچھا لانا، ہر بار کا اچھا لانا دوسرے سے آزاد ہوتا ہے۔

(b) منحصر واقعات (Dependent Events)

دو یا دو سے زیادہ واقعات کو منحصر کہا جاتا ہے اگر ایک کا نتیجہ دوسرے کے نتیجے پر اثر

انداز ہوتا ہو۔



مثال کے طور پر، واپس رکھے بغیر تاش کی گڈی سے پتے نکالنا، پہلے نکالے گئے پتے کا دوسرے نکالے گئے پتوں کے احتمال کو تبدیل کر دیتا ہے۔

(c) باہمی متنافی واقعات (Mutually Exclusive Events)

دو یا دو سے زیادہ واقعات کو باہمی متنافی واقعات کہا جاتا ہے اگر وہ ایک ہی وقت میں رونما نہ ہو سکیں۔ اگر ایک واقعہ رونما ہو سکتا ہے، تو دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر، جب ہم ایک ڈس پھینکتے ہیں تو ایک ہی وقت میں 5 اور 3 حاصل کرنا ناممکن ہے۔

(d) غیر باہمی متنافی واقعات (Non-Mutually Exclusive Events)


دو یا دو سے زیادہ واقعات کو غیر باہمی متنافی واقعات کہا جاتا ہے اگر وہ ایک ہی وقت میں رونما ہو سکیں۔ یہ واقعات اوور لپ کر سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر، تاش کے پتوں سے سرخ پتہ یا بادشاہ نکالنا۔

شجری خاکہ (Tree Diagram)

شجری خاکہ ایک بھری ہے جو احتمال میں ایک یا ایک سے زیادہ واقعات کے تمام ممکنہ نتائج کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شجری خاکہ کی ہر شاخ ایک ممکنہ نتیجہ کا اظہار کرتی ہے۔


(i) جب ہم ڈس پھینکتے ہیں تو شجری خاکہ (شکل 12.2) سے، سیمپل اسپیس کو یوں لکھا جاسکتا ہے:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$




(ii) جبکہ ہم دو سکے اچھالتے ہیں تو شجری خاکہ (شکل 12.3) سے، سیمپل اسپیس کو یوں لکھا جاسکتا ہے:

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}$$



مثال 1: شجری خاکہ استعمال کرتے ہوئے دو ڈس کو پھینکنے کی سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔

حل: جب ہم دو ڈس پھینکتے ہیں، چوں کہ ہر ڈس کے اوپری رخ پر 1, 2, 3, 4, 5, 6 ہوتا ہے، تو شجری خاکہ اس طرح دکھائی دے گا۔ لہذا، سیمپل اسپیس کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے:



سپیل اسپیس خاکہ (Sample Space Diagram)

سپیل اسپیس خاکہ ایک اظہار ہے جو کسی تجربے کے ممکن نتائج کو فہرست یا جدول کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم دو سکے اچھالتے ہیں تو

سپیل اسپیس کو یوں لکھا جاتا ہے: $S = \{HH, HT, TH, TT\}$

امکانی خاکہ (Possibility Diagram)

امکانی خاکہ گزریا جدول میں ایک اظہار ہے جو دو واقعات کے تمام ممکن نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم دو سکے اچھالتے ہیں، تو امکانی خاکہ یوں نظر آئے گا:

	H	T
H	HH	HT
T	TH	TT

مثال 2: ہاشم نے ایک ڈس اور ایک سکے بیک وقت اچھالا۔ امکانی خاکہ بنائیے۔

حلی

	1	2	3	4	5	6
H	(H, 1)	(H, 2)	(H, 3)	(H, 4)	(H, 5)	(H, 6)
T	(T, 1)	(T, 2)	(T, 3)	(T, 4)	(T, 5)	(T, 6)

واقعہ کا احتمال (Probability of an Event)

ایک بے ترتیب تجربے میں، فرض کیجیے S سپیل اسپیس اور $E \subseteq S$ ہے۔ پھر اگر E ایک واقعہ ہے، تو E کے وقوع پذیر ہونے کے احتمال کو یوں بیان کیا جاتا ہے:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} \quad \text{تمام ممکنہ نتائج کی تعداد کے وقوع پذیر ہونے والے سازگار نتائج کی تعداد}$$

احتمال کی تعریف کا یہ طریقہ صرف محدود سیٹ پر لاگو ہوتا ہے۔ لہذا اس پر بنیاد میں ہم صرف محدود سیٹ اپنیس سے متعلق مسائل حل کریں گے۔

یاد رکھیے!

$$0 \leq P(E) \leq 1 \quad \text{احتمال کی قدر ہمیشہ 0 سے لے کر 1 تک ہوتی ہے}$$

$$P(E) = 1 \quad \text{اگر } P(E) = 1 \text{ ہو تو یہ واقعہ یقینی ہے۔}$$

$$P(E) = 0 \quad \text{اگر } P(E) = 0 \text{ ہو تو یہ واقعہ ناممکن ہے۔}$$

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1 \quad \text{E کا مکمل منہ واقعہ } \bar{E} \text{ ہے۔}$$

مثال 3: ایک بیگ میں 5 نیلی گیندیں اور 4 سبز گیندیں ہیں۔ ابوبکر تھیلے میں سے بلا ترتیب ایک گیند نکالتا ہے۔ احتمال معلوم کریں کہ نکالی گئی گیند (i) نیلی ہے (ii) نیلی نہیں ہے۔

$$\text{حل: نتائج کی کل ممکنہ تعداد: } n(S) = 5 + 4 = 9$$

$$(i) \quad \text{فرض کیجیے } A \text{ نیلی گیند نکلنے کا واقعہ ہے۔ اس لیے } n(A) = 5$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{5}{9}$$

$$(ii) \quad \text{فرض کیجیے } \bar{A} \text{ نیلی گیند نہ نکلنے کا واقعہ ہے۔}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$$

سرگرمی

• طلبہ کو گروہوں میں تقسیم کیجیے۔

• طلبہ سے کہیں کہ وہ ایک سکہ گھیس، اسے 5 بار، 10 بار، 15 بار یا 20 بار اچھا لیں اور اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کریں۔

• ہیڈ اور ٹیل کے اچھا لوں کا تناسب کیا ہے؟ ہیڈ کے نتیجے کا احتمال کیا ہے؟

مثال 4: دو ڈاکس پھینکے جاتے ہیں۔ احتمال معلوم کریں کہ نتائج کا مجموعہ ہے۔

$$(i) \quad 4 \text{ کے برابر} \quad (ii) \quad 10 \text{ سے زیادہ} \quad (iii) \quad 13 \text{ سے کم}$$

حل: جب ہم دو ڈاکس پھینکتے ہیں تو سیٹ اپنیس یوں دی جاتی ہے:

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}; n(S) = 36$$

$$(i) \quad \text{فرض کیجیے } A \text{ نتائج کے مجموعہ 4 کے برابر ہونے کا واقعہ ہے۔}$$

$$A = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}; n(A) = 3$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

$$(ii) \quad \text{فرض کیجیے } B \text{ نتائج کے مجموعہ 10 سے زیادہ ہونے کا واقعہ ہے۔}$$

$$B = \{(5, 6), (6, 5), (6, 6)\}; n(B) = 3$$

• نتائج کے مجموعہ 10 سے زیادہ ہونے کا احتمال ہے:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

(iii) فرض کیجیے کہ C نتائج کے مجموعہ 13 سے کم ہونے کا واقعہ ہے۔
یہاں تمام 36 نتائج کا مجموعہ 13 سے کم ہے لہذا $C = S$ ہے۔ اس لیے، $n(C) = n(S) = 36$

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{36}{36} = 1$$

نتائج کے مجموعہ 13 سے کم ہونے کا احتمال:

چلیں!

ایک ناممکن واقعہ کا کلیئیت واقعہ کیا ہے؟

$$n(A) = 0, P(A) = 0$$

$$P(A) + P'(A) = 1$$

$$0 + P'(A) = 1$$

$$P'(A) = 1$$

حل: فرض کیا ناممکن واقعہ ہم جانتے ہیں کہ

مثال 5: دو سکے ایک ساتھ اچھالے گئے۔ دونوں سکوں پر مختلف رخ آنے کا احتمال کیا ہے؟

حل: جب دو سکے اچھالے جاتے ہیں تو ٹیمپل اسپیس یہ ہے:

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}; n(S) = 4$$

فرض کیجیے سکوں پر مختلف رخ آنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{HT, TH\}$$

$$n(A) = 2$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

سکوں پر مختلف رخ آنے کا احتمال:

مثال 6: اگر ایک ساتھ ایک ڈس اور ایک سکے کو پھینکا جائے تو احتمال معلوم کریں کہ ڈس پر طاق عدد اور سکے پر ہیڈ آئے۔

حل:

$$S = \{(1,H), (1,T), (2,H), (2,T), (3,H), (3,T), (4,H), (4,T), (5,H), (5,T), (6,H), (6,T)\}; n(S) = 12$$

فرض کیجیے A طاق عدد اور ہیڈ آنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{(1,H), (3,H), (5,H)\}; n(A) = 3$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

مثال 7: امکانت کا ایک کھیل جو کہ تیر کو گھمانے پر مشتمل ہے۔ جو کہ 1, 2, 3, ... 12 میں سے کسی ایک عدد پر رکنے کا یکساں امکان رکھتا ہے۔ احتمال کیا ہے کہ تیر درجن ذیل پر رکنے گا۔


(i) 7 (ii) ایک نمبر عدد (iii) ایک مرکب عدد

حل:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}; n(S) = 12$$

(i) فرض کیجیے کہ A تیر کا 7 پر رکنے کا واقعہ ہے، $n(A) = 1$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{12}$$



(ii) فرض کیجیے کہ ایک مختصر عدد پر گرنے کا واقعہ ہے۔

$$B = \{2, 3, 5, 7, 11\}; n(B) = 5$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{5}{12}$$

(iii) فرض کیجیے کہ C تیر کا ایک مرکب عدد پر گرنے کا واقعہ ہے۔


$$C = \{4, 6, 8, 9, 10, 12\}; n(C) = 6$$



$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

سرگرمی

حور یہ گھر سے اس کے کام کی جگہ تک جانے کے چار راستے R_1, R_2, R_3 اور R_4 ہیں۔ بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے تین پارکنگ لائٹس P_1, P_2, P_3 اور دو داخلی راستے B_1, B_2 ہیں۔ بلڈنگ میں اس کے دفتر کی منزل تک تین لفٹیں E_1, E_2, E_3 ہیں۔ شجری خاکہ کا استعمال کرتے ہوئے وضاحت کریں کہ وہ کتنے طریقوں سے اپنے دفتر تک پہنچ سکتی ہے؟

حل:






پس کل طریقہ = 72


حل مشق 12.1

1- تین سکے اچھالنے کے لیے شجری خاکہ استعمال کرتے ہوئے سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔
حل:



$S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$

2- ایک استاد بلا ترتیب 2 لڑکوں (حامد، احمد) اور دو لڑکیوں (نہیب، سمعیہ) کے ایک گروہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی منتخب کرتا ہے۔ شجری خاکہ بنائیے اور تمام ممکنہ نتائج کے لیے مکمل اسپیس کی فہرست بنائیے۔
حل:



3- پیمپل اسپیس = {(حامد، نہیب)، (حامد، سمعیہ)، (احمد، نہیب)، (احمد، سمعیہ)}
اگر ایک بلا ترتیب تجربہ کا ایک واقعہ A ہے جب کہ $P(A) : P(\bar{A}) = 17 : 15$ اور $n(S) = 640$ ہے۔
تو معلوم کیجیے۔ (i) $P(\bar{A})$ ، (ii) $n(A)$

(معلوم) $P(A) : P(\bar{A}) = 17 : 15$

$P(A) + P(\bar{A}) = 1$ (i)

$17x + 15x = 1$

$32x = 1$

$x = \frac{1}{32}$ (ii)

$P(\bar{A}) = 15 \times \frac{1}{32}$
 $= \frac{15}{32}$

(ii) $n(S) = 640$
 $P(A) = 17x$

دیا گیا

(ii) سے $x = \frac{1}{32}$ کی قیمت درج کریں۔

$P(A) = 17 \times \frac{1}{32}$

$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$

$\frac{17}{32} = \frac{n(A)}{640}$

$n(A) = \frac{17}{32} \times 640 = 340$

4- ایک سکہ کو تین بار پھینکا گیا۔ لگا تار دو ٹیل آنے کا احتمال کیا ہے۔
حل:

$$S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$$

$$n(S) = 8$$

$$A = \{HTT, TTH, TTT\}$$

$$n(A) = 3$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(A) = \frac{3}{8}$$

ایک سکہ کو تین بار پھینکا جائے اس پر لگا تار دو ٹیل آنے کا احتمال $\frac{3}{8}$ ہے۔

5- ایک ڈائس اور ایک سکہ کو ایک ساتھ اچھالا گیا۔

(i) امکانی خاکہ بنا کر سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔ (ii) شجری خاکہ کے ذریعے سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔


(iii) ایک ٹیل اور ایک جفت عدد آنے کا احتمال کیا ہے؟

(i) امکانی خاکہ بنا کر سیمپل اسپیس
حل:

سکہ		ڈائس	
		H	T
1	(1,H)	(1,T)	
2	(2,H)	(2,T)	
3	(3,H)	(3,T)	
4	(4,H)	(4,T)	
5	(5,H)	(5,T)	
6	(6,H)	(6,T)	

$$S = \{(1, H), (1, T), (2, H), (2, T), (3, H), (3, T), (4, H), (4, T), (5, H), (5, T), (6, H), (6, T)\}$$

(ii) شجری خاکہ کے ذریعے سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔
حل:



(iii) ایک ٹیل اور ایک جفت عدد آنے کا احتمال کیا ہے؟

حل:

$$n(S) = 12$$

$$S = \{(1, H), (1, T), (2, H), (2, T), (3, H), (3, T), (4, H), (4, T), (5, H), (5, T), (6, H), (6, T)\}$$

فرض کیا B ایک ٹیل اور ایک حقیقت آنے کا واقعہ ہے۔

$$B = \{(T, 2), (T, 4), (T, 6)\}, n(B) = 3$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

-6 دو غیر جانبدار ڈس کو ایک بار اچھالا گیا۔

(i) شجری خاکہ کے ذریعے سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔

(ii) امکانی خاکہ کے ذریعے سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔


(iii) درج ذیل حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔

(a) دونوں ڈس پر ایک ہی عدد ہو (b) ان کا حاصل ضرب ایک مفرد عدد ہو۔

(c) مجموعہ ایک جفت عدد ہو۔ (d) مجموعہ 13 ہو۔

(i) شجری خاکہ کے ذریعے سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔

حل:



(ii) امکانی خاکہ کے ذریعے سیمپل اسپیس معلوم کیجیے۔

حل:

		ڈیس 2					
		1	2	3	4	5	6
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)	
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)	
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)	
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)	
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)	
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)	

(iii) درج ذیل حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔

(a) دونوں ڈاس پر ایک ہی عدد ہو

حل:

$$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \\ (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), \\ (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), \\ (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), \\ (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

فرض کیا A نتائج دونوں ڈاس پر ایک ہی عدد آنے والا واقعہ ہے۔

$$A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$$

$$n(A) = 6$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$= \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

(b) ان کا حاصل ضرب ایک مفرد عدد ہو۔

حل:

فرض کیا B نتائج کا حاصل ضرب ایک مفرد عدد ہونے کا واقعہ ہے۔

$$B = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (1, 5), (5, 1)\}$$

$$n(B) = 6$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$$

$$= \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

(c) مجموعہ ایک جفت عدد ہو۔

حل:

فرض کیا C نتائج کا مجموعہ ایک جفت عدد ہونے کا واقعہ ہے۔

$$C = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 6), \\ (3, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 4), (4, 6), \\ (5, 1), (5, 3), (5, 5), (6, 2), (6, 4), (6, 6)\}$$

$$n(C) = 18$$

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)}$$

$$= \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

(d) مجموعہ 13 ہو گا۔
 حل: فرض کیا D نتائج کا مجموعہ 13 ہونے کا واقعہ ہے زیادہ سے زیادہ مجموعہ 12 = 6 + 6 ہے۔
 لہذا مجموعہ 13 ناممکن ہے۔

$$n(D) = 0$$

$$P(D) = \frac{n(D)}{n(S)} = \frac{0}{36} = 0$$

7- تین غیر جانبدار سکوں کو ایک ساتھ اچھالا گیا۔ درج ذیل حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے:

- (i) تمام ٹیل (ii) کم از کم ایک ہیڈ (iii) زیادہ سے زیادہ دو ٹیل (iv) دو ہیڈز
 (v) زیادہ سے زیادہ دو ہیڈز (vi) کوئی ہیڈ نہیں

(i) تمام ٹیل
 حل:

{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT}

$$n(S) = 8$$

$$A = \{TTT\}, n(A) = 1$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{8}$$

(ii) کم از کم ایک ہیڈ
 حل:

$$n(S) = 8$$

فرض کیا B کم از کم ایک ہیڈ آنے کا واقعہ ہے۔

$$B = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, THT, TTH\}, n(B) = 7$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{7}{8}$$

(iii) زیادہ سے زیادہ دو ٹیل
 حل:

$$n(S) = 8$$

فرض کیا زیادہ سے زیادہ دو ٹیل آنے کا واقعہ ہے۔

$$C = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH\}, n(C) = 7$$

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{7}{8}$$

(iv) دو ہیڈز
 حل:

$$E = \{HHT, HTH, THH\}, n(E) = 3$$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{3}{8}$$

$$n(S) = 8$$

$$D = \{HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

$$n(D) = 7$$

$$p(D) = \frac{n(D)}{n(S)} = \frac{7}{8}$$

$$n(S) = 8$$

$$F = \{TTT\}, n(F) = 1$$

$$P(F) = \frac{n(F)}{n(S)} = \frac{1}{8}$$

8- ایک تھیلے میں 4 سرخ گیندیں، 5 سفید گیندیں، 6 سبز گیندیں اور 3 سیاہ گیندیں ہیں۔ علی تھیلے میں سے بلا ترتیب ایک گیند نکالتا ہے۔ احتمال معلوم کیجئے کہ نکالی گئی گیند:

(i) سفید ہو۔ (ii) سرخ ہو۔ (iii) سفید نہ ہو۔ (iv) سیاہ نہ ہو۔

$$n(S) = 4 + 5 + 6 + 3 = 18$$

$$n(S) = 18$$

(i) سفید ہو۔

حل: فرض کیا W سفید گیند ہونے کا واقعہ ہے۔

$$n(W) = 5$$

$$p(W) = \frac{n(W)}{n(S)} = \frac{5}{18}$$

(ii) سرخ ہو۔

حل: فرض کیا B سرخ گیند ہونے کا واقعہ ہے۔

$$n(B) = 4, n(S) = 18 \text{ (گیندوں کی کل تعداد)}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$$

(iii) سفید نہ ہو۔

$$n(S) = 18 \text{ (گیندوں کی کل تعداد)}$$

حل: فرض کیا W سفید گیند ہونے کا واقعہ ہے۔

$$n(W) = 5$$

$$P(W) = \frac{n(W)}{n(S)} = \frac{5}{18}$$

$$P(\bar{W}) = 1 - P(W)$$

$$= 1 - \frac{5}{18}$$

$$= \frac{18-5}{18} = \frac{13}{18}$$

$$n(S) = 18 \text{ (گیندوں کی کل تعداد)}$$

$$n(C) = 3$$

$$P(C) = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$$

$$P(\bar{C}) + P(C) = 1$$

$$P(\bar{C}) = 1 - \frac{1}{6}$$

$$= \frac{6-1}{6} = \frac{5}{6}$$

9- ایک عدد کو 1 سے لے کر 15 تک کے مکمل اعداد کے سیٹ سے ایک عدد بطور ترتیب منتخب کیا گیا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ منتخب عدد ہو۔

(i) طاق عدد (ii) 3 کا جزو ضربی (iii) 2 کا مربع (iv) مفرد عدد (v) 20

$$S = \{1, 2, 3, 4, \dots, 15\}$$

$$n(S) = 15$$

$$n(S) = 15$$

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}, n(A) = 8$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{8}{15}$$

$$n(S) = 15$$

$$B = \{3, 6, 9, 12, 15\}, n(B) = 5$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

$$n(S) = 15$$

(iv) سیاہ نہ ہو۔
حل:

فرض کیا C سیاہ گیند ہونے کا واقعہ ہے۔

فرض کیا $\bar{C}$ سیاہ گیند نہ ہونے کا واقعہ ہے۔

(i) طاق عدد
حل:

فرض کیا A تمام طاق عدد ہونے کا واقعہ ہے۔

(ii) 3 کا جزو ضربی
حل:

فرض کیا B 3 کا جزو ضربی ہونے کا واقعہ ہے۔

(iii) 2 کا مربع
حل:

$$C = \{4\}, n(C) = 1$$

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{1}{15}$$

$$n(S) = 15$$

(iv) مفرد عدد
حل:

فرض کیا D مفرد عدد ہونے کا واقعہ ہے۔

$$D = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}, n(D) = 6$$

$$P(D) = \frac{n(D)}{n(S)} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

$$n(S) = 15$$

20 (v)
حل:

فرض کیا N 20 ہونے کا واقعہ ہے۔
چونکہ 20 سے لے کر 15 کے سیٹ میں موجود نہیں

$$N = \{ \}, n(N) = 0$$

$$P(N) = \frac{n(N)}{n(S)} = \frac{0}{15} = 0$$

10- اگر ایک واقعہ A کا احتمال $\frac{7}{10}$ ہو تو واقعہ "A نہیں" کا احتمال معلوم کیجیے۔
حل:

$$P(A) = \frac{7}{10} \text{ (معلوم)}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$= 1 - \frac{7}{10}$$

$$= \frac{10 - 7}{10} = \frac{3}{10}$$

11- ایک ڈالس کو دوبارہ پھینکا گیا۔ ہر بار پھینکنے پر 4 سے بڑا عدد حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔
حل:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, n(S) = 6$$

ایک ہی ڈالس پر 4 سے بڑا عدد حاصل ہونے کا واقعہ

$$P(\text{پہلی باری} > 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{دوسری باری} > 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{دونوں باریوں میں} > 4) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

12.2 احتمال کا قانون جمع (Addition Law of Probability)




(i) اگر A اور B کوئی غیر متنافی واقعات ہوں تو
(ii) اگر A اور B کوئی دو باہمی متنافی واقعات ہوں تو

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

وین شکل (Venn Diagram)

ایک بلا ترتیب تجربے میں فرض کریں S کیپٹل ایچس کے علاوہ اس کے علاوہ A اور B وہ واقعات ہیں جو S میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ

(i) $(A \cap B)$ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب A اور B دونوں وقوع پذیر ہوں۔	(ii) $(A \cup B)$ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب A یا B وقوع پذیر ہوں۔	(iii) A ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب A وقوع پذیر نہ ہو۔
		

مثال 8: اگر $P(A) = 0.37$, $P(B) = 0.42$, $P(A \cap B) = 0.09$ ہو تو $P(A \cup B)$ معلوم کیجیے۔

$$P(A) = 0.37, P(B) = 0.42, P(A \cap B) = 0.09$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0.37 + 0.42 - 0.09 = 0.7$$

چینج

$P(A \cap B)$ and $P(A \cup B)$ کا مجموعہ کیا ہے؟

حل:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

دونوں اطراف $P(A \cap B)$ کا جمع کریں۔

$$P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$$

مثال 9: پھولوں کی ایک ٹوکری میں 50 پیلے، 70 سرخ اور 80 سفید پھول ہیں۔ ان میں سے ایک پھول بلا ترتیب منتخب کیا جاتا ہے۔ پیلے یا سرخ پھول کے منتخب ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔

حل: پھولوں کی تعداد، $n(S) = 50 + 70 + 80 = 200$

$$n(Y) = 50 \text{ پیلے پھولوں کی تعداد}$$

$$\therefore P(Y) = \frac{n(Y)}{n(S)} = \frac{50}{200}$$

$$n(R) = 70 \text{ سرخ پھولوں کی تعداد}$$

$$\therefore P(R) = \frac{n(R)}{n(S)} = \frac{70}{200}$$

Y اور R باہمی متنافی واقعات ہیں لہذا، پیلے یا سرخ پھول کو منتخب کرنے کا احتمال ہے:

$$P(Y \cup R) = P(Y) + P(R)$$

$$\therefore P(Y \cup R) = \frac{50}{200} + \frac{70}{200} = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}$$

مثال 10: دو ڈانس ایک ساتھ پھینکے گئے۔ دونوں ڈانس پر ایک جیسے ہی اعداد ہوں یا اعداد کا مجموعہ 10 حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔

حل: فرض کریں S تکمیل اسپیس ہے، تو $n(S) = 36$

فرض کیجیے A دونوں ڈانس پر ایک جیسے ہی اعداد حاصل کرنے کا واقعہ ہے اور B اعداد کا مجموعہ 10 حاصل کرنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$$

$$B = \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}$$

$$\therefore A \cap B = \{(5, 5)\}$$

$$n(A) = 6, n(B) = 3, n(A \cap B) = 1$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{36}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{36}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{1}{36}$$

$$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{6}{36} + \frac{3}{36} - \frac{1}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

$$= \frac{6}{36} + \frac{3}{36} - \frac{1}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

لہذا، مطلوبہ احتمال $\frac{2}{9}$ ہے۔

حل مشق 12.2

1- اگر A اور B دو ایسے واقعات ہوں کہ $P(A) = \frac{1}{4}$ ، $P(B) = \frac{1}{2}$ اور $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$ ہوں تو $P(A \cup B)$ معلوم کیجیے۔

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{2}, P(A \cap B) = \frac{1}{8}$$

دیا گیا ہے

حل:

$$P(A \cup B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{8}$$

$$P(A \cup B) = \frac{2+4-1}{8} = \frac{5}{8}$$

2- ایک اپارٹمنٹ میں گھر کے دروازوں کے نمبر 1 سے 50 تک ہیں۔ ان میں سے ایک گھر کا دروازہ نمبر جفت عدد یا مکمل مربع ہونے کا احتمال معلوم کیجیے۔

$$S = \{1, 2, 3, 4, \dots, 50\}, n(S) = 50$$

حل:

فرض کیا کہ بلیٹس نے آئے کا نام B مکمل مربع آنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{2, 4, 6, \dots, 50\}, n(A) = 25$$

$$B = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49\}, n(B) = 7$$

$$A \cap B = \{4, 16, 36\}, n(A \cap B) = 3$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{25}{50} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{7}{50}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{3}{50}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{7}{50} - \frac{3}{50}$$

$$= \frac{25 + 7 - 3}{50} = \frac{29}{50}$$

3- ایک ٹیم کے کسی میچ کو جیتنے کا احتمال $\frac{3}{10}$ ہے اور کسی میچ کو ہارنے کا احتمال $\frac{2}{10}$ ہے۔ اس بات کا کیا احتمال ہے کہ:

(i) ٹیم ایک خاص میچ جیت جائے یا ہار جائے۔ (ii) ٹیم نہ ہی کوئی میچ جیتے نہ ہارے۔

حل: فرض کیا W جیتنے کا اور L ہارنے کا واقعہ ہے۔

$$P(W) = \frac{3}{10}, P(L) = \frac{2}{10}$$

دیا گیا ہے

(i) ٹیم ایک خاص میچ جیت جائے یا ہار جائے۔

جیت اور ہار ایک باہمی متناہی واقعات ہیں۔

$$P(W \cup L) = P(W) + P(L)$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

(ii) ٹیم نہ ہی کوئی میچ جیتے نہ ہارے۔

$$\text{نہ ہی کوئی جیتے یا ہارے} = P(\overline{W \cup L})$$

$$P(\overline{W \cup L}) = 1 - P(W \cup L)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$$

4- دو ڈانس کے ایک ہی بار پھینکنے پر، مجموعہ 7 یا 11 حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔

حل: فرض کیا A اعداد کا مجموعہ 7 آنے کا واقعہ ہے اور B اعداد کا مجموعہ 11 آنے کا واقعہ ہے۔

$$n(S) = 6 \times 6 = 36$$

$$A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}, n(A) = 6$$

$$B = \{(5,6), (6,5)\}, n(B) = 2$$

$$A \cap B = \phi$$

لہذا A اور B باہمی متناہی واقعات ہیں۔

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{18}$$

$$= \frac{3+1}{18} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$$

5- دو ڈانس کے ایک بار پھینکنے پر مجموعہ 5 یا 7 حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔

$$\text{کل نتائج } n(S) = 6 \times 6 = 36$$

فرض کیا A = مجموعہ 5 کا واقعہ ہے اور B = مجموعہ 7 کا واقعہ ہے۔

$$A = \{(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)\}, n(A) = 4$$

$$B = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}, n(B) = 6$$

$$A \cap B = \phi$$

لہذا A اور B باہمی متناہی واقعات ہیں۔

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= \frac{1}{9} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{2+3}{18} = \frac{5}{18}$$

6- 52 شہر کی گڈی کے پتوں سے بلا ترتیب ایک پتا نکالا گیا۔ نکالے گئے پتے کا احتمال معلوم کیجیے کہ وہ:

(i) ایک بادشاہ یا ایک غلام ہو۔ (ii) نہ بادشاہ اور نہ ہی غلام ہو۔

(i) ایک بادشاہ یا ایک غلام ہو۔

$$\text{کل پتے } = 52, n(s) = 52$$

$$\text{بادشاہ کے نمبر } = 4, \text{ غلام کے نمبر } = 4$$

فرض کیا A بادشاہ نکھنے کا واقعہ ہے اور B غلام نکھنے کا واقعہ ہے۔

$$n(A) = 4, n(B) = 4$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \\ = \frac{1}{13} + \frac{1}{13} = \frac{2}{13}$$

(ii) نہ بادشاہ اور نہ ہی غلام ہو۔
حل:

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(A \cup B) \\ = 1 - \frac{2}{13} = \frac{13-2}{13} = \frac{11}{13}$$

7- ایک ڈس کو دو بار پھینکا گیا۔ کیا احتمال ہے کہ دو میں سے کم از کم ایک بار پھینکنے پر عدد 3 آئے؟
حل: $n(S) = 6 \times 6 = 36$ کل نتیجہ

فرض کیا کہ ایک بار پھینکنے پر عدد 3 آنے کا واقعہ ہے۔

$$C = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (1, 3), (2, 3), (4, 3), (5, 3), (6, 3)\}$$

$$n(C) = 11$$

$$p(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{11}{36}$$

8- ایک تھیلے میں 1 سے لے کر 15 تک اعداد لکھے ہوئے 15 کارڈ ہیں۔ ایک کارڈ بلا ترتیب نکالا گیا، احتمال معلوم کیجیے کہ اس پر 5 کے جزو ضربی یا 7 کے جزو ضربی والا عدد لکھا ہو۔
حل:

$$S = \{1, 2, 3, 4, \dots, 15\}, n(S) = 15$$

فرض کیا A 5 کے جزو ضربی اٹھانے کے پتے کا واقعہ ہے اور B 1 کا جزو ضربی کے پتے اٹھانے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{5, 10, 15\}, n(A) = 3$$

$$B = \{7, 14\}, n(B) = 2$$

$$A \cap B = \phi$$

پس A اور B باہمی متناہی واقعات ہیں۔

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{15}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{2}{15} \\ = \frac{3+2}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

9- دو غیر جانبدار سکہ اچھالے گئے۔ کم از کم ایک ہیڈ یا دو ہیڈ حاصل کرنے کا احتمال کیا ہے؟

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}, n(S) = 4$$

حل:

فرض کیا ۸ کم از کم ایک ہیڈ آنے کا واقعہ ہے اور B کم از کم دو بار ہیڈ آنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{HH, HT, TH\}, n(A) = 3$$

$$B = \{HH\}, n(B) = 1$$

$$A \cap B = \{HH\}, n(A \cap B) = 1$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{4}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3+1-1}{4} = \frac{3}{4}$$

10- ایک مصروف چوراہے پر 50% گاڑیاں دائیں مڑتی ہیں۔ 30% بائیں مڑتی ہیں اور 20% سیدھی چلی جاتی ہیں۔ بلا ترتیب منتخب کی گئی گاڑی کے بائیں یا دائیں مڑنے کا احتمال کیا ہے؟

حل: فرض کیا R دائیں طرف جانے کا واقعہ ہے۔ L بائیں طرف جانے کا اور اسیدھا جانے کا واقعہ ہے۔

$$P(R) = 50\% = \frac{50}{100} = 0.50$$

$$P(L) = 30\% = \frac{30}{100} = 0.30$$

$$P(T) = 20\% = \frac{20}{100} = 0.20$$

پس دائیں اور بائیں باہمی متنافی واقعات ہیں۔

$$P(R \cup L) = P(R) + P(L)$$

$$= 0.50 + 0.30 = 0.80$$

11- دو غیر جانبدار سکہ اچھالے گئے۔ دو ہیڈ یا دو ٹیل حاصل کرنے کا کیا احتمال کیا ہے؟

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}, n(S) = 4$$

حل:

پس واقعات باہمی اور متنافی ہیں۔

فرض کیا A دو بار ہیڈ آنے کا واقعہ اور B دو بار ٹیل آنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{HH\}, n(A) = 1$$

$$B = \{TT\}, n(B) = 1$$

$$A \cap B = \phi$$

پس واقعات باہمی اور متنافی ہیں۔

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{4}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1+1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

12- اگر A اور B ایک بلا ترتیب تجربے کے دو باہمی متنافی واقعات ہوں اور $P(A) = 0.45$ (A نہیں) اور $P(A \cup B) = 0.65$ ہو تو

$P(B)$ معلوم کیجیے۔

حل: دیا گیا

$$P(\text{نہیں } A) = 0.45$$

$$P(A) = 1 - P(\text{نہیں } A)$$

$$= 1 - 0.45 = 0.55$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$0.65 = 0.55 + P(B)$$

$$P(B) = 0.65 - 0.55$$

$$P(B) = 0.10$$

13- اگر $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{2}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$ ہو تو $P(A \cap B)$ معلوم کیجیے۔

حل: دیا گیا

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{2}{5}, P(A \cup B) = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{3} + \frac{2}{5} - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{10+6-5}{15}$$

$$= \frac{11}{15}$$

14- A اور B دو ایسے واقعات ہیں کہ $P(A) = 0.42$, $P(B) = 0.48$, اور $P(A \cap B) = 0.16$ تو معلوم کیجیے:

حل: دیا گیا ہے


$$P(A) = 0.42, P(B) = 0.48, P(A \cap B) = 0.16$$

(i) $P(\bar{A})$
 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
 $= 1 - 0.42 = 0.58$

(ii) $P(\bar{B})$
 $P(\bar{B}) = 1 - P(B)$
 $= 1 - 0.48 = 0.52$

(iii) $P(A \cup B)$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $= 0.42 + 0.48 - 0.16$
 $= 0.74$

12.3 احتمال کا قانون ضرب (Multiplication Law of Probability)



(i) اگر A اور B دو آزاد واقعات ہوں تو

$$P(A \text{ اور } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

(ii) مشترک احتمال

$$P(A \text{ اور } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B | A)$$

جہاں $P(B | A)$ واقعہ B کے وقوع پذیر ہونے کا احتمال کو ظاہر کرتا ہے۔

جب کہ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ واقعہ A پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکا ہے (اسے B سبب A دیا گیا ہوتا ہے جاحاتا ہے)۔

مثال 11: ایک تھیلے میں 4 سرخ اور 3 سبز گیندیں ہیں۔ کبیر ایک کے بعد ایک کر کے دو گیندیں نکال دیتا ہے (پہلی گیند واپس رکھنے کے بعد

دوسری نکالی جاتی ہے)۔ احتمال معلوم کیجیے کہ پہلی گیند سرخ ہو اور دوسری گیند بھی سرخ ہو۔

حل: فرض کریں A واقعہ ہے کہ پہلی گیند سرخ ہو اور B واقعہ ہے کہ دوسری گیند بھی سرخ ہو۔

تب $P(A) = \frac{4}{7}$ اور $P(B) = \frac{4}{7}$ (چونکہ گیند واپس رکھ دی گئی ہے اس لیے سیمپل اسپیس متاثر نہیں ہوتی)

$$P(A \text{ اور } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$= \frac{4}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{16}{49}$$

مثال 12: ایک تھیلے میں 3 سفید اور 2 سیاہ گولیاں ہیں۔ واپس رکھے بغیر یکے بعد دیگرے دو گولیاں نکالی جاتی ہیں۔ احتمال معلوم کیجیے کہ

پہلی گولی سفید ہو اور دوسری گولی بھی سفید ہو۔

حل: فرض کریں A واقعہ ہے کہ پہلی گولی سفید ہو اور B واقعہ ہے کہ دوسری گولی بھی سفید ہو۔

گولیوں کی کل تعداد 5 ہے

تب $P(A) = \frac{3}{5}$ اور $P(B | A) = \frac{2}{4}$ (چونکہ گولیاں واپس نہیں رکھی گئیں، اس لیے سیمپل اسپیس متاثر ہوتی ہے)

$$P(A \text{ اور } B) = P(A) \times P(B | A)$$

$$= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

مثال 13: ماجد 52 ٹکٹس کے چھوٹے مسلسل (بغیر واپسی کے) دوپٹے نکالتا ہے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ پہلا پتا بادشاہ ہو اور دوسرا پتا ملکہ ہو۔
حل: فرض کریں A واقعہ ہے کہ نکالا گیا پتا بادشاہ ہو اور B واقعہ ہے کہ نکالا گیا پتا ملکہ ہو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ واقعہ B کے احتمال کے لیے سیمپل اسپیس کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیونکہ واقعہ A پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکا ہے۔

$$P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, P(B|A) = \frac{4}{51}$$

$$P(A \text{ اور } B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$= \frac{1}{13} \times \frac{4}{51} = \frac{4}{663}$$

حل مشق 12.3

1- 1 سے 10 تک کے اعداد میں سے دو اعداد کو واپس رکھنے کے ساتھ بلا ترتیب منتخب کیا گیا ہے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ:

(i) دونوں مفرد ہوں۔ (ii) ان کا حاصل ضرب جفت ہو۔

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, n(s) = 10$$

حل:

(i)

دونوں مفرد ہوں۔
فرض کیا A پہلے جفت عدد نکالنے کا واقعہ ہے اور B دوسری بار جفت عدد نکالنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{2, 3, 5, 7\}, n(A) = 4$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(s)} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

چونکہ اعداد واپس رکھیں گئے ہیں سیمپل اسپیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

$$B = \{2, 3, 5, 7\} = n(B) = 4$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(s)} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$P(A \text{ اور } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$$

(ii) ان کا حاصل ضرب جفت ہو۔

جب اعداد کا حاصل ضرب جفت ہو تو حاصل ضرب تب ہی جفت ہوگا اگر اس میں کوئی جفت عدد ہو۔

فرض کیا A طاق اعداد نکالنے کا واقعہ ہے اور B طاق عدد نکالنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\} = n(A) = 5$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(s)} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

حاصل ضرب اس وقت ہی جفت عدد ہوگا اگر اس میں کوئی بھی جفت عدد ہو۔

پس اعداد کو واپس رکھا گیا ہے تو سیمپل اسپیس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

$$B = \{1, 3, 5, 7, 9\} n(B) = 5$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

اب ہم $P(A \cap B)$ | احتمال ہوگا کہ حاصل ضرب ایک جفت اعداد ہیں۔

$$P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$$

$$= 1 - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$$

2- لفظ PUNJAB سے ایک حرف اور لفظ LAHORE سے ایک اور حرف منتخب کیا گیا۔ احتمال کیا ہے کہ:

(i) دونوں حروف واؤول ہوں۔ (ii) ایک حرف کانسوٹ اور دوسرا واؤول ہو۔

$$S = \{P, U, N, J, A, B\}, n(S) = 6$$

حل:

(i)

$$A = \{U, A\}, n(A) = 2$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$S = \{L, A, H, O, R, E\}, n(S) = 6$$

فرض کیا B واؤول حروف آنے کا واقعہ ہے۔

$$B = \{A, O, E\}, n(B) = 3$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

(ii) ایک حرف کانسوٹ اور دوسرا واؤول ہو۔

$$C = \{P, N, J, B\}, n(C) = 4$$

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

8 صورت حال کا حساب لگانا
فرض کیا C کانسوٹ PUNJAB سے منتخب ہوگا واقعہ ہے۔

فرض کیا D واؤول LAHORE سے منتخب ہونے کا واقعہ ہے۔

$$D = \{A, O, E\} = n, (D) = 3$$

$$P(D) = \frac{n(D)}{n(S)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(C \cap D) = P(C) \times P(D) \\ = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

B صورت حال کا حساب لگانا

فرض کیا E واؤول حرف PUNJAB سے منتخب ہونے کا واقعہ ہے اور F کانسوٹ حرف LAHORE سے منتخب ہونے کا واقعہ ہے۔

$$n(E) = 2, n(F) = 3$$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(F) = \frac{n(F)}{n(S)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(E \cap F) = P(E) \times P(F)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{کل}) = P(A \text{ صورت حال}) + P(B \text{ صورت حال})$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{آخری جواب} = \frac{1}{2}$$

3- ایک ڈس کو دوبار اچھالا گیا۔ احتمال معلوم کیجیے کہ ایک اچھال 3 کا جزو ضربی اور دوسرا 5 ہو۔

$$\text{کل نتائج} = 6 \times 6 = 36, n(s) = 36$$

فرض کیا A ایک باری میں 3 کا جزو ضربی اور دوسری باری 5 ہونے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{(3, 5), (6, 5), (5, 3), (5, 6)\}, n(A) = 4$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

4- دو ڈس پھینکی گئیں۔ ایک برطاق اور دوسرے پر 2 کا جزو ضربی حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔

$$\text{کل نتائج} n(s) = 6 \times 6 = 36$$

فرض کیا A پہلے برطاق اور دوسرے پر 2 کا جزو ضربی ہونے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (3, 2), (3, 4), (3, 6), (5, 2), (5, 4), (5, 6), (2, 1), (4, 1), (6, 1), (2, 3), (4, 3), (6, 3), (2, 5), (4, 5), (6, 5)\}$$

$$n(A) = 18$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

5- تلاش کے چھوٹے میں سے دو پتے بلا ترتیب کے بعد دیگرے بغیر واپسی کے نکالے گئے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ پہلا پتا پان ہو اور دوسرا پتا بادشاہ ہو۔

حل:

$$52 = \text{کل پتوں کی تعداد}$$

$$n(S) = 52$$

صورت 1 (پہلا پتہ پان کا ہو لیکن بادشاہ نہ ہو۔)

فرض کیا 8 پہلا پتہ پان کا آنے کا واقعہ ہے (جس میں بادشاہ نہ ہو)

$$n(A) = 13 - 1 = 12$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}$$

فرض کیا 13 دوسرا پتہ بادشاہ آنے کا واقعہ ہے۔

چونکہ پہلا پتہ واپس نہیں رکھا تو کل پتے بچے 51

$$n(S) = 51$$

$$P(B|A) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{4}{51}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) \\ = \frac{3}{13} \times \frac{4}{51} = \frac{4}{221}$$

صورت 2 (پہلا پتہ پان کا ہو لیکن بادشاہ نہ ہو۔)

فرض کیا C پہلا پتہ پان کے بادشاہ آنے کا واقعہ ہے۔

$$n(C) = 1, n(S) = 52$$

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)}$$

$$P(C) = \frac{1}{52}$$

فرض کیا D دوسرا پتہ بادشاہ آنے کا واقعہ ہے۔

چونکہ پہلا پتہ واپس نہیں رکھا تو کل پتے بچے 51

$$n(D) = 3, n(S) = 51$$

$$P(D|C) = \frac{3}{51}$$

$$P(C \cap D) = P(C) + P(D|C)$$

$$P(C \cap D) = \frac{1}{52} \times \frac{3}{51} = \frac{1}{884}$$

$$P(\text{کل احتمال}) = P(A \cap B) + P(C \cap D) \\ = \frac{4}{221} + \frac{1}{884}$$

$$= \frac{16+1}{884}$$

$$= \frac{17}{884} = \frac{1}{52}$$

6- تاش کے 52 پتوں سے بغیر واپسی کے دو پتے منتخب کیے گئے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ:

(i) دونوں سیاہ ہوں۔ (ii) وہ ملکہ ہوں۔ (iii) دونوں حکم ہوں۔ (iv) دونوں اینٹیں ہوں۔

حل: $n(S) = 52$ کل پتے

(i) دونوں سیاہ ہوں۔

فرض کیا 8 پہلا پتہ سیاہ آنے کا واقعہ اور B دوسرا پتہ سیاہ آنے کے واقعہ ہیں۔

$$n(A) = 26$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

پتوں کو واپس نہیں رکھا گیا لہذا سیمپل واپس بدلے گی

$$n(B|A) = 25$$

$$P(B|A) = \frac{25}{51}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{25}{51} = \frac{25}{102}$$

(ii) وہ ملکہ ہوں۔

$$n(S) = 52$$

حل:

فرض کیا 8 پہلے ملکہ آنے کا واقعہ ہے اور B دوسرا ملکہ آنے کا واقعہ ہے۔

$$n(A) = 4$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

پتوں کو واپس نہیں رکھا گیا لہذا سیمپل واپس بدلے گی

$$n(S) = 51$$

$$n(B|A) = 3$$

$$P(B|A) = \frac{3}{51} = \frac{1}{17}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$= \frac{1}{13} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{221}$$

$$n(s) = 52$$

$$n(A) = 13$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

پتوں کو تبدیل نہیں کیا گیا سیمپل اسپیس بدل جائے گی۔

$$n(s) = 51$$

$$n(B|A) = 12$$

$$P(B|A) = \frac{12}{51} = \frac{4}{17}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) \\ = \frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}$$

(iv) دونوں اینٹیں ہوں۔

$$n(s) = 52$$

$$n(A) = 13$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

پتوں کو تبدیل نہیں کیا گیا سیمپل اسپیس بدل جائے گی۔

$$n(s) = 51$$

$$n(B|A) = 12$$

$$P(B|A) = \frac{12}{51} = \frac{4}{17}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) \\ = \frac{1}{4} \times \frac{4}{17} = \frac{1}{17}$$

7- سلیم اچھی طرح پھینٹے ہوئے تاش کے 52 پتوں میں سے بغیر واپسی کے یکے بعد دیگرے دو پتے نکالتا ہے۔ احتمال کیا ہے

کہ پہلا پتہ غلام ہو اور دوسرا پتہ ملکہ ہو۔

$$n(s) = 52 \text{ کل پتے}$$

$$n(A) = 4$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

پتوں کو واپس نہیں رکھا گیا سیمپل اسپیس بدلے گی۔

$$n(s) = 51$$

$$n(B|A) = 4$$

$$P(B|A) = \frac{n(B|A)}{n(s)} = \frac{4}{51}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) \\ = \frac{1}{13} \times \frac{4}{51} = \frac{4}{663}$$

حل اعادہ مشق 12

1- درج ذیل سوالات کے دیے گئے چار ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔
(i) ناممکن واقعہ کا احتمال ہے:

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) -1
(ii) ایک سکے کو ایک بار اچھالنے پر ہیڈ حاصل کرنے کا احتمال کیا ہے؟

- (a) 0 (b) 0.25 (c) 0.5 (d) 1
(iii) کسی تجربہ میں تمام ممکنہ نتائج کے احتمالات کا مجموعہ ہوتا ہے:

- (a) 0.5 (b) 0.25 (c) 1 (d) 0.4
(iv) اگر $P(A) = 0.6$ ہو تو واقعہ A وقوع پذیر ہونے کا احتمال ہے:

- (a) 0.4 (b) 0.6 (c) 1 (d) 1.6
(v) دو واقعات باہمی متنافی کہلاتے ہیں اگر:

- (a) وہ ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہو سکتے ہوں۔
(b) ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہوں۔
(c) وہ ایک ساتھ وقوع پذیر نہ ہو سکتے ہوں۔
(d) وہ ہمیشہ برابر ہوں۔

(vi) اگر ایک سکہ اچھالا جائے اور ایک ڈس کو پھینکا جائے تو سیمیپل پوائنٹس کی تعداد ہے:

- (a) 3 (b) 6 (c) 2 (d) 12
(vii) یقینی واقعہ کا احتمال کیا ہوتا ہے؟

- (a) 1 (b) 0 (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{4}{5}$
(viii) ایک ڈس پر 6 سے بڑا عدد حاصل کرنے کا احتمال ہے:

- (a) 0.33 (b) 1 (c) 0 (d) 0.5
(ix) ماش کی گڈی کے پتوں میں سے ایک پتہ نکالنے کے..... ممکنہ نتائج ہوتے ہیں۔

- (a) 13 (b) 1 (c) 52 (d) 26
(x) اگر $P(E) = 0.07$ ہو تو E نہ ہونے کا احتمال ہے:


- (a) 0.95 (b) 0.89 (c) 0.93 (d) 0.90

جوابات

- (i) 0 (ii) 0.5 (iii) 1 (iv) 0.4 (v) وہ ایک ساتھ وقوع پذیر نہ ہو سکتے ہیں
(vi) 12 (vii) 1 (viii) 0 (ix) 52 (x) 0.93

2- عرشید منگل اور بدھ میں سے ایک دن اور صبح شام میں سے ایک وقت منتخب کرتی ہے۔ امکانہ خاکہ بنائیے۔ شجری خاکہ بھی بنائیے۔
حل:

	منگل	بدھ
صبح	(منگل، صبح)	(بدھ، صبح)
شام	(منگل، شام)	(بدھ، شام)



3- تاش کے پتوں میں سے ایک پتا نکالا گیا ہے۔ ایک انکا اور ایک حکم حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔
حل:

فرض کیا ۸ کا آنے کا واقعہ ہے اور ۱۳ ایک حکم آنے کا واقعہ ہیں۔

$$n(S) = 52 \text{ کل پتے}$$

$$n(A) = 4$$

$$n(B) = 13$$

$$n(A \cap B) = 1 \text{ (اکا دونوں پتوں میں آئے گا)}$$

$$p(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$p(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$p(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{1}{52}$$

$$p(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{13} + \frac{1}{4} - \frac{1}{52}$$

$$= \frac{4+13-1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

4- فاطمہ تاش کے پتوں سے یکے بعد دیگرے (بغیر واپسی کے) دو پتے نکالتی ہے۔ احتمال معلوم کیجیے کہ دونوں پتے سیاہ ہوں۔
حل:

فرض کیا ۸ کا آنے کا واقعہ ہے اور ۱۳ دوسرا پتا سیاہ آنے کا واقعہ ہے۔

$$n(S) = 52 \text{ کل پتے}$$

$$n(A) = 26$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

پتوں کو واپس نہیں رکھا گیا تو سہیل اپنیس تبدیل تبدیل ہوگی۔

$$n(S) = 51$$

$$n(B|A) = 25$$

$$p(B|A) = \frac{n(B|A)}{n(S)} = \frac{25}{51}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{25}{51} = \frac{25}{102}$$

5- اگر دو ڈائس پھینکے جائیں تو ان کے اوپری رخ اعداد کی حاصل ضرب 6 یا اوپری رخ اعداد کا فرق 5 حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔

$$\text{کل نتائج } n(S) = 6 \times 6 = 36$$

حل:

فرض کیا 8 حاصل ضرب 6 آنے کا واقعہ ہے اور B کا فرق 5 آنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{(1,6), (2,3), (3,2), (6,1)\}, n(A) = 4$$

$$B = \{(1,6), (6,1)\}, n(B) = 2$$

$$A \cap B = \{(1,6), (6,1)\}, n(A \cap B) = 2$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{9} + \frac{1}{18} - \frac{1}{18}$$

$$= \frac{2+1-1}{18} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$$

6- ایک تھیلے میں 7 نارنجی اور 5 جامنی گولیاں ہیں۔ دو گولیاں یکے بعد دیگرے بغیر واپسی کے نکالی گئیں۔ احتمال معلوم کیجیے کہ پہلی گولی نارنجی اور دوسری گولی بھی نارنجی ہو۔

$$\text{کل گولیاں } = 7 + 5 = 12, n(S) = 12$$

فرض کیا 8 نارنجی گولیاں آنے کا واقعہ ہے اور B جامنی گولیاں آنے کا واقعہ ہے۔

$$n(A) = 7$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{7}{12}$$

$$n(S) = 11$$

$$n(B|A) = 6$$

$$p(B|A) = \frac{n(B|A)}{n(S)} = \frac{6}{11}$$

$$P(A \cap B) = p(A) \times p(B|A)$$

$$= \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} = \frac{42}{132} = \frac{7}{22}$$

معرضی طرز سوالات

اضافی کثیر الانتخابی سوالات

یہ قسم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

احتمال

12.1

درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- ان میں سے کون سا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ کسی چیز کے رہ نما ہونے کا کتنا امکان ہے:
 - (a) نتیجہ
 - (b) احتمال
 - (c) واقعہ
 - (d) مربع
- 2- ایک بلا ترتیب تجربے میں تمام ممکنہ نتائج کا مجموعہ کہلاتا ہے:
 - (a) سیمپل اسپیس
 - (b) آزمائش
 - (c) سکے
 - (d) نقطہ
- 3- ایک ڈس پھینکے کی کھیل اسپیس ہے:
 - (a) {2, 4, 6}
 - (b) $P(A)$
 - (c) {4, 5, 6}
 - (d) {1, 2, 3, 4, 5, 6}
- 4- سیمپل اسپیس کا ہر رکن کہلاتا ہے:
 - (a) واقعہ
 - (b) سیمپل پوائنٹ
 - (c) نتیجہ
 - (d) بلا ترتیب

واقعہ

12.1.3

- 5- ایک بلا ترتیب تجربے میں ہر ممکنہ نتیجہ کہلاتا ہے:
 - (a) ایک واقعہ
 - (b) سیمپل اسپیس
 - (c) احتمال
 - (d) ڈس پھینکنا
- 6- واقعات A اور B باہمی منافی واقعات کہلاتے ہیں اگر:
 - (a) $A \cup B = B$
 - (b) $A \cap B = A$
 - (c) $A \cap B = \phi$
 - (d) $A \cap B = U$
- 7- ایک سکے اچھالنے میں واقعہ ”دوہیل“ اور واقعہ ”ٹیل“ ہیں:
 - (a) ایک جیسے واقعات
 - (b) متضاد واقعات
 - (c) حقیقی واقعات
 - (d) ناممکن واقعات
- 8- اگر کوئی واقعہ صرف ایک نتیجہ پر مشتمل ہو تو اسے کہا جاتا ہے:
 - (a) واحد واقعہ
 - (b) ابتدائی واقعہ
 - (c) جامع واقعہ
 - (d) باہمی واقعہ
- 9- ایک سکے کا متحدہ بار اچھالنا ہر بار کا اچھالنا ایک دوسرے سے:
 - (a) منحصر
 - (b) باہمی
 - (c) آزاد
 - (d) ممکن
- 10- واقعات کے تمام ممکنہ نتائج کو ظاہر کرنے کے لیے بصری اظہار کہلاتا ہے:
 - (a) ایک آزاد خاکہ
 - (b) ایک ٹیل خاکہ
 - (c) سادہ خاکہ
 - (d) شجرہ خاکہ

11- احتمال کی قدر ہمیشہ ہوتی ہے:

- (a) 0 سے لے کر 1 تک (b) 1 سے لے کر 2 تک (c) 1 سے لے کر 1 تک (d) 2 سے لے کر 6 تک

12- E کا مکمل منصف ہوتا ہے:

- (a) $\bar{E}$ (b) $P(E)$ (c) $\bar{E}$ (d) E

13- کوئی واقعہ یقینی ہوتا ہے جب:

- (a) $P(E) = 1$ (b) $P(E) = 0$ (c) $P(E) > 1$ (d) $P(E) < 0$

14- ایک ناممکن واقعہ کا مکمل منصف ہوتا ہے:

- (a) یقینی واقعہ (b) بڑا واقعہ (c) باہمی واقعہ (d) کوئی واقعہ نہیں

15- اگر آپ ایک سکے کو دوبارہ اچھالتے ہیں۔ سیمپل اسپیس S میں کتنے سیمپل پوائنٹ ہوں گے:

- (a) 2 (b) 8 (c) 4 (d) 6

16- کون سی مساوات ہمیشہ درست ہوتی ہے:

- (a) $P(A) + P(A') = 1$ (b) $P(A) + P(A') = 0$ (c) $P(A) \times P(B) = 1$ (d) $P(A) + P(A') = 1$

17- ایک ڈس پھینکنے سے 4 سے بڑا عدد پانے کا احتمال ہے:

- (a) $\frac{3}{6}$ (b) $\frac{2}{6}$ (c) $\frac{4}{6}$ (d) $\frac{1}{6}$

18- اگر بارش ہونے کا احتمال 0.3 ہو تو بارش نہ ہونے کا احتمال ہوگا۔

- (a) 0.7 (b) 0.0 (c) 0.1 (d) 1

19- کون سی قدر احتمال کے لیے درست نہیں ہے:

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) 2.3 (c) 0.3 (d) 0.5

20- دو ڈس پھینکنے کے نتائج کا مجموعہ 17 آنے کا احتمال ہوگا:

- (a) 1 (b) $\frac{17}{36}$ (c) 0.17 (d) 0

21- دو ڈس پھینکنے کے۔ دونوں پر مجموعہ 13 سے کم آنے کا احتمال ہوگا۔

- (a) 1 (b) $\frac{12}{36}$ (c) $\frac{13}{36}$ (d) 0

22- دو ڈس پھینکنے کے۔ اگر A دونوں پر ایک ہی عدد ہونے کا واقعہ ہو تو $n(A)$ ہوگی۔

- (a) 36 (b) 6 (c) $\frac{1}{36}$ (d) $\frac{18}{36}$

23- اگر $P(A) = \frac{1}{6}$ تب $P(A')$ ہوگی:

- (a) 1.6 (b) 0.6 (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{6}{5}$

24- احتمال کے قانون جمع کا درست کلیہ ہے:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (b)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (a)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B) \quad (d)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (c)$$

25- اگر $P(A) = 0.3$ اور $P(B) = 0.4$ ہو اور A اور B باہمی متنافی ہوں تو $P(A \cup B)$ ہوگی:

$$1 - 0.4 \quad (d)$$

$$1 + 0.3 \quad (c)$$

$$0.7 \quad (b)$$

$$0.2 \quad (a)$$

26- اگر $P(A) = 0.5$ اور $P(B) = 0.3$ اور $P(A \cap B) = 0.1$ ہو تو $P(A \cup B)$ ہوگی:

$$0.9 \quad (d)$$

$$0.5 \quad (c)$$

$$0.2 \quad (b)$$

$$0.7 \quad (a)$$

27- تاش کی ایک گنڈی سے ایک پتہ نکالا گیا اس کا احتمال کیا ہوگا اگر یہ بادشاہ یا ملکہ ہو۔

$$\frac{8}{51} \quad (d)$$

$$\frac{2}{13} \quad (c)$$

$$\frac{1}{13} \quad (b)$$

$$\frac{4}{52} \quad (a)$$

28- 100 طلبہ میں سے 60 ریاضی کو پسند کرتے ہیں۔ 40 سائنس کو اور 20 دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک طالب علم بلا ترتیب سائنس یا ریاضی کو پسند کرتا ہے اس کا احتمال ہوگا:

$$0.2 \quad (d)$$

$$0.4 \quad (c)$$

$$0.6 \quad (b)$$

$$0.8 \quad (a)$$

$$\frac{6}{6} \quad (d)$$

$$\frac{5}{6} \quad (c)$$

$$\frac{4}{6} \quad (b)$$

$$\frac{3}{6} \quad (a)$$

30- اگر $P(A \cap B) = 0.9$ ، $P(A) = 0.6$ ، $P(B) = 0.5$ ہو تو $P(A \cup B)$ ہوگی:

$$0.2 \quad (d)$$

$$0.4 \quad (c)$$

$$0.3 \quad (b)$$

$$1.1 \quad (a)$$

31- واقعات کا کونسا جوڑا باہمی متنافی ہے:

(b) بارش ہو رہی ہے اور چھتری اٹھائی ہے

(a) ایک سرخ پتہ اور ایک یکہ نکالنا

(d) طالب ہونا اور ریاضی کا چاہنے والا ہونا

(c) ڈاکس پر 3 اور ایک جفت عدد آنا

32- ایک باکس 5 سرخ، 3 نیلی اور 2 سبز گیندوں پر مشتمل ہے۔ ایک سرخ یا نیلی گیند نکالنے کا احتمال ہوگا۔

$$0.19 \quad (d)$$

$$0.17 \quad (c)$$

$$0.2 \quad (b)$$

$$0.6 \quad (a)$$

33- اگر $P(A) = 0.4$ اور $P(B) = 0.5$ اور A اور B آزاد ہیں تو $P(A \cup B)$ کا احتمال ہوگا:

$$0.9 \quad (d)$$

$$0.7 \quad (c)$$

$$0.1 \quad (b)$$

$$0.2 \quad (a)$$

34- اگر $P(A) = 0.6$ اور $P(B) = 0.7$ تو ممکنہ زیادہ سے زیادہ $P(A \cap B)$ کی قدر ہوگی۔

$$0.6 \quad (d)$$

$$0 \quad (c)$$

$$0.1 \quad (b)$$

$$0.3 \quad (a)$$

35- کونسا نقطہ عام طور پر احتمال کی جمع کے قانون سے متعلقہ ہے:

(d) یا

(c) نہیں

(b) اور

(a) معلوم

36- اگر A اور B دو آزاد واقعات ہوں تو کونسا کھیا احتمال کے قانون ضرب کا ہے:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (b)$$

$$P(A \cup B) = P(A) \times P(B) \quad (a)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \quad (d)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) \quad (c)$$

37- اگر A اور B دو منحصر واقعات ہوں تو درست قانون ضرب ہے:

$$P(A \cap B) = \frac{P(A)}{P(B)} \quad (b)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) \quad (a)$$

$$P(A|B) P = (A) \times P(B) \quad (d)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \quad (c)$$

38- اگر ایک ہموار سکہ دوبار اچھالا گیا تو پہلی مرتبہ ہیڈ اور دوسری مرتبہ بھی ہیڈ آنے کا احتمال ہوگا:

$$\frac{1}{2} \quad (d)$$

$$1 \quad (c)$$

$$\frac{1}{4} \quad (b)$$

$$\frac{3}{4} \quad (a)$$

39- اگر $P(A) = 0.6$ اور $P(B) = 0.5$ ہو تو $P(A \cap B)$ ہوگی:

$$1.1 \quad (d)$$

$$0.1 \quad (c)$$

$$0.83 \quad (b)$$

$$0.3 \quad (a)$$

40- دو ہموار ڈس سپیکل گئے۔ تو پہلی ڈس پر 6 اور دوسروں پر بھی 6 آنے کا احتمال ہوگا:

$$\frac{1}{6} \quad (d)$$

$$\frac{1}{36} \quad (c)$$

$$\frac{1}{2} \quad (b)$$

$$\frac{1}{6} \quad (a)$$

41- تاش کے 52 پتوں کی ڈگی سے آپ دو پتے بغیر دوبارہ کے نکالتے ہیں۔ اگر دونوں کے ہوں تو احتمال ہوگا:

$$\frac{1}{13} \times \frac{1}{13} \quad (d)$$

$$\frac{4}{52} \times \frac{3}{51} \quad (c)$$

$$\frac{4}{52} \times \frac{3}{52} \quad (b)$$

$$\frac{4}{52} \times \frac{3}{52} \quad (a)$$

42- اگر $P(A \cap B) = 0.2$ اور $P(A) = 0.5$ ہو تو $P(B|A)$ ہوگی:

$$0.1 \quad (d)$$

$$0.7 \quad (c)$$

$$0.4 \quad (b)$$

$$2.5 \quad (a)$$

جوابات

4- سیمپل پوائنٹ

3- {1, 2, 3, 4, 5, 6}

2- سیمپل اسپیس

1- احتمال

9- آزاد

8- ابتدائی واقعہ

7- تکمیلی واقعات

6- $A \cap B = \phi$

5- ایک واقعہ

14- یقینی واقعہ

13- $P(E) = 1$

12- $\bar{E}$

11- 0 سے لے کر 1 تک

10- شجری خاکہ

18- 0.7

17- $\frac{2}{6}$

16- $P(A) + P(A')$

15- 4

23- $\frac{5}{6}$

22- 6

21- 1

20- 0

19- 2.3

26- 0.7

25- 0.7

24- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

24- 4

30- 0.2

29- $\frac{4}{6}$

28- 0.8

27- $\frac{2}{3}$

34- 0.3

33- 0.9

32- 0.8

31- ڈس پر 3 اور ایک جفت عدد کا آنا

37- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$

36- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

35- یا

42- 0.4

41- $\frac{4}{52} \times \frac{3}{51}$

40- $\frac{1}{36}$

39- 0.3


38- $\frac{1}{4}$

✿ مختصر جواب دیں۔


- 1- احتمال کی بنیادی تعریف کیا ہے؟
جواب: احتمال ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کسی چیز کے رونما ہونے کا کتنا امکان ہے خاص طور پر جب ہم غیر یقینی صورت حال سے نمٹتے ہیں۔
- 2- بلا ترتیب تجربہ کی دو اہم خصوصیات کیا ہیں؟
جواب: بلا ترتیب تجربہ وہ تجربہ ہے جس میں:
(i) تمام ممکنہ نتائج کا سیٹ معلوم ہوتا ہے۔
(ii) درست نتیجہ معلوم نہیں ہوتا۔
- 3- احتمال میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
جواب: ایک بلا ترتیب تجربہ کے ممکنہ حاصل کو نتیجہ کہتے ہیں۔
- 4- سیمپل اسپیس کی تعریف کیا ہے؟
جواب: ایک بلا ترتیب تجربے میں تمام ممکنہ نتائج کا مجموعہ سیمپل اسپیس کہلاتا ہے۔ (S سے ظاہر کیا جاتا ہے۔)
- 5- سیمپل پوائنٹ کی تعریف کریں۔
جواب: سیمپل اسپیس کا ہر رکن سیمپل پوائنٹ کہلاتا ہے۔

- 6- واقعہ کی تعریف کریں۔
جواب: ایک بلا ترتیب تجربے میں ہر ممکن نتیجہ ایک واقعہ (Event) کہلاتا ہے۔
- 7- مساوی امکانی واقعات کی تعریف کریں۔
جواب: دو یا دو سے زیادہ واقعات کو مساوی امکانی واقعات کہا جاتا ہے۔
- 8- ایک ناممکن واقعہ کیا ہوتا ہے؟
جواب: ایک ناممکن واقعہ وہ واقعہ ہے جو کسی بھی صورت حال میں رونما نہیں ہو سکتا۔
- 9- متخمس واقعہ کی تعریف کریں۔
جواب: کسی واقعہ ۸ کا متخمس واقعہ ہے جو ان تمام سیمپل پوائنٹس کے مجموعہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ جو ۸ میں شامل نہ ہوں۔
- 10- ابتدائی واقعہ کی تعریف کریں۔
جواب: اگر کوئی واقعہ کسی ایک نتیجہ پر مشتمل ہو تو اسے ابتدائی واقعہ کہا جاتا ہے۔
- 11- باہمی متنافی واقعات کیا ہوتے ہیں؟
جواب: دو یا دو سے زیادہ واقعات کو باہمی متنافی واقعات کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک ہی وقت میں رونما نہ ہو سکیں۔

13- شجری خاکہ استعمال کرتے ہوئے دو سکے اچھالنے کی سہیل
اپس میں معلوم کریں۔



12- شجری خاکہ استعمال کرتے ہوئے ایک ڈس پھینکنے کی سہیل
اپس میں معلوم کریں۔



واقعہ کا احتمال

12.1.9

14- تین سکہ اچھالے گئے کم از کم ایک ٹیل آنے کا احتمال معلوم کریں۔
حل: $S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$

فرض کریں $A = \{HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{7}{8}$$

16- اگر $P(A) = \frac{5}{9}$ ہو تو A' کا احتمال معلوم کریں۔

$$P(A) = \frac{5}{9}$$

$$P(A') = 1 - P(A)$$

$$1 - \frac{5}{9}$$

$$= \frac{9-5}{9} = \frac{4}{9}$$

15- ایک تھیلے میں 5 سفید گیندیں، اور تین سبز گیندیں ہیں۔ حظلہ
اسد تھیلے میں سے ایک گیند بلا ترتیب نکالتا ہے احتمال معلوم
کریں کہ نکالی گئی گیند سبز ہو۔

$$\text{کل گیندیں} = 5 \text{ سفید} + 3 \text{ سبز} = 8$$

$$n(S) = 8$$

فرض کیا A نکالی گیند کے سبز ہونے کا واقعہ ہے۔

$$n(A) = 3$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{8}$$

17- ناش کے 52 چٹوں کی ایک گڈی سے حکم کا ایک پتہ نکالنے کا احتمال معلوم کریں۔

$$n(S) = 52$$

فرض کیا B حکم کے پتے کے نکالنے جانے کا واقعہ ہے

$$n(B) = 13$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

18- اتفاق کے ایک کھیل میں ایک تیر کو گھمایا جاتا ہے جس کا کسی ایک عدد 3, 4, 5, ..., 13 پر آکر رکنے کا امکان برابر ہے۔ اس بات کا کیا

احتمال ہے کہ تیر 3 کے کسی اضعاف پر آکر رکنے کا

$$S = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}, n(s) = 11$$

فرض کیا 8 تیر کے 3 اضعاف پر رکنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{3, 6, 9, 12\}, n(A) = 4$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(s)} = \frac{4}{11}$$

20- ایک ڈانس کو دو بار پھینکا گیا تو ہر ایک پر 6 سے بڑے عدد آنے کا احتمال معلوم کریں۔

$$n(S) = 6 \times 6 = 36$$

فرض کیا A ہر ایک پر 6 سے بڑے عدد کے آنے کا واقعہ ہے۔

$$A = \{\}, n(A) = 0$$

کیونکہ سیکپل اسپیس میں کوئی بھی سیکپل پوائنٹ ہر ایک پر 6 سے بڑا نہیں ہے۔

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{0}{36} = 0$$

19- اگر $P(A') = \frac{7}{10}$ ہو تو $P(A)$ معلوم کریں۔

$$P(A') = \frac{7}{10} \quad (\text{معلوم})$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$P(A') = 1 - P(A)$$

$$\frac{7}{10} = 1 - P(A)$$

$$P(A) = 1 - \frac{7}{10}$$

$$= \frac{10 - 7}{10} = \frac{3}{10}$$

احتمال کا قانون جمع

12.2

21- دو کوئی سے نمبر یا ہی متنافی واقعات کے لیے احتمال کا قانون جمع لکھیں۔

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

22- کوئی سے دو یا ہی متنافی واقعات کے لیے احتمال کا قانون جمع لکھیں۔

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

23- اگر $P(A) = 0.3$ اور $P(B) = 0.4$ ہو اور وہ یا ہی متنافی ہیں تو $P(A \cup B)$ کیا ہوگی۔

$$P(A) = 0.3, P(B) = 0.4$$

دیا گیا

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= 0.3 + 0.4 = 0.7$$

24- اگر $P(A) = \frac{7}{10}$ اور $P(B) = \frac{5}{10}$ ہو تو $P(A \cap B)$ کیا ہوگا۔

$$P(A) = \frac{7}{10}, P(B) = \frac{5}{10} \text{ اور } P(A \cup B) = \frac{8}{10}$$

دیا گیا

ہم جانتے ہیں

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{8}{10} = \frac{7}{10} + \frac{5}{10} - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = \frac{7}{10} + \frac{5}{10} - \frac{8}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

25- اگر $P(A) = 0.43$ اور $P(A \cup B) = 0.8$ اور $P(A \cap B) = 0.07$ ہو تو $P(B)$ معلوم کریں۔

$$P(A) = 0.43, P(A \cup B) = 0.8, P(A \cap B) = 0.07$$

حل: دیا گیا ہے

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$0.8 = 0.43 + P(B) - 0.07$$

$$0.8 - 0.43 + 0.07 = P(B)$$

$$0.44 = P(B)$$

$$P(B) = 0.44$$

26- اگر $P(A \cup B) = 0.9$ اور $P(B) = 0.4$ ہو تو $P(A)$ معلوم کریں۔

$$(A \cup B) = 0.9, P(B) = 0.4$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$0.9 = P(A) + 0.4$$

$$0.9 - 0.4 = P(A)$$

$$0.5 = P(A)$$

$$P(A) = 0.5$$

27- اگر $P(A \cup B) = 0.6$ ہو تو اس بات کا کیا احتمال ہے کہ نہ تو A وقوع پذیر ہو یا نہ ہی B۔

$$P(A \cup B) = 0.6$$

حل: (معلوم)

$$P((A \cup B) \text{ نہی}) = 1 - P(A \cup B)$$

$$= 1 - 0.6 = 0.4$$

احتمال کا قانون ضرب

12.3

28- دو آزاد واقعات کے لیے احتمال کا قانون ضرب لکھیں۔

$$P(A \text{ and } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

29- دو منحصر واقعات کے لیے احتمال کا قانون ضرب لکھیں۔

$$P(A \text{ and } B) = P(A) \times P(B|A)$$

30- عریشان نے ایک ہمارڈ اس چھٹکی۔ دونوں بار 4 آنے کا احتمال معلوم کریں۔

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, n(S) = 6$$

حل: فرض کیا A پہلی بار پھینکنے پر 4 آنے کا واقعہ ہے

اور B دوسری بار بھی 4 آنے کا واقعہ ہے۔

$$n(A) = 1$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{6}$$

$$n(B) = 1$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \\ = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

31- ایک تھیلے میں 5 سرخ اور 3 سیاہ گولیاں ہیں، منہ ایک کے ایک کر کے دو گولیاں نکالتی ہے۔ (پہلی گولی واپس رکھنے کے بعد دوسری گولی نکالی جاتی ہے۔) احتمال معلوم کریں کہ دونوں بار گولی سرخ ہو۔

حل: (گولیوں کی کل تعداد) $n(S) = 8$

فرض کیا 8 پہلی بار گولی نکالنے کا واقعہ ہے اور B دوسری بار گولی نکالنے کا واقعہ ہے۔

$$n(A) = 5, n(B) = 5$$

$$P(A) = \frac{5}{8}, P(B) = \frac{5}{8}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$= \frac{5}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{64}$$

32- ایک باکس میں 6 سیاہ اور 4 سفید گیندیں ہیں۔ مجھ بلا ترتیب دو گیندیں نکالتی ہے (پہلی گیند واپس رکھے بغیر) احتمال معلوم کریں کہ دونوں بار گیند سفید ہی ہو۔

حل: (گیندوں کی کل تعداد) $n(S) = 10$

فرض کیا 8 پہلی بار سفید گیند نکالنے کا واقعہ ہے اور B دوسری بار سفید گیند نکالنے کا واقعہ ہے۔
کیونکہ پہلی گیند کو واپس نہیں رکھا اس لیے سیمپل اسپیس متاثر ہوگی۔

$$n(A) = 4, n(B) = 3$$

$$P(A) = \frac{4}{10}, P(B|A) = \frac{3}{9}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$= \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$


33- افضل کے ریاضی میں پاس ہونے کا احتمال 0.7 ہے اور اردو میں پاس ہونے کا احتمال 0.6 ہے۔ دونوں واقعات آزاد ہیں اس بات کا احتمال بیان کریں کہ وہ مضامین میں پاس ہو جائے۔

$$P(\text{ریاضی}) = 0.7, P(\text{اردو}) = 0.6$$

$$P(\text{اردو اور ریاضی}) = P(\text{ریاضی}) \times P(\text{اردو})$$

$$= 0.7 \times 0.6$$

$$= 0.42$$



امتحانی پرچہ ریاضی کی تیاری کے لیے ہدایات برائے جماعت دہم

◀ جماعت دہم کے لیے ریاضی کا پرچہ 75 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ ▶ معروضی طرز 15 نمبر، انشائیہ طرز 60 نمبر۔ ▶ پرچہ کا دورانیہ 2 گھنٹے 30 منٹ ہوگا۔ ▶ معروضی طرز 20 منٹ + انشائیہ طرز 2 گھنٹے 10 منٹ۔ ▶ پرچہ درج ذیل تفصیلات کے مطابق تیار کیا جائے گا۔

1×15=15	سوال 1: پورے نصاب کتاب سے کل 15 کثیر الانتخابی سوالات (MCQs) لیے جائیں گے۔ تقسیم درج ذیل ہے۔ ابواب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 10 میں سے ایک ایک سوال؛ اور ابواب 9، 11 اور 12 میں سے دو سوالات لیے جائیں گے۔	معروضی طرز
2×6=12	یہ حصہ تین مختصر سوالات پر مشتمل ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ سوال 2: طلبہ کو 9 مختصر جوابی سوالات میں سے کوئی بھی 6 سوالات حل کرنے ہوں گے۔ تفصیلی درج ذیل ہے: • ابواب 1، 2، 3 اور 4 میں سے کم از کم دو مختصر سوالات لیے جائیں گے۔	حصہ اول انشائیہ طرز
2×6=12	سوال 3: طلبہ کو 9 مختصر سوالات میں سے کوئی بھی 6 سوالات حل کرنے ہوں گے۔ تفصیلی درج ذیل ہے: • ابواب 5، 6، 7 اور 8 میں سے کم از کم دو مختصر سوالات کیے جائیں گے۔	
2×6=12	سوال 4: طلبہ کو 9 مختصر سوالات میں سے کوئی بھی 6 سوالات حل کرنے ہوں گے۔ تفصیلی درج ذیل ہے: • ابواب 9، 10، 11 اور 12 میں سے کم از کم دو مختصر سوالات کیے جائیں گے۔	
2×8=16	یہ حصہ تین تفصیلی سوالات پر مشتمل ہوگا جو دو حصوں (الف اور ب) میں تقسیم ہوں گے۔ ہر حصہ 4 نمبروں کا ہوگا۔ طلبہ کو ان میں سے کوئی بھی دو سوالات حل کرنا ہوں گے۔ تفصیل درج ذیل ہے: سوال 5: (الف) ایک تفصیلی سوال باب 1 میں سے لیا جائے گا۔ (ب) ایک تفصیلی سوال باب 2 میں سے لیا جائے گا۔ سوال 6: (الف) ایک تفصیلی سوال باب 3 میں سے لیا جائے گا۔ (ب) ایک تفصیلی سوال باب 4 میں سے لیا جائے گا۔ سوال 7: (الف) ایک تفصیلی سوال باب 5 میں سے کسی ایک سے لیا جائے گا۔ (ب) ایک تفصیلی سوال باب 7 میں سے لیا جائے گا۔	حصہ دوم انشائیہ طرز
1×8=8	یہ حصہ دو تفصیلی سوالات پر مشتمل ہوگا جو دو حصوں (الف اور ب) میں تقسیم ہوں گے، ہر حصہ 4 نمبروں کا ہوگا۔ طلبہ کو ان میں سے کوئی ایک سوال حل کرنا ہوگا۔ تفصیل درج ذیل ہے: سوال 8: (الف) ایک تفصیلی سوال باب 6 میں سے کسی ایک سے لیا جائے گا۔ (ب) ایک تفصیلی سوال باب 8 یا باب 11 میں سے کسی ایک سے لیا جائے گا۔ سوال 9: (الف) ایک تفصیلی سوال باب 10 میں سے لیا جائے گا۔ (ب) ایک تفصیلی سوال باب 9 یا باب 12 میں سے کسی ایک سے لیا جائے گا۔	حصہ سوم انشائیہ طرز

وقت: 20 منٹ

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا چین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کر یا کاٹ کر نہ کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

نمبر شمار	سوالات	A	B	C	D
(i)	$i^2 + i^4$	-1	0 ✓	1	2
(ii)	$x^2 + 5x - 5 = 0$ کا فرق کنندہ ہے:	-20	20	25	45 ✓
(iii)	اگر $A' = -A$ ہو تو A _____ قالب ہے:	سمیٹرک	قطاری	مستطیلی	✓ کیو سیمٹرک
(iv)	X سے Y تفاعل کو _____ سے ظاہر کیا جاتا ہے:	$f: XY$	$f: Y \rightarrow X$	$f: X \rightarrow Y$ ✓	$f: \frac{X}{Y}$
(v)	$\frac{15xyz}{10}$ کی مختصر ترین شکل ہے:	$\frac{3xyz}{2}$ ✓	$\frac{3}{2}$	xyz	$\frac{xyz}{2}$
(vi)	P(4, -4) ربع میں واقعی ہے:	سپا	دوسرا	تیسرا	✓ چوتھا
(vii)	$\sin(90^\circ + \theta) =$	$\sin \theta$	$-\sin \theta$	$\cos \theta$ ✓	$-\cos \theta$
(viii)	ایک دائرہ کے مرکزی زاویوں کا مجموعہ ہوتا ہے:	90°	180°	270°	360° ✓
(ix)	دائرہ کے بیرونی نقطہ سے دائرہ پر _____ مماس کھینچے جاسکتے ہیں:	ایک	✓ دو	تین	بہت سے
(x)	اگر $r = 6\text{cm}$ ، ریڈین $\theta = 2$ ہو تو قوس کی لمبائی ہے:	12 cm ✓	8 cm	6 cm	3 cm
(xi)	دائرہ کا مرکز معلوم کرنے کے لیے کم از کم کتنے وتروں کی ضرورت ہوتی ہے؟	1	2 ✓	3	4
(xii)	دوسرا چہاروی حصہ ظاہر کرتا ہے:	اوسط	✓ وسطانیہ	غادہ	تغیریت
(xiii)	تغیریت کا مثبت غلط المراح کہلاتا ہے:	اوسط	وسطانیہ	✓ معیاری انحراف	سعت
(xiv)	اگر $P(A) = 0.6$ ہو تو واقعہ A واقع پذیر ہونے کا احتمال ہے:	0.4 ✓	0.6	1	1.6
(xv)	تاش کی گڈی میں سے ایک پتہ نکالنے کے _____ ممکن نتائج ہوتے ہیں:	13	1	52 ✓	26

انشائیہ طرز (حصہ اول)

وقت: 2:10 گھنٹے

$$(2 \times 6 = 12)$$

کل نمبر: 60

سوال 2: کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) مختصر کیجیے۔ i^{17} (ii) مائیلیس معلوم کیجیے۔ $-5 - 4i$

(iii) دو درجی مساوات کی مثال کے ساتھ تعریف کیجیے۔

(iv) دو درجی مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے۔ $2x(x+1) = 4(2x+3)$

(v) مساوات کے روٹس کی نوعیت کا جائزہ لیجیے۔ $3x^2 - 9x - 2 = 0$

(vi) $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ معلوم کیجیے۔ $A - B$ اور $B - A$

(vii) ضربی معکوس معلوم کیجیے۔ $\begin{bmatrix} -4 & 8 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$

(viii) $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x - 3$ معلوم کیجیے۔ $f(g(x))$

(ix) حل کیجیے اور حل کو عددی خط پر ظاہر کیجیے۔ $4x - 9 = 3$

$$(2 \times 6 = 12)$$

سوال 3: کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) مختصر کیجیے۔ $\frac{3}{x-y} + \frac{1}{y-x}$

(ii) معکوس مساوات کی مثال کے ساتھ تعریف کیجیے۔

(iii) مختصر ترین شکل میں تبدیل کیجیے۔ $\frac{x^2 - 5x}{x^2 - 4x - 5}$

(iv) جیت کیجیے کہ $\underline{a} = 5\underline{i} - 2\underline{j}$ اور $\underline{b} = 10\underline{i} + 4\underline{j}$ متوازی ہیں۔

(v) $\underline{a} = \frac{5}{3}\underline{i} + \frac{1}{3}\underline{j}$ کی سمت میں یونٹ ویکٹر معلوم کیجیے۔ (vi) سائن کا قانون بیان کیجیے۔

(vii) ΔABC کا رقبہ معلوم کیجیے جس میں $a = 6.12 \text{ cm}$, $b = 8.34 \text{ cm}$, $c = 7.12 \text{ cm}$


(viii) قاطع خط کی تعریف کیجیے اور اس کی شکل بھی بنائیے۔

(ix) بتائیے کہ نقطہ $A(1, 1)$, $B(4, 2)$ اور $C(3, 5)$ میں سے ایک منفرد دائرہ گزر سکتا ہے۔

$$(2 \times 6 = 12)$$

سوال 4: کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

(i) شکل کے ساتھ دائرہ کے مماس کی تعریف کیجیے۔



(ii) x کی قیمت معلوم کیجیے۔

(iii) دائرہ کا قطر معلوم کیجیے۔ جس کا مرکزی زاویہ 60° اور رداس 7cm ہے، قوس کی لمبائی بھی معلوم کیجیے۔

(iv) 2cm رداس کی مدد سے دائرہ بنائیے اور دائرہ کے مرکز کی تصدیق کیجیے۔

(v) 1.3cm رداس کا ایک دائرہ بنائیے اور نقطہ P پر ایک مماس کھینچیں، نقطہ P کے محیط پر واقع ہو۔

(vi) دیے گئے مواد کا وسطانیہ معلوم کیجیے۔ 102, 98, 95, 100, 93, 110, 108, 104, 97, 96, 92, 101, 99, 105, 107

(vii) دیے گئے مواد کی سعت معلوم کیجیے۔ 15, 22, 18, 30, 17, 25

(viii) دو سکے ایک ساتھ اچھالے گئے۔ دونوں سکوں پر مختلف رُخ آنے کا احتمال کیا ہے؟

(ix) 1 سے 10 تک کے اعداد میں سے دو اعداد کو واپس رکھنے کے ساتھ بلا ترتیب منتخب کیا گیا، احتمال معلوم کیجیے کہ دونوں اعداد مفرد ہوں۔

(حصہ - دوم)

(2 × 8 = 16)

کوئی سے دو (02) سوالات کے جوابات لکھیے۔

سوال 5: (الف) کمپلیکس عددی سروں z اور w کے لیے $3z + (2 + i)w = 11 - i$, $(2 - i)z - w = -1 + i$

(ب) اگر مساوات $x^2 + 2(1 + k)x + k^2 = 0$ کے رُش مساوی ہوں تو k کی قیمت معلوم کیجیے۔

$$3x + 2y = 2$$

$$x - 2y = -2$$

سوال 6: (الف) دونوں قائلوں کے طریقے سے حل کیجیے۔

(ب) تصدیق کیجیے۔ $x \neq -2, f(x) = \frac{x-4}{x+2}$ جہاں $f(f(x)) = x, f(f(x)) = x$

سوال 7: (الف) حل کیجیے۔ $4 \cdot 2^{2x+1} - 9 \cdot 2^x + 1 = 0$

(ب) مثلث ABC کو حل کیجیے۔ $c = 7\text{cm}, \beta = 34^\circ, \gamma = 64^\circ$

(حصہ - سوم)

(1 × 8 = 8)

نوٹ: کوئی سے ایک سوال کا جواب لکھیے۔

سوال 8: (الف) A, B اور D کے محدودات بالترتیب $(1, 2), (6, 3)$ اور $(2, 8)$ ہیں۔ اگر $ABCD$ متوازی الاضلاع ہو تو ویکٹر کے طریقہ

سے C کے محدودات معلوم کیجیے۔

(ب) ایک فیکٹری درج ذیل لمبائیوں (سنٹی میٹر میں) کی سلاخیں تیار کرتی ہے۔ 50.1, 49.9, 50.0, 50.2, 49.8

معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے یکسانیت کی جانچ کیجیے۔

سوال 9: (الف) 1.5cm رداس کا دائرہ بنائیے اور دو مماس کھینچیں جو 30° کے زاویہ پر ملتے ہوں۔

(ب) دو ڈائس ایک ساتھ پھینکے گئے۔ دونوں ڈائس پر ایک جیسے ہی اعداد یا اعداد کا مجموعہ 10 حاصل کرنے کا احتمال معلوم کیجیے۔

