

سوال 1: ایٹمز شیلیٹی حاصل کرنے کے لیے اپنی انرجی کو کیسے کم کرتے ہیں؟

جواب: اس دنیا میں موجود تمام ایٹمز اپنی انرجی کم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اس کوشش میں وہ دوسرے ایٹمز کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کیونکہ اس کی مدد سے ایٹمز کی شیلیٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔

تمام ایٹمز جو پیریاڈک ٹیبل میں موجود ہیں غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بیرونی شیل نامکمل ہوتے ہیں سوائے گروپ VIII-A کے۔ ایلیمینٹس کے گروپ VIII-A کے ایلیمینٹس کے ویلنس شیل مکمل ہوتے ہیں اس لیے یہ دوسرے ایلیمینٹس کے ساتھ ملنے کا رجحان کم رکھتے ہیں۔ لہذا دوسرے ایلیمینٹس (نوبل گیسز کے علاوہ) نوبل گیسز کی ترتیب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رجحان کیمیکل بانڈ کی ایک اہم بنیاد ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایٹم نان ری ایکٹیو گیس کی الیکٹرونک کنفیگریشن حاصل کرنے کے لیے کیمیکل بانڈ بناتے ہیں۔

سوال 2: ایٹمز اپنا ڈوپلیٹ یا آکٹیٹ کیسے مکمل کرتے ہیں؟ مثال سے واضح کریں۔

جواب: ایٹمز دوسرے ایٹمز سے مل کر اپنے بیرونی شیلز میں دو یا آٹھ الیکٹرونز لے کر خود کو مستحکم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم کے ایٹم کے بیرونی شیل میں ایک الیکٹرون ہے اس ایٹم کے لیے استحکام حاصل کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ اپنا ایک الیکٹرون کھو دے، دوسرا یہ ہے کہ مزید سات الیکٹرونز جذب کر لے۔ ان دونوں طریقوں سے سوڈیم کے بیرونی شیل میں آٹھ الیکٹرونز آ جانے سے اس کا آکٹیٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً سوڈیم ایک ایسا آسان راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنا ایک الیکٹرون کھو کر دوسرے ایٹم سے بانڈ بناتا ہے۔ اس طرح ہائیڈروجن ایٹم کے لیے یہ دونوں راستے آسان ہیں وہ چاہے تو اپنے بیرونی شیل میں ایک الیکٹرون کھو کر پروٹان (Proton H^+) بنائے یا ایک الیکٹرون حاصل کر کے اپنا ڈوپلیٹ مکمل کرے۔

سوال 3: الیکٹرو پوزیٹو میٹلز اور الیکٹرو نیگیٹو میٹلز میں فرق کریں۔

جواب: پیریاڈک ٹیبل میں موجود الکی میٹلز (Alkali Metals) اور الکلائن ارٹھ میٹلز (Alkaline Earth Metals) کے لیے یہ بات آسان ہے کہ وہ اپنے الیکٹرونز سولہویں اور سترہویں گروپس کو منتقل کر کے بانڈ بنائیں۔ الکی اور الکلائن ارٹھ میٹلز چونکہ آسانی سے اپنے الیکٹرونز سے محروم ہو جاتی ہیں اس لیے ان کو الیکٹرو پوزیٹو میٹلز (Electropositive Metals) کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سولہویں اور سترہویں گروپس کے ایلیمینٹس آسانی سے الیکٹرون جذب کر لیتے ہیں اس لیے ان ایلیمینٹس کو الیکٹرو نیگیٹو میٹلز (Electronegative Metals) کا نام دیا گیا ہے۔

سوال 4: کیمیکل بانڈ کی تعریف لکھیں۔ کیمیکل بانڈ کی اقسام کے نام لکھیں۔

جواب: کیمیکل بانڈ (Chemical Bond): کیمیکل بانڈ کشش کی وجہ سے جو ایٹمز کو الیکٹرونیکی یا کمپاؤنڈ کی صورت میں باندھ کے رکھتی ہے۔

کیمیائی بانڈ کی اقسام (i) آئیونک بانڈ (Ionic Bond) (ii) کوویلنٹ بانڈ (Covalent Bond)

(iii) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (Coordinate Covalent Bond)

سوال 5: کیمیکل بانڈ کی انرجیٹکس سے کیا مراد ہے؟

جواب: کیمیکل بانڈ کی انرجیٹکس: جب دو مختلف اشیاء کے ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو دو باتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ کیمیکل بانڈ کے دوران

ان کے درمیان کشش کی قوتیں جنم لیں جبکہ دوسرا امکان اس بات کا ہے کہ ان کے درمیان دفع کی قوتیں پیدا ہوں۔ اگر کشش کی قوتیں دفع کی قوتوں سے زیادہ طاقتور ہوں گی تو منسلک ہونے والے دونوں ایٹمز کی انرجی کم ہوگی اور نتیجتاً وہ ایک دوسرے سے منسلک ہو کر نیا مالیکیول بنائیں گے۔ دوسری صورت میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔





سوال 6: سوڈیم کلورائیڈ کی مثال سے آئیونک بانڈ کے بننے کی وضاحت کریں۔

جواب: آئیونک بانڈ (Ionic Bond): یہ کیمیکل بانڈ ایلیمنٹ کے ایٹمز کی اس خصوصیت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے کہ وہ خود کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کوشش میں یہ ایٹمز اپنے شیلز میں موجود الیکٹرونز کھودیتے ہیں یا پھر الیکٹرون یا الیکٹرونز جذب کر لیتے ہیں۔ دراصل یہ ایٹمز اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرونز کی تعداد نزدیک ترین نوئل گیس جیسی ہو جائے تاکہ ان میں بھی نوئل گیس جیسا استحکام پیدا ہو جائے۔ سوڈیم کلورائیڈ میں آئیونک بانڈ اس وقت وجود میں آتا ہے جب سوڈیم اور کلورین کیمیکل ری ایکشن کرتے ہیں۔ ان کے الیکٹرونک کنفیگوریشنز درج ذیل ہیں۔

	پہلا شیل	دوسرا شیل	تیسرا شیل
$_{11}\text{Na}$	2	8	1
$_{17}\text{Cl}$	2	8	7

سوڈیم اور کلورین کی الیکٹرونک کنفیگوریشنز

سوڈیم کے بیرونی شیل میں سے ایک الیکٹرون کلورین کے بیرونی شیل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ان دونوں ایلیمنٹس کے الیکٹرونک کنفیگوریشنز نزدیک ترین نوئل گیس جیسے ہو جاتے ہیں۔



سوڈیم سے ایک الیکٹرون کا کلورین میں منتقل ہونا۔



اسی طرح سوڈیم کلورین اور برومین سے ری ایکٹ کر کے بالترتیب سوڈیم کلورائیڈ اور سوڈیم برومائڈ بناتا ہے۔



منتقل ہونے والا الیکٹرون یا الیکٹرونز ہمیشہ ایٹمز کے بیرونی شیل میں موجود ہوتا ہے یا ہوتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثال میں بننے والے سوڈیم

کلورائیڈ میں موجود سوڈیم اور کلورائیڈ آئنز کے درمیان الیکٹروسٹیک کشش کی فوریس (Electrostatic Force of Attraction) وجود میں آتی

ہے۔ اس طرح وجود میں آنے والے کیمیائی بانڈ کو آئیونک یا الیکٹروویلیٹ بانڈ کہتے ہیں۔


کیلشیم جو کہ ایک الکلائن ارتھ میٹل ہے دو الیکٹرونز کھو کر کیلشیم کلورائیڈ بنتا ہے۔






کلیشیم کلورائیڈ کا بننا


یہ آئنز ایک دوسرے کے گرد اس طرح تین جہتی (Three dimensionally) گھیراؤ لیتے ہیں کہ کرشل لیٹس (Crystal lattice) کی شکل بن جاتی ہے۔ آئیونک کمپاؤنڈ کی دوسری مثالیں درج ذیل ہیں: CaF_2 , KBr , MgF_2 , KCl ۔ سوال 7: سوڈیم کلورائیڈ اور کلیشیم کلورائیڈ کے کرشل لیٹس کی ڈایا گرام بنائیں۔ جواب: سوڈیم کلورائیڈ اور کلیشیم کلورائیڈ کے کرشل لیٹس:



سوڈیم کلورائیڈ کا کرشل لیٹس



سوڈیم کلورائیڈ اور کلیشیم کلورائیڈ کے کرشل لیٹس



کلیشیم کلورائیڈ کا کرشل لیٹس

مشق

1- کس قسم کے ایلمنٹس آئیونک بانڈز بناتے ہیں؟

جواب: میٹلز اور نان میٹلز آئیونک بانڈز بناتے ہیں۔

2- آئیونک بانڈ کے لیے کن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے؟

جواب: آئیونک بانڈ اس وقت بنتا ہے جب ایک ایٹم (مثلاً) آسانی سے الیکٹرون دے سکتا ہے اور دوسرا ایٹم (نان میٹل) آسانی سے الیکٹرون لے سکتا ہے۔ الیکٹرون حاصل کرنے اور خارج کرنے کے بعد دونوں ایٹمز آئن بن جاتے ہیں جن پر مخالف چارج ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کوکشش کرتے ہیں جس سے آئیونک بانڈ بنتا ہے۔

سوال 8: کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟ کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟

جواب: کوویلنٹ بانڈ (Covalent Bond) "کیمیکیل بانڈ" کی ایسی قسم جو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی باہمی اشتراک سے وجود میں آئے کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے، "گروپ 14 تا گروپ 17 کے ایٹمنس کو جب رسی ایکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایٹمنس ویلنٹس الیکٹرونز کا باہمی اشتراک کر کے کیمیکیل بانڈ بناتے ہیں۔ اس قسم کا بانڈ جو الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ جب دو ایٹمز بانڈ بنانے کی غرض سے ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں تو دونوں کی انرجی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک ایٹم کے الیکٹرونز دوسرے ایٹم کے نیوکلئیس کی کشش میں آنے کی وجہ سے دونوں کی انرجی میں کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ایٹم کا نیوکلئیس جب دوسرے ایٹم کے نیوکلئیس کے قریب آتا ہے تو دفع کی قوتیں جنم لیتی ہیں ایسی ہی قوتیں ایٹمز کے الیکٹرونز کے نزدیک آنے کی وجہ سے بھی وجود پذیر ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے انرجی میں اضافہ ہوتا ہے۔ قریب آنے والے دونوں ایٹمز اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اتنی دوری پر رکھتے ہیں جس سے ان کے درمیان کشش کی قوتیں دفع کی قوتوں سے زیادہ مضبوط ہوں۔ دونوں ایٹمز پھر اپنے آپ کو اتنی ہی دوری پر رہنے کو ترجیح دیں گے جس سے کشش کی قوتوں کا اثر زیادہ رہے۔ اس جگہ ان ایٹمز کی انرجی کم از کم ہوتی ہے۔ اس طرح ایک مالیکیول وجود میں آتا ہے۔

سوال 9: کوویلنٹ بانڈ کی اقسام کی وضاحت کریں اور ہر قسم کے لیے کم از کم ایک مثال دیں۔

جواب: کوویلنٹ بانڈ کی اقسام: کوویلنٹ بانڈ دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ ایسے الیکٹرون جو کیمیکیل بانڈ بنانے کے لیے باہم جوڑے بنتے ہیں، بانڈ پیئر الیکٹرونز کہلاتے ہیں۔ بانڈ پیئر کی تعداد کے لحاظ سے کوویلٹ بانڈ کی درج ذیل تین اقسام ہیں۔


1- سنگل کوویلٹ بانڈ 2- ڈبل کوویلٹ بانڈ 3- ٹریپل کوویلٹ بانڈ

1- سنگل کوویلٹ بانڈ: جب کوویلٹ بانڈ بنانے والا ہر ایٹم ایک ایک الیکٹرون فراہم کرتا ہے تو ایک بانڈ پیئر وجود میں آتا ہے۔ اسے سنگل کوویلٹ بانڈ کہتے ہیں۔

ایٹمز کے درمیان موجود سنگل کوویلٹ بانڈ کو سنگل لائن (—) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سنگل کوویلٹ بانڈ کی مثالیں ہائیڈروجن (H_2) کلورین (Cl_2)، ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس (HCl) اور میتھین (CH_4) ہیں۔

(i) کلورین کا بننا: جب کلورین کے دو ایٹمز ملتے ہیں تو ان ایٹمز کے درمیان ایک الیکٹرون پیئر کا اشتراک ہوتا ہے۔ جس سے ایک سٹیل کلورین مالیکیول بنتا ہے۔




شکل (الف) سنگل کوویلٹ بانڈ کا بننا

(ii) ہائیڈروجن کا بننا: جب دو ہائیڈروجن ایٹمز ملتے ہیں تو ان کے درمیان ایک الیکٹرون پیئر کا اشتراک ہوتا ہے جس سے ایک سٹیل ہائیڈروجن مالیکیول بنتا ہے۔



شکل (ب) سنگل کوویلنٹ بانڈ کا بننا


- 2- ڈبل کوویلنٹ بانڈ: جب ہر بانڈ بنانے والا ایٹم دو دو الیکٹرونز فراہم کرتا ہے تو دو عدد بانڈ ہیئرز کی شرکت بنتی ہے اور ایک ڈبل کوویلنٹ بانڈ وجود میں آتا ہے۔ ایٹمز کے درمیان ڈبل کوویلنٹ بانڈ دو لائنز (=) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
 مثالیں: آکسیجن گیس (O_2) اور اتھین (C_2H_4) میں ڈبل کوویلنٹ بانڈز بنتے ہیں۔
 آکسیجن مالیکیول کا ہونا:



شکل (ج) ڈبل کوویلنٹ بانڈ کا بننا

- 3- ٹریپل کوویلنٹ بانڈ: جب بانڈ بنانے والا ہر ایٹم تین تین الیکٹرونز فراہم کرتا ہے تو بانڈز بننے کے عمل میں تین بانڈ ہیئرز حصہ لیتے ہیں اس قسم کے بانڈز کو ٹریپل کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔
 ٹریپل کوویلنٹ بانڈ کو تین لائنوں (≡) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
 مثالیں: ٹریپل کوویلنٹ بانڈ رکھنے والے مالیکیولز کی مثالیں نائٹروجن (N_2) اور اتھین (C_2H_2) ہیں۔

نائٹروجن مالیکیول کا بننا



شکل (د) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ کا بننا

مشق

- 1- کس قسم کے ایلیمنٹس کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں؟

جواب: نان میٹلز کوویلنٹ بانڈ بناتی ہیں۔

2- آئیونک بانڈ اور کوویلنٹ بانڈ میں کیا فرق ہے؟


جواب:

آئیونک بانڈ	کوویلنٹ بانڈ
آئیونک بانڈ ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں الیکٹرونز کی مکمل منتقلی سے وجود میں آتا ہے۔ آئیونک بانڈ میٹلز اور نان میٹلز دونوں میں بنتا ہے۔	کوویلنٹ بانڈ الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ کوویلنٹ بانڈ صرف نان میٹلز میں بنتا ہے۔

سوال 10: درج ذیل میں دیئے گئے کپاؤنڈز کے بننے کے عمل کی وضاحت ڈایا گرام کے ساتھ کریں۔


- (i) پانی (H_2O) (ii) کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) (iii) امونیا (NH_3)
(iv) میتھین (CH_4) (v) اتھین (C_2H_2) (vi) میتھانول (CH_3OH)

جواب: (i) پانی: جب دو ہائیڈروجن ایٹمز علیحدہ علیحدہ اپنے الیکٹرونز آکسیجن کے ایک ایٹم کے ساتھ شیئر کریں تو پانی کا مالیکیول بنتا ہے۔




شکل (1)

(ii) کاربن ڈائی آکسائیڈ: کاربن ڈائی آکسائیڈ کا مالیکیول ایک کاربن ایٹم اور دو آکسیجن ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ کاربن کا ایٹم اپنے دو الیکٹرونز ایک آکسیجن ایٹم کے دو الیکٹرونز سے شیئر کرتا ہے جبکہ یہی ایٹم اور دوسرا آکسیجن ایٹم بھی دو دو الیکٹرونز آپس میں شیئر کرتے ہیں۔






شکل (2)

(iii) امونیا (Ammonia)




شکل (3)



مشق

1- درج ذیل کمپائونڈز میں موجود کوویلنٹ بانڈ کوڈاٹ اور کراس فارمولا سے ظاہر کریں۔ SiH_4 , PCl_3 , SO_2 , SO_3



سوال 11: پولر اور نان پولر کوویلنٹ بانڈز کیسے بنتے ہیں؟


جواب: نان پولر کوویلنٹ بانڈ (Non-polar covalent Bond): جب کوویلنٹ بانڈ دو ایک جیسے ایٹمز بناتے ہیں تو الیکٹرونز کا جوڑا دونوں ایٹمز کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے۔ جس سے ایک ایسا کوویلنٹ بانڈ وجود میں آتا ہے جس میں کسی ایٹم پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ اس کو نان پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔

مثال: ہائڈروجن مالکیول میں موجود دو ہائڈروجن ایٹمز کے درمیان بانڈ یا پھر کلورین مالکیول میں پایا جانے والا بانڈ۔ یہ دونوں بانڈز نان پولر بانڈز ہیں۔

پولر کوویلنٹ بانڈ (Polar covalent Bond)

جب ایک کوویلنٹ بانڈ دو مختلف ایٹمز کے درمیان بنتا ہے تو شیئر ہونے والا الیکٹرونز کا جوڑا اس ایٹم کے نزدیک چلا جاتا ہے جو ان الیکٹرونز کو زیادہ قوت سے کھینچتا ہے یا جس کی الیکٹرونگیٹیویٹی (Electronegativity) زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایٹم کی الیکٹرونگیٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اس پر ایک چھوٹا سا منفی چارج بن جاتا ہے اور جس ایٹم کی الیکٹرونز کو کھینچنے کی طاقت کم ہوتی ہے اس پر ایک چھوٹا مثبت چارج بن جاتا ہے۔ اس طرح بننے والے کوویلنٹ بانڈ کو پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔


مثال: HCl مالکیول میں شیئر ہونے والا الیکٹرونز کا جوڑا کلورین کے قریب چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی الیکٹرونگیٹیویٹی زیادہ ہے جس کی وجہ سے کلورین پر ایک منفی چارج بن جاتا ہے۔ HCl مالکیول میں موجود کوویلنٹ بانڈ پولر کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح پانی میں موجود کوویلنٹ بانڈز بھی پولر کوویلنٹ بانڈ کہلاتے ہیں۔



سوال 12: کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسے بنتا ہے؟
جواب: کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ: ایک ایسا کوویلنٹ بانڈ ہے جس میں الیکٹرونز کا جوڑا ایک ایٹم یا آئن یا مالکیول مہیا کرتا ہے۔ اور دوسرا ایٹم یا مالکیول اس جوڑے کو قبول کرتا ہے۔ جو شے الیکٹرونز کا جوڑا مہیا کرتا ہے اس کو ڈونر (Donor) کہتے ہیں اور قبول کرنے والی شے کو ایکسیپٹر (Acceptor) کہتے ہیں۔ اس بانڈ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تیر کا نشان ڈونر سے ایکسیپٹر کی طرف (→) بنایا جاتا ہے۔

ہائڈروآکسونیم آئن کا بننا (Formation of hydroxonium ion)

جب ایسڈز کو پانی حل کیا جاتا ہے تو پروٹائز (H^+) بنتے ہیں۔ اس پروٹان کا بیرونی شیل خالی ہونے کی وجہ سے یہ الیکٹرونز کا جوڑا قبول کرتا ہے۔ آکسیجن ایٹم پر موجود الیکٹرونز کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا اس پروٹان کو دے دیا جاتا ہے۔ پانی اور پروٹان کے ملاپ سے ہائڈروآکسونیم آئن بن جاتا ہے۔




پانی اور پروٹان (H^+) کے درمیان کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کا بننا

اس طرح وجود میں آنے والا مثبت چارج پورے ہائڈروآکسونیم آئن کا لحاظ کر لیتا ہے۔ ایک بار جب یہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بن جاتا ہے تو پھر اس میں اور پانی میں موجود دونوں کوویلنٹ بانڈز میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آکسیجن سے منسلک تینوں بانڈز بالکل ایک جیسے خواص رکھتے ہیں۔

امونیا اور بورون ٹرائی فلورائیڈ کے درمیان تعامل

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کی ایک مثال اس وقت سامنے آتی ہے جب امونیا، بورون ٹرائی فلورائیڈ سے ری ایکٹ کرتی ہے۔ اس ری ایکشن کے دوران نائٹروجن پر موجود الیکٹرونز کا جوڑا بورون کے بیرونی شیل کو دے کر اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔




بورون ٹرائی فلورائیڈ کا بننا، امونیم کلورائیڈ کا اور پروٹونیزڈ استھائل الکوحل کا بننا

مثال میں کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنانے کے لیے امونیا یا لیکیٹوں میں موجود نائٹروجن کا الیکٹرون جوڑا پروٹان کو مہیا کیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو آکسینیم آئن کی طرح امونیم آئن میں موجود چاروں بانڈز کے خواص بالکل ایک جیسے ہیں۔ جس سے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بننے کا طریقہ اگرچہ کوویلنٹ بانڈ بننے سے مختلف ہے لیکن جب یہ بن جاتا ہے تو ان دونوں بانڈز میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس طرح جب کوئی کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بننا ہے تو دونوں الیکٹرونز ڈونر کو واپس مل جاتے ہیں۔



مشق

1- ذیل میں درج مالدیوٹریا آئنز کے درمیان کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بننے کے عمل کی وضاحت کریں۔




جواب: (a) BF_3 and AlCl_3

BF_3 اور AlCl_3 دونوں میں الیکٹرون کی کمی ہوتی ہے تاہم BF_3 میں بورون (B) کے پاس ایک خالی P آرٹیل ہوتا ہے اور AlCl_3 میں ایلمینیم (Al) کے پاس ایک لون پیئر ہوتا ہے۔ ایلمینیم اپنا لون پیئر بورون کے خالی P آرٹیل میں ڈونیت کرتا ہے جس سے ایک کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔ اس طرح BF_3 اور AlCl_3 مل کر ایک ایڈکس بناتے ہیں۔



جواب: (b) CH_3OCH_3 میں آکسیجن (O) کے پاس ایک لون پیئر ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کے پاس کوئی الیکٹرون نہیں ہوتا۔ آکسیجن اپنا لون پیئر H^+ کو ڈونیت کرتا ہے۔ جس سے ایک کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔



2- کون سے کپاؤنڈ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنا سکیں؟


جواب: وہ کپاؤنڈ جن میں کوئی لون پیئر موجود نہ ہو یا کوئی خالی آر بیٹل نہ ہو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ نہیں بنا سکتے۔ مثلاً، استھین (C_2H_4)، استھائن (C_2H_2) وغیرہ۔

سوال 13: مٹیلک بانڈ سے کیا مراد ہے؟ مٹیلک بانڈ کیسے بنتا ہے؟

جواب: مٹیلک بانڈ (Metallic Bond): ایسا کیمیائی بانڈ جس کی وجہ سے مٹل میں موجود مثبت چارج رکھنے والے آئنز آزاد گھومنے والے الیکٹرونز کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔

عام طور پر مٹلز کے آئمز کی آئیونائزیشن انرجی (Ionization Energy) کم ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے آئمز آسانی سے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون یا الیکٹرونز کو آزاد کر سکتے ہیں۔ یہی بات اگر دوسرے انداز میں کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مٹلز کے آئمز میں موجود نیوکلیائی (Nuclei) اپنے الیکٹرون یا الیکٹرونز کو اپنے ساتھ مضبوطی سے بندھ کر نہیں رکھ سکتے۔


مٹیلک بانڈ کا بننا سوڈیم مٹل میں ایک سوڈیم ایٹم کے ارد گرد آٹھ اور سوڈیم ایٹم ہوتے ہیں۔ ان سب کے بیرونی الیکٹرونز ان ایٹمز کی درمیانی جگہوں میں آزاد نہ گھومتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی الیکٹرون کسی مخصوص نیوکلیس سے بندھا نہیں رہتا بلکہ تمام الیکٹرونز یک وقت تمام نیوکلیائی سے بندھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب تمام آئنز ان آزاد گھومنے والے تمام الیکٹرونز کو یک وقت اپنے ساتھ بانڈھیں گے تو خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں گے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ مٹل آئمز ان الیکٹرونز کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔



سوڈیم مٹل میں موجود مٹیلک بانڈ

سوال 14: سوڈیم اور میکینیشیم کے موازنے کی بنیاد پر مٹیلک بانڈ کی مضبوطی کو متاثر کرنے والے عوامل پر بحث کریں۔

جواب: مٹیلک بانڈ کی مضبوطی کا انحصار دو باتوں پر ہے۔ پہلی بات اس مٹل میں موجود آئنز پر مثبت چارج بڑی تعداد اور دوسری بات یہ کہ ایک ایٹم نے کتنے الیکٹرونز آزاد کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم مٹل میں اس کا ایک ایٹم صرف ایک الیکٹرون آزاد کرتا ہے اس لیے سوڈیم مٹل میں مٹیلک بانڈ کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس میکینیشیم مٹل میں میکینیشیم کا ایک ایٹم دو الیکٹرونز آزاد کرتا ہے جس کی وجہ سے میکینیشیم کے آئنز پر دو مثبت چارجز ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ میکینیشیم میں موجود مٹیلک بانڈ سوڈیم کی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسی وجہ سے میکینیشیم کا میلنگ پوائنٹ سوڈیم سے کافی زیادہ ہے۔




میکنیشیم میں موجود میٹلک بانڈ

سوال 15: میٹلز کی اہم خصوصیات بیان کریں۔

جواب: میٹلز کے خواص:

- میٹلز کی سطح عام طور پر چمکدار ہوتی ہے۔
- میٹلز کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
- میٹلز بجلی اور حرارت دونوں کی گندھ ہیں۔
- عام طور پر میٹلز بیماری اور سخت ہوتی ہیں۔
- دباؤ سے میٹلز کی شکل و صورت تبدیل کی جاسکتی ہے۔



دباؤ میں میٹل کی کیفیت

سوال 16: الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر سے کیا مراد ہے؟ الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر اور ری ایکٹیویٹی کے درمیان کیا تعلق ہے مثال سے وضاحت کریں۔

جواب: الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر (Electropositive character): میٹلز کی الیکٹرونز کھونے کی صلاحیت کو الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کہتے ہیں۔

الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر اور ری ایکٹیویٹی کے درمیان تعلق: عام طور پر میٹلز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے الیکٹرون یا الیکٹرونز کسی کو دے کر مثبت آئنز یا کیٹائن بنائیں۔ میٹلز اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے الیکٹرو پوزیٹیو ہوتے ہیں۔ اس خصوصیت کا تعلق براہ راست ان کی ری ایکٹیویٹی سے بھی ہے۔ میٹلز جتنی زیادہ آسانی سے الیکٹرون یا الیکٹرونز کا تبادلہ کریں گی وہ اتنی ہی زیادہ ری ایکٹیو ہوں گی۔

مثال: الکلی میٹلز (سوڈیم اور پوٹاشیم) بہت زیادہ الیکٹرو پوزیٹیو ہیں اس لیے وہ بڑی آسانی سے ری ایکٹ کر سکتے ہیں۔ سوڈیم اور پوٹاشیم، پانی اور کلورین سے تیزی سے ری ایکٹ کر کے بالترتیب ہائیڈرو آکسائیڈ اور کلورائیڈ بناتی ہیں۔ یہ تیزابوں سے ری ایکٹ کر کے سالٹس بناتی ہیں اور ہائیڈروجن خارج کرتی ہیں۔ ان کے مقابلہ میں الکلائن ارتھ میٹلز کو اپنے الیکٹرونز نسبتاً مشکل سے چھوڑتی ہیں اور یہ مقابلہ تمام الیکٹرو پوزیٹیو ہیں۔ پانی اور کلورین کے ساتھ بھی ان کے ری ایکشنز تیزی کے ساتھ وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ ایلمینیم بھی ایک زیادہ الیکٹرو پوزیٹیو ایلیمنٹ ہے اور یہ ایسڈز سے تیزی سے ری ایکٹ کر کے سالٹس اور ہائیڈروجن بناتی ہے۔

سوال 17: نان میٹلز کے الیکٹر ویکٹیو کریکٹر سے کیا مراد ہے؟

جواب: الیکٹر ویکٹیو کریکٹر: نان میٹلز کی الیکٹرو نیگٹوٹیٹ کو نان میٹلز کی الیکٹر ویکٹیوٹی کہتے ہیں۔

وضاحت: نان میٹلز الیکٹرو نیگٹوٹیٹ سے رغبت کی وجہ سے ان کو اپنے میں جذب کر کے اینائنز (Anions) بناتی ہیں۔ اس لیے ان کو الیکٹر ویکٹیو الیمنٹس کا نام دیا گیا ہے۔ ہیریاڈک ٹیبل میں موجود فلورین سب سے زیادہ الیکٹر ویکٹیو الیمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد کلورین، بھرم، جن اور کلورین کا نمبر آتا ہے۔ نان میٹلز، میٹلز کے ساتھ تیزی سے ری ایکٹ کر کے آئیونک بانڈز بناتی ہیں۔ نان میٹلز دوسری نان میٹلز سے ری ایکٹ کر کے مالکیولر کمپاؤنڈز بناتی ہیں۔

سوال 18: آئیونک اور کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی خصوصیات کا موازنہ کریں۔

جواب: آئیونک اور کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی خصوصیات میں تقابلہ:

آئیونک کمپاؤنڈز	کوویلنٹ کمپاؤنڈز
(i) آئیونک کمپاؤنڈز میں مخالف چارج رکھنے والے آئنز موجود ہوتے ہیں جو خود کو مخصوص ترتیب دے کر کرسٹلائن سٹرکچر بناتے ہیں۔ آئیونک کمپاؤنڈز ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور اس میں موجود مخالف چارج رکھنے والے آئنز کے درمیان موجود کشش کی قوت کو الیکٹرو سٹیک فورس کہتے ہیں۔	(i) کوویلنٹ کمپاؤنڈز زیادہ تر نیوٹرل مالکیولز کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ ان میں موجود ایٹمز کے نیوکلیائی اور شیئرڈ الیکٹرو نیگٹوٹیٹ کے درمیان خاصی مضبوط کشش موجود ہوتی ہے۔
(ii) آئیونک کمپاؤنڈز عام طور پر ٹھوس حالت میں ملتے ہیں۔ ان کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً سوڈیم کلورائیڈ کا میلنگ پوائنٹ 801°C ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود سوڈیم اور کلورائیڈ آئنز کے درمیان کشش کی مضبوط قوت موجود ہے۔	(ii) زیادہ تر نان میٹلز کوویلنٹ کمپاؤنڈز بناتی ہیں۔ کم مالکیولر پاس رکھنے والے کوویلنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر یا تو گیس ہیں یا پھر ایسے مائع ہیں جن کے بوائلنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔ زیادہ مالکیولر ماس رکھنے والے کمپاؤنڈز زیادہ تر ٹھوس حالت میں ملتے ہیں۔ اور عام طور پر ان کے میلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔
(iii) آئیونک کمپاؤنڈز عام طور پر پولر سولونٹ مثلاً پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔	(iii) یہ زیادہ تر پانی میں حل نہیں ہوتے لیکن نان پولر سولونٹس مثلاً ایٹر، ہیکسین اور ایسیٹون میں حل ہو جاتے ہیں۔
(iv) کچھ آئیونک کمپاؤنڈز میں اور سولوشنز کی صورت میں چونکہ ان کے آئنز آزادانہ حرکت کرتے ہیں اس لیے ان دونوں صورتوں میں یہ بجلی کے کنڈکٹر ہیں۔	(iv) عام طور پر یہ بجلی کے کنڈکٹر نہیں ہوتے۔

سوال 19: انٹر مالکیولر فورسز سے کیا مراد ہے؟ طبعی خصوصیات پر انٹر مالکیولر فورسز کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟

جواب: انٹر مالکیولر فورسز (Intermolecular Forces): ایلیمنٹس اور مالکیولز کے درمیان کشش کی قوتوں کو انٹر مالکیولر فورسز آف آٹریکشن کہتے ہیں۔ کشش کی یہ قوتیں عام طور پر ایٹمز کے درمیان کیمیائی بانڈ کی نسبت بہت کمزور ہوتی ہیں۔

طبعی خصوصیات پر اثر: مادہ کی تین حالتوں میں سے گسی حالت میں یہ کشش کی قوتیں دوسری حالتوں کی نسبت بہت کمزور ہوتی ہیں جبکہ ٹھوس حالت میں مالکیولز کے درمیان یہ کشش کی قوتیں سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔


مالیکیوٹر کے درمیان کشش کی قوتیں بہت سی قسموں کی ہیں ان میں سے کچھ کمزور ہوتی ہیں اور کچھ نسبتاً طاقتور۔ اشیاء کی طبعی خصوصیات کا انحصار ان قوتوں پر ہوتا ہے۔ اشیاء کے میلنگ اور بوائٹنگ پوائنٹس کا انحصار کشش کی ان قوتوں کی طاقت پر ہے۔ یہ قوتیں جتنی طاقتور ہوں گی اشیاء کے میلنگ اور بوائٹنگ پوائنٹس اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔

سوال 20: انٹر مالیکیولر فورسز کی اقسام کی وضاحت کریں۔
جواب: انٹر مالیکیولر فورسز: ایٹمنس اور مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتوں کو انٹر مالیکیولر فورسز آف اٹریکشن کہتے ہیں۔
انٹر مالیکیولر فورسز کی اقسام: انٹر مالیکیولر فورسز کی اقسام درج ذیل ہیں:


1- ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں 2- ہائیڈروجن بانڈنگ

1- ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں: کشش کی یہ قوتیں پولر کمپاؤنڈ مثلاً HCl میں پائی جاتی ہیں۔ HCl میں موجود ہائیڈروجن اور کلورین اپنے درمیان بانٹے گئے الیکٹرونی جوڑے کو مختلف طاقتوں سے کھینچتے ہیں۔ ایٹم کی اس طاقت کو الیکٹرو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں۔ چونکہ کلورین کا ایٹم بانٹے گئے الیکٹرونی جوڑے کو زیادہ قوت سے کھینچتا ہے اس لیے یہ جوڑا اس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً کلورین ایٹم پر ایک چھوٹا سا منفی چارج بن جاتا ہے۔ اس طرح کا مثبت چارج ہائیڈروجن پر بھی بن جاتا ہے۔ ان چارجز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ HCl ایک پولر مالیکیول ہے۔

ان مثبت اور منفی چارجز کی وجہ سے HCl کے مالیکیولز آپس میں کشش رکھتے ہیں۔ کشش کی اس قوت کو ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں کہتے ہیں۔



ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں



2- ہائیڈروجن بانڈنگ: ہائیڈروجن بانڈنگ، ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتوں کی ایک مخصوص شکل ہے۔ جب ہائیڈروجن ایٹم بہت زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ایٹمنس کے ایٹمز یعنی N یا O، F کے ساتھ کوویلنٹ بانڈز بناتا ہے تو ان کے درمیان الیکٹرو نیگیٹیوٹی کے بہت زیادہ فرق کی وجہ سے یہ بانڈز بہت زیادہ پولر بن جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت طاقتور ڈائی پول۔ ڈائی پول کشش کی قوتیں وجود میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی میں O-H بانڈز بہت زیادہ پولر بن جاتے ہیں۔ تبھی ان کے درمیان کشش کی بہت مضبوط قوتیں وجود میں آتی ہیں جن کو ہائیڈروجن بانڈنگ کہتے ہیں۔

نوٹ: پانی میں موجود طاقتور ہائیڈروجن بانڈز ہونے کی وجہ سے اس کے میلنگ اور بوائٹنگ پوائنٹس ان سے ملتے جلتے کمپاؤنڈز H_2S اور NH_3 سے زیادہ ہوتے ہیں۔


سوال 21: آئیونک کمپاؤنڈز میں کرسٹل لٹس کی تحلیل کیسے ہوتی ہے؟

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز میں مخالف چارجز رکھنے والے آئنز کے درمیان مضبوط کشش کی قوتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آئنز کرسٹل لٹس (Crystal)

(lattice) بنائے ہیں۔ چونکہ آئنز بیضوی شکل رکھتے ہیں اس لیے ہر آئن کے چاروں اطراف مخالف آئنز کا گھیراؤ بن جاتا ہے آئنز کی اس ترتیب کو کرسل لیس کہتے ہیں۔ آئنز کے بیضوی ہونے کی وجہ سے آئنوں کا باہمی کوئی مست نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ سے وجود میں آنے والی قوتیں آئن کے چاروں طرف موجود ہوتی ہیں۔

سوال 22: آئنوں کا وائڈ میں ہائڈریشن کے عمل کی وضاحت کریں۔


جواب: ہائڈریشن (Hydration): آئنوں کا وائڈز عام طور پر پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ پانی کے مالیکیولز نہ صرف آئنوں کا وائڈز میں موجود آئنز کے درمیان کشش کی مضبوط قوتوں کو توڑ دیتے ہیں بلکہ آزاد ہونے والے آئنز کے درمیان ایک گھیراؤ بھی بنا لیتے ہیں۔ گھیراؤ بنانے کے اس عمل کو ہائڈریشن (Hydration) کہتے ہیں۔



آئنز کی ہائڈریشن

سوال 23: آئنوں کا وائڈز پانی میں حل پذیر ہیں؟ مثال سے واضح کریں۔

جواب: عام طور پر آئنوں کا وائڈز پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ جن سے ان میں موجود آئنز بھی ایک دوسرے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سلوشن بجلی کے کنڈکٹر بن جاتے ہیں۔ اس طرح آئنوں کا وائڈز کا آپس میں ری ایکشن بھی پانی میں ہی ہوتا ہے۔ پانی میں ان کے آئنز آپس میں ری ایکٹ کر کے نیا کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں۔



تقریر حل شدہ مسئلوں کا مفید رسوب (Precipitate) پانی سے الگ ہو کر نیچے بیٹھ جاتا ہے۔

سوال 24: آئیوٹک کیا ڈنڈرے کیا مراد ہے؟ ان کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: آئیونک کمپاؤنڈز ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو مخالف چارج والے آئنز کے درمیان الیکٹرو سٹیک کشش سے بنتے ہیں۔ یہ آئنز،

میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی سے بنتے ہیں۔

مثلاً: CaO , MgO , NaCl , KF وغيره

خصوصیات

(i) آئیونک کیاؤنڈز کرشل لیس بناتے ہیں۔ (ii) یہ پاؤ بیٹاؤر نیکیٹو آئنز پر مشتمل ہوتے ہیں۔

(iii) یہ روم ٹیکس پچر بخوش ہوتے ہیں۔
(iv) ان کے میلنگ اور بوائٹنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں۔

(v) یہ جار سالوٹنٹس جیسے کہ بانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ (vi) یہ ہیٹ اور الیکٹریسیٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں۔

(vii) یہ سخت ہوتے ہیں۔

سوال 25: کوویڈ 19 کیا ہے؟ اور اس کی خصوصیات لکھیں۔

جواب: کوویڈ 19 کی وائرسز وہ کیا وائرسز ہیں جو ایئر بزنس کے درمیان الیکٹرونز کی شراکت سے بنتے ہیں۔ اس شراکت سے ایک

کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔

کوویڈ کی خصوصیات

(i) کوویڈنٹ کیا ونڈ کے میلنگ اور بوائنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔

(ii) یہ زیادہ تر نان پولر سالوینٹس میں حل پذیر ہوتے ہیں جیسے کہ ایٹھر، ہینزین۔

(iii) یہ عام طور پر بجلی کے اچھے کنڈکٹر نہیں ہوتے۔

(iv) ہر مادہ تر نیوٹرل مالدیو لڑ کے طور پر پائے جاتے ہیں۔

The image displays a standard periodic table of elements. A callout box highlights the element Chlorine (Cl) with the following information:

- Atomic Number:** 17
- Atomic Mass:** 35.45
- Symbol:** Cl
- Name:** Chlorine
- Chemical Group:** Halogens

The periodic table itself shows elements from Hydrogen (H) to Oganesson (Og), with their respective symbols, atomic numbers, and names. The callout box is positioned over the Chlorine element in the table.

سوال 26: گریفائٹ کی ساخت پر اہمیت تحریر کریں۔ نیز اس کے چند استعمالات لکھیں

جواب: گریفائٹ میں چھ کاربن ایٹمز مل کر ہیکسائگونل رینگز (Hexagonal rings) بناتے ہیں اور پھر بہت سے یہ رنگز تہ در تہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر تہ کا دوسری تہ سے تعلق زیادہ مضبوط نہیں ہوتا اس لیے یہ ایک دوسرے پر آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے گریفائٹ کو صنعتی پیانے پر لبریکنٹ (Lubricant) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید گریفائٹ کی تہوں کے درمیان آؤکسائیڈ حرکت کرنے والے الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں۔ جو اس کو نہایت اچھا بجلی کا کنڈکٹر بناتے ہیں۔ اس لیے اس کو الیکٹروڈز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

گریفائٹ کے استعمالات

گریفائٹ سے پنسل، پالش اور کٹھالیاں (Crucibles) بنائی جاتی ہیں۔ گریفائٹ سے بنے الیکٹروڈز (Electrodes) عام بیٹری سیل اور ایسی بھٹیوں (fumaces) میں استعمال ہوتے ہیں جن سے شیل بنتا ہے۔

دلچسپ معلومات

- ایٹم میں موجود نیوکلیس سے باہر الیکٹرونز اور سب شیلز میں موجود ہوتے ہیں۔ الیکٹرونز کی اس ترتیب کو الیکٹرونک کنفیگوریشن (Electric Configuration) کہتے ہیں۔
- میٹلوں کی وسیع پیمانے پر صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو مشینری کاریں، ریلوے، ہوائی جہاز، راکٹ، جیولری اور بجلی کی تاریں وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میٹلوں کی صنعت اور الیکٹرونکس کی صنعت میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔
- پگھلے ہوئے آئیونک کمپاؤنڈز یا پانی میں ان کے سلوشن میں سے جب بجلی گزاری جائے تو اس کا الیکٹرولیس (Electrolysis) ہو جاتا ہے اور سوڈیم میٹل اور کلورین گیس بنتے ہیں۔ مثلاً پگھلے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ سے اگر بجلی گزاری جائے تو اس کا الیکٹرولیس (Electrolysis) ہو جاتا ہے اور سوڈیم میٹل اور کلورین گیس بنتے ہیں۔ اس طرح پانی میں سوڈیم کلورائیڈ کی مائنڈ اور کلورین گیس بنتے ہیں۔
- انتہائی سخت شے ہونے کی وجہ سے ہیرے بہت اہم ہیں اور بہت سی صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہیرے لگی پنسل کی مدد سے شیشہ کو بڑی خوب صورتی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ اس طرح ہیرے لگی ڈرل سے پہاڑوں میں سوراخ کیے جاسکتے ہیں اور ان کو کان کنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال 27: آئیونک کمپاؤنڈز کی پگھلی ہوئی حالت کی مختصر اہمیت لکھیں۔

جواب: پگھلے ہوئے آئیونک کمپاؤنڈز یا پانی میں جب ان کے سلوشن سے بجلی گزاری جاتی ہے تو اس عمل کے دوران مختلف الیمینٹس اور کمپاؤنڈز بنتے ہیں۔ مثلاً پگھلے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ سے جب بجلی گزاری جائے تو اس کی الیکٹرولیس ہوتی ہے اور سوڈیم میٹل اور کلورین گیس بنتی ہے۔ اس طرح پانی میں سوڈیم کلورائیڈ کی الیکٹرولیس کرنے سے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور کلورین گیس بنتے ہیں۔

سوال 28: ڈائنڈ اور گریفائٹ کی صنعتی پیمانے پر اہمیت بیان کریں۔

جواب: انتہائی سخت شے ہونے کی وجہ سے ہیرے بہت اہم ہیں اور بہت سی صنعتوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہیرے والی پنسل کی مدد سے شیشہ کو بڑی خوبصورتی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ اس طرح ہیرے والی ڈرل سے پہاڑوں میں سوراخ کیے جاسکتے ہیں اور ان کو کان کنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گریفائٹ: گریفائٹ سے پنسل، پالش اور کٹھالیاں (کروسیٹل) بنائی جاتی ہیں۔ گریفائٹ سے بنے الیکٹروڈز عام بیٹری سیل اور ایسی بیٹوں میں استعمال ہیں جن سے شیل بنتا ہے۔

سوال 29: میٹلوں کے استعمالات لکھیں۔

جواب: مختلف دھاتوں (میٹلوں) کے استعمالات درج ذیل ہیں۔

- 1- لوہا (Iron) (i) لوہا عمارتوں، پلوں اور گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ (ii) ہتھیار، اوزار اور مشینری بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔
- 2- تانبا (Copper) (i) برقی تاروں اور برقی آلات میں استعمال ہوتا ہے۔ (ii) پائپنگ کے پائپ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔
- 3- ایلومینیم (Aluminium) (i) ہوائی جہاز، گاڑیاں اور گھریلو اشیاء (برتن) وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ (ii) بجلی کی تاروں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
- 4- سونا (Gold) (i) زیورات اور قیمتی اشیاء بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ (ii) الیکٹرونک چپس اور سرکٹس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
- 5- چاندی (Silver) (i) زیورات، ماہرین اور کچے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ (ii) فوٹو گرافی اور طبی آلات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔

اہم نکات

- 1- ایٹمز ڈوپلٹ اور آکٹٹ قوانین کے مطابق اپنے استحکام کی خاطر دوسرے ایٹمز کے ساتھ کیمیائی بانڈز بناتے ہیں۔
- 2- کشش کی وہ قوت جو ایٹمز کو جوڑے رکھتی ہے کیمیائی بانڈ کہلاتی ہے۔
- 3- الیکٹرون یا الیکٹرونز کے تبادلہ سے وجود میں آنے والا بانڈ آئیونک بانڈ کہلاتا ہے۔
- 4- کوویلنٹ بانڈ ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی باہمی شیئرنگ سے بنتا ہے۔ کوویلنٹ بانڈ سنگل، ڈبل اور ٹریپل ہو سکتے ہیں۔
- 5- جب کوویلنٹ بانڈ دو ایک جیسے ایٹمز کے درمیان بنتا ہے تو اسے نان پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔
- 6- جب کوویلنٹ بانڈ دو مختلف ایٹمز کے درمیان بنے جن کی الیکٹرو نیگیٹیویٹیوں میں فرق ہو تو اس کو پولر کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔
- 7- جب دو ایٹمز کے درمیان بننے والا الیکٹرونی جوڑا ایک ہی ایٹم مہیا کرے تو اس کو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں۔
- 8- مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتیں دو قسم کی ہیں ایک ڈائی پول، ڈائی پول کشش اور دوسری ہائیڈروجن بانڈنگ۔
- 9- ٹھوس آئیونک کمپاؤنڈز عام طور پر کرسٹلائن ہوتے ہیں اور ان کے میٹلک اور بوائٹنگ پوائنٹس زیادہ ہوتے ہیں یہ کمپاؤنڈز عام طور پر پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔
- 10- کم ماس رکھنے والے کوویلنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر گیسیں یا کم بوائٹنگ پوائنٹ رکھنے والے مائع ہوتے ہیں ان کے ذرات زیادہ ماس رکھنے والے کمپاؤنڈز زیادہ تر ٹھوس ہیں۔ یہ بجلی کے نان کنڈکٹر ہیں اور آرکیٹک سالوں سنٹس میں حل ہو جاتے ہیں۔
- 11- آئیونک اور کوویلنٹ بانڈز کے خواص کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کے ذرات کے درمیان کسی قسم کی کشش کی قوت موجود ہے۔



مشقی سوالات

صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔

- 1- جب پچھلے ہوئے کا پر اور پچھلے ہوئے زنک کو لایا جاتا ہے تو براس (Brass) نام کی نئی شے بنتی ہے۔ بتائیں کہ اس میں کا پر اور زنک کے درمیان کس قسم کا بانڈ وجود میں آئے گا؟

(الف) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (ب) آئیونک بانڈ

(ج) آئیونک بانڈ (د) کوویلنٹ بانڈ

- 2- کونسا ایلیمینٹ تینوں یعنی آئیونک، کوویلنٹ اور کوآرڈینیٹ بانڈز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟

(الف) کاربن (ب) آکسیجن (ج) میکینیشیم (د) سیلیکون

- 3- پانی کیوں مائع ہے اور ہائیڈروجن سلفائیڈ کیوں گیس ہے؟

(الف) کیونکہ پانی میں آکسیجن کا ایٹمک سائز سلفر سے بہت چھوٹا ہے

(ب) کیونکہ پانی ایک پولر کیاؤنڈ ہے اور اس کے مالیکیولز کے درمیان کشش کی مضبوط قوتیں موجود ہیں

(ج) کیونکہ پانی ہائیڈروجن سلفائیڈ سے ہلکا ہے۔

(د) کیونکہ پانی آسانی سے منجمد ہو کر برف بنا دیتا ہے۔

- 4- ذیل میں سے درج ہائڈروجن سے کون سا بانڈ سب سے کمزور تصور ہوتا ہے؟

(الف) C-C (ب) Cl-Cl (ج) O-O (د) F-F

- 5- کاربن کی کون سی فارم کو لبریکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟

(الف) کوئلہ (ب) ہیرا (ج) گریفائٹ (د) چارکول

- 6- مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتوں کی مضبوطی کو مد نظر رکھ کر بتائیں کہ کون سے کپاؤنڈ کا بوائلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہوگا؟

(الف) H_2S (ب) H_2O (ج) HF (د) NH_3

- 7- کس میٹل کا میلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہوگا؟

(الف) H (ب) Na (ج) K (د) Rb

- 8- کس آئیونک کپاؤنڈ کا میلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ ہوگا؟

(الف) NaCl (ب) KCl (ج) LiCl (د) RbCl

- 9- کس کپاؤنڈ میں کوویلنٹ بانڈ اور آئیونک بانڈ دونوں موجود ہیں؟

(الف) $MgCl_2$ (ب) NH_4Cl (ج) CaO (د) PCl_3

- 10- درج ذیل میں سے کس میں ڈبل کوویلنٹ بانڈ ہے؟

(الف) ایتھین (Ethane) (ب) میتھین (Methane)

(ج) ایتھیلین (Ethylene) (د) ایسٹیلین (Acetylene)

ج	5	د	4	ب	3	ب	2	ج	1
ج	10	ب	9	الف	8	د	7	ب	6

2- مختصر سوالات -

1- کس قسم کے ایلیمینٹ اپنے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون کو آسانی سے کھودیتے ہیں اور کس قسم کے ایلیمینٹ اپنے بیرونی شیل میں الیکٹرون جذب کر لیتے ہیں؟

جواب: میٹلز آسانی سے اپنے بیرونی الیکٹرونز خارج کر سکتی ہیں جبکہ نان میٹلز آسانی سے الیکٹرونز حاصل کرتی ہیں۔

2- کم ماس رکھنے والے کوویلنٹ کمپاؤنڈز کیوں گیس یا کم بوائٹنگ پوائنٹ والے مائع کی طرح پائے جاتے ہیں؟

جواب: لوئر مالیکیولر ماس والے کوویلنٹ کمپاؤنڈز اپنے مالیکیولز کے درمیان کشش کی کمزور فورسز کی وجہ سے گیسز یا کم بوائٹنگ لیکوڈز کے طور پر موجود ہیں۔

3- ایسے کسی ایلیمینٹ کی مثال دیں جو کہ سٹائن ٹھوس کی طرح پایا جاتا ہے اور اس کے ایٹمز کے درمیان کوویلنٹ بانڈز ہیں؟

جواب: کاربن (ڈائمنڈ) کر سٹائن ٹھوس کے طور پر پایا جاتا ہے اور اس کے ایٹمز کے درمیان کوویلنٹ بانڈز موجود ہوتا ہے۔

4- میٹلز کی کون سی خصوصیت کی وجہ سے ان کوتاروں اور چادروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے؟

جواب: جب میٹلز پر پریشر ڈالا جاتا ہے تو ایٹمز کی اوپر قطاریں نیچے کی قطاروں سے پھسل جاتی ہیں اس کے نتیجے میں ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے میٹلز کو کھینچ کر تاروں اور چادروں کی شکل دی جاسکتی ہے۔ میٹلز کی یہ خاصیت انہیں میلبل (malleable) اور ڈکٹائل (Ductile) بناتی ہے۔

5- کیا کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ایک مضبوط بانڈ ہے؟

جواب: جب الیکٹرونز کا بانڈ بنیئر صرف ایک ایٹم دیتا ہے۔ تو کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ مضبوط بانڈ ہے لیکن دوسرے کوویلنٹ بانڈز کی طرح مضبوط نہیں ہے۔

7- نائٹرک ایسڈ (HNO_3) کا ڈاٹ اور کراس سٹرکچر لکھیں۔



جواب:

3- تعمیری فکر پر مبنی سوالات (Constructed Response Questions)

1- HF ایک مائع ہے اور HCl ایک گیس۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب: HF روم ٹمبریچر پر مائع ہے جبکہ HCl گیس ہے کیونکہ HF میں HCl کی نسبت ہائیڈروجن بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔

2- کوویلنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر پانی میں کیوں حل نہیں ہوتے؟

جواب: کوویلنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر پانی میں حل پذیر نہیں ہوتے کیونکہ زیادہ تر کوویلنٹ کمپاؤنڈز نان پولر ہیں جبکہ پانی پولر ہے۔

3- مپلورجی ارسنک کی کنڈکٹریس ہے؟

جواب: آزادانہ الیکٹرونز کی موجودگی کی وجہ سے مپلورجی ارسنک اور الیکٹریسٹی کی اچھی کنڈکٹر ہیں۔

4- نائٹروجن کتنی قسم کے آکسائیڈز بناتی ہے؟ ان آکسائیڈز کے فارمولے لکھیں۔

جواب: نائٹروجن سے پانچ آکسائیڈز بنتے ہیں۔

آکسائیڈ کا فارمولا:

1- ڈائی نائٹروجن آکسائیڈ (نائٹرس آکسائیڈ) N_2O

2- نائٹروجن آکسائیڈ (نائٹرک آکسائیڈ) NO

3- ڈائی نائٹروجن ٹرائی آکسائیڈ (نائٹرس این بائیڈرائیڈ) N_2O_3

4- نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (نائٹروجن پر آکسائیڈ) NO_2

5- ڈائی نائٹروجن آکسائیڈ (نائٹرک این بائیڈرائیڈ) N_2O_5

5- سوڈیم بروائیڈ کو پانی میں اگر سلور نائٹریٹ سے ملا یا جائے گا تو کیا ہوگا؟

جواب: جب $NaBr$ اور $AgNO_3$ کے ہاتھ رکھتے کرتے ہیں تو $AgBr$ کی رسوب (ppt) بنتی ہے۔



6- آئیوڈین ایک ٹھوس جبکہ کلورین ایک گیس کے طور پر کیوں پائی جاتی ہیں؟

جواب: آئیوڈین ایک ٹھوس جبکہ کلورین گیس ہے کیونکہ آئیوڈین کے مالیکیولز بڑے ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ الیکٹرون ہوتے ہیں جس کی وجہ سے

آئیوڈین کے مالیکیولز کے درمیان مضبوط انٹر مالیکیولر فورسز موجود ہوتی ہیں، جو کہ آئیوڈین کو روم ٹمپریچر پر ٹھوس بناتی ہیں۔ جبکہ کلورین میں

چھوٹے سائز کی وجہ سے انٹر مالیکیولر فورسز کمزور ہوتی ہیں اس لیے کلورین روم ٹمپریچر پر گیس ہے۔

4- تفصیلی سوالات۔

1- آئیوڈک اور کوویلنٹ بانڈز کیسے بنتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 6 اور 8

2- سوڈیم کلورائیڈ کی کرشل بنانے کے لیے اس میں موجود آئنز کس طرح خود کو ترتیب دیتے ہیں؟

جواب: دیکھیے سوال نمبر 7

3- مثیلک ہاتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے مپلورجی خصوصیات کی وضاحت کریں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 15

4- آئیوڈک اور کوویلنٹ کیا بانڈز کی خصوصیات کا تقابلی جائزہ لیں۔

جواب: دیکھیے سوال نمبر 18

5- گریفائیٹ کرشل بجلی کا کنڈکٹر ہے اس کے سٹرکچر کی مدد سے اس بات کی وضاحت کریں؟

جواب: گریفائیٹ ایک تہہ دار ساخت پر مشتمل ہوتا ہے جو کاربن کے میکسا گولڈ رنگز سے بنا ہوتا ہے۔ چونکہ یہیں ایک دوسرے سے جکڑی نہیں

ہوتیں اس لیے ایک دوسرے سے پھسل سکتی ہیں۔ صنعت میں گریفائٹ کو لبری کینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، گریفائٹ میں ان تہوں کے درمیان موبائل الیکٹرونز ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے گریفائٹ کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے اور اس الیکٹروڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

کثیر الانتخابی معروضی سوالات

☆ درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- سوڈیم کلورائیڈ میں کس قسم کا کیمیکیل بانڈ موجود ہوتا ہے؟
 (الف) کوویلنٹ بانڈ
 (ب) مٹیلک بانڈ
 (ج) آئیونک بانڈ
 (د) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 2- الیکٹرون کی مکمل منتقلی سے بننے والا بانڈ کہلاتا ہے:
 (الف) آئیونک بانڈ
 (ب) کوویلنٹ بانڈ
 (ج) مٹیلک بانڈ
 (د) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 3- کس قسم کے ایٹمیں آئیونک بانڈ بناتے ہیں؟
 (الف) مٹلز
 (ب) نان مٹلز
 (ج) مٹلز اور نان مٹلز
 (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 4- کیمیشم اور کلورین کے درمیان کس قسم کا کیمیکیل بانڈ بنتا ہے؟
 (الف) آئیونک بانڈ
 (ب) کوویلنٹ بانڈ
 (ج) مٹیلک بانڈ
 (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 5- دو ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے بننے والا بانڈ کہلاتا ہے:
 (الف) آئیونک بانڈ
 (ب) ڈبل کوویلنٹ بانڈ
 (ج) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ
 (د) سنگل کوویلنٹ بانڈ
- 6- کونسا کوویلنٹ بانڈ الیکٹرونز کے دو جوڑوں کے باہمی اشتراک سے بنتا ہے؟
 (الف) آئیونک بانڈ
 (ب) ڈبل کوویلنٹ بانڈ
 (ج) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ
 (د) سنگل کوویلنٹ بانڈ
- 7- آئیونک کمپاؤنڈز کس کی موجودگی کی وجہ سے الیکٹریسٹی کے اچھے کنڈکٹر ہیں؟
 (الف) فری پروٹونز
 (ب) فری آئنز
 (ج) فری نیوٹرونز
 (د) فری مالیکیولز
- 8- کوویلنٹ بانڈز بننے ہیں:
 (الف) مٹلز کے درمیان
 (ب) مٹلز اور نان مٹلز کے درمیان
 (ج) نان مٹلز کے درمیان
 (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 9- کمپاؤنڈ کے مختلف مالیکیولز کے درمیان کشش کی قوتیں کہلاتی ہیں:
 (الف) انٹر مالیکیولر فورسز
 (ب) آئیونک فورسز
 (ج) نیوٹرل فورسز
 (د) نیچرل فورسز
- 10- کس بانڈنگ کی وجہ سے پانی کا بوائلنگ پوائنٹ H_2S اور NH_3 سے زیادہ ہے؟
 (الف) آئیونک بانڈنگ کی وجہ سے
 (ب) کوویلنٹ بانڈنگ کی وجہ سے
 (ج) مٹیلک بانڈنگ کی وجہ سے
 (د) ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے

- 11- آئیونک کیا؟ عام طور پر حل پذیر ہوتے ہیں: (الف) پانی (ب) پیٹرول (ج) الکحل (د) ایتر
- 12- پیریاڈک ٹیبل کے دائیں جانب موجود ایلمنٹس ہیں: (الف) ٹرائی اٹامک مالیکیولز (ب) مونو اٹامک مالیکیولز (ج) ڈائی اٹامک مالیکیولز (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 13- کوویلنٹ کیا؟ جیسے کہ سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروجن کلورائیڈ اور نائٹریک ایسڈ پانی میں مکمل طور پر آئیونائز ہو کر بنتے ہیں۔ (الف) کمزور ایسڈز (ب) مضبوط ایسڈز (ج) نان الیکٹرو لائٹس (د) الیکٹرو لائٹس
- 14- مندرجہ ذیل میں سے کونسا بائنری کوویلنٹ کیا؟ (الف) CH_4 (ب) H_2SO_4 (ج) HNO_3 (د) O_3
- 15- مندرجہ ذیل میں سے کونسا مالیکیول آئیونک بانڈ بناتا ہے؟ (الف) H_2O (ب) CH_4 (ج) $NaCl$ (د) CO_2
- 16- ایٹمز کے درمیان الیکٹرونز کی منتقلی وجہ بنتی ہے: (الف) آئیونک بانڈ (ب) مٹیلک بانڈ (ج) کوویلنٹ بانڈ (د) ہائیڈروجن بانڈ
- 17- نان میٹلوں کے درمیان کونسا بانڈ موجود ہوتا ہے؟ (الف) آئیونک بانڈ (ب) مٹیلک بانڈ (ج) ہائیڈروجن بانڈنگ (د) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 18- جب کیلشیم کلورین کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے تو بانڈ بنتا ہے۔ (الف) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (ب) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (ج) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (د) آئیونک بانڈ
- 19- ایسا بانڈ جو مٹیلک ایٹمز کے درمیان موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے، کہلاتا ہے۔ (الف) آئیونک بانڈ (ب) کوویلنٹ بانڈ (ج) مٹیلک بانڈ (د) ڈبل کوویلنٹ بانڈ
- 20- کس قسم کے ایلمنٹس مٹیلک بانڈ بناتے ہیں؟ (الف) آئیونک بانڈ (ب) کوویلنٹ بانڈ (ج) مٹیلک بانڈ (د) ڈبل کوویلنٹ بانڈ
- 21- میٹلوں کی موجودگی کی وجہ سے الیکٹریسیٹی کے اچھے کنڈکٹر ہیں؟ (الف) میٹلوں (ب) نان میٹلوں (ج) میٹلوں اور نان میٹلوں (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 22- ایسا بانڈ جو میٹل ایٹمز کے درمیان موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے کہلاتا ہے: (الف) مٹیلک بانڈ (ب) آئیونک بانڈ (ج) ہائیڈروجن بانڈ (د) پروٹونز اور نیوٹرونز
- 23- جب الیکٹرونز کا بانڈ پھر صرف ایک ایٹم دے تو ایسی بانڈنگ کو کہتے ہیں: (الف) کو-آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ (ب) آئیونک بانڈ (ج) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (د) مٹیلک بانڈ

- 24- کس کیمیکیل بانڈ کو ہوتا ہے (ج) سے ظاہر کیا جاتا ہے:
 (الف) مثیلک بانڈ (ب) کوویلنٹ بانڈ (ج) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (د) مثیلک بانڈ
- 25- کونے الیمینٹس کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں؟
 (الف) میٹلز (ب) نان میٹلز (ج) میٹلز اور نان میٹلز (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 26- دوآکسیجن ایٹمز کے درمیان کونسا کوویلنٹ بانڈ موجود ہوتا ہے؟
 (الف) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (ب) سنگل کوویلنٹ بانڈ
 (ج) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (د) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ
- 27- دو نائٹروجن ایٹمز کے درمیان کس قسم کا کیمیکیل بانڈ موجود ہوتا ہے؟
 (الف) مثیلک بانڈ (ب) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (ج) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (د) سنگل کوویلنٹ بانڈ
- 28- جب کوویلنٹ بانڈ بنانے والا ہر ایٹم ایک ایک الیکٹرون فراہم کرے تو اسے کہتے ہیں:
 (الف) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (ب) سنگل کوویلنٹ بانڈ
 (ج) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (د) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ
- 29- ایٹمز کے آخری شیل میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے:
 (الف) آکٹیٹ رول (ب) ڈوپلیٹ رول (ج) بانڈنگ رول (د) اینٹی بانڈنگ رول
- 30- ایٹم کے آخری شیل میں آٹھ الیکٹرون حاصل کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے:
 (الف) آکٹیٹ رول (ب) ڈوپلیٹ رول (ج) الف اور ب دونوں (د) الیکٹرونک نیوٹرون رول
- 31- دو نائٹروجن ایٹمز مل کر نائٹروجن مالیکیول N_2 بناتے ہیں۔ ان کے درمیان بننے والا بانڈ کہلاتا ہے:
 (الف) ٹریپل کوویلنٹ بانڈ (ب) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (ج) آئیونک کوویلنٹ بانڈ (د) مثیلک بانڈ
- 32- دو الیکٹرونز کے جوڑوں کے باہمی اشتراک سے بننے والا کیمیکیل بانڈ کہلاتا ہے:
 (الف) آئیونک بانڈ (ب) ڈبل کوویلنٹ بانڈ (ج) مثیلک بانڈ (د) سنگل کوویلنٹ بانڈ
- 33- سنگل کوویلنٹ بانڈ موجود ہوتا ہے:
 (الف) سوڈیم میٹل (ب) آکسیجن گیس (ج) میتھین (د) نائٹروجن
- 34- گریفائٹ الیکٹرونک سیٹی کا اچھا کنڈکٹر ہے:
 (الف) فری آئیز کی وجہ سے (ب) موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے
 (ج) موبائل پروٹونز کی وجہ سے (د) موبائل نیوٹرونز کی وجہ سے
- 35- کونسا کوویلنٹ کمپاؤنڈ روم ٹمپریچر پر گیس ہے؟
 (الف) پانی (ب) آکسیجن (ج) امونیا (د) سوڈیم کلورائیڈ
- 36- مندرجہ میں سے کونسا الیمینٹ کوویلنٹ ٹھوس ہے؟
 (الف) آکسیجن (ب) کاربن (ج) نائٹروجن (د) کلورین

- 37- کشش کی قوت جو پارٹیکلز کو آپس میں جوڑتی ہے کہلاتی ہے:
 (الف) آئینٹ رول (ب) ڈیپٹ رول (ج) کیمیکل بانڈ (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 38- نیوکلیس کے گرد الیکٹرون کی ترتیب کہلاتی ہے:
 (الف) الیکٹرونک کنفیگریشن (ب) ٹریل کوویلنٹ بانڈ (ج) الیکٹرو نیگیٹیویٹی (د) آئیونک بانڈ
- 39- کس قسم کے ایٹمکٹس میں الیکٹرونز کھونے کی صلاحیت ہوتی ہے؟
 (الف) نان میٹلز (ب) میٹلز (ج) میٹلز اور نان میٹلز (د) میٹالائڈز
- 40- میٹلز کی الیکٹرونز کھونے کی صلاحیت کو کہتے ہیں:
 (الف) الیکٹرو پازٹیو کریکٹر (ب) الیکٹرو نیگیٹیو کریکٹر (ج) الف اور ب دونوں (د) الیکٹرو نیگیٹیوٹی
- 41- نان میٹلز کی الیکٹرونز حاصل کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں:
 (الف) الیکٹرو نیگیٹیو کریکٹر (ب) الیکٹرو پازٹیو کریکٹر (ج) آئیونائزیشن انرجی (د) الیکٹرون افینٹی
- 42- مندرجہ ذیل میں سے کونسا ایٹمٹ پر یا ڈک ٹیبل میں سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ہے؟
 (الف) سوڈیم (ب) فلورین (ج) میگنیشیم (د) ہائیڈروجن
- 43- آئیونک بانڈ بنانے والے کمپاؤنڈز کو کہا جاتا ہے:
 (الف) آئیونک کمپاؤنڈز (ب) کوویلنٹ کمپاؤنڈز (ج) میٹلز (د) نان میٹلز
- 44- کون سے کمپاؤنڈز ایکس اور مولٹن فارم میں الیکٹریسیٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں؟
 (الف) کوویلنٹ کمپاؤنڈز (ب) آئیونک کمپاؤنڈز (ج) نان میٹلز (د) میٹلز اور نان میٹلز
- 45- ڈائی پول۔ ڈائی پول فورسز موجود ہوتی ہیں:
 (الف) H_2 (ب) O_2 (ج) HCl (د) N_2
- 46- انٹر مالیکیول فورسز مضبوط ہوتی ہیں:
 (الف) H_2O (ب) H_2 (ج) N_2 (د) O_2
- 47- کسی ایٹم کی مالیکیول میں موجود اشتراک شدہ الیکٹرون پیر کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کہلاتی ہے:
 (الف) الیکٹرو نیگیٹیویٹی (ب) الیکٹرو پازٹیویٹی (ج) میٹلیک بانڈ (د) آئیونائزیشن انرجی
- 48- آئیونک بانڈ ہیں:
 (الف) ڈائی ریپکشنل (ب) نان۔ ڈائی ریپکشنل (ج) الف اور ب دونوں (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 49- مندرجہ ذیل میں سے کوئی کاربن کی ایسورفس فارم ہے؟
 (الف) ڈائمنڈ (ب) گریفائٹ (ج) پانی (د) کوئلہ
- 50- مندرجہ ذیل میں سے کوئی چیز اس سیارے پر سب سے سخت ہے؟
 (الف) کوئلہ (ب) ڈائمنڈ (ج) گریفائٹ (د) پانی

کثیر الانتخابی مختصر سوالات

65

-7

میٹلز میں سے الیکٹرکسٹی کیوں گزرتی ہے؟

جواب:

موبائل الیکٹرونز کی وجہ سے میٹلز میں سے الیکٹرکسٹی آسانی سے گزرتی ہے۔

-8

آئیونک بانڈ، کوویلنٹ بانڈ سے مختلف کیوں ہے؟

جواب:

آئیونک بانڈ	کوویلنٹ بانڈ
- ایسا کیمیکل بانڈ جو ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں الیکٹرون کی مکمل منتقلی کے نتیجے میں بنتا ہے آئیونک بانڈ کہلاتا ہے۔ - یہ میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان بنتا ہے۔	- ایسا کیمیکل بانڈ جو الیکٹرونز کے باہمی اشتراک کی وجہ سے بنتا ہے کوویلنٹ بانڈ کہلاتا ہے۔ - یہ نان میٹلز میں بنتا ہے۔

-9

کون سے کپاؤنڈز کو آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں؟

جواب:

لون پیئر کے حامل کپاؤنڈز جو کہ دوسرے مالکیول کے ایٹم کو لون پیئر دے دیتے ہیں کو آرڈی نیٹ کوویلنٹ بانڈ بناتے ہیں۔

-10

ٹھوس شکل میں آئیونک کپاؤنڈز سے الیکٹرکسٹی کیوں نہیں گزرتی؟

جواب:

ٹھوس شکل میں آئیونک کپاؤنڈز سے الیکٹرکسٹی نہیں گزرتی کیونکہ ان کے آئنز مضبوطی سے جکڑے ہوتے ہیں اور حرکت نہیں کر سکتے۔

-11

ایکٹس اور مولٹن فورم میں آئیونک کپاؤنڈز الیکٹرکسٹی کے اچھے کنڈکٹرز کیسے ہیں؟

جواب:

ایکٹس اور مولٹن فورم میں آئیونک کپاؤنڈز الیکٹرکسٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں کیونکہ ان کے آئنز اپنے متعلقہ الیکٹرونز کی طرف جانے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔

-12

آئیونک کپاؤنڈز سے کیا مراد ہے؟

جواب:


وہ کپاؤنڈز جن میں آئیونک بانڈ ہوتا ہے انہیں آئیونک کپاؤنڈز کہتے ہیں۔ مثلاً MgO

-13

جب سوڈیم کلورائیڈ کا ایکٹس سلوشن اور نائٹریٹ کے ایکٹس سلوشن کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے تو کیا بنتا ہے؟

جواب:

جب سوڈیم کلورائیڈ کا ایکٹس سلوشن اور نائٹریٹ کے ایکٹس سلوشن کے ساتھ ملتا ہے تو $AgCl$ کا سفید رسوب (ppt) بنتا ہے۔



(white precipitate)

-14

کوئلے کا ایک استعمال لکھیں۔

جواب:

کوئلہ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس میں بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے۔

-15

دو ہائٹری کوویلنٹ کپاؤنڈز کے نام اور فارمولے لکھیں جو روم ٹمپریچر پر گیسز ہیں؟

جواب:

نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ NO_2 ہائیڈروجن کلورائیڈ HCl

-16

کاربن کی ایک کرسٹلائن اور ایک ایسورفس فارم کا نام لکھیں۔

جواب:

کرسٹلائن: ڈائمنڈ، ایمارفس: کوئلہ

- 17- کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ کی تعریف لکھیں۔ اسے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے؟
جواب: کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ: کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ تک ایسی بانڈنگ ہے جس میں الیکٹرونز کا بانڈ پیئر صرف ایک ایٹم دیتا ہے۔
کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ کو ظاہر کرنے کے لیے عموماً ایک (→) تیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- 18- کو ویلٹ اور کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ میں کیا فرق ہے؟
جواب: کو ویلٹ بانڈ الیکٹرونز کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے جب الیکٹرونز کا بانڈ پیئر صرف ایک ایٹم فراہم کرتا ہے تو کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ بنتا ہے۔ دونوں بانڈز بننے کے بعد کو ویلٹ اور کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔
- 19- مٹیلک بانڈ سے کیا مراد ہے؟
جواب: مٹیلک بانڈ: مٹیلک بانڈ ایک ایسا بانڈ ہے جو پازٹیو چارج والے میٹل ایٹمز اور نیگیٹو چارج والے موبائل الیکٹرونز کے درمیان بنتا ہے۔
- 20- مٹیلک بانڈ کی مضبوطی کن عوامل پر منحصر ہے؟
جواب: مٹیلک بانڈ کی مضبوطی دو عوامل پر منحصر ہے:
- (i) پازٹیو آئنز پر موجود پازٹیو چارجز کی تعداد۔
 - (ii) ہر ایٹم کے ذریعہ آزاد کیے گئے موبائل الیکٹرونز کی تعداد۔
- 21- میٹلو الیکٹریسیٹی کی اچھے کنڈکٹرز کیوں ہوتی ہیں؟
جواب: میٹلو میں فری الیکٹرونز آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں اس وجہ سے میٹلو الیکٹریسیٹی کی اچھی کنڈکٹرز بناتے ہیں۔
- 22- ایٹمز کیمیکل بانڈز کیوں بناتے ہیں؟
جواب: ایٹمز اپنے بیرونی شیل کو مکمل کرنے اور استحکام حاصل کرنے کے لیے کیمیکل بانڈز بناتے ہیں۔
- 23- کیمیکل بانڈ کی تعریف لکھیں۔
جواب: کیمیکل ایٹمز کے درمیان عمل کرنے والی ایسی فورس جو انہیں ایک مالیکیول میں جوڑے رکھتی ہے۔ کیمیکل بانڈ کہلاتی ہے۔
- 24- جب الیکٹرو پازٹیو اور الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹ ملتے ہیں تو کونسا بانڈ بنتا ہے؟
جواب: جب الیکٹرو پازٹیو اور الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹ ملتے ہیں تو آئیونک بانڈ بنتا ہے۔
- 25- تین سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹس کے نام لکھیں۔
جواب: فلورین، آکسیجن، نائٹروجن سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں۔
- 26- کون سے کمپاؤنڈز کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ بنانے کے قابل نہیں ہوتے؟
جواب: دو کمپاؤنڈز جس میں الیکٹرون کے لون پیئر دینے والا ایٹم موجود نہ ہو کوآرڈی نیٹ کو ویلٹ بانڈ بنانے کے قابل نہیں ہوتے۔
- 27- مٹیلک بانڈ اور آئیونک بانڈ کے درمیان فرق کریں۔
جواب: مٹیلک بانڈ: پازٹیو چارج والے میٹل ایٹمز اور نیگیٹو چارج والے موبائل الیکٹرونز کے درمیان کشش کی قوت مٹیلک بانڈ کہلاتی ہے۔
آئیونک بانڈ: ایسا بانڈ جو ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں الیکٹرون کی مکمل منتقل سے وجود میں آتا ہے۔ آئیونک بانڈ کہلاتا ہے۔
- 28- دوسولوشن کے نام لکھیں جن میں کو ویلٹ کمپاؤنڈ حل پذیر ہوتے ہیں۔
جواب: کو ویلٹ کمپاؤنڈ عام طور پر نان۔ پولر سولوشن میں حل پذیر ہوتے ہیں جیسے کہ بینزین اور ایسی ٹون وغیرہ۔

29- انٹر مالیکیولر فورسز سے کیا مراد ہے؟ ان کی اقسام کے نام لکھیں۔

جواب: ایک کمپاؤنڈ میں انٹرا مالیکیولر فورسز کو بانڈ کہا جاتا ہے، بانڈ بنانے والی ان طاقتوں کو فورسز کے ساتھ ساتھ مالیکیولز کے درمیان نسبتاً کمزور فورسز بھی پائی جاتی ہیں۔ جو انٹر مالیکیولر فورسز کہلاتی ہیں۔

اقسام: (i) ڈائی پول۔ ڈائی پول انٹرایکشن (ii) ہائیڈروجن بانڈنگ

29- سوڈیم یا میگنیشیم میں سے کونسی میٹلز میں میٹلک بانڈ مضبوط ہوتے ہیں؟

جواب: سوڈیم کی نسبت میگنیشیم میں میٹلک بانڈ مضبوط ہوتے ہیں۔

30- کیٹائن سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: کیٹائن: بازو چارج شدہ میٹل آئنز کیٹائن کہلاتے ہیں۔

مثالیں: Na^+ , Mg^{2+} وغیرہ۔

31- اینائن سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: اینائن: نیگیو چارج شدہ نان۔ میٹلک آئنز اینائن کہلاتے ہیں۔

مثالیں: Cl^- , O^{2-} وغیرہ

32- الکلائن ارتھ میٹلز کی کوئی سی دو مثالیں دیں۔

جواب: میگنیشیم (Mg)، کیلشیم (Ca) الکلائن ارتھ میٹلز ہیں۔

33- الکلائن ارتھ میٹلز الکلی میٹلز سے کم ری ایکٹیو کیوں ہیں؟

جواب: الکلائن ارتھ میٹلز الکلی میٹلز کی نسبت کم ری ایکٹیو ہوتی ہیں۔ کیونکہ الکلائن ارتھ میٹلز اپنے بیرونی الیکٹرون کو الکلی میٹلز کی نسبت کم آسانی سے خارج کرتی ہیں۔

34- پیریاڈک ٹیبل کے سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ایلیمنٹ کا نام لکھیں۔

جواب: فلورین پیریاڈک ٹیبل کا سب سے زیادہ الیکٹرو نیگیٹیو ایلیمنٹ ہے۔

35- طبعی خصوصیات پر انٹر مالیکیولر فورسز کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟

جواب: انٹر مالیکیولر فورسز مادے کی طبعی خصوصیات کو متاثر کرتی ہیں۔ اشیاء کے میٹلنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کا انحصار ان فورسز پر ہوتا ہے۔ مائع کے مالیکیولز کے درمیان یہ فورسز جتنی مضبوط ہوں گی ان کا بوائلنگ پوائنٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ٹھوس کے مالیکیولز میں انٹر مالیکیولر فورسز جتنی مضبوط ہوں گی ان کا میٹلنگ پوائنٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔