

سوال 1: سٹائو شیو میٹری سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت لکھیں۔

جواب: شایو شیومیٹری (Stoichiometry): شایو شیومیٹری علم کیمیا کی ایک اہم برانچ ہے جس میں ہم کمپل ایکویشنز کی مدد سے ری ایکشنس اور پراڈکٹس کی مقداروں کا حساب لگاتے ہیں۔

وضاحت سٹائشیومیٹری کی بنیاد قانون بقائے مادہ پر رکھی گئی جس کے مطابق مادہ نہ تو بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے مٹایا یا تباہ کیا جاسکتا ہے۔ ری ایکٹنٹس کا کل ماس پراڈکٹس کے کل ماس کے برابر ہونا ضروری ہے۔ کیمیکل ایکویشن کو متوازن کرنے کے لیے استعمال میں لائے جانے والے کوایفیشنٹس دراصل ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے درمیان ماس کی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔

شائیشیومیٹری کی اہمیت شائیشیومیٹری کو صنعتوں میں پراڈکٹس کی مطلوبہ مقدار حاصل کرنے کے لیے اور دور کا رخامال کی مقدار معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال 2: کیمیکل فارمولا کیا ہے؟ الیمینٹس اور کمپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولوں میں فرق واضح کریں۔

جواب: کیمیکل فارمولا (Chemical Formula): کیمیکل فارمولا کسی کپاؤنڈ یا ایلیمنٹ کی سادہ علامتی نمائندگی ہوتی ہے جو اس میں موجود ایٹمز اور ان کے تناسب کو ظاہر کرتی ہے۔

مثلاً: پانی کا کیمیکل فارمولا (H_2O) ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک ایٹم ہوتا ہے۔

کیمیکل فارمولا کی اہمیت

(i) کیمیکل فارمولادوں کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔

(ii) یہ کیمیائی تعاملات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔

(iii) یہ کیمیائی حساب کتاب میں مدد کرتا ہے۔

ایٹمیٹنس کے کیمیکل فارمولے اس دنیا میں موجود ایٹمیٹنس مختلف شکل و صورت میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایٹمیٹنس ایسے ہیں جن میں ایٹمز مجموعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ ان ایٹمیٹنس کو صرف ان کے سمبل (Symbols) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سوڈیم (Na)، کیلشیم (Ca)، کاربن (C)، آئرن (Fe) وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ ایٹمیٹنس علیحدہ علیحدہ مالیکیولز کی شکل میں اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں جیسے آکسیجن (O_2)، نائٹروجن (N_2)، ہائیڈروجن (H_2)۔ ان مالیکیولز میں ایٹمز آپس میں کیمیکل بانڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ اوزون میں آکسیجن کے تین ایٹمز آپس میں کیمیکل بانڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ اوزون میں آکسیجن کے تین ایٹمز بیک وقت ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کا فارمولا (O_3) ہے۔

کپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولے

ایٹیمٹس کی طرح کیمیکل کپاؤنڈ مختلف انداز میں پائے جاتے ہیں۔ عام نمک یعنی سوڈیم کلورائیڈ آئنز کے مجموعہ کے طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ آئنز آپس میں کیمیکل بانڈ سے جڑ کر اس ترتیب سے آپس میں جڑتے ہیں کہ کرشل لٹیس (Crystal Lattice) بن جاتا ہے۔ چونکہ اس کے کرشل لٹیس میں آئنز 1:1 کی نسبت سے موجود ہوتے ہیں اس لیے سوڈیم کلورائیڈ کو ایک فارمولائیونٹ NaCl کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے آئیونک کپاؤنڈز کو ان کے فارمولائیونٹس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو ان میں موجود آئنز کے درمیان کم سے کم نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر CaCl_2 ، KBr ، BaCl_2 وغیرہ۔

مشق

1- ایٹمنٹ اور کپاؤنڈ کے مالکیولر فارمولوں میں فرق کو مثالوں سے واضح کریں۔ نیز آئیونک اور کوویلنٹ کپاؤنڈز کے نام بھی لکھیں جن کے فارمولوں میں آئرٹیل میں دیے گئے ہیں۔

جواب: کسی ایٹمنٹ کا کیمیکل فارمولا صرف ایک سہیل پر مشتمل ہوتا ہے جو اس ایٹمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ جبکہ کسی کیمیکل کپاؤنڈ کا فارمولا ایک کے کپاؤنڈ میں موجود مختلف ایٹمنٹس کے دو یا دو سے زیادہ سہیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔

آئیونک کپاؤنڈز کے فارمولوں	کوویلنٹ کپاؤنڈز کے فارمولوں
سوڈیم کلورائیڈ $NaCl$	ہائیڈروجن کلورائیڈ HCl
پوٹاشیم برومائڈ KBr	کاربن ڈائی آکسائیڈ CO_2
کیلشیم کلورائیڈ $CaCl_2$	بینزین C_6H_6
بیریم کلورائیڈ $BaCl_2$	امونیا NH_3

سوال 3: امپیریکل فارمولا سے کیا مراد ہے؟ آئیونک اور کوویلنٹ کپاؤنڈز کے امپیریکل فارمولوں میں مثالوں کی مدد سے فرق واضح کریں۔

جواب: امپیریکل فارمولا کسی کپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا اس میں موجود ایٹمز کے درمیان سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔

آئیونک کپاؤنڈز کا امپیریکل فارمولا: تمام آئیونک کپاؤنڈز ان کے امپیریکل فارمولوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ فارمولوں میں کپاؤنڈز میں موجود آئنز کی سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلشیم کلورائیڈ کا امپیریکل فارمولا CaF_2 ہے جو اس کے کرٹل میں موجود کیلشیم آئنز اور فلورائیڈ آئنز کے درمیان سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔

کوویلنٹ کپاؤنڈز کا امپیریکل فارمولا: کوویلنٹ کپاؤنڈز جو مالکیولز کے طور پر رہتے ہیں ان کے امپیریکل فارمولوں اور مالکیولر فارمولوں مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا مالکیولر فارمولا H_2O_2 ہے جبکہ اس کا امپیریکل فارمولا HO ہے۔ اس طرح کی دوسری مثال بینزین مالکیول کی ہے جس کا مالکیولر فارمولا C_6H_6 ہے اور اس کا امپیریکل فارمولا CH ہے۔

چونکہ کسی کپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا اس میں موجود ایٹمز کی صحیح تعداد کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ان ایٹمز کے درمیان سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے اس لیے یہ ممکن ہے کہ کچھ کپاؤنڈز کے امپیریکل فارمولوں میں ایک ہی ہوں۔ مثلاً بینزین C_6H_6 اور اسیٹیلین $(Acetylene)C_2H_2$ کا امپیریکل فارمولا ایک ہی یعنی CH ہے۔

مشق

1- دو ایٹمی کپاؤنڈز کی مثالیں دیں جن کے امپیریکل اور مالکیولر فارمولوں میں ایک ہی ہوں۔

جواب: 1- پانی:

امپیریکل فارمولا: H_2O

مالکیولر فارمولا: H_2O

2- امونیا:

امپیریکل فارمولا: NH_3

مالکیولر فارمولا: NH_3


سوال 4: بانٹری آئیونک کپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولوں کو لکھنے کے طریقے کی وضاحت مثالوں سے کریں۔

جواب: ایک بانٹری آئیونک کپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا لکھنے کے درج ذیل مراحل ہیں:

1- بانٹری آئیونک کپاؤنڈ کا فارمولا لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا آئنز اور ان کے چارجز کی تعداد معلوم کریں۔

- 2- دونوں آئنز (کیٹائن اور اینئن) کی علامتیں ایک ساتھ لکھیں۔ پازیٹو ریڈیکل بائیں طرف اور نیگیٹو ریڈیکل دائیں طرف۔
- 3- ہر آئن پر موجود چارج (ویلیٹیٹی) لکھیں۔
- 4- ویلیٹسز (چارجز) کو ہر آئن کے نیچے دائیں طرف کراس کریں۔ اگر ویلیٹسز (چارجز) برابر ہیں تو کراس نہ کریں۔
- مثال کے طور پر لیٹھیم آکسائیڈ کا فارمولا اس طرح لکھیں گے۔ لیٹھیم کیٹائن کا سمبل اور اس پر موجود آئن چارج اس طرح لکھا جائے گا Li اور اینئن کا سمبل اور اس پر چارج اس طرح لکھا جائے گا O^{2-} ۔
- کراس گراس (Crisscross) کا فارمولا لگا کر اس کپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا لکھیں۔ اس فارمولا کے مطابق ہر آئن کے اوپر موجود چارج کو دوسرے آئن کے نیچے دائیں طرف لکھا جاتا ہے اور پھر چارج کا سائن ختم کر دیتے ہیں۔

مثالیں



ایٹمز اور ان کے کپاؤنڈز اور اینائنز بمعہ چارجز		ایٹمز اور ان کے کپاؤنڈز بمعہ چارجز	
ایٹم	چارج	ایٹم	چارج
H	H^{1+}	O	O^{2-}
Na	Na^{1+}	N	N^{3-}
Li	Li^{1+}	Cl	Cl^{1-}
K	K^{1+}	Br	Br^{1-}
Mg	Mg^{2+}	I	I^{1-}
Ca	Ca^{2+}	Cu	Cu^{1+}, Cu^{2+}
Ba	Ba^{2+}	Fe	Fe^{2+}, Fe^{3+}
Zn	Zn^{2+}	Sn	Sn^{2+}, Sn^{4+}
Cl	Cl^{1-}	Ni	Ni^{2+}

سوال 5: مثال کی مدد سے کسی کپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ لکھیں۔ یا کسی کپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟


جواب: کپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولانہ (Chemical Formulas of Compounds): کسی کپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا معلوم کیا جاسکتا ہے اگر ہمیں اس کے امپیریکل فارمولا کا علم ہو۔ کسی مرکب کا امپیریکل فارمولا معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے درمیان سادہ ترین نسبت کا پتہ ہو۔ اس سادہ ترین نسبت کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کپاؤنڈ کی ماس پر مبنی کمپوزیشن کا علم آنا چاہیے۔ اس طرح امپیریکل فارمولا معلوم کرنے کے بعد پھر مالیکیولر فارمولا معلوم کرنے کے لیے درج ذیل مساوات استعمال کی جاتی ہے۔

$$n = \frac{\text{مالیکیولر فارمولا}}{\text{امپیریکل فارمولا}}$$

$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا}}$$

مثال: ہائیڈروجن کا ایٹم کم از کم 1 گرام فیوئل فارمولا OH ہے۔ اس کا مولر ماس 34 ہے تو اس کا مالیکیولر فارمولا کیا ہوگا؟


$$n = \frac{34}{17} = 2$$



نوٹ: ”اگر کسی مرکب کے لیے n کی قیمت ایک ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا اور امپیریئل فارمولا ایک ہی ہوگا۔“

مشق

- 1- ایسے تین کمپاؤنڈز کے نام لکھیں جن کے مالیکیولر فارمولا زان کے امپیریئل فارمولا ز سے مختلف ہوں۔
جواب: ایسک ایسڈ:



- مالیکیولر فارمولا: H_2O_2 امپیریئل فارمولا: HO
2- ایک مرکب کا امپیریئل فارمولا CH_2O ہے اس کا مولر ماس 180 g mol^{-1} ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔
جواب: امپیریئل فارمولا: CH_2O

$$180 \text{ g mol}^{-1} = \text{مولر ماس}$$

$$\text{CH}_2\text{O کا امپیریئل فارمولا ماس} = (12 \times 1) + (1 \times 2) + (16 \times 1) =$$

$$12 + 2 + 16 =$$

$$30 =$$


$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریئل فارمولا ماس}}$$

$$n = \frac{180}{30} = 6$$

$$\text{مالیکیولر فارمولا} = n (\text{امپیریئل فارمولا})$$

$$(\text{CH}_2\text{O})_6 =$$

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 =$$



- 3- ایک مرکب کا امپیریئل فارمولا CH_2O ہے اس کا مولر ماس 60 g mol^{-1} ہے۔ اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔
جواب: امپیریئل فارمولا: CH_2O

$$60 \text{ g mol}^{-1} = \text{مولر ماس}$$

$$\text{CH}_2\text{O کا امپیریئل فارمولا ماس} = (12 \times 1) + (1 \times 2) + (16 \times 1) =$$



$$12 + 2 + 16 =$$

$$30 =$$

$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا ماس}}$$

$$n = \frac{60}{30} = 2$$

مالکیولر فارمولا = (امپیریکل فارمولا)




مثال: ایک مرکب کا امپیریکل فارمولا CH ہے۔ اس کا مولر ماس 78 g mol^{-1} ہے۔ اس کا مالکیولر فارمولا معلوم کریں۔

جواب: امپیریکل فارمولا = CH مولر ماس = 78 g mol^{-1}

(امپیریکل فارمولا) $n =$ (مالکیولر فارمولا)

$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا ماس}}$$

$$n = \frac{78}{13} = 6$$



سوال 6: سٹرکچرل فارمولا سے مالکیولر فارمولا اخذ کرنے کا طریقہ کار بیان کریں۔

جواب: سٹرکچرل فارمولا مالکیولر فارمولا اخذ کرنا (Deduce the molecular Formula from structural Formula):

سٹرکچرل فارمولا سے مالکیولر فارمولا اخذ کرنے کے لیے درج ذیل طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔


(i) کپاؤنڈ کا سٹرکچرل فارمولا لکھیں۔

(ii) سٹرکچرل فارمولا میں موجود ہر قسم کے ایٹمز کی تعداد معلوم کریں۔

(iii) تمام ایٹمز کے سمبلز لکھیں۔


(iv) ہر قسم کے ایٹمز کی تعداد کو ان کے سمبلز کے نیچے دائیں طرف لکھیں۔

مثال: سلفیورک ایسڈ کا مالکیولر فارمولا لکھیں۔ اس کا سٹرکچرل فارمولا درج ذیل ہے۔



مثال: اس میں 2H ایک S اور 4O ایٹمز ہیں۔ اس کا فارمولا یہ ہوگا: H_2SO_4


سوال 7: ایسیٹک ایسڈ کا مالکیولر فارمولا لکھیں۔ اس کا سٹرکچرل فارمولا یہ ہے۔



جواب: اس میں 4H، 2C اور 2O ایٹمز ہیں۔ اس کا فارمولا یہ ہوگا: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

مشق


1- فاسفورک ایسڈ کا مالیکیولر فارمولہ معلوم کریں۔ اس کا سٹرکچرل فارمولہ یہ ہے۔



اس میں 3H، 1P اور 4O ایٹمز ہیں۔

جواب: فاسفورک ایسڈ کا مالیکیولر فارمولہ H_3PO_4

2- n- پروپائل الکھول کا مالیکیولر فارمولہ لکھیں۔ اس کا سٹرکچرل فارمولہ یہ ہے۔



اس میں 3C، 8H اور 1O ایٹمز ہیں۔

جواب: n- پروپائل الکھول کا مالیکیولر فارمولہ $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$

3- کلسیم کاربونیٹ کا فارمولہ لکھیں۔ اس کا سٹرکچرل فارمولہ یہ ہے۔



جواب: کلسیم کاربونیٹ کا مالیکیولر فارمولہ CaCO_3

سوال 8: ایوگیڈرو نمبر سے کیا مراد ہے؟ مثالوں کی مدد سے وضاحت کریں۔

جواب: ایوگیڈرو نمبر: ایوگیڈرو نمبر کسی مادے کے ایک مول میں موجود پارٹیکلز (ایٹم، مالیکیول اور آئنز) کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی قیمت

6.022×10^{23} ہے۔ اسے N_A سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$6.022 \times 10^{23} \text{ atoms} = (12\text{g})$$

کاربن ایٹم کا ایک مول

$$6.022 \times 10^{23} \text{ molecules} = (18\text{g})$$

پانی کے مالیکیول کا ایک مول

$$6.022 \times 10^{23} \text{ ions} = (23\text{g})$$

سوڈیم آئن Na^+ کا ایک مول


وضاحت: درج ایک ایسے تعامل سے شروع کریں جس میں دو کاربن ایٹمز آکسیجن کے ایک مالیکیول کے ساتھ ری ایکٹ کر کے کاربن مونوآکسائیڈ کے

دو مالیکیولز بناتے ہیں۔



چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انفرادی طور پر ایٹمز یا مالیکیولز کے ماسز سے حساب لگائیں۔ لہذا ان کے ماسز بہت کم ہوتے ہیں لہذا اس مشکل کو حل

کرنے کے لیے ہم ری ایکٹ کرنے والے ذرات کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔



ایٹمز 2×100

مالیکیولز 100


مالیکیولز 2×100

ایٹمز 2×10000

مالیکیولز 10000

مالیکیولز 2×10000

ری ایکٹو کرنے والے ایٹمز یا مالیکیولز کی تعداد بڑھانے سے ان کے ری ایکٹ کرنے کی نسبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ری ایکٹ کرنے والے ذرات کی تعداد میں اضافہ کرنے سے بھی ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا کیونکہ یہ تعداد اب بھی بہت کم ہے۔ ری ایکٹ کرنے والے ذرات کی تعداد اس حد تک بڑھانے کی ضرورت ہے جن سے ہمارے لیے ان کے ماس کا حساب کرنا آسان ہو۔



2 × 6.022 × 10²³ ایٹمز 6.022 × 10²³ مالیکیولز 2 × 6.022 × 10²³ مالیکیولز
6.022 × 10²³ ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے اور اس کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کیوں کہ

ایٹمک ماس یونٹس (6.022 × 10²³) = 1.00 گرام

اب مساوات 2 میں موجود ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کی مقدار میں ہم اس طرح لکھیں گے۔

2 × 6.022 × 10²³ × (12.0 amu) = 24.00 گرام کاربن ایٹمز

2 × 6.022 × 10²³ × (12.0 amu) = 32.00 گرام آکسیجن مالیکیولز

2 × 6.022 × 10²³ × (12.0 amu) = 2 × 28.00 گرام کاربن مونو آکسائیڈ مالیکیولز

ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے درمیان ماس کی نسبت اب اس طرح ہوگی۔



ایک سادہ ایکویشن سے شروع ہو کر ہم نے ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے ماس کی نسبت معلوم کر لی ہے جس کو ہم با آسانی لیبارٹری میں استعمال کر سکتے ہیں۔

مساوات نمبر 3 کے مطابق 24 گرام کاربن میں 2 × 6.022 × 10²³ کاربن کے ایٹمز ہیں جبکہ 32 گرام آکسیجن میں 6.022 × 10²³ آکسیجن مالیکیولز ہیں۔ اس طرح 56 گرام کاربن مونو آکسائیڈ میں اس کے 6.022 × 10²³ مالیکیولز ہیں۔

اس نمبر 6.022 × 10²³ کو امیڈالوویڈیڈرو (Amaedo Avogadro) کے نام کی مناسبت سے ایوگیڈرو نمبر کہتے ہیں اور اس کو N_A سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سوال 9: مول اور مولر ماس کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں۔

جواب: مول: کسی ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کی وہ مقدار جس میں N_A ذرات ہوں اس کو مول کہتے ہیں۔ مول ایک درجن یا ایک گرام (Gross) کی طرح کا نمبر ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک درجن مالتوں میں 12 مالتے ہوتے ہیں اس طرح کسی شے کے ایک مول میں 6.022 × 10²³ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ایٹمز، مالیکیولز یا آئنز ہو سکتے ہیں۔ جب مول کا لفظ استعمال کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس شے میں موجود چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلز کی وضاحت کی جائے۔ درج ذیل مثالوں سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔


"ایک مول کاربن میں 6.022 × 10²³ ایٹمز ہوتے ہیں اور اس کا ماس 12 گرام ہے۔"

ایک مول آکسیجن مالیکیولز (O₂) میں 6.022 × 10²³ مالیکیولز ہوتے ہیں اور اس کا ماس 32 گرام ہے۔ ایک مول سوڈیم کلورائیڈ (NaCl)

میں 6.022 × 10²³ فارمولائیونٹس ہوتے ہیں اور اس کا ماس 58.5 گرام ہے۔

مولر ماس (Molar Mass) کسی شے کے ایک مول کا ماس اس کا مولر ماس کہلاتا ہے۔ اس طرح ہائیڈروجن ایٹم کا مولر ماس اس کے ایک مول کا ماس

یعنی 1.008 گرام ہوگا اور ہائیڈروجن مالیکیولز کا مولر ماس 2.016 گرام ہوگا۔



مثالیں: C ایٹم کا مولر ماس = 12g

H₂O کا مولر ماس = 18g

CaCO₃ کا مولر ماس = (40 × 1) + (12 × 1) + (16 × 3) =

$$40 + 12 + 48 = 100 =$$

سوڈیم کلورائیڈ کا مولر ماس = (23 × 1) + (35.5 × 1) =

$$58.5g =$$

مثال: درج ذیل کمپاؤنڈز کے مولر ماس (g mol⁻¹) میں معلوم کریں۔

(a) H ₂ SO ₄ (سلفورک ایسڈ)	(b) C ₆ H ₁₂ O ₆ (گلوکوز)
ہائیڈروجن کا اٹامک ماس = 1	ہائیڈروجن کا اٹامک ماس = 1
سلفر کا اٹامک ماس = 32	کاربن کا اٹامک ماس = 12
آکسیجن کا اٹامک ماس = 16	آکسیجن کا اٹامک ماس = 16
ہر ایٹم کی تعداد کے لحاظ سے ان کے ماسز جمع کریں	ہر ایٹم کی تعداد کے لحاظ سے ان کے ماسز جمع کریں
2(1) + 1(32) + 4(16) = 98 g mol ⁻¹	(12) + (12)(1) + 6(16) = 180 g mol ⁻¹

مشق


1- درج ذیل کمپاؤنڈز کے مولر ماسز معلوم کریں۔ H₃PO₄, SiO₂, C₁₂H₂₂O₁₁, N₂O₄, MgCO₃

جواب: H ₃ PO ₄	SiO ₂
H ₃ PO ₄ کا مولر ماس = (1 × 3) + (31 × 1) + (16 × 4) =	SiO ₂ کا مولر ماس = (1 × 28) + (2 × 16) =
3 + 31 + 64 =	28 + 32 =
98 g mol ⁻¹ =	60 g mol ⁻¹ =
C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	N ₂ O ₄
C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ کا مولر ماس = (12 × 12) + (1 × 22) + (11 × 16) =	N ₂ O ₄ کا مولر ماس = (1 × 14) + (4 × 16) =
144 + 22 + 176 =	3 + 31 + 64 =
342 g mol ⁻¹ =	92 g mol ⁻¹ =
MgCO ₃	
MgCO ₃ کا مولر ماس = (1 × 24) + (1 × 12) + (3 × 16) =	
24 + 12 + 48 =	
84 g mol ⁻¹ =	

سوال 10: کیمیکل ایکویشن سے کیا مراد ہے؟ مثال سے واضح کریں۔

جواب: کیمیکل ایکویشن (Chemical Equation): کیمیکل ایکویشن کیمیکل ری ایکشنز کو علامات اور فارمولوں کی مدد سے ظاہر کرنے کا ایک

طریقہ ہے۔ یہ ری ایکشن میں حصہ لینے والے ری ایکٹنٹس اور بننے والے پراڈکٹس دکھاتا کرتی ہے۔




کیمیکل ایکویشن کا بنیادی مقصد کسی بھی کیمیکل ایکویشن کا بنیادی مقصد ان ایٹمز یا مالیکیولز کی نشاندہی کرنا ہے جو کیمیکل ری ایکشن میں حصہ لیتے ہیں اور

اس کے نتیجے میں بنتے ہیں۔

ری ایکٹنٹس (Reactants) وہ مادے جو کیمیکل ری ایکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ مساوات کی بائیں جانب لکھے جاتے ہیں۔

پراڈکٹس (Products) دو مادے جو ری ایکشن کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ یہ مساوات کی دائیں جانب لکھے جاتے ہیں۔



میں $C + O_2$ ری ایکٹنٹس ہیں جبکہ CO_2 پراڈکٹ ہے۔



پراڈکٹس

سوال 11: کیمیکل ایکویشن لکھتے وقت کن نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے؟

جواب: کیمیکل ایکویشن لکھتے وقت ضروری نکات: کیمیکل ایکویشن لکھتے وقت درج ذیل نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

1- کیمیکل ایکویشن کو لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ قانون بقائے مادہ کے مطابق ہو یعنی اس میں نہ تو کوئی ایٹم نیا بنے اور نہ ہی کوئی ایٹم فنا ہو۔ کیمیکل ری ایکشن میں حصہ لینے والے ایٹمز کی تعداد دونوں طرف لازمی طور پر برابر ہونی چاہیے یعنی کیمیکل ایکویشن متوازن ہونی چاہیے۔

2- تمام ری ایکٹ کرنے والے اور بننے والے ایٹمنٹس یا کمپاؤنڈز کو صحیح فارمولہ سے ظاہر کرنا چاہیے۔


3- کیمیکل ایکویشن کو ری ایکٹنٹس، پراڈکٹس اور ان دونوں کے درمیان مول نسبت کا ٹھیک تعین کرنا چاہیے۔

4- کیمیکل ایکویشن میں کیمیکل ری ایکشن کی سمت کا تعین لازمی طور پر ہونا چاہیے۔

5- عام طور پر کیمیکل ایکویشن میں ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کی فزیکل حالت کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے۔ مثلاً ٹھوس کے لیے (s) مائع کے لیے (l) گیس کے لیے (g) اور آبیوں (Aqueous) کے لیے (aq) کے سمبلز استعمال کیے جاتے ہیں۔

اوپر دیے گئے نکات کے مطابق کیمیکل ایکویشن صرف اس وقت لکھی جاسکتی ہے جب عملی تجربات سے ان نکات کے متعلق تمام معلومات کا علم ہو۔ مثال کے طور پر یہ معلوم کرنا کہ کون سی اشیا بن رہی ہیں (کیونکہ ری ایکشن میں حصہ لینے والی اشیا کے متعلق عام طور پر علم ہوتا ہے) اور ان کے ٹھیک فارمولہ لکھنا چاہیے۔

یہ سادہ کی کیمیکل ایکویشن مندرجہ بالا تمام نکات کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔




سوال 12: ریورسیبل ری ایکشنز سے کیا مراد ہے؟

جواب: ریورسیبل ری ایکشنز (Reversible Reaction): ریورسیبل ری ایکشنز ایسے کیمیائی ری ایکشنز ہیں جو دونوں سمتوں میں ہو سکتے


ہیں ری ایکٹنٹس مل کر پراڈکٹس بناتے ہیں اور پراڈکٹس مل کر ری ایکٹنٹس بناتے ہیں۔

- ☆ ریورسیبل ری ایکشنز کو ظاہر کرنے کے لیے دوہرے تیر (⇌) کا نشان استعمال کیا جاتا ہے۔
- ☆ یہ ری ایکشن ایکوی لبریم کی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں دونوں سمتوں میں ری ایکشن کی مقدار برابر ہو جاتی ہے۔
- ☆ ایکوی لبریم کی حالت میں، ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس دونوں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی مقداریں وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتیں۔
- ☆ ریورسیبل ری ایکشنز میں بیرونی حالات یعنی درجہ حرارت اور پریشر کو تبدیل کر کے ایکوی لبریم کی سمت کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔




سوال 13: مقداری مسائل کو حل کرنے میں ایکوییشن کا استعمال بیان کریں۔

جواب: مکمل اور متوازن کیمیکل ایکوییشن ہمیں ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کی مول نسبت یا مولر ماس کی نسبت بھی بتاتی ہے۔ اگر میں پراڈکٹس کے مولر ماسز معلوم ہوں تو ہم اس نسبت کی مدد سے ری ایکٹنٹس کے مولر ماسز معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل ایکوییشن ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مول (100) گرام کیلشیم کاربونیٹ 2 مولز (73) گرام ہائڈروکلورک ایسڈ سے ری ایکٹ کر کے ایک مول (111) گرام کیلشیم کلورائیڈ ایک مول (18) گرام (کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں۔



ری ایکٹنٹس کا ٹوٹل ماس پراڈکٹس کے ٹوٹل ماس کے برابر ہوتا ہے۔

سوال 14: 25 گرام لائم سٹون $CaCO_3$ کو جب ہائڈروکلورک ایسڈ کی کافی زیادہ مقدار سے اوپر دی گئی ایکوییشن کے مطابق ری ایکٹ کرایا جاتا ہے تو کیلشیم کلورائیڈ کتنی مقدار بنتی ہے؟



جواب: کیلشیم کاربونیٹ کا ماس = 25 گرام
کیلشیم کاربونیٹ کا مولر ماس = 100 g mol^{-1}
کیلشیم کلورائیڈ کا ماس = ؟
کیلشیم کلورائیڈ کا مولر ماس = 111 g mol^{-1}
ایکوییشن کے مطابق

100 گرام کیلشیم کاربونیٹ جتنا کیلشیم کلورائیڈ مہیا کرتا ہے۔ = 111 گرام

1 گرام کیلشیم کاربونیٹ جتنا کیلشیم کلورائیڈ مہیا کرے گا۔ = $\frac{111}{100}$ گرام


25 گرام کیلشیم کاربونیٹ جتنا کیلشیم کلورائیڈ مہیا کرے گا۔ = $\frac{111}{100} \times 25$ گرام

= 27.75 گرام

سوال 15: 1.80 مولز ایتھائل الکوحل کو ہوا میں پوری طرح جلانے کے لیے آکسیجن کے کتنے مولز کی ضرورت ہوگی؟ نیز کاربن ڈائی آکسائیڈ کے کتنے مولز بنیں گے؟

جواب: ایتھائل الکوحل کے مولز = 1.80

درکار آکسیجن کے مولز = ؟



کیمیائی ایکویشن کے مطابق
ایک مول ایٹھائل الکوحل کو پوری طرح جلائے کے لیے درکار آکسیجن = 3 مولز

1.8 مولز ایٹھائل الکوحل کو جلائے کے لیے درکار آکسیجن = $\frac{3}{1} \times 1.8$

= 5.4 مولز


ایک مول ایٹھائل الکوحل کتنے مولز کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتی ہے۔ = 2.0

1.8 مولز ایٹھائل الکوحل کتنے مولز کاربن ڈائی آکسائیڈ بنائے گی۔ = $\frac{2}{1} \times 1.8$

= 3.6 مولز

سوال 16: ایلمینیم آکسائیڈ کے ساتھ ری ایکٹ کر کے ایلمینیم آکسائیڈ بنائی ہے۔ 0.3 مولز ایلمینیم سے ری ایکٹ کرنے کے لیے آکسیجن کے کتنے گرام کی ضرورت ہوگی؟

جواب: ایلمینیم کے مولز = 0.3 آکسیجن کے کتنے گرام استعمال ہوئے = ؟



کیمیائی ایکویشن کے مطابق
4 مولز ایلمینیم کے لیے درکار آکسیجن = 3.0 مولز

1 مول ایلمینیم کے لیے درکار آکسیجن = $\frac{3}{4}$

3.0 مول ایلمینیم کے لیے درکار آکسیجن = $\frac{3}{4} \times 0.3$

= 0.225 مولز


ایک مول آکسیجن (O₂) کا مولر ماس = 32

0.225 مول آکسیجن (O₂) کا مولر ماس = 7.2 گرام

سوال 17: اگر 5 گرام ہائیڈروجن کا آکسیجن کی زیادہ مقدار سے ری ایکشن کروایا جائے تو پانی کے کتنے مالیکیولز بنیں گے؟

جواب: ہائیڈروجن کا ماس = 5 گرام پانی کے بننے والے مالیکیولز = ؟

ری ایکشن کی متوازن ایکویشن



2 moles 1 mole 2 moles

4g 32g 36g

ایکویشن کے مطابق

4 گرام ہائیڈروجن پانی بناتی ہے۔ = 36 گرام

5 گرام ہائیڈروجن پانی بنائے گی۔ = $45 = \frac{36}{4} \times 5$ گرام پانی

18 گرام ایک مول پانی میں مالیکیولز کی تعداد = 6.022×10^{23}

$$6.022 \times 10^{23} \times 2 =$$

36 گرام پانی میں مائیکرو لٹر کی تعداد

$$12.04 \times 10^{23} =$$

$$\frac{45}{36} \times 12.04 \times 10^{23} =$$

45 گرام پانی میں مائیکرو لٹر کی تعداد

$$1.505 \times 10^{24} =$$

سوال 18: مندرجہ ذیل کپاؤٹڈ میں نائٹروجن کی پریسینج (فیصد مقدار) معلوم کریں۔



حل: $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ (i)


$$(12 \times 1) + (16 \times 1) + (14 \times 2) + (1 \times 4) = \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \text{ کا مولر ماس}$$

$$12 + 16 + 28 + 4 =$$

$$60 \text{ g} = \text{CO}(\text{NH}_2)_2 \text{ کا مولر ماس}$$

$$\%N = \frac{28}{60} \times 100 = 46.66\%$$

$46.66\% = \% \text{ age}$ میں نائٹروجن کی $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$




$$(14 \times 2) + (1 \times 4) = \text{N}_2\text{H}_4 \text{ کا مولر ماس}$$

$$28 + 4 =$$

$$32 \text{ g} = \text{N}_2\text{H}_4 \text{ کا مولر ماس}$$

$$\%N = \frac{28}{32} \times 100 = 87.5\%$$

$82.35\% = \% \text{ age}$ میں نائٹروجن کی N_2H_4




$$(14 \times 1) + (1 \times 3) + (16 \times 1) = \text{NH}_2\text{OH} \text{ کا مولر ماس}$$

$$14 + 3 + 16 =$$

$$33 \text{ g} = \text{NH}_2\text{OH} \text{ کا مولر ماس}$$

$$\%N = \frac{14}{33} \times 100 = 42.42\%$$

$42.42\% = \% \text{ age}$ میں نائٹروجن کی NH_2OH



$$(14 \times 1) + (1 \times 3) = \text{NH}_3 \text{ کا مولر ماس}$$

$$14 + 3 =$$

$$17 \text{ g} = \text{NH}_3 \text{ کا مولر ماس}$$

$$\%N = \frac{14}{17} \times 100 = 82.35\%$$

NH₃ میں نائٹروجن کی % age = 82.35%

سوال 19: کاربن (ڈائنٹرو) کے 6g ایٹمز کی تعداد معلوم کریں۔

حل: گرامز میں کاربن کا ماس = 6g

کاربن کا مولر ماس = 12g

مولز کی تعداد = $\frac{\text{گرامز میں ماس}}{\text{مولر ماس}}$

$\frac{6}{12}$ = مولز کی تعداد

مولز کی تعداد = 0.5 moles

ایٹمز کی تعداد = مولز کی تعداد × ایووگیڈرو نمبر

$$0.5 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ atoms} =$$

$$3.011 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

کاربن (ڈائنٹرو) کے 6g میں ایٹمز کی تعداد = $3.011 \times 10^{23} \text{ atoms}$

سوال 20: ایلمینیم ایک ہلکی میٹل ہے۔ یہ دودھ کے ٹینک بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 204g ایلمینیم آکسائیڈ (Al₂O₃) میں ایلمینیم (Al) کی مقدار معلوم کریں۔

حل: ایلمینیم آکسائیڈ کا مولر ماس = $(27 \times 2) + (16 \times 3)$

$$54 + 48 =$$

$$102 \text{ g} =$$

$$54 \text{ g} = 102 \text{ g ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al)}$$



$$\frac{54}{102} \text{ g} = 1 \text{ g ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al)}$$

$$\frac{54}{102} \times 204 = 108 \text{ g ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al)}$$

$$108 \text{ g} =$$

$$108 \text{ g} = 204 \text{ g Al}_2\text{O}_3 \text{ میں ایلمینیم کا ماس}$$

سوال 21: میتھین گیس (CH₄) کے 30 گرامز کے مکمل جلتے سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار معلوم کریں۔
حل: متوازن کیمیکل ایکویشن:



$$16 \text{ g} \longrightarrow 44 \text{ g}$$

$$16 \text{ g میتھین (CH}_4\text{) سے بننے والی CO}_2 \text{ کی مقدار} = 44 \text{ g}$$

$$\frac{44}{16} g = \text{بننے والی CO}_2 \text{ کی مقدار}$$

$$\frac{44}{16} \times 30 g = \text{بننے والی CO}_2 \text{ کی مقدار}$$

$$82.5 g =$$

$$82.5 g = \text{CO}_2 \text{ کی مقدار}$$

سوال 22: ہوا مختلف گیسوں کا ایک ہومو جنس مکسچر ہے۔ اس میں والیم کے لحاظ سے 78 فیصد نائٹروجن موجود ہے۔ 3.5 گرام نائٹروجن میں ایٹمز کی تعداد معلوم کریں۔

$$\text{حل: } N_2 \text{ کا مولر ماس} = 14 \times 2$$

$$28 g =$$

$$3.5 g = N_2 \text{ کا گرامز میں ماس}$$

$$\frac{\text{مولر کی تعداد}}{\text{مولر ماس}} = \text{گرامز میں ماس}$$

$$\frac{3.5}{28}$$

$$0.125 \text{ moles} =$$

$$\text{مولر کی تعداد} \times \text{ایو گیڈر نمبر} = \text{مالیکیولز کی تعداد}$$

$$0.125 \times 6.02 \times 10^{23} =$$

$$0.752 \times 10^{23} \text{ molecules} = \text{مالیکیولز کی تعداد}$$

$$2 = \text{نائٹروجن کے ایک مالیکیول میں ایٹمز کی تعداد}$$

$$2 \times 0.75 \times 10^{23} \text{ atom} =$$

$$1.505 \times 10^{23} \text{ atoms} =$$

$$1.505 \times 10^{23} \text{ atoms} = \text{اس طرح N}_2 \text{ کے 3.5 گرامز میں ایٹمز کی تعداد}$$

ولچپ معلومات

☆ ہم اپنی زندگی میں جو کیمیائی اشیاء مثلاً شیمپو، عطریات، صابن اور کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کے اجزائے ترکیبی کو شائیو میٹری کی کیلکولیشنز کے تحت بنایا جاتا ہے۔ شائیو میٹری کے بغیر کیمیکل صنعت وجود میں نہیں آسکتی۔

☆ مول کا نظریہ بہت اہم ہے کیونکہ ایٹمز اور مالیکیولز بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے ماسز بھی بہت کم ہیں۔ مول کے نظریہ کی مدد سے ہم اشیاء کا وزن کر کے ان میں موجود ان پارٹیکلز کی تعداد معلوم کرتے ہیں۔

اہم نکات

- 1- ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کا مالیکیولر فارمولا ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کے مالیکیول میں موجود ایٹمز کی صحیح تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔
- 2- کسی کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا اس کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے درمیان کم سے کم نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ تمام آئیونک کمپاؤنڈز اور کچھ کوویلنٹ کمپاؤنڈز کو امپیریکل فارمولا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\%N = \frac{14}{17} \times 100 = 82.35\%$$

NH₃ میں نائٹروجن کی % age = 82.35%

سوال 19: کاربن (ڈائنٹرو) کے 16g ایٹمز کی تعداد معلوم کریں۔

حل: گرامز میں کاربن کا ماس = 6g

کاربن کا مولر ماس = 12g

مولز کی تعداد = $\frac{\text{گرامز میں ماس}}{\text{مولر ماس}}$

$\frac{6}{12} =$ مولز کی تعداد

$0.5 \text{ moles} =$ مولز کی تعداد

ایٹمز کی تعداد = مولز کی تعداد $\times$ ایووگیڈرو نمبر

$$0.5 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

$$3.011 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

کاربن (ڈائنٹرو) کے 6g میں ایٹمز کی تعداد $3.011 \times 10^{23} \text{ atoms}$ ہے۔

سوال 20: ایلمینیم ایک ہلکی میٹل ہے۔ یہ دودھ کے ٹینک بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ 204g ایلمینیم آکسائیڈ (Al₂O₃) میں ایلمینیم (Al) کی مقدار معلوم کریں۔

حل: ایلمینیم آکسائیڈ کا مولر ماس = $(27 \times 2) + (16 \times 3)$

$$54 + 48 =$$

$$102 \text{ g} =$$

$$102 \text{ g} = \text{ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al)}$$



$$\frac{54}{102} \text{ g} = \text{ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al)}$$

$$\frac{54}{102} \times 204 = \text{ایلمینیم آکسائیڈ میں ایلمینیم (Al)}$$

$$108 \text{ g} =$$

$$108 \text{ g} = 204 \text{ گرام Al}_2\text{O}_3 \text{ میں ایلمینیم کا ماس}$$

سوال 21: میتھین گیس (CH₄) کے 30 گرامز کے کھل جانے سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار معلوم کریں۔
حل: متوازن کیمیکل ایکویشن:



16g میتھین (CH₄) سے بننے والی CO₂ کی مقدار = 44g

$$\frac{44}{16} g = \text{میتھین (CH}_4\text{) سے بننے والی CO}_2\text{ کی مقدار}$$

$$\frac{44}{16} \times 30 g = \text{میتھین (CH}_4\text{) سے بننے والی CO}_2\text{ کی مقدار}$$

$$82.5 g =$$

$$82.5 g = \text{CO}_2\text{ کی مقدار}$$

سوال 22: ہوا مختلف گیسوں کا ایک ہوموجینس مکسچر ہے۔ اس میں والیم کے لحاظ سے 78 فیصد نائٹروجن موجود ہے۔ 3.5 گرام نائٹروجن میں ایٹمز کی تعداد معلوم کریں۔

$$\text{حل: N}_2\text{ کا مولر ماس} = 14 \times 2 =$$

$$28 g =$$

$$\text{N}_2\text{ کا گرامز میں ماس} = 3.5 g =$$

$$\text{مولز کی تعداد} = \frac{\text{گرامز میں ماس}}{\text{مولر ماس}}$$

$$\frac{3.5}{28}$$

$$=$$

$$0.125 \text{ moles} =$$

$$\text{مالیکیولز کی تعداد} = \text{مولز کی تعداد} \times \text{ایویگریڈر نمبر}$$

$$0.125 \times 6.02 \times 10^{23} =$$

$$0.752 \times 10^{23} \text{ molecules} = \text{مالیکیولز کی تعداد}$$

$$\text{نائٹروجن کے ایک مالیکیول میں ایٹمز کی تعداد} = 2 =$$

$$2 \times 0.75 \times 10^{23} \text{ atom} =$$

$$1.505 \times 10^{23} \text{ atoms} =$$

$$1.505 \times 10^{23} \text{ atoms} = \text{اس طرح N}_2\text{ کے 3.5 گرامز میں ایٹمز کی تعداد}$$

دلچسپ معلومات

☆ ہم اپنی زندگی میں جو کیمیائی اشیاء مثلاً شیمپو، عطریات، صابن اور کھادیں استعمال کرتے ہیں ان کے اجزائے ترکیبی کو شائے شیمیو میٹری کی کیلکولیشنز کے تحت بنایا جاتا ہے۔ شائے شیمیو میٹری کے بغیر کیمیکل صنعت وجود میں نہیں آسکتی۔

☆ مول کا نظریہ بہت اہم ہے کیونکہ ایٹمز اور مالیکیولز بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے ماسز بھی بہت کم ہیں۔ مول کے نظریہ کی مدد سے ہم اشیاء کا وزن کر کے ان میں موجود ان پادیکلز کی تعداد معلوم کرتے ہیں۔

اہم نکات

1- ایٹمنٹ یا کمپاؤنڈ کا مالیکیولر فارمولہ ایٹمنٹ یا کمپاؤنڈ کے مالیکیول میں موجود ایٹمز کی صحیح تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔

2- کسی کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولہ اس کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کے درمیان کم سے کم نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ تمام آئیونک کمپاؤنڈز اور کچھ کوویلنٹ کمپاؤنڈز کو امپیریکل فارمولہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

- 3- بائری آئیونک کمپاؤنڈز کا کیمیکل فارمولا لکھنے کے لیے اس کمپاؤنڈ میں موجود آئنز کے سمبلز اور ان پر موجود چارجز کا علم ہونا چاہیے۔
- 4- کمپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا اس کے امپیریکل فارمولا کو n سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ n کی قیمت نکالنے کے لیے اس کمپاؤنڈ کے مولر ماس اور امپیریکل فارمولا ماس کی نسبت معلوم کی جاتی ہے۔
- 5- ایوگیڈرو نمبر کی مدد سے ہم ری ایکشن میں حصہ لینے والے ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے درمیان ماسز کی نسبت معلوم کر سکتے ہیں۔ ایوگیڈرو نمبر کی قیمت 6.022×10^{23} ہے۔
- 6- کسی ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ میں موجود ایوگیڈرو نمبر جتنے پارٹیکلز کی تعداد کو اس ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کا مول کہتے ہیں اور اس میں موجود ماس کو مولر ماس کہتے ہیں۔
- 7- کیمیکل ری ایکشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں کون سے ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ری ایکٹنٹس کے درمیان، پراڈکٹس کے درمیان اور ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے درمیان مولز کی نسبت کا پتہ چلا ہے۔ کیمیکل ایکویشن لازمی طور پر متوازن ہونی چاہیے اور اس میں حصہ لینے والے ایلیمنٹس کی اور کمپاؤنڈز کو صحیح فارمولا ز سے ظاہر کرنا چاہیے۔
- 8- کیمیکل ایکویشن میں موجود ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے درمیان مولز کی نسبت سے ہم ان کے درمیان ماسز کی نسبت معلوم کر سکتے ہیں۔ کیمیکل ایکویشن کی مدد سے ری ایکشن میں حصہ لینے والے ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کے ماسز معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مشقی سوالات

- 1- صحیح جواب پر ٹک (✓) کریں۔
- (i) ایک گرام پانی میں کتنے ایٹمز ہوتے ہیں؟
 (الف) 1002×10^{23} ایٹمز
 (ب) 1002×10^{23} ایٹمز
 (ج) 0.334×10^{23} ایٹمز
 (د) 2.004×10^{23} ایٹمز
- (ii) کیلشیم فاسفائیڈ کا درست فارمولا کیا ہے؟
 (الف) CaP
 (ب) CaP₂
 (ج) Ca₂P₃
 (د) Ca₃P₂
- (iii) ایک گرام میں کتنے ایٹم ماس یونٹس amu ہیں؟
 (الف) 1 amu
 (ب) 10^{23} amu
 (ج) 6.022×10^{23} amu
 (د) 6.022×10^{23} amu
- (iv) 2-ہیکسین (2-Hexene) کا سٹرکچرل فارمولا $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - (\text{CH}_2)_2 - \text{CH}_3$ اس کا امپیریکل فارمولا کیا ہوگا؟
 (الف) C₂H₂
 (ب) CH
 (ج) C₆H₁₂
 (د) CH₂
- (v) 25 گرام سلفیورک ایسڈ (H₂SO₄) میں کتنے مولز ہوں گے؟
 (الف) 0.765 مولز
 (ب) 0.51 مولز
 (ج) 0.255 مولز
 (د) 0.4 مولز
- (vi) ایک ٹیکلیس میں 6 گرام ہیرے بڑے ہیں ان میں کاربن ایٹمز کی تعداد کتنی ہوگی؟
 (الف) 6.02×10^{23}
 (ب) 12.04×10^{23}
 (ج) 1.003×10^{23}
 (د) 3.01×10^{23}

(vii) ایلیمنٹل آکسائیڈ (Al_2O_3) کے 204 گرام میں Al کا ماس کتنا ہوگا؟

(الف) 26 گرام (ب) 27 گرام (ج) 54 گرام (د) 108 گرام

(viii) ذیل میں درج مرکبات میں سے کس میں نائٹروجن کے ماس کی فیصد مقدار زیادہ ہوگی؟

(الف) $CO(NH_2)_2$ (ب) N_2H_4 (ج) NH_3 (د) H_2OH

(ix) جب ذیل میں درج اشیا کا ایک مول آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرے گا تو کس شے کے ساتھ CO_2 سب سے زیادہ بنے گی۔

(الف) کاربن (ب) ہیرا (ج) C_2H_6 (د) میتھین CH_4

(x) 95% کیلشیم کاربونیٹ ($CaCO_3$) کا کتنا ماس 0.5 مولر ہائڈروکلورک ایسڈ کے $50cm^3$ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے درکار ہوگا؟

(الف) 9.5 گرام (ب) 1.25 گرام (ج) 1.32 گرام (د) 1.45 گرام

جوابات

1	الف	2	د	3	ج	4	د	5	ج
6	د	7	د	8	ب	9	ج	10	ج

-2

(i) بیریم نائٹرائڈ (Barium Nitride) کا کیمیائی فارمولہ لکھیں۔

جواب: بیریم نائٹرائڈ کا کیمیائی فارمولہ B_3N_2 ہے۔

(ii) ایک ایسے مرکب کا مالیکیولر فارمولہ معلوم کریں جس کا امپیریکل فارمولہ (CH_2O) ہے اور اس کا مولر ماس 180 ہے۔

CH_2O = امپیریکل فارمولہ

$CH_2O = (12 \times 1) + (1 \times 2) + (16 \times 1)$

= 30

= 180

$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولہ ماس}}$

$n = \frac{180}{30} = 6$

$n = 6$

(امپیریکل فارمولہ) n = مالیکیولر فارمولہ

= $6(CH_2O)$

= $C_6H_{12}O_6$

(iii) 1.5 گرام پانی میں کتنے مالیکیولز ہوں گے؟

$H_2O = 1.5$ g کا گرامز میں ماس

$H_2O = (1 \times 2) + (16 \times 1)$

= 2 + 16 = 18g

$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولہ ماس}}$

امپیریکل فارمولہ ماس

$$= \frac{1.5}{18} = 0.0833 \text{ moles}$$


$$\begin{aligned} \text{ایو گینڈروز نمبر} \times \text{مول کی تعداد} &= \text{مالیکیولز کی تعداد} \\ &= 0.0833 \times 6.022 \times 10^{23} \\ &= 0.501 \times 10^{23} \text{ molecules} \\ &= 5.01 \times 10^{24} \text{ molecules} \end{aligned}$$

(iv) مول اور ایو گینڈروز نمبر میں کیا فرق ہے؟

جواب:

ایو گینڈروز نمبر	مول
ایو گینڈروز نمبر سے مراد پارٹیکلز یعنی (ایٹمز، مالیکیول یا فارمولا یونٹس) کی عددی تعداد ہے جو کسی شے کے ایک مول میں موجود ہوتی ہے۔	جب کسی شے کے اٹامک ماس، مالیکیولر ماس اور فارمولا ماس کو گرامز میں ظاہر کیا جائے تو اسے مول کہتے ہیں۔

(v) ذیل میں درج ری ایکشن کی کیمیکل ایکویشن لکھیں۔



3- تعمیری فکر پر مبنی سوالات (Constructed Response Questions)

(i) مختلف کمپاؤنڈز کا مالیکیولر فارمولا بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا البتہ ان کا امپیریکل فارمولا ایک جیسا ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہے؟

جواب: مختلف کمپاؤنڈز کا مالیکیولر فارمولا کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا کیونکہ مختلف کمپاؤنڈز میں ایک مقررہ تناسب میں مختلف ایٹمنٹس موجود ہوتے ہیں۔ امپیریکل فارمولا ہمیں کمپاؤنڈز میں موجود ایٹمنٹس کی اصل تعداد نہیں بتاتا بلکہ یہ کسی کمپاؤنڈز میں موجود ایٹمنٹس کی سادہ ترین عددی نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ مختلف کمپاؤنڈز کا امپیریکل فارمولا ایک جیسا ہو۔

مثلاً: بیئزین (C₆H₆) اور ایسیٹائلین (C₂H₂) دونوں کا امپیریکل فارمولا (CH) ایک جیسا ہے۔

(ii) ذیل میں درج کیمیکل کمپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولا لکھیں۔

کیلشیم فاسفیٹ، ایلمینیم نائٹرائڈ، سوڈیم ایسیٹ، امونیم کاربونیٹ اور ہسٹہ سلفیٹ

جواب: کیلشیم فاسفیٹ: Ca₃(PO₄)₂ ایلمینیم نائٹرائڈ: AlN سوڈیم ایسیٹ: CH₃COONa

امونیم کاربونیٹ: (NH₄)₂CO₃ ہسٹہ سلفیٹ: Bi₂(SO₄)₃

(iii) علم کیمیا میں ایو گینڈروز نمبر کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟

جواب: ایو گینڈروز نمبر کیمسٹری میں بہت اہم ہیں کیونکہ یہ ایٹمز اور مالیکیولز کی مالیکولر کمپاؤنڈز کو جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ایسی دنیا سے جوڑتا ہے جسے ہم دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہمیں کیمیکل کیلکولیشنز معلوم کرنے اور مول کے تصور کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایو گینڈروز نمبر سائنسدانوں کو مادے میں پارٹیکلز کی تعداد کا حساب لگانے میں مدد دیتا ہے۔

(iv) جب 8.657 گرام کمپاؤنڈز کو اس میں موجود ایٹمنٹس میں تحلیل کیا گیا تو 5.217 گرام کاربن، 0.962 گرام ہائیڈروجن اور 2.478 گرام آکسیجن حاصل ہوتے ہیں۔ کمپاؤنڈز میں موجود ان ایٹمنٹس کی فیصد مقدار معلوم کریں۔

جواب: کمپاؤنڈ کا ماس = 8.6575g کاربن کی %:

$$8.657g = 5.217g \text{ کپاؤنڈ میں کاربن}$$

$$1g = \frac{5.217g}{8.657g} \text{ کپاؤنڈ میں کاربن}$$

$$5.217g = \text{کاربن کا ماس}$$

$$0.962g = \text{ہائیڈروجن کا ماس}$$

$$2.478g = \text{آکسیجن کا ماس}$$

$$100g = \frac{5.217g}{7.657g} \times 100 \text{ کپاؤنڈ میں کاربن}$$

$$100g = 60.26\% \text{ کپاؤنڈ میں کاربن}$$

$$60.26\% = \text{کاربن کی \%}$$

$$\text{آکسیجن کی \%}$$

$$\text{ہائیڈروجن کی \%}$$

$$8.657g = 2.478g \text{ کپاؤنڈ میں آکسیجن}$$

$$1g = \frac{2.478}{8.657} \text{ کپاؤنڈ میں آکسیجن}$$

$$100g = \frac{2.478g}{8.657g} \times 100 \text{ کپاؤنڈ میں آکسیجن}$$

$$28.62\% = \text{آکسیجن کی \%}$$

$$8.657g = 0.962g \text{ کپاؤنڈ میں ہائیڈروجن}$$

$$1g = \frac{0.962}{8.657} \text{ کپاؤنڈ میں ہائیڈروجن}$$

$$100g = \frac{0.962}{8.657g} \times 100 \text{ کپاؤنڈ میں ہائیڈروجن}$$

$$11.11\% = \text{ہائیڈروجن کی \%}$$

(v) آپ ایک ریورسبل ری ایکشن میں پراڈکٹس کے ماسز کس طرح معلوم کریں گے؟

جواب: ریورسبل ری ایکشنز میں بننے والے پراڈکٹس کے ماسز کا حساب لگانے کے لیے پہلے متوازن (ایکسٹنڈ) کیمیکل ایکویشن لکھیں پھر دیے گئے ری ایکٹنٹس کے ماس کو مولز میں تبدیل کریں، متوازن مساوات سے مول تناسب کا استعمال کر کے بننے والے پراڈکٹ کے مولز تلاش کریں اور آخر میں ان مولز کو پراڈکٹ کے مولر ماس سے ضرب دے کر ماس معلوم کریں۔

4- تفصیلی سوالات۔

(i) ایک ری ایکشن کی کیمیکل ایکویشن لکھنے سے پہلے کن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے؟

جواب: دیکھئے سوال نمبر 11



(ii) ایووگایڈروڈ نمبر اور مول کی وضاحت کیجیے۔

جواب: دیکھئے سوال نمبر 8 اور 9

(iii) اگر 10 گرام میتھین کو بہت زیادہ آکسیجن میں جلا یا جائے تو درج ذیل ایکویشن کے مطابق کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کتنی مقدار بنے گی؟



جواب: متوازن کیمیائی مساوات:




$$\text{CH}_4 \text{ کے } 1 \text{ g سے CO}_2 \text{ بنتی ہے} = \frac{44}{16}$$

$$\text{CH}_4 \text{ کے } 10 \text{ g سے CO}_2 \text{ بنتی ہے} = \frac{44}{16} \times 100$$


$$= 27.5 \text{ g}$$

$$\text{CO}_2 \text{ کی مقدار} = 27.5 \text{ g}$$

(iv) درج ذیل کیمیکیل ایکویشن کے مطابق 10 مول CO بنانے کے لیے کونسلے کی کتنی مقدار درکار ہوگی؟



جواب: متوازن کیمیائی مساوات:



$$\text{CO} = 3 \text{ moles کے 3 مول کے لیے کونسلے کے مولز}$$

$$\text{CO} = \frac{3}{3} \text{ moles} = 1 \text{ کے 1 مول کے لیے کونسلے کے مولز}$$

$$\text{CO} = \frac{3}{3} \times 10 = 10 \text{ moles کے 10 مول کے لیے کونسلے کے مولز}$$

$$= 10 \text{ moles کے کونسلے کے مولز}$$

$$= 12 \text{ g کو کونسلے کا مول}$$

$$\text{ایک مول کا ماس} \times \text{کونسلے کے مول} = \text{کونسلے کا ماس}$$

$$= 10(12)$$

$$= 120 \text{ g}$$

(v) 10 مول سلفر بنانے کے لیے SO₂ کے کتنے گرام درکار ہوں گے؟



جواب: متوازن کیمیائی مساوات:



$$\text{Sulfur} = 1 \text{ mole کے 3 مول کے لیے SO}_2 \text{ کے مولز}$$

$$\text{Sulfur} = \frac{1}{3} \text{ mole کے 1 مول کے لیے SO}_2 \text{ کے مولز}$$

$$\text{Sulfur} = \frac{1}{3} \times 10 \text{ کے 10 مول کے لیے SO}_2 \text{ کے مولز}$$

$$\text{SO}_2 \text{ کے مولز} = 3.33 \text{ moles}$$

$$\text{SO}_2 \text{ کے مولر ماس} = (32 \times 1) + (16 \times 2)$$

$$= 32 + 32 = 64$$


مولر ماس × مولر کی تعداد = گرامز میں ماس

$$= 3.33 \times 64$$


$$= 213.12 \text{ g}$$

گرامز میں $\text{SO}_2 = 213.12 \text{ g}$

(vi) 1 کلوگرام پوریا کھاد بنانے کے لیے امونیا کے کتنے گرامز درکار ہوں گے؟



جواب: متوازن کیمیائی مساوات:



$$(14 \times 2) + (1 \times 6) \longrightarrow (12 \times 1) + (16 \times 1) + (14 \times 2) + (1 \times 4)$$

$$34 \text{ kg} \longrightarrow 60 \text{ kg}$$

$$60 \text{ kg} = 34 \text{ kg} \text{ پوریا کھاد کے لیے امونیا کی ضرورت}$$

$$1 \text{ kg} = \frac{34}{60} \text{ kg} \text{ پوریا کھاد کے لیے امونیا کی ضرورت}$$

$$= 0.566 \text{ kg}$$

$$1 \text{ kg} = 0.566 \text{ kg} \text{ میں امونیا کی مقدار}$$

$$1 \text{ g} = 0.566 \times 1000 \text{ g} \text{ میں امونیا کی مقدار}$$

$$= 566 \text{ g}$$

$$566 \text{ g} = \text{گرامز میں امونیا کی مقدار}$$

(vii) درج ذیل میں ایٹمز کی تعداد معلوم کریں۔

(الف) 3 گرام H_2 (ب) 4.3 مولر N_2 (ج) 10 گرام $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

جواب: (الف) 3 گرام H_2

$$= 3 \text{ g} \text{ گرامز میں ماس}$$

$$\text{H}_2 \text{ کا مولر ماس} = 1 \times 2 = 2 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\text{H}_2 \text{ میں مولر کی تعداد} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ moles}$$

$$\text{ایوگینڈرو نمبر} \times \text{مولر کی تعداد} = \text{پارٹیکلز (مالیکیولز) کی تعداد}$$

$$= 1.5 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

$$= 9.033 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

$$= 2 \text{ atom} \text{ ہائیڈروجن کے ایک مولیکیول میں ایٹمز}$$

$$9.033 \times 10^{23} = 2 \times 9.033 \times 10^{23} \text{ atoms} \text{ ہائیڈروجن کے مالیکیولز میں ایٹمز کی تعداد}$$

$$= 1.8066 \times 10^{24} \text{ atoms}$$

$$3 \text{ گرام ہائیڈروجن میں ایٹمز کی تعداد} = 1.8066 \times 10^{24} \text{ atoms}$$

(ب) 4.3 مول N_2

$$N_2 = 3.4 \text{ moles}$$

$$N_2 = \text{مولز کی تعداد} \times \text{ایووگیڈرو نمبر}$$

$$= 3.4 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

$$= 20.4748 \times 10^{23} \text{ molecules}$$

$$N_2 = 2 \text{ atom}$$

$$N_2 = 2 \times 20.47 \times 10^{23}$$

$$= 40.949 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

$$= 4.0949 \times 10^{24} \text{ atoms}$$

$$N = 4.0949 \times 10^{24} \text{ atoms}$$

(ج) 10 گرام $C_6H_{12}O_6$

$$C_6H_{12}O_6 = 10 \text{ g}$$

$$C_6H_{12}O_6 = (12 \times 6) + (1 \times 12) + (16 \times 6)$$

$$= 180 \text{ g}$$

$$n = \frac{\text{گرامز میں مولر ماس}}{\text{مولر ماس}}$$

$$\text{مولز کی تعداد} = \frac{10}{180} = 0.055 \text{ moles}$$

$$= 0.0555 \times 6.022 \times 10^{23}$$

$$= 0.334221 \times 10^{24}$$

$$C_6H_{12}O_6 = 24 \text{ atoms}$$

$$C_6H_{12}O_6 = 8.02 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

$$C_6H_{12}O_6 = 8.02 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

(Investigative Questions) تحقیقی سوالات

-5

(i) عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک بالغ شخص کو ہائیڈروجن کے لیے گرمیوں میں آٹھ گلاس پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک گلاس میں پانی کا حجم 400 cm^3 ہو تو ایک شخص کو دن میں کتنے مولز پانی درکار ہوگا؟

$$= 8 \text{ ہر روز درکار پانی کے گلاس کی تعداد}$$

جواب:

$$= 400 \text{ cm}^3 \text{ ایک گلاس میں پانی کا حجم}$$

$$= 8 \times 400 = 3200 \text{ cm}^3$$

$$18 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mole}$$

$$1 \text{ cm}^3 \text{ پانی} = \frac{1}{18} \text{ mole} \quad \left[\begin{array}{l} \text{[g = 1 cm}^3 \text{]} \\ \text{(پانی کیلئے)} \end{array} \right]$$


$$3200 \text{ cm}^3 \text{ پانی} = \frac{1}{18} \times 3200$$

$$= 177.77 \text{ moles}$$

$$= 177.77 \text{ moles} = \text{ایک بالغ کو پانی کی ضرورت}$$

(ii) ریت کا کیمیائی فارمولا SiO_2 ہے لیکن ریت پانی کی طرح علیحدہ علیحدہ مالیکیولز کی صورت میں اپنا وجود نہیں رکھتی۔ تو پھر اس کا سٹرکچر دیکھتے ہوئے اس کا فارمولا کیسے بنایا گیا ہے؟

جواب: کچھ کوویلنٹ کپاؤنڈز جیسے کہ آئیونک کپاؤنڈز مالیکیولز کی شکل میں موجود نہیں ہوتے بلکہ وہ ایٹمز کی ترتیب کے نیٹ ورک کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ایسے کوویلنٹ کپاؤنڈز کو امپیریکل فارمولے بھی دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر SiO_2 ایک کوویلنٹ کپاؤنڈ ہے لیکن یہ انفرادی مالیکیولز کے طور پر موجود نہیں ہے بلکہ سلیکون اور آکسیجن کے ایٹمز کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان 1:2 کا سادہ تناسب موجود ہے۔ نیچے ریت کو ایک امپیریکل فارمولا SiO_2 کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔



کثیر الانتخابی معروضی سوالات

☆ درست جواب کا انتخاب کریں۔

1- گلوکوز کا مالیکیولر فارمولا ہے:

(الف) C_6H_6 (ب) CH_2O (ج) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (د) CH

2- کیمیشیم آکسائیڈ کا مالیکیولر فارمولا ہے:

(الف) CO_2 (ب) CaCO_3 (ج) CaO (د) Ca_2O

3- مالیکیول میں موجود تمام ایٹمز اور ان کے ایٹمز کی حقیقی تعداد کو ظاہر کرتا ہے:

(الف) مالیکیولر فارمولا (ب) امپیریکل فارمولا (ج) کیمیکل فارمولا (د) سمپل فارمولا

4- ایلیمنیم نائٹرائیڈ کا فارمولا ہے:

(الف) Al/N (ب) Al_2N_3 (ج) Al_3N_2 (د) Al_3N_2

- 5- ایلیئم آکسائیڈ کا فارمولا ہے: (الف) AlO (ب) Al_2O_3 (ج) Al_3O_2 (د) Al_2O_2
- 6- گلوکوز کا مالیکیولر فارمولا ہے: (الف) CH_2O (ب) CHO_2 (ج) $C_6H_{12}O_6$ (د) CHO
- 7- 6.022×10^{23} کہلاتا ہے: (الف) ایوگیڈرو نمبر (ب) کونسٹنٹ نمبر (ج) امپیریکل نمبر (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 8- ایوگیڈرو نمبر کس نے دریافت کیا؟ (الف) بوہرنے (ب) ردرفورڈ نے (ج) امیڈو ایوگیڈرو نے (د) جابر بن حیان نے
- 9- کسی کمپاؤنڈ نے اٹامک ماس مالیکیولر ماس اور فارمولہ ماس کو گراہ میں ظاہر کرنا کہلاتا ہے: (الف) ایوگیڈرو نمبر (ب) مول (ج) مولر ماس (د) مالیکیولر فارمولا
- 10- ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا امپیریکل فارمولا ہے: (الف) H_2O_2 (ب) H_2O (ج) HO_2 (د) HO
- 11- آئرن کا سہل ہے: (الف) Fe (ب) Ir (ج) In (د) Fl
- 12- بینزین کا مالیکیولر فارمولا ہے: (الف) CH (ب) C_6H_6 (ج) C_2H_2 (د) C_5H_5
- 13- 6.022×10^{23} کہلاتا ہے۔ (الف) ایوگیڈرو نمبر (ب) بوہر نمبر (ج) ردرفورڈ نمبر (د) لیوس نمبر
- 14- بینزین (C_6H_6) کا مولر ماس ہے: (الف) $100g$ (ب) $78g$ (ج) $80g$ (د) $13g$
- 15- کسی بھی شے میں ایوگیڈرو پارٹیکلز کی تعداد کہلاتی ہے: (الف) مول (ب) امپیریکل فارمولا (ج) مالیکیولر فارمولا (د) الف اور ج دونوں
- 16- "CH" کا امپیریکل فارمولا ہے: (الف) پانی (ب) بینزین (ج) ہائیڈروجن پر آکسائیڈ (د) کلورین
- 17- نیکیو چارج شدہ آئنز کو کہتے ہیں: (الف) اینائن (ب) کیٹائن (ج) الف اور ب دونوں (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 18- پازیٹو چارج شدہ آئنز کو کہتے ہیں: (الف) اینائن (ب) کیٹائن (ج) الف اور ب دونوں (د) کمپاؤنڈ
- 19- سمبل اور فارمولہ کے لحاظ سے کیمیائی تبدیلی کی نمائندگی کرنے کا طریقہ کہلاتا ہے: (الف) کیمیکل ایکویشن (ب) کیمیکل کیلویشن (ج) پروڈکٹ (د) ری ایکٹنٹ

- 20- وہ مادے جو کیمیائی تبدیلی کے لیے رد عمل ظاہر کرتے ہیں:
- (الف) ری ایکٹنٹس (ب) پراڈکٹس (ج) کمپائونڈز (د) ایلیمنٹس
- 21- کیمیائی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مادے کہلاتے ہیں:
- (الف) ری ایکٹنٹس (ب) پراڈکٹس (ج) کمپائونڈز (د) ایلیمنٹس
- 22- ایک مول مادے کا ماس کہلاتا ہے:
- (الف) ایوگیڈرو نمبر (ب) مول (ج) مولر ماس (د) ایٹمک ماس
- 23- آکسیجن کا ایک مول مشتمل ہوتا ہے:
- (الف) 6.022×10^{23} ایٹمز (ب) 6.022×10^{23} مالیکیولز (ج) 6.022×10^{23} آئنز (د) 6.022×10^{23} مالیکیولز
- 24- آکسیجن کا ایک مول مشتمل ہوتا ہے:
- (الف) 32g (ب) 16g (ج) 48g (د) 8g
- 25- میگنیشیم ٹائیٹرائیڈ کا فارمولا ہے:
- (الف) Mg_3N_3 (ب) Mg_3N_2 (ج) MgN (د) Mg_2N_2
- 26- ایوگیڈرو نمبر متعارف کروائے:
- (الف) اٹلی کے سائنس دان نے (ب) امریکا کے سائنس دان نے (ج) برطانیہ کے سائنس دان نے (د) پاکستانی سائنس دان نے
- 27- ایوگیڈرو نمبر کو ظاہر کیا جاتا ہے:
- (الف) N_A (ب) N_A (ج) A_v (د) A_N
- 28- سلفیورک ایسڈ کا کیمیائی فارمولا ہے:
- (الف) HNO_3 (ب) HCl (ج) H_2SO_4 (د) SO_4
- 29- ایسٹلین کا کیمیائی فارمولا ہے:
- (الف) C_2H_2 (ب) CH (ج) C_6H_6 (د) C_3H_3
- 30- کیمیاؤں کا ایک مول برابر ہے:
- (الف) 100g کے (ب) 10g کے (ج) 110g کے (د) 80g کے
- 31- آئیونک کمپائونڈز کو ظاہر کیا جاتا ہے:
- (الف) مالیکیولر فارمولا سے (ب) امپیریکل فارمولا سے (ج) کیمیائی فارمولا سے (د) الف اور ب دونوں
- 32- شاؤشیو میٹری مٹی ہے:
- (الف) لاء آف کنزرویشن آف ماس پر (ب) لاء آف ماس ایکشن پر (ج) سائمنٹک لاء پر (د) ڈسٹری بیوٹو لاء پر

- 33- اوزون کا کیمیkal فارمولا ہے: (الف) O_2 (ب) O_4 (ج) O_3 (د) O
- 34- کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کی سادہ عددی نسبت کو ظاہر کرتا ہے: (الف) امپیریکل فارمولا (ب) مالیکیولر فارمولا (ج) کیمیkal فارمولا (د) کنڈرینٹ فارمولا
- 35- نمک کا کیمیkal فارمولا ہے: (الف) $CaCl_2$ (ب) $NaCl$ (ج) $NaBr$ (د) NaI

جوابات

1	ج	2	ج	3	الف	4	الف	5	ب	6	ج	7	الف
8	ج	9	ب	10	د	11	الف	12	ب	13	الف	14	ب
15	الف	16	ب	17	الف	18	ب	19	الف	20	الف	21	ب
22	ج	23	ب	24	الف	25	ب	26	الف	27	ب	28	ج
29	الف	30	الف	31	ب	32	الف	33	ج	34	الف	35	ب

کثیر الانتخابی مختصر سوالات

مختصر جواب دیں۔

1- مندرجہ ذیل کیمیkal ایکویشن کو بیلنس کریں۔ $Al + O \longrightarrow Al_2O_3$

جواب: $Al + O \longrightarrow Al_2O_3$ غیر متوازن مساوات

$4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3$ متوازن مساوات

2- استحال الکلول C_2H_5OH کا مولر ماس معلوم کریں۔

جواب: $C_2H_5OH = (12 \times 2) + (1 \times 6) + (16 \times 1)$ کا مولر ماس
 $= 24 + 6 + 16 = 46g$

3- پانی H_2O کے ایک گرام میں کتنے ایٹمز موجود ہوتے ہیں؟

جواب:

$1g =$ گرامز میں پانی کا ماس

$H_2O = (1 \times 2) + (16 \times 1) = 18g$ پانی کا مولر ماس

پانی کے مولز کی تعداد = $\frac{\text{گرامز میں ماس}}{\text{مولر ماس}}$

مولز = $\frac{1}{18} = 0.055 = 0.055$

ایوگنڈرؤز نمبر $\times$ مولز کی تعداد = مالیکیولز کی تعداد

$= 0.055 \times 6.022 \times 10^{23}$ مالیکیولز

$= 0.03345 \times 10^{23}$

3 = پانی کے ایک مالیکیول میں ایٹمز

$$0.03345 \times 10^{23} \text{ مالیکیولز میں پانی کے ایٹمز} = 0.03345 \times 10^{23} \times 3 = 1.0036 \times 10^{23} \text{ ایٹمز}$$

4- لاء آف کنزرویشن آف ماس کی تعریف لکھیں۔

جواب: کیمیکل ری ایکشن کے دوران مادہ نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی تباہ کیا جاسکتا ہے۔

5- امپیریکل فارمولا سے کیا مراد ہے؟

جواب: کیمیکل فارمولا کی سادہ ترین شکل امپیریکل فارمولا کہلاتی ہے۔ یہ ایک کمپاؤنڈ میں موجود ایٹمز کی سادہ عددی نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔

6- مالیکیولر فارمولا اور امپیریکل فارمولا کے درمیان تعلق لکھیں۔


جواب: مالیکیولر فارمولا کو امپیریکل فارمولا سے درج ذیل تعلق کے ذریعے اخذ کیا جاتا ہے۔

$$n = \text{مالیکیولر فارمولا} / \text{امپیریکل فارمولا}$$

$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا}}$$

7- کیمیکل ایکیویشن کی تعریف لکھیں اور ایک مثال دیں۔

جواب: کیمیکل ایکیویشن: علامتوں اور فارمولوں کے جالے سے کیمیائی تبدیلی کو ظاہر کرنے کا طریقہ کیمیکل ایکیویشن کہلاتا ہے۔



8- پانی کے دو مولز کا ماس معلوم کریں۔

جواب: $(1 \times 2) + (16 \times 1) = 18 \text{ g}$ ایک مول پانی کا ماس

$$2 \times 18 = 36 \text{ g}$$

9- سٹائیو میٹری سے کیا مراد ہے؟

جواب: سٹائیو میٹری کیمیا کی اہم برانچ ہے جس میں ہم کیمیکل ایکیویشنز کی مدد سے ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کی مقداروں کا حساب لگاتے ہیں۔

10- ایو گیڈرو ز نمبر سے کیا مراد ہے؟

جواب: ایو گیڈرو ز نمبر سے مراد پارٹیکلز یعنی ایٹمز، مالیکیولز یا فارمولائیونٹس کی عددی تعداد 6.022×10^{23} ہے جو کسی شے کے ایک مول میں موجود ہوتے ہیں۔

مثال: پانی کا ایک مول 6.022×10^{23} مالیکیولز

11- H_2SO_4 25g میں مولز کی تعداد معلوم کریں۔

$$\text{H}_2\text{SO}_4 = 25 \text{ g}$$

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ کا مولر ماس} = (1 \times 2) + (32 \times 1) + (16 \times 4)$$


$$= 98 \text{ g}$$

$$\text{پانی کے مولز کی تعداد} = \frac{\text{گرامز میں ماس}}{\text{مولر ماس}}$$

$$\frac{25}{98} = 0.255 = 0.255$$

25 گرام H_2SO_4 میں مولز کی تعداد

12- ایسٹک ایسڈ کے سٹرکچرل فارمولا سے مالکیولر فارمولا اخذ کریں۔



جواب: C ایٹمز کی تعداد: 2

O ایٹمز کی تعداد: 4

H ایٹمز کی تعداد: 4

ایسٹک ایسڈ کا مالکیولر فارمولا: $C_2H_4O_2$

13- ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا امپیریکل فارمولا HO ہے اور مولر ماس 34 ہے۔ اس کا مالکیولر فارمولا معلوم کریں۔

جواب: $1 + 16 = 17$ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا امپیریکل فارمولا

$34 =$ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا مولر ماس

$HO = 34$ کا امپیریکل فارمولا

$$n = \frac{34}{17} = 2$$

$$n = \frac{\text{مولر ماس}}{\text{امپیریکل فارمولا ماس}}$$

(امپیریکل فارمولا) $n =$ مالکیولر فارمولا

$= 2(HO)$

$= H_2O_2$

$H_2O_2 =$ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا مالکیولر فارمولا

14- شائو شیو میٹری صنعت میں کسی طرح کا دھماکا ہے؟

جواب: شائو شیو میٹری کو صنعتوں میں پراؤٹکس کی مطلوبہ مقدار حاصل کرنے کے لیے اور درکار خام مال کی مقدار معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

15- امپیریکل فارمولا سے ہم مالکیولر فارمولا کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟

جواب: امپیریکل فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی کمپاؤنڈ مالکیولر فارمولا معلوم کر سکتے ہیں، اگر ہمیں "n" کی ویلیو معلوم ہو۔

امپیریکل فارمولا $n =$ مالکیولر فارمولا

16- این- پروپائل الکوئل کا سٹرکچرل فارمولا $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ ہے اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔

جواب: $\text{C} = 3$ ایٹمز کی تعداد

$\text{H} = 8$ ہائیڈروجن ایٹمز کی تعداد

$\text{O} = 1$ آکسیجن ایٹمز کی تعداد

$\text{C}_3\text{H}_8\text{O} = \text{این- پروپائل الکوئل کا مالیکیولر فارمولا}$

17- مول کی تعریف لکھیں اور ایک مثال دیں۔

جواب: مول: جب اٹاک ماس، مالیکیولر ماس اور فارمولا ماس کو گرامز میں ظاہر کیا جائے تو اسے مول کہتے ہیں۔

مثلاً: $32 \text{ g} = 16 \times 2 = \text{آکسیجن مالیکیول (O}_2\text{) کا ایک مول}$

18- مالیکیولر ماس سے کیا مراد ہے؟

جواب: مالیکیولر ماس: کسی مالیکیول میں موجود تمام ایٹمز کے اٹاک ماس کو جمع کرنے پر مالیکیولر ماس حاصل ہوتا ہے۔

مثلاً: نائٹرک ایسڈ HNO_3 کا مالیکیولر ماس 63 amu ہے۔

19- SiO_2 کا مولر ماس کیلکولیٹ کریں۔

جواب: SiO_2 کا مولر ماس $= (28 \times 1) + (16 \times 2) = 28 + 32 = 60 \text{ g}$

20- مالیکیولر فارمولا سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دیں۔

جواب: مالیکیولر فارمولا: مالیکیولر فارمولا ایک مالیکیول میں موجود تمام ایٹمز اور ان کے ایٹمز کی حقیقی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔

مثالیں: سلفیورک ایسڈ کا مالیکیولر فارمولا H_2SO_4

گلوکوز کا مالیکیولر فارمولا $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

21- مندرجہ ذیل کمپاؤنڈز کے کیمیکل فارمولا لکھیں۔

(i) کیشیم کلورائیڈ (ii) زنک آکسائیڈ

جواب: (i) کیشیم کلورائیڈ CaCl_2

(ii) زنک آکسائیڈ ZnO

22- سلفیورک ایسڈ کے سٹرکچرل فارمولا سے مالیکیولر فارمولا لکھیں۔



جواب: ہائیڈروجن ایٹمز کی تعداد $2 =$

سلفر ایٹمز کی تعداد $1 =$

آکسیجن ایٹمز کی تعداد $4 =$

سلفیورک ایسڈ کا مالیکیولر فارمولا H_2SO_4