

باب 2 کائناتی میکانکس (Kinematics)

سوال نمبر 1: میکانکس سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام کو مختصر بیان کریں۔
جواب: میکانکس: میکانکس، فزکس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں اجسام کی حرکت اور اس حرکت کو جنم دینے والی فورس (Force) کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر میکانکس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(i) کائناتی میکانکس (Kinematics) (ii) ڈائنامکس (Dynamics)

(i) کائناتی میکانکس: کائناتی میکانکس، فورس کے حوالے کے بغیر اجسام کی حرکت کے مطالعہ کا نام ہے۔ جب کہ ڈائنامکس، فورسز اور اجسام کی حرکت پر فورسز کے اثرات کے مطالعے کا علم ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم بہت سے حرکت کرتے ہوئے اجسام کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً سڑکوں پر دوڑتی ہوئی کاریں۔ بسیں، سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز، نہروں میں بہتا ہوا پانی اور میز پر سے زمین پر گرتی ہوئی کچھ اشیا۔
(ii) ڈائنامکس: ڈائنامکس ان اجسام کی حرکت کے مطالعہ کا نام ہے جو بلحاظ یا بالفاظ اس فورس پر منحصر ہے جو ان میں حرکت پیدا کرتی ہے یا ان کی حرکت کو

تبدیل کرتی ہے۔
سوال نمبر 2: سکیلر اور ویکٹر مقداروں کے مابین فرق بیان کریں۔

جواب:	سکیلر مقداریں	ویکٹر مقداریں
تعریف: سکیلر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جو صرف اس کی عددی مقدار کے ذریعے مکمل طور پر بیان کی جاسکتی ہے۔	تعریف: ویکٹر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اس کی عددی مقدار کے ساتھ ساتھ اس کی سمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔	
مثالیں: ماس، فاصلہ، لمبائی، وقت، سپیڈ، انرجی، ٹمپریچر وغیرہ	مثالیں: ویکٹر مقداروں کی مثالیں ڈس پلیسمنٹ، ولائیٹی، ایکسلریشن، وزن اور فورس ہیں۔	
سکیلر مقداروں کو عام اعداد کی طرح جمع کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر: 8 میٹر = 3 میٹر + 5 میٹر	ویکٹر مقداروں کو سکیلر مقداروں کی طرح جمع نہیں کیا جاسکتا۔ ویکٹر کو جمع کرنے کے خاص طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں ویکٹر کی سمتوں کو بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔	
عددی مقدار میں ایک عدد اور اس کا مناسب یونٹ شامل ہوتا ہے۔	سمت کے بغیر کسی ویکٹر کو بیان کرنا بے معنی ہوگا مثال کے طور پر کسی ریفرینس پوائنٹ یا حوالہ کی جگہ سے کسی مقام کا فاصلہ اس مقام کی نشاندہی کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ اس مقام کا ریفرینس پوائنٹ سمت کا علم بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔	

مثلاً 5 سیکنڈ، 3 کلوگرام

سوال نمبر 3: ویکٹر کے اظہار کی وضاحت کریں۔

یا ویکٹر کے اظہار کے طریقوں کی وضاحت کریں۔

جواب: ویکٹر کو ظاہر کرنے کا طریقہ (Representation of Vectors)

1- ویکٹر کو سیدھے جلی حروف سے ظاہر کرتا: ویکٹر کو سیدھے جلی حروف (Bold-face letters) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ v, F, A وغیرہ۔ چونکہ ہم کاغذ پر جلی حروف میں نہیں لکھ سکتے لہذا ویکٹر کو لکھنے کے لیے حرف (Letter) کے اوپر ایک چھوٹا سا تیر کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا


کہ $\vec{d}$ اور $\vec{v}$ ، $\vec{F}$ ، $\vec{A}$ اور $\vec{a}$ ویکٹر کی عددی قیمت ظاہر کرنے کے لیے حرف کو ایٹلک (Italic) لکھا جاتا ہے اور اس پر تیر کا نشان نہیں بنایا جاتا۔

2- ویکٹرز کو اشکال کے ذریعے ظاہر کرنا: اشکال کے ذریعے (Graphically) ویکٹر کو


ایک سیدھی لائن سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کے ایک سرے پر تیر کا نشان بنایا جاتا ہے۔ لائن کی

لمبائی ایک مناسب سکیل کے مطابق ویکٹر مقدار کی عددی قیمت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ تیر کی سمت

ویکٹر کی سمت بتاتی ہے۔



ویکٹر $\vec{v}$ مشرق سے شمال کی طرف θ زاویہ بناتے ہوئے شکل (a)




ویکٹر $\vec{F}$ ، $\vec{x}$ ایکسر کے ساتھ 30° کا زاویہ

بناتے ہوئے شکل (b)

ویکٹر کا گرافیکل اظہار: ”ویکٹر کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی لائن نقطہ آغاز سے مطلوبہ سمت کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ عموماً سمت کے لیے لائن کا $\vec{x}$ ایکسر

کے ساتھ زاویہ θ (تھیلٹا) بنایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ $\vec{x}$ ایکسر کی دائیں طرف سے گھڑی مخالف (Anticlockwise) سمت میں ماپا جاتا ہے۔“



شکل (a)

سوال نمبر 4: ہیڈ ٹیل طریقہ استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز کو جمع کر

کے حاصل ویکٹر معلوم کر سکتے ہیں؟

جواب: حاصل ویکٹر: ہم دو یا دو سے زیادہ ویکٹرز کو جمع کر کے ایک ویکٹر حاصل کر سکتے ہیں، یہ

حاصل ویکٹر کہلاتا ہے۔ اس کا وہی اثر ہوتا ہے جو جمع کیے جانے والے تمام ویکٹرز کا مجموعی اثر ہوگا۔

ہمیں حاصل ویکٹر کی عددی قیمت اور سمت دونوں معلوم کرنا ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ سکیلز کی جمع سے

بالکل مختلف ہے۔ ویکٹرز کو جمع کرنے کے ایک طریقہ کو شکل کے ذریعے اظہار گرافیکل

(Graphical) کا طریقہ کیا جاتا ہے۔


شکل کے ذریعے ویکٹرز کی جمع کا طریقہ: آئیے دو ویکٹرز $\vec{v}$ اور $\vec{u}$ کو جمع کریں جن کی عددی

قیمتیں 300N اور 400N ہیں اور وہ $\vec{x}$ ایکسر کے ساتھ بالترتیب 30° اور 60° کے زاویے بناتے ہیں۔ ایک مناسب سکیل منتخب کر کے یعنی 100

$N = 1cm$ ہم ویکٹرز بنا سکتے ہیں جیسا کہ شکل (a) میں دکھایا گیا ہے۔

ان ویکٹرز کو جمع کرنے کے لیے ہم ایک اصول پر عمل درآمد کرتے ہیں جو ہیڈ ٹیل رول (Head-to-tail Rule) کہلاتا ہے اسے

الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔



شکل (b)

ہیڈ ٹو ٹیل رول: ”ببت سے ویکٹر جمع کرنے کے لیے ان کی تہا سندھ ولائیں اس طرح کھینچیں کہ ایک ویکٹر کا ہیڈ دوسرے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ جوے۔ اس کا حاصل ویکٹر ایک ایسا ویکٹر ہوگا جو کہ پہلے ویکٹر کی ٹیل سے شروع ہو کر آخری ویکٹر کے ہیڈ تک جائے گا۔“

وضاحت: حاصل ویکٹر v کو شکل (b) میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی کی پیمائش 6.8 cm ہے۔ منتخب کی گئی سکیل کے مطابق حاصل جمع ویکٹر کی عددی قیمت 680N ہوگی اور اس کی سمت x ۔ ایکسر کے ساتھ (پیمائش کیا گیا) 49° کا زاویہ ہے۔

نوٹ: ”ہم دو سے زیادہ ویکٹر کا حاصل ویکٹر بھی اسی طریقے سے ان کو ہیڈ ٹو۔ ٹیل رول کے مطابق جمع کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔“

سوال نمبر 5: مثالوں کی مدد سے ریٹ اور موئن کی تعریف کریں وضاحت کریں کہ کسی جسم کی ریٹ کی حالت یا حرکت کی حالت مشاہدہ کرنے والے کے لحاظ سے ہے۔

جواب: ریٹ (Rest): اگر کوئی شے اپنے ارد گرد کے حوالے سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی تو یہ ریٹ کی حالت میں کہلاتی ہے۔



شکل (a)

مثال: جب ہم اپنے ارد گرد کو نظر دہڑاتے ہیں تو ہم سب سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتیں۔ مثلاً عمارتیں، درخت، بجلی کے کھمبے وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ریٹ کی حالت میں ہیں۔

وضاحت: فرض کریں کہ ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر کھڑا ہے (شکل a)۔ کوئی شخص (Observer) اسے دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی اشیاء مثلاً قریبی عمارت، درخت یا کھمبے کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا تو وہ شخص کہے گا کہ موٹر سائیکل سوار ریٹ کی حالت میں ہے۔



شکل (a)

موئن (Motion): اگر کوئی شے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہو تو اسے موئن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔

مثالیں: جب سوار موٹر سائیکل چلا رہا ہو (شکل b) تو مشاہدہ کرنے والا شخص دیکھے گا کہ موٹر سائیکل سوار اپنے ارد گرد کی اشیاء کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ تب وہ شخص کہے گا کہ موٹر سائیکل سوار موئن (حرکت) کی حالت میں ہے۔

وضاحت: کوئی شخص (Observer) ریٹ اور موئن کی حالت مشاہدہ کرنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر چلتی ہوئی ٹرین کے ایک ذریعے میں کھڑا شخص دوسرے مسافروں کے لحاظ سے ریٹ کی حالت میں ہے لیکن ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر کھڑے کسی مشاہدہ کرنے والے شخص کے لحاظ سے وہ موئن کی حالت میں ہے۔

سوال نمبر 6: موئن کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی مثالوں کی مدد سے وضاحت کریں۔

یا مثالوں کی مدد سے موئن کی اقسام کی وضاحت کریں۔

جواب: موئن کی اقسام: عام طور پر اجسام کی موئن کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے



ٹرانسلیری موشن

روٹیٹری موشن

(ii)

واہیریٹری موشن

(i)

(iii)

(i) ٹرانسلیری موشن (Translatory Motion): اگر کسی جسم کی موشن اس طرح ہو کہ اس کا ہر ذرہ بالکل ایک جیسی حرکت کرے تو وہ ٹرانسلیری موشن کہلاتی ہے۔

مثال: مثال کے طور پر ایک ریل گاڑی یا کار کی موشن ٹرانسلیری موشن ہے۔

(ii) روٹیٹری موشن: اگر کسی جسم کا ہر ذرہ ایک نقطہ یا ایک سر کے گرد گھمے تو اس جسم کی موشن روٹیٹری موشن کہلاتی ہے۔



پچھے کی روٹیٹری موشن



واہیریٹری موشن

مثالیں: (a) مثال کے طور پر الیکٹرک مشین یا واشنگ مشین ڈرائر کی موشن روٹیٹری موشن ہے۔

(b) لٹو کی موشن بھی روٹیٹری موشن ہے۔

(iii) واہیریٹری موشن: اگر کوئی جسم اپنی ریٹ پوزیشن کے آگے پیچھے اپنی حرکت کو بار بار دہرائے تو ایسی حرکت واہیریٹری موشن کہلاتی ہے۔

مثلاً چلڈرن پارک کے کسی جھوٹے لڑکے کی حرکت واہیریٹری موشن کہلاتی ہے۔

سوال نمبر 7: ٹرانسلیری موشن کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کی وضاحت کریں۔

جواب: ٹرانسلیری موشن تین طرح کی ہو سکتی ہے۔

(i) لی نیئر موشن: اگر کوئی جسم سیدھی لائن میں حرکت کرے تو اسے لی نیئر موشن کہتے ہیں۔

مثال: لی نیئر موشن کی مثال آزادانہ گرتا ہوا جسم ہے۔

(ii) ریٹڈم موشن: اگر کوئی جسم بے ترتیب انداز میں حرکت کرے تو اسے ریٹڈم موشن کہتے ہیں۔

مثال: شہد کی مکھی کی اڑان۔



(iii) سرکلر موشن: کوئی جسم دائرے میں حرکت کرے تو اسے سرکلر موشن کہتے ہیں۔

مثالیں: (i) اگر کسی ڈوری کے ایک سرے پر بندھے گیند کو گھمائیں تو وہ ایک دائرے میں حرکت کرے گا۔

(b) فیرس ویل (Ferris Wheel) کی حرکت بھی سرکلر موشن ہے۔



شکل (a): بے ترتیب راستہ شکل (b)




سرکلر موشن

سوال نمبر 8: فاصلہ اور ویس پلیسمنٹ میں فرق بیان کریں۔

جواب:	فاصلہ	ویس پلیسمنٹ
(i) فاصلہ اصل میں طے کیے گئے راستے کی لمبائی ہے۔	(i) ویس پلیسمنٹ جسم کی حرکت کے دوران ابتدائی پوزیشن سے آخری پوزیشن تک کے سیدھے فاصلے کی لمبائی ہے۔	
(ii) اسے معلوم کرنے کے لیے دیا گیا فارمولا استعمال کرتے ہیں۔	(ii) اسے معلوم کرنے کے لیے دیا گیا فارمولا استعمال کرتے ہیں۔	
	$S = v \times t$	$d = v \times t$

(iii) یہ ایک سکیلر مقدار ہے کیونکہ اسے ظاہر کرنے کے لیے صرف عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔	(iii) یہ ایک ویکٹر مقدار ہے کیونکہ اسے ظاہر کرنے کے لیے عددی قیمت کے ساتھ سمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
(iv) اس کا یونٹ میٹر (m) ہے۔	(iv) اس کا یونٹ میٹر (m) ہوتا ہے۔
مثال: فرض کریں ایک شخص کار کے ذریعے لاہور سے ملتان کے لیے سفر کر رہا ہے۔ ملتان پہنچ کر وہ میٹر کی ریڈنگ دیکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ اُس نے 320 کلومیٹر فاصلہ طے کیا ہے۔ یہ اس شخص کا اصل میں طے کردہ فاصلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لاہور سے ملتان تک کا کم سے کم فاصلہ نہیں ہے کیونکہ راستے میں کار نے کئی موڑ مڑے ہیں۔ اُس نے ایک سیدھی لائن میں سفر طے نہیں کیا ہے۔	مثال: فرض کریں ایک کار پورٹیشن A سے B تک سفر کرتی ہے۔ منحنی لائن AB کی فاصلہ منحنی لائن AB کی لمبائی کے برابر ہے۔ ڈس پلیسمنٹ (d) سے لے کر B تک سیدھی لائن AB ہے جس کے سرے پر تیر کا نشان بنایا گیا ہے۔



سوال نمبر 9: سپیڈ کی تعریف کریں۔ مثالیں دیں۔ اس کا فارمولا اور یونٹ بھی لکھیں۔

جواب: سپیڈ: اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ کہلاتا ہے۔ اکائی وقت ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ ایک دن اور ایک سال بھی ہو سکتا ہے۔

مثالیں: چیتا 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے دوڑتا ہے۔

سیل فاش بھی 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے تیرتی ہے۔

فارمولا: سپیڈ کو مندرجہ ذیل فارمولا سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{سپیڈ} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{وقت}}$$

$$v = \frac{S}{t}$$

$$S = vt$$

سپیڈ ایک سکیلر مقدار ہے کیونکہ اس کے اظہار کے لیے صرف عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔

یونٹ: سپیڈ کا SI یونٹ ms^{-1} یا kmh^{-1} ہے۔

لمحاتی سپیڈ اور اوسط سپیڈ (Instantaneous Speed and Average Speed): یقیناً کسی گاڑی کی سپیڈ تمام سفر کے دوران میں یکساں

(constant) نہیں رہتی۔ اگر سپیڈ میٹر کی ریڈنگ دیکھتے ہیں تو یہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے۔ کسی بھی لمحے کسی گاڑی کی سپیڈ جو اس کا سپیڈ میٹر ظاہر کرتا ہے،

اس کی لمحاتی سپیڈ (Instantaneous Speed) کہلاتی ہے۔ عملی طور پر ہم اوسط سپیڈ ہی استعمال کرتے ہیں، جس کی تعریف یوں ہے:

$$v_{av} = \frac{S}{t} \quad \text{یا} \quad \text{اوسط سپیڈ} = \frac{\text{کل طے کردہ فاصلہ}}{\text{کل وقت}}$$

سوال نمبر 10: ویری اسبل سپیڈ اور یونیفارم سپیڈ کی تعریف کریں مثالیں بھی دیں۔

جواب: ویری اسبل سپیڈ: ایک جسم ویری اسبل سپیڈ سے حرکت کرتا ہے۔ اگر وقت کے مساوی وقفوں میں اس کا طے کردہ فاصلہ غیر مساوی ہو۔ خواہ یہ

وقت کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں۔
 مثال: فرض کیا ایک جسم 2 کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں گزرتا ہے اور وہ دوبارہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں گزرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ جسم مساوی فاصلہ وقت کے غیر مساوی وقفوں میں طے کرتا ہے لہذا اس کی سپیڈ ویری ایبل ہے۔
 یونیفارم سپیڈ: ایک جسم یونیفارم سپیڈ سے حرکت کرتا ہے اگر وہ وقت کے مساوی وقفوں میں مساوی فاصلہ طے کرے خواہ وہ وقفے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں۔

مثال: فرض کیا ایک جسم 2 کلومیٹر کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے کرتا ہے اور مزید 2 کلومیٹر کا فاصلہ بھی آدھے گھنٹے میں طے کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جسم مساوی فاصلہ وقت کے مساوی وقفوں میں طے کرتا ہے لہذا اس کی سپیڈ یونیفارم ہوتی ہے۔
 سوال نمبر 11: ولاسٹی کی تعریف کریں۔ مختصر اوضاحت کریں۔ اس کا فارمولہ اور یونٹ لکھیں۔
 جواب: ولاسٹی: کسی جسم کی ایک یونٹ ٹائم (ایک سیکنڈ) میں کل ڈس پلیسمنٹ کو ولاسٹی کہتے ہیں۔

وضاحت: اگر کوئی جسم کسی منحنی راستے کے ذریعے نقطہ A سے نقطہ B تک جاتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے تو اس کی کل ڈس پلیسمنٹ d سیدھی لائن AB ہے۔



$$\text{فارمولا: } v = \frac{d}{t} \quad \text{ڈس پلیسمنٹ} \quad \text{اوسط ولاسٹی} \quad \text{کل وقت}$$

ویکٹر مقدار: ولاسٹی v ایک ویکٹر مقدار ہے۔ مساوات 1 ظاہر کرتی ہے کہ ولاسٹی کی سمت وہی ہوگی جو کہ ڈس پلیسمنٹ d کی ہے۔

یونٹ: ولاسٹی SI یونٹ ms^{-1} یا kmh^{-1} ہے۔

مثال: ایک کار کی مثال لے لیں جو کہ 70 km h^{-1} کی سمت کی طرف جا رہی ہے۔ سپیڈ اور ولاسٹی میں فرق واضح کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ کار کی سپیڈ جو کہ 70 km h^{-1} ہے۔ جو کہ سکیلر مقدار ہے۔ کار کی ولاسٹی ویکٹر مقدار ہے جس کی عددی قیمت 70 km h^{-1} ہے اور اس کی سمت شمال کی طرف ہے۔

سوال نمبر 12: یکساں اور غیر یکساں ولاسٹی کی وضاحت کریں۔

جواب: یکساں ولاسٹی: اگر متحرک جسم کی سپیڈ اور سمت تبدیل نہ ہو تو اس کی ولاسٹی یکساں ولاسٹی کہلاتی ہے۔

مثال: یکساں ولاسٹی سے حرکت کرنے والے جسم کی ایک اچھی مثال چھاتہ بردار (Paratrooper) کی نیچے کی طرف موشن ہے۔ جب ایک چھاتہ بردار ہوائی جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ چند لمحے آزادانہ نیچے گرتا ہے۔ تب پیراشوٹ کھل جاتا ہے۔ اس مرحلے میں چھاتہ بردار پر نیچے کی طرف عمل کرنے والی فورس آف گریوٹی (Force of Gravity) کو چھاتہ بردار پر لگنے والی اوپر کی طرف ہوا کی مزاحمت متوازن کر دیتی ہے۔ نتیجتاً چھاتہ بردار یکساں ولاسٹی کے ساتھ نیچے گرتا ہے۔

غیر یکساں ولاسٹی: اگر کسی متحرک جسم کی سپیڈ یا سمت یا دونوں میں تبدیلی ہو تو اس کی ولاسٹی متغیر یا غیر یکساں ولاسٹی کہتے ہیں۔

مثال: عملی طور پر کوئی گاڑی اپنے تمام سفر کے دوران سیدھی لائن میں نہیں چلتی۔ اس کی سپیڈ اور سمت بدلتی رہتی ہے۔

سوال نمبر 13: ایکسلریشن کی تعریف کریں۔ ایک مثال دیں۔ اس کا فارمولہ اور یونٹ لکھیں۔

جواب: ایکسلریشن: وقت کے ساتھ کسی جسم کی ولاسٹی میں تبدیلی کی شرح کو ایکسلریشن کہتے ہیں۔


وضاحت: ولاسٹی میں یہ تبدیلی اس کی عددی قیمت یا سمت یا پھر دونوں میں ہے۔ جب کسی شے کی ولاسٹی بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شے ایکسلریشن

کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہے۔
جب کسی شے کی ولاسٹی کم ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شے ولاسٹی اور ایکسلریشن کے مخالف حرکت کر رہی ہے۔
فارمولا: ایکسلریشن کو مندرجہ ذیل فارمولے کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{ولاسٹی میں تبدیلی} = \frac{\text{ایکسلریشن}}{\text{وقت}}$$

$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$



یونٹ: ایکسلریشن SI یونٹ میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ (ms^{-2}) ہے۔
ویکٹر مقدار: ولاسٹی کی طرح ایکسلریشن بھی ایک ویکٹر مقدار ہے۔

سوال نمبر 14: یکساں ایکسلریشن اور غیر یکساں ایکسلریشن کی وضاحت کریں۔ نیز مثبت ایکسلریشن اور منفی ایکسلریشن کی تعریف کریں۔
جواب: یکساں ایکسلریشن: اگر وقت کے برابر وقفوں میں ولاسٹی میں تبدیلی ایک ہی جتنی ہو تو اس صورت میں ایکسلریشن کو یکساں ایکسلریشن کہتے ہیں۔
غیر یکساں ایکسلریشن: اگر وقت کے برابر وقفوں میں ولاسٹی میں تبدیلی یکساں نہ ہو تو اس صورت میں ایکسلریشن کو غیر یکساں ایکسلریشن کہتے ہیں۔
وضاحت: ولاسٹی میں یہ تبدیلی مدتی قیمت یا اسٹاپ پوائنٹ میں ہو سکتی ہے۔

اگر ایکسلریشن 'a' یکساں ہو تو مساوات یوں ہوگی۔
 $v_f = v_i + at$
مثبت ایکسلریشن: اگر ولاسٹی بڑھ رہی ہو ایکسلریشن مثبت ہوگا۔ مثبت ایکسلریشن کی سمت وہی ہوتی ہے جس سمت میں جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے۔
منفی ایکسلریشن: اگر ولاسٹی کم ہو رہی ہو تو ایکسلریشن منفی ہوگا۔ منفی ایکسلریشن، ڈی سیلریشن (Deceleration) یا ریٹارڈیشن (Retardation) بھی کہلاتا ہے۔ منفی ایکسلریشن کی سمت مخالف ہوتی ہے جس سمت میں جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے۔
سوال نمبر 15: مندرجہ ذیل کی تعریف کریں۔

- | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| (i) گراف | (ii) ویری ایبلز | (iii) منحصر متغیر مقدار |
| (iv) غیر منحصر متغیر مقدار | (v) ایکسز | (vi) آغاز نقطہ |

جواب: (i) گراف (Graph): گراف دو طبعی مقداروں کے تعلق کو تصویر کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ عموماً سیدھی یا گولائی والی لائن کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم ایک ایسے کاغذ پر گراف کھینچتے ہیں جس پر برابر فاصلے سے افقی اور عمودی لائنیں کھینچی ہوتی ہیں۔ گراف پیپر پر عموماً ہر دسویں لائن موٹی ہوتی ہے۔


(ii) ویری ایبلز (Variables): وہ مقداریں جن کے مابین گراف بنایا جاتا ہے ویری ایبلز کہلاتی ہیں۔

اقسام: ویری ایبلز دو اقسام میں ہیں۔ (a) منحصر متغیر مقدار (b) غیر منحصر متغیر مقدار

(iii) منحصر متغیر مقدار (Dependent Variables): وہ مقدار جو لا-ایکسز کے ساتھ لی جاتی ہیں منحصر متغیر مقدار ہوتی ہیں۔

(iv) غیر منحصر متغیر مقدار (Independent Variable): وہ مقدار جو x-ایکسز کے ساتھ لی جاتی ہیں غیر منحصر متغیر مقدار کہلاتی ہیں۔

مثال: مثال کے طور پر فاصلہ۔ وقت کے گراف (Distance Time Graph) میں t غیر منحصر اور S اُس پر منحصر متغیر مقدار ہے۔ اس لیے t کو x-ایکسز کے ساتھ اور S کو y-ایکسز کے ساتھ لیا جائے گا۔



(v) ایکسز (Axes): گراف بنانے کے لیے ایک دوسرے پر عموداً دو موٹی لائنیں 'xox' اور 'yoy' منتخب کر لی جاتی ہیں۔ ان کو ایکسز (Axes) کہا جاتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

(vi) نقطہ آغاز (Origin): جہاں یہ دو ایکسز ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس نقطے کو نقطہ آغاز "O" (origin) کہتے ہیں۔

x-ایکسز کے ساتھ مثبت قیمتیں نقطہ آغاز کے دائیں طرف لی جاتی ہیں جبکہ منفی قیمتیں بائیں طرف لی جاتی ہیں۔

اسی طرح y-ایکسز کے ساتھ مثبت قیمتیں نقطہ آغاز سے اوپر کی طرف اور منفی قیمتیں نیچے کی طرف لے جاتی ہیں۔

سوال نمبر 16: (الف) فاصلہ اور وقت کے مابین گراف کیسے بنایا جاتا ہے؟ اسے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

(ب) فاصلہ اور وقت کے مابین گراف بنائیں جب:

(i) جسم یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہو۔ جب جسم ایکسزیشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔


(ii) جسم متغی ایکسزیشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔ جب جسم ریسٹ کی حالت میں ہو۔

جواب: (الف) فاصلہ اور وقت کے مابین گراف: فاصلہ اور وقت کے مابین گراف، حرکت کرنے والے جسم کا طے کردہ فاصلہ S اور صرف شدہ وقت t میں تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔

(ب) (i) جب جسم یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہو: مثلاً موٹر وے پر ایک کار سیدھی لائن میں چل رہی ہے۔ فاصلہ S (km) اس کے آغاز سے ہر ایک منٹ کے بعد جسم اس کا طے کردہ فاصلہ نوٹ کرتے ہیں اور اسے نیچے دیے گئے ٹیبل میں درج کرتے ہیں۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
فاصلہ S (km)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0

سینٹی میٹر والے گراف پیپر پر گراف بنانے کے لیے درج ذیل ترتیب پر عمل کریں۔



1- وقت 't' ایکسز کے ساتھ لیں اور فاصلہ 'S' y-ایکسز کے ساتھ لیں۔

2- مناسب سکیل منتخب کریں۔ (1 منٹ = 1 cm) x-ایکسز کے ساتھ اور

y-ایکسز کے ساتھ (1.2 km = 1 cm)۔

3- سکیل کے مطابق ہرے خانوں (Divisions) کے بالمقابل x-ایکسز اور y-ایکسز پر قیمتیں درج کریں۔

4- وقت اور فاصلہ کے متعلقہ جوڑوں کو ایک نقطے کی شکل میں گراف پیپر پر ظاہر کریں۔


5- تمام نقاط کو سیدھی لائن کھینچیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

ٹیبل کے مشاہدہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کار نے وقت کے برابر وقفوں میں برابر فاصلے طے کیے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کار یکساں سپیڈ سے چل رہی ہے۔ لہذا وقت اور فاصلہ کے مابین سیدھی لائن کی شکل کا گراف یکساں سپیڈ سے حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔

(ii) جب جسم ایکسپریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: اب کار کے ایک اور سفر کو زیر غور لائیں جو نیچے نیبل میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
فاصلہ S (km)	0	2.40	0.960	2.160	3.840	6.000


نیبل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وقت کے برابر وقفوں میں سپیڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔۔۔ شکل میں پلائے گئے گراف سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔
گراف کی لائن اوپر کی طرف کھڑکی جا رہی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جب جسم (کار) ایکسپریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔



(iii) جب جسم منفی ایکسپریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: ایک اور سفر دیکھیں۔ اس سفر کے مشاہدات نیچے نیبل میں درج ہیں۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
فاصلہ S (km)	0	2.0	3.1	4.0	4.6	5.0


گراف لائن نیچے کی طرف مڑتی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر دفعہ اتنے ہی وقفہ میں طے کردہ فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ ڈی سیلریشن یا منفی ایکسپریشن کے ساتھ حرکت کی صورت حال ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔



(iv) جب جسم ریٹ کی حالت میں ہو: اب ایک اور صورت حال ملاحظہ کریں۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
فاصلہ S (km)	0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

اس صورت حال میں گراف لائن افقی ہے (شکل)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کار کا طے کردہ فاصلہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کار حرکت نہیں کر رہی۔ یہ ریسٹ کی حالت میں ہے۔



سوال نمبر 16: فاصلہ۔ وقت گراف کے گریڈینٹ سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: فاصلہ۔ وقت گراف کا گریڈینٹ: فاصلہ۔ وقت گراف کا گریڈینٹ جسم کی اوسط سپیڈ کے برابر ہوتا ہے۔ گریڈینٹ کسی لائن کے سلوپ (Slope) کی پیمائش ہے۔

وضاحت: ایکس ایس کا فاصلہ۔ وقت کا گراف دوبارہ زیر غور لائیں۔ اس پر وقت کی کوئی دو قیمتیں t_1 اور t_2 منتخب کریں۔ ان t_1 اور t_2 نقاط سے x-ایکسز سے گراف تک غیر مسلسل (dotted) دھندلی لائنیں کھینچیں۔

یہ لائنیں گراف پر نقاط P اور Q پر ملتی ہیں۔ ان نقاط سے دو افقی لائنیں S_1 اور S_2 نقاط پر ملتی ہیں، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس وقت کے دورانیے میں طے کردہ فاصلہ $S_2 - S_1 = S$ وقت کا دورانیہ $t_2 - t_1 = t$ ہے۔

گراف کا سلوپ یا گریڈینٹ، مثلث POR کے θ tangent کی پیمائش ہے۔


$$\text{سلوپ} = \frac{RQ}{PR}$$

$$\text{سلوپ} = \frac{S_2 - S_1}{t_2 - t_1} = \frac{S}{t}$$

$$v_{av} = \frac{S}{t}$$

اوسط سپیڈ کی تعریف کے مطابق

$$\text{شکل ظاہر کرتی ہے کہ: } \frac{S}{t} = \tan \theta = \text{گراف لائن کا سلوپ}$$



لہذا "فاصلہ" وقت گراف کا گریڈینٹ جسم کی اوسط سپیڈ کے برابر ہوتا ہے۔


سوال نمبر 18: مندرجہ ذیل کے لیے سپیڈ-وقت گراف کی وضاحت کریں۔

(i) جب جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔ (ii) جب جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔

جواب: سپیڈ-وقت گراف میں وقت کو x-ایکسز کے ساتھ جبکہ سپیڈ کو y-ایکسز کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔
(i) جب جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: فرض کریں کہ ہم کسی کار کی سپیڈ ہر ایک سیکنڈ کے بعد نوٹ کر سکتے ہیں اور اسے نیچے ٹیبل میں درج کرتے ہیں۔ ہم سپیڈ v اور وقت t کے مابین گراف بنا سکتے ہیں۔ یہ سپیڈ-وقت گراف کہلاتا ہے۔

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
سپیڈ v (m s^{-1})	0	8	16	24	32	40


t کو x-ایکسز کے ساتھ اور v کو y-ایکسز کے ساتھ لیں۔ یہ سکیل منتخب کی جاسکتی ہے۔ $1 \text{ s} = 1 \text{ cm}$ ، x-ایکسز کے ساتھ اور $8 \text{ ms}^{-1} = 1 \text{ cm}$ ، y-ایکسز کے ساتھ گراف کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔ یہ گراف اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی سیدھی لائن ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد سپیڈ اتنی ہی مقدار میں بڑھتی ہے۔ یہ یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت ہے۔ ٹیبل سے بھی یہی مشاہدہ ہوتا ہے۔



(ii) جب جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو:

وقت t (منٹ)	0	1	2	3	4	5
سپیڈ v (m s^{-1})	20	20	20	20	20	20

اس صورت حال میں گراف افقی لائن ہے (شکل)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ سپیڈ تبدیل نہیں ہو رہی۔ یہ یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت ہے۔




سوال نمبر 19: سپیڈ۔ وقت گراف کا گریڈینٹ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وضاحت کریں۔

(i) جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔ (ii) جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو۔

جواب: سپیڈ بمقابلہ وقت گراف کا گریڈینٹ جسم کے اوسط ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے۔
گریڈینٹ: گریڈینٹ کسی لائن کی سلوپ کی پیمائش ہے۔

(i) جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: اب سپیڈ۔ وقت کے گراف کو دیکھیں جو شکل (a) میں بنایا گیا ہے۔ وقت t_1 اور t_2 پر بالترتیب ولائی v_1 اور v_2 ہے۔ وقت کے دورانیہ $(t_2 - t_1)$ میں سپیڈ میں تبدیلی $(v_2 - v_1)$ ہے۔ اس لیے:




$$\text{سپید میں تبدیلی} = \frac{\text{کل وقت کا دورانیہ}}{\text{سلوپ}}$$

$$\text{سلوپ} = \frac{(v_2 - v_1)}{(t_2 - t_1)}$$

$$\text{سلوپ} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\text{اوسط ایکسلریشن} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = a$$

لہذا، 'سپیڈ بمقابلہ وقت گراف کا گریڈینٹ جسم کے اوسط ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے'۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک کار یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو اس کا سپیڈ۔ وقت گراف ایک سیدھی لائن ہوتی ہے جو وقت کے برابر وقفوں میں ہر دفعہ اتنی ہی بلندی تک اونچی ہوتی جاتی ہے۔



(ii) جب جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو: گراف شکل میں بنایا گیا ہے۔ وقت t_1 پر سپیڈ v_1 اتنی ہی ہے جتنی وقت t_2 پر سپیڈ v_2 ہے۔ لہذا سپیڈ میں تبدیلی صفر ہے۔

$$\text{چونکہ } v_2 - v_1 = 0 \text{ اس لیے } \text{سلوپ} = \frac{(v_2 - v_1)}{(t_2 - t_1)} = 0$$

جب کسی جسم کی سپیڈ یکساں ہو تو سپیڈ۔ وقت کا گراف ایک افقی لائن ہوتی


ہے جو کہ وقت کے ایکسز کے متوازی ہوتی ہے شکل (b)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حرکت کا ایکسلریشن صفر ہے۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جس میں سپیڈ تبدیل نہیں ہوتی۔

سوال نمبر 20: سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے رقبہ معلوم کرنے کے لیے مثالوں سے وضاحت کریں۔


جواب: تعریف: سپیڈ۔ وقت کے گراف کے نیچے وقت کے ایکسز تک کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔
سپیڈ۔ وقت گراف سے کسی جسم کا طے کردہ فاصلہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

گراف: سپیڈ۔ وقت کے گراف میں سپیڈ v کو y -ایکسز کے ساتھ جبکہ وقت t کو x -ایکسز کے ساتھ لیں گے۔

مثال 1: مثال کے طور پر شکل (a) میں گراف سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔ وقت کے دورانیہ میں جسم کا طے کردہ فاصلہ مساوات $S = v \times t$ ہے۔



یہ فاصلہ سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے رقبہ نکال کر بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔
گراف کے نیچے رقبہ وقت کے دورانیہ t کے لیے ایک مستطیل کے رقبہ کے برابر ہوگا جس کے اضلاع t اور v ہوں۔ شکل میں رقبہ شید شدہ دکھایا گیا ہے جو کہ $v \times t$ کے برابر ہے۔ لہذا سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے وقت کے ایکسر (x- ایکسر) تک کا رقبہ عددی طور پر وقت کے دورانیہ میں جسم کے طے کردہ فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔



مثال 2: اب ایک اور گراف کی مثال لیتے ہیں جو شکل (b) میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں جسم کی سپیڈ وقت کے دورانیہ میں یکساں طور پر بڑھتی ہوئی صفر سے v تک جاتی ہے۔ اوسط سپیڈ یہ ہوگی:

$$v_{av} = \frac{0 + v}{2} = \frac{1}{2} v$$

$$= \frac{1}{2} v \times t$$

اگر ہم سپیڈ۔ وقت کے گراف کے نیچے رقبہ معلوم کریں جو شکل (b) کے

مطابق یہ قائمہ الزاویہ مثلث OAB کے رقبہ کے برابر ہے جسے شید شدہ دکھایا گیا ہے۔ مثلث کا قاعدہ t کے برابر ہے اور عمود v کے برابر ہے۔

$$(\text{قاعدہ} \times \text{عمود}) / 2 = \text{مثلث کا رقبہ}$$

$$= 1/2 (v \times t)$$

”اس طرح یہ رقبہ عددی طور پر وقت کے دورانیہ میں جسم کے طے کردہ فاصلے کے برابر ہے۔“

سوال نمبر 21: گریوینی کے تحت حرکت سے متعلق حسابی سوالات حل کرنے کی وضاحت کریں۔ نیز ان مساواتوں میں استعمال ہونے والے چند اہم نکات بیان کریں۔

جواب: گریوینی کے تحت حرکت سے متعلق حسابی سوالات حل کرتا: اجسام کی حرکت سے متعلق حسابی سوالات حل کرنے کے لیے تین مساوات استعمال کی جاتی ہیں۔

وضاحت: اگر v_i جسم کی ابتدائی ولاسٹی، v_f اس کی آخری ولاسٹی، t وقت کا دورانیہ، S طے کردہ فاصلہ اور a ایکسلریشن ہو تو:

$$v_f = v_i + at$$

$$S = v_i t + \frac{1}{2} at^2 \quad (1)$$

$$2aS = v_f^2 - v_i^2 \quad (2)$$

اہم نکات: جب ان مساوات کو استعمال کیا جاتا ہے تو:

(i) حرکت ہمیشہ سیدھی لائن میں تصور کی جاتی ہے۔ (ii) ایکسلریشن کو یکساں تصور کیا جاتا ہے۔

(iii) ویکٹر مقداروں کی صرف عددی قیمتیں ہی استعمال کی جاتی ہیں۔

(iv) ابتدائی ولاسٹی کی سمت کو مثبت رکھا جاتا ہے۔ دوسری مقداریں جو ابتدائی ولاسٹی کی سمت میں ہوں، ان کو بھی مثبت رکھا جاتا ہے۔ جو مقداریں، ابتدائی ولاسٹی کی سمت کے مخالف سمت میں ہوں، ان کو منفی رکھا جاتا ہے۔

سوال نمبر 22: گریویٹیشنل ایکسلریشن کی تعریف کریں؟ گریویٹی کے تحت حرکت کرتے ہوئے اجسام کے لیے حرکت کی مساواتیں لکھیں۔

جواب: گریویٹیشنل ایکسلریشن: جب کوئی جسم زمین کی گریویٹی کے زیر اثر آزادانہ نیچے گرتا ہے تو اس پر عمل کرنے والا ایکسلریشن، گریویٹیشنل ایکسلریشن ہوتا ہے جسے g سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ گریویٹیشنل ایکسلریشن کی سمت ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتی ہے۔

قیمت (Value): اس کی عددی قیمت 9.8 ms^{-2} ہوتی ہے لیکن آسانی کے لیے ہم g کی عددی قیمت 10 ms^{-2} استعمال کریں گے۔

گریویٹی کے زیر اثر حرکت کرتے ہوئے اجسام کے لیے حرکت کی مساواتیں: چونکہ آزادانہ گرنے والی اشیا یکساں ایکسلریشن g کے ساتھ نیچے کی طرف سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہیں اس لیے ایسی اشیا پر حرکت کی تینوں مساوات کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ حرکت کی مساوات استعمال کرتے ہوئے ایک ایکسلریشن a کی جگہ g لکھا جاتا ہے۔ اس طرح آزادانہ گرتی ہوئی اشیا کے لیے حرکت کی مساوات یوں لکھی جائیں گی:

$$v_f = v_i + gt \quad (1)$$

$$S = v_i t + \frac{1}{2} gt^2 \quad (2)$$

$$2gS = v_f^2 - v_i^2 \quad (3)$$

اہم اصول: یاد رکھیں کہ ان مساوات کو استعمال کرتے ہوئے:

(i) اگر کوئی شے کسی بلندی سے آزادانہ گرنے کے لیے چھوڑی جاتی ہے تو اس کی ابتدائی ولاسٹی $v_i = 0$ کو مثبت رکھا جائے گا۔

(ii) نیچے کی سمت گرتے ہوئے گریویٹیشنل ایکسلریشن g کو مثبت رکھا جائے گا۔ دیگر تمام نیچے کی سمت والی مقداروں میں بھی مثبت رکھی جائیں گی۔ جو مقداریں ایکسلریشن کے مخالف سمت میں ہوں گی انہیں منفی رکھا جائے گا۔

(iii) اگر کوئی شے عموداً اوپر کی طرف پھینکی جائے تو اس کے لیے g کی عددی قیمت منفی ہوگی اور بلند ترین نقطہ پر اس کی آخری ولاسٹی صفر لی جائے گی۔

سوال 23: سچشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔

جواب: سچشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی (نظریہ اضافیت) Relativity: 1905ء میں معروف سائنسدان البرٹ آئن سٹائن نے ایک انقلابی تھیوری پیش کی جسے سچشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں جس نے فزکس سے متعلق بہت سے بنیادی نظریات کو بدل دیا۔ روشنی کی سپید: اس تھیوری کے مطابق روشنی کی سپید یونیورسل کونسٹنٹ (Constant) ہے۔

قیمت: اس کی عددی قیمت تقریباً $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ہے۔ تمام قسم کی حرکات کے لحاظ سے روشنی کی سپید اتنی ہی رہتی ہے۔

یونیورسل سپید لمٹ: کسی بھی ماس رکھنے والی شے کی سپید روشنی کی سپید کے برابر یا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اسے یونیورسل سپید لمٹ (limit) کہا جاتا ہے۔

اہم سوالات

آپ کی معلومات کے لیے

- سوال 1: جغرافیائی حوالہ اور کارڈینیشن کو آرڈی نیٹ سسٹم میں کیا فرق ہے؟
 جواب: جغرافیائی سمت کے لیے حوالہ کی لائن شمالاً، جنوباً ہوتی ہے جبکہ کارڈینیشن کو آرڈینیٹ سسٹم میں پازیٹیو x- ایکسز کا حوالہ استعمال کیا جاتا ہے۔
- سوال 2: سینٹ ہیلنز آتش فشاں پھٹنے سے چٹانیں کتنی سپیڈ سے اڑی تھیں۔
 جواب: 1980ء میں سینٹ ہیلنز آتش فشاں پھٹا تھا تو کئی چٹانیں 400 kmh^{-1} کی سپیڈ سے اڑی تھیں۔



سوال 5: آزادانہ گرنے والے

اجسام کا ایکسلریشن کتنا ہوتا ہے؟

جواب: آزادانہ گرنے کا ایکسلریشن

10 ms^{-2} ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

سوال: زمین پر تیز ترین جانور اور مچھلی کونسی ہے؟

جواب: زمین پر تیز ترین دودھ پلانے والا جانور (چیتا) اور تیز ترین مچھلی (سیل فیش) دونوں کی ریکارڈ شدہ تیز ترین رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔



دماغ لڑائی!

سوال: گول گھومتی سڑک پر دوڑتی کار کی سپیڈ کیساں ہوتی ہے۔ لیکن اس کی ولاسٹی ہر لمحہ بدل رہی ہوتی ہے۔




جواب: کیوں؟
 کیونکہ گول گھومتی سڑک پر دوڑتی کار کی سمت ہر لمحہ بدل رہی ہوتی ہے۔

دچپ فوٹو گرافی

- سوال: آزادانہ نیچے کی طرف گرتے ہوئے سیب کے ایکسلریشن کو کیمرے سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟
 جواب: یہ ایک کرتے ہوئے سیب کی تصویر ہے جو کچھ بلندی سے گرایا گیا ہے۔ سب کی تصاویر جس کیمرے سے لی گئیں وہ ایک سیکنڈ میں 60 فلیش لیتا تھا۔ نیچے آتے ہوئے درمیانی بڑھتی ہوئی خالی جگہ سیب کے ایکسلریشن کو ظاہر کرتی ہے۔



مختصر مشق



فاصلہ۔ وقت یا گراف تین سائیکل سواروں کی حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔

(1) گراف میں ہر ایک لائن کیا ظاہر کر رہی ہے؟

جواب:

ہر لائن سائیکلسٹ کی حرکت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر لائن کی ڈھلوان لائن کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔

(2) کونسے سائیکل سوار نے سب سے زیادہ فاصلہ طے کیا ہے؟

جواب:

سائیکلسٹ 'A' سب سے زیادہ فاصلہ پر سفر کرتا ہے، کیونکہ اس کی لکیر فاصلے کے محور کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی سلوپ بھی زیادہ ہے۔

(3) کس سائیکل سوار نے سب سے زیادہ سپیڈ سے اور کس نے سب سے کم سپیڈ سے فاصلہ طے کیا ہے؟

جواب:

سائیکلسٹ 'A' میں سب سے بڑی رفتار ہے۔ سائیکلسٹ 'B' میں مستقل رفتار ہوتی ہے۔ سائیکلسٹ 'C' کی رفتار سب سے کم ہے کیونکہ اس نے کم فاصلہ طے کیا ہے اور اس کی سلوپ بھی کم ہے۔

اہم نکات

- سکیلر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جسے صرف عددی قیمت بتا کر مکمل طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔
- ویکٹر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اس کی عددی قیمت کے ساتھ ساتھ اس کی سمت بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔
- بہت سے ویکٹر کو جمع کرنے کے لیے ان کی نمائندہ لائیں اس طرح کے متعلقہ ویکٹر کا ہینڈ دوسرے کی ٹیل سے ملے۔ حاصل جمع ویکٹر ایک ایسا ویکٹر ہوگا جو پہلے ویکٹر کی ٹیل سے شروع ہو کر آخری ویکٹر کے ہیڈ تک جاتا ہو۔
- ٹرانسلیری مشن، روٹیری مشن اور وائبریری مشن، مشن کی مختلف اقسام ہیں۔
- کسی جسم کی پوزیشن ایک مقام سے اس کا فاصلہ اور سمت ہے۔
- ابتدائی اور آخری پوزیشن کے درمیان کم از کم فاصلہ اس کی ڈس پلیسمنٹ کہلاتی ہے۔
- ایک سیکنڈ وقت میں کسی جسم کا طے کردہ فاصلہ اس کی سپیڈ کہلاتی ہے۔
- وقت کے لحاظ سے کسی جسم کی ڈس پلیسمنٹ کی شرح اس کی ولاشی کہلاتی ہے۔
- اگر کسی متحرک جسم کی سپیڈ اور سمت تبدیل نہ ہو تو اس کی ولاشی یکساں کہلاتی ہے۔
- کسی جسم کی ولاشی کی تبدیلی کی شرح کو ایکسلریشن کہتے ہیں۔
- اگر کسی جسم کی ولاشی میں تبدیلی کی شرح یکساں ہو تو اس کا ایکسلریشن یکساں کہلاتا ہے۔
- ایسا گراف جس میں حرکت کرتے جسم کے طے کردہ فاصلہ S اور وقت کا دورانیہ t کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے، وہ فاصلہ۔ وقت گراف کہلاتا ہے۔
- سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔
- فاصلہ۔ وقت گراف کا سلوپ یا گریڈینٹ کسی جسم کی اوسط سپیڈ کے برابر ہوتا ہے۔
- سپیڈ۔ وقت گراف کا سلوپ یا گریڈینٹ جسم کے ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے۔
- مندرجہ ذیل حرکت کی تین مساواتیں ہیں:

$$2aS = v_f^2 - v_i^2 \quad (iii) \quad S = v_i t + \frac{1}{2}at^2 \quad (ii) \quad v_f = v_i + at \quad (i)$$



مشقی سوالات

درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

2.1 ڈس پلیسمنٹ اور فاصلہ میں عددی قیمتوں کی نسبت:

- (الف) ہمیشہ ایک سے کم ہوتی ہے
(ب) ہمیشہ ایک سے بڑھی ہوئی ہے
(ج) ہمیشہ ایک سے بڑی ہوتی ہے
(د) ایک کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے

2.2 اگر کوئی جسم ایک مقام کے لحاظ سے اپنی جگہ نہ بدلے تو اس کی حالت کہلائے گی:

- (الف) ریٹ (ب) موشن (ج) یکساں موشن (د) متغیر موشن

2.3 ایک گیند کسی ٹاور پر سے گرایا گیا ہے۔ پہلے ایک سیکنڈ میں اس کا طے کردہ فاصلہ ہوگا:

- (الف) 5 m (ب) 10 m (ج) 50 m (د) 100 m


2.4 ایک جسم ریٹ کی حالت سے یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت شروع کرتے ہوئے 20 سیکنڈ میں 144 kmh^{-1} کی وائی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کا طے کردہ فاصلہ ہوگا:

- (الف) 100 m (ب) 400 m (ج) 1400 m (د) 1440 m

2.5 ایک جسم ریٹ کی حالت سے یکساں ایکسلریشن کے ساتھ حرکت شروع کرتا ہے وہ 4 سیکنڈ میں S فاصلہ طے کرتا ہے۔ اگر اس فاصلہ کا ایک چوتھائی فاصلہ طے کرتا ہو تو وہ کتنا وقت لے گا؟

- (الف) 1 s (ب) 2 s (ج) 4 s (د) 16 s

2.6 دو اجسام A اور B کے فاصلہ۔ وقت گراف سامنے شکل میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے درست بیان کی نشان دہی کریں۔



(الف) A کی ولائی B کی ولائی سے زیادہ ہے

(ب) A کی ولائی B کی ولائی سے کم ہے

(ج) A کی ولائی B کی ولائی کے برابر ہے

(د) اس ضمن میں گراف کوئی معلومات نہیں دیتا

2.7 سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے کارقبہ عددی طور پر برابر ہوتا ہے:

- (الف) ولائی کے (ب) یکساں ولائی کے (ج) ایکسلریشن کے (د) طے کردہ فاصلہ کے

2.8 سپیڈ۔ وقت گراف کا گریڈ نیٹ برابر ہوتا ہے:


- (الف) سپیڈ کے (ب) ولائی کے (ج) ایکسلریشن کے (د) طے کردہ فاصلہ کے

2.9 فاصلہ۔ وقت گراف کا گریڈ نیٹ برابر ہوتا ہے:

- (الف) سپیڈ کے (ب) ولائی کے (ج) طے کردہ فاصلہ کے (د) ایکسلریشن کے

2.10 ایک کار $t = 0$ پر 8.5 kmh^{-1} ولائی سے یکساں ایکسلریشن کے ساتھ $t = 9 \text{ s}$ پر 113 kmh^{-1} ولائی تک کی جاتی ہے۔

کون سا گراف کار کی حرکت سب سے بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے؟



جوابات

ب	2.5	ب	2.4	الف	2.3	الف	2.2	د	2.1
ج	2.10	الف	2.9	ج	2.8	د	2.7	ج	2.6

2- مختصر جوابات کے سوالات:

2.1 سکیر اور ویکٹر مقداروں کی تعریف کریں۔
جواب: سکیر مقدار: سکیر ایک ایسی طبیعی مقدار ہے جو صرف اس کی عددی مقدار کے ذریعے مکمل طور پر بیان کی جاسکتی ہے۔
ویکٹر مقدار: ویکٹر ایسی طبیعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اس کی عددی مقدار کے ساتھ ساتھ اس کی سمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

2.2 سکیر اور ویکٹر مقداروں کی پانچ پانچ مثالیں دیں۔

جواب: سکیر مقداروں کی مثالیں:

(i) ماس (ii) لمبائی (iii) وقت (iv) سپیڈ (v) ورک
ویکٹر مقداروں کی مثالیں:

(i) ولائی (ii) ڈس پلیسمنٹ (iii) فورس (iv) موومنٹ (v) مارک

2.3 ویکٹر کی جمع کا ہیڈ ٹیل رول بیان کریں۔

جواب: دو سے زیادہ ویکٹر کو جمع کرنے کے لیے ان کی نمائندہ لائنیں اس طرح کھینچیں کہ ایک ویکٹر کا ہیڈ دوسرے ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ جڑے اُن کا حاصل ویکٹر ایک ایسا ویکٹر ہوگا جو کہ پہلے ویکٹر کی ٹیل سے شروع ہو کر آخری ویکٹر کے ہیڈ تک جائے گا۔ اس طریقے کو ہیڈ ٹیل رول کہتے ہیں۔

2.4 فاصلہ۔ وقت گراف اور سپیڈ۔ وقت گراف کیا ہیں؟

جواب: فاصلہ۔ وقت گراف:

فاصلہ اور وقت کے مابین گراف، حرکت کرنے والے جسم کا طے کردہ فاصلہ اور صرف شہدہ وقت میں تعلق ظاہر کرتا ہے۔

سپیڈ۔ وقت گراف: سپیڈ اور وقت کے مابین گراف، حرکت کرنے والے جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوتا ہے اور سپیڈ۔ وقت

گراف کے نیچے وقت کے ایکسز تک کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔

2.5 زمین پر قریب سے گرنے والے تمام اجسام کا یکساں ایکسلریشن ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بھاری جسم، ہلکے جسم کی نسبت زیادہ تیزی سے گرتا ہے؟

جواب: اگر ہوا کی رزسٹنس کو نظر انداز کر دیا جائے تو زمین کی سطح کے قریب سے گرنے والے تمام اجسام کا ایکسلریشن ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر ہوا کی موجودگی میں مختلف اجسام نیچے کی طرف گرتے ہیں تو ان کا ایکسلریشن مختلف ہوتا ہے یعنی بھاری جسم ہلکے جسم کی نسبت تیزی سے گرتے ہیں۔

2.6 ویکٹر مقدار میں بعض اوقات سکالر انداز میں لکھ دی جاتی ہیں (یعنی جلی حروف میں نہیں) پھر ان کی سمت کیسے ظاہر کی جاتی ہے؟
جواب: جب ویکٹر مقداریں سکالر انداز میں لکھی جاتی ہیں (یعنی جلی حروف میں نہیں)، تو ان کی سمت کو مثبت یا منفی علامت سے، خاص قسم کے زاویوں سے یا الفاظ، علامتوں یا حوالہ جات کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

2.7 ایک جسم یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔ کیا اس کی ولاشی بھی یکساں ہوگی؟ وجہ بیان کریں۔
جواب: اگر ایک جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ جسم یکساں ولاشی کے ساتھ بھی حرکت کرے۔

وجہ: سپیڈ ایک سکالر مقدار ہے جو صرف عددی قیمت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ولاشی ایک ویکٹر مقدار ہے جو کسی جسم کی حرکت کو عددی قیمت اور سمت سے ظاہر کرتے ہیں۔

2.8 کیا کسی جسم کا ایکسلریشن ہوگا؟ جب کہ وہ حرکت کر رہا ہو؟

(الف) یکساں ولاشی کے ساتھ (ب) یکساں سپیڈ کے ساتھ
جواب: (الف) اگر جسم یکساں ولاشی کے ساتھ حرکت کر رہا ہو تو جسم کا ایکسلریشن صفر ہوگا کیونکہ ولاشی میں تبدیلی کی شرح کو ایکسلریشن کہتے ہیں۔
(ب) اگر جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو تو جسم میں ایکسلریشن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سرکولر ٹریک (دائروی راستے) پر حرکت کرتا ہے کیونکہ سرکولر ٹریک پر جسم کی حرکت کی سمت ہر لمحہ بدلتی ہے۔

3- تعمیری فکر کے سوالات

2.1 فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ کی عددی قیمتیں برابر بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی۔ اس بیان کی وضاحت کریں۔

جواب: فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ کی عددی قیمتیں برابر نہیں ہو سکتیں کیونکہ فاصلہ کل سفر کو ظاہر کرتا ہے جبکہ ڈس پلیسمنٹ دو پوائنٹس کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے۔

فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ صرف اس صورت میں برابر ہو سکتے ہیں جب خط مستقیم میں ایک ہی سمت میں جسم حرکت کر رہا ہو۔

2.2 جب بندوق سے ایک گولی داغی جاتی ہے تو جس ولاشی سے گولی نالی سے نکلتی ہے اُسے بندوق کی منزل ولاشی (Mural Velocity) کہا جاتا ہے۔

لمبی تالی والی ایک بندوق کی منزل ولاشی ایک چھوٹی تالی والی بندوق کی منزل ولاشی سے کم ہوتی ہے۔ کس بندوق میں گولی کا ایکسلریشن زیادہ ہوگا؟ اپنے جواب کو ثابت کریں۔


جواب: چھوٹی تالی والی بندوق میں گولی کا ایکسلریشن زیادہ ہوگا۔

وجہ: کیونکہ چھوٹی تالی والی بندوق کی گولی کی منزل ولاشی بڑی تالی والی بندوق کی گولی کی منزل ولاشی سے زیادہ ہوتی ہے۔

2.3 ایک مکمل ٹرپ (trip) کے لیے اوسط ولاشی نکالی گئی۔ اس کی قیمت مثبت نکلی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پورے ٹرپ کے دوران میں کسی لمحے اس کی لمحاتی ولاشی منفی رہی ہو؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔


جواب: جی ہاں ایسا ممکن ہے کہ پورے ٹرپ کے دوران میں کسی لمحے اس کی لمحاتی ولاشی منفی رہی ہو۔

- وجہ: اوسط ولاسٹی کل ولاسٹی کے برابر ہے جبکہ لمبائی ولاسٹی کسی ایک لمحے کی ولاسٹی کو ظاہر کرتی ہے۔
 - اگر ٹرپ کے دوران جسم عارضی طور پر ریورس ہوتا ہے تو اس لمحے جسم کی لمبائی ولاسٹی منفی ہوگی چاہے اس کا ڈس پلیسمنٹ مثبت ہی کیوں نہ ہو۔
- 2.4 ایک ذرہ ولاسٹی v کے ساتھ عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا۔ یہ وقت کے دوران T میں زمین پر واپس آ گیا۔ نیچے دیے گئے گرافس میں سے کون سا گراف اس حرکت کا صحیح اظہار کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔



جواب: گراف (الف) اس حرکت کا صحیح اظہار کرتا ہے۔ اوپر جاتے ہوئے جسم کی ولاسٹی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے بلند ترین مقام پر صفر ہو جاتی ہے۔ پھر ولاسٹی مخالف سمت میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ زمین تک پہنچ جائے گا۔ گراف کے نیچے کا رقبہ ڈس پلیسمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جو کہ صفر ہے جب جسم زمین پر واپس آ جاتا ہے۔

2.5 نیچے دی گئی شکل ایک سائیکلسٹ کے سفر کا فاصلہ۔ وقت گراف ہے۔ اس میں (a)، (b) اور (c) قطعوں کے درمیان میں ولاسٹی معلوم کریں۔



جواب: قطع (a) کے لیے ولاسٹی:

$$\Delta d = 2 \text{ km} - 0 \text{ km} = 2 \text{ km}$$

$$\Delta t = 6 \text{ min} - 0 \text{ min} = 6 \text{ min}$$

ولاسٹی = ؟

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

$$v = \frac{2}{6} = 0.33 \text{ km min}^{-1}$$

قطع (b) کے لیے ولاسٹی:

$$\Delta d = 2 \text{ km} - 2 \text{ km} = 0 \text{ km}$$

$$\Delta t = 10 \text{ min} - 6 \text{ min} = 4 \text{ min}$$

ولاسٹی = ؟

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

$$v = \frac{0}{4} = 0 \text{ km/min}$$

قطع (c) کے لیے ولاشی:

$$\Delta d = 0 \text{ km} - 2 \text{ km} = -2 \text{ km}$$

$$\Delta t = 20 \text{ min} - 10 \text{ min} = 10 \text{ min}$$

ولاشی = ?

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{-2}{10}$$

$$v = -0.5 \text{ km/min}$$

2.6 کیا ممکن ہے کہ کسی جسم کی ولاشی (وقت کے کسی ایک لمحے کے لیے صفر ہو لیکن اس کا ایکسلریشن صفر نہ ہو؟ اگر ہاں تو کسی ایک ایسی صورت حال کی مثال دیں۔

جواب: جی ہاں! ایسا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر عمودی اوپر پھینکا گیا بال بلند ترین مقام پر صفر ولاشی رکھتا ہے۔ مگر گریوٹی کی وجہ سے اس کا ایکسلریشن (کنسٹنٹ رہتا ہے)۔ 9.8 ms^{-2} نیچے کی طرف

2.1 کسی ویکٹر کو گرافیکل (Graphically) طریقے سے کیسے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 3

2.2 درج ذیل کے مابین فرق واضح کریں: (i) ریسٹ اور موشن (ii) ایسا اور ولاشی

جواب: (i) جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 5 (ii) جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 9 اور 11

2.3 موشن کی مختلف اقسام بیان کریں۔ مثالیں بھی دیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 6 اور 7

2.4 فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ کے درمیان فرق واضح کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 8

2.5 فاصلہ۔ وقت گراف کا گریڈینٹ اور سپیڈ۔ وقت گراف کا گریڈینٹ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ڈایا گرام بنا کر وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 17 اور 19

2.6 ثابت کریں کہ سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے رقبہ کسی جسم کے طے کردہ فاصلہ کے برابر ہوتا ہے۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 20

2.7 گریوٹی کے زیر اثر حرکت کرنے والی اشیاء کے لیے حرکت کی مساوات کیسے استعمال کی جاسکتی ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیں سوال نمبر 22

حسابی سوالات

2.1 مندرجہ ذیل ویکٹرز کی نمائندہ لائنیں کھینچیں۔

(الف) ایک 400 ms^{-1} ولاشی x۔ ایکس کے ساتھ 60° کا زاویہ بناتی ہے۔



(ب) ایک 50 N ولاشی x-ایکسز کے ساتھ 120° کا زاویہ بناتی ہے۔

حل:

(الف) فرض کیا: سکیل

10 N = 1 cm
50 N = 5 cm
 $\theta = 120^\circ$

100 ms⁻¹ = 1 cm
400 ms⁻¹ = 4 cm
 $\theta = 60^\circ$



2.2 ایک کار 72 kmh^{-1} کی اوسط سپیڈ سے چل رہی ہے۔ یہ 360 km کا فاصلہ کتنے وقت میں طے کرے گی؟

حل:

فاصلہ = $d = 360 \text{ km}$

سپیڈ = $v = 72 \text{ km/h}$

وقت = $t = ?$

مطلوب:

فارمولا: وقت $\times$ ولاشی = فاصلہ

حل:

$d = v \times t$

یا $t = \frac{d}{v}$

$t = \frac{360 \text{ km}}{72 \text{ kmh}^{-1}} = 5 \text{ گھنٹے}$

جواب: کار کو 360 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 5 گھنٹے لگیں گے۔

2.3 ایک ٹرک ریست کی حالت سے چلنا شروع کرتا ہے۔ یہ 50 سیکنڈ میں 90 kmh^{-1} کی ولاشی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا اوسط ایکسلریشن

معلوم کریں۔

معلوم:

ابتدائی ولاشی $v_i = 0 \text{ ms}^{-1}$

آخری ولاشی $v_f = 90 \text{ ms}^{-1}$

$v_f = \frac{90 \times 1000}{3600} \text{ ms}^{-1}$

$v_f = 25 \text{ ms}^{-1}$

$t = 50 \text{ سیکنڈ}$

$$\text{اوسط ایکسلریشن} = a_{av} = ?$$

مطلوب:

حل:

فارمولا:

$$a_{av} = \frac{v_i - v_f}{t}$$

$$a_{av} = \frac{25 \text{ ms}^{-1} - 0}{50 \text{ s}}$$

$$a_{av} = 0.5 \text{ ms}^{-2}$$

جواب: ٹرک کا اوسط ایکسلریشن 0.5 ms^{-2} ہے۔

2.4 ایک کار 5 ms^{-1} کی ولائی سے چلتی ہوئی ٹریفک کے گرین سگنل سے گزری ہے۔ تب یہ 1.5 ms^{-2} ایکسلریشن سے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ 5 سیکنڈ کے بعد کار کی ولائی کتنی ہوگی؟

معلوم: ڈیٹا:

$$v_i = 5 \text{ ms}^{-1} \text{ ابتدائی ولائی}$$

$$a = 1.5 \text{ ms}^{-2} \text{ ایکسلریشن}$$

$$t = 5 \text{ s} \text{ وقت}$$

$$v_f = ? \text{ آخری ولائی}$$

مطلوب:

حل:

فارمولا:

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f = v_i + at$$

$$v_f = 5 \text{ ms}^{-1} + 1.5 \text{ ms}^{-2} \times 5 \text{ s}$$

$$v_f = 12.5 \text{ ms}^{-1}$$

جواب: 5 سیکنڈ کے بعد کار کی ولائی 12.5 ms^{-1} ہے۔

2.5 ایک موٹر سائیکل ابتدائی طور پر 18 kmh^{-1} کی ولائی سے حرکت کرتے ہوئے 2 ms^{-2} کے یکساں ایکسلریشن سے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ موٹر سائیکل 10 سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

معلوم:

$$v_i = 18 \text{ kmh}^{-1} = \frac{18 \times 1000 \text{ ms}}{3600} = 5 \text{ ms}^{-1} \text{ ابتدائی ولائی}$$

$$a = 2 \text{ ms}^{-2} \text{ ایکسلریشن}$$

$$t = 10 \text{ s} \text{ وقت}$$

$$S = ? \text{ فاصلہ}$$

حل:

قارمولا:

$$S = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$S = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$S = (5 \text{ ms}^{-1})(10 \text{ s}) + \frac{1}{2} (2 \text{ ms}^{-2})(10 \text{ s})^2$$

$$S = 50 \text{ m} + 100 \text{ m}$$

$$S = 150 \text{ m}$$

جواب: موٹر سائیکل 10 سیکنڈ میں 150 میٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔

2.6 ایک ویگن سڑک پر 54 kmh^{-1} کی ولاسٹی سے دوڑ رہی ہے۔ تب یکدم بریکیں لگاتی ہے اور رکنے سے پہلے 25m کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ویگن کا ایکسلریشن معلوم کریں۔

معلوم:

$$\text{ابتدائی ولاسٹی} = v_i = 54 \text{ kmh}^{-1}$$

$$= \frac{54 \times 1000}{60 \times 60} \text{ ms}^{-1} = 15 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{آخری ولاسٹی} = v_f = 0 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{فاصلہ} = S = 25 \text{ m}$$

$$\text{ایکسلریشن} = a = ?$$

مطلوب:

حل:

قارمولا:

$$2aS = v_f^2 - v_i^2$$

$$a = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2S}$$

لہذا

$$\frac{(0)^2 - (15 \text{ ms}^{-1})^2}{2 \times 25 \text{ m}} = -4.5 \text{ ms}^{-2}$$

جواب: ویگن کا ایکسلریشن -4.5 ms^{-2} ہے (منفی کی علامت ڈی سلریشن کو ظاہر کرتی ہے) ایک پتھر 45m کی بلندی سے گرایا گیا ہے۔ یہ زمین تک پہنچنے میں کتنا وقت لے گا؟ زمین پر گرانے سے ذرا پہلے اس کی ولاسٹی کتنی ہوگی؟

معلوم:

$$\text{ابتدائی ولاسٹی} = v_i = 0 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{بلندی} = h = 45 \text{ m}$$

$$\text{سرگرمی پینٹل ایکسلریشن} = g = 10 \text{ ms}^{-2}$$

مطلوب:

$$\text{وقت} = t = ?$$

$$\text{آخری ولاسٹی} = v_f = ?$$

حل: فارمولہ: $S = v_i t + \frac{1}{2} g t^2$
 $v_f = v_i + g t$
 (i) زمین تک پہنچنے کا وقت:

$$S = v_i t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$45m = 0 + \frac{1}{2} (10) t^2$$

$$t^2 = \frac{45 \times 2}{10} = 9$$

طرفین کا جذر لینے سے

$$\sqrt{t^2} = \sqrt{9}$$

$$t = 3s$$

(ii) زمین پر گرانے سے ذرا پہلے پتھر کی ولائی:

$$v_f = v_i + g t$$

$$v_f = 0 + (10 \text{ ms}^{-2}) \times (3s)$$

$$v_f = 30 \text{ ms}^{-1}$$

جواب: (i) پتھر کو زمین تک پہنچنے میں 3 سیکنڈ لگتے ہیں۔

(ii) زمین پر گرانے سے ذرا پہلے پتھر کی ولائی 30 ms^{-1} ہے۔

2.8 ایک کار 20 ms^{-1} کی اوسط ولائی سے 10km کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تب یہ ایک متبادل راستے (diversion) سے اُسی سمت میں 4 ms^{-1} کی اوسط ولائی سے اگلے 0.8km تک چلتی ہے۔ کار کے کل سفر کے لیے اوسط ولائی معلوم کریں۔

حل:

پہلا مرحلہ: سفر کے دوران پہلے حصے کا فاصلہ طے کرنے کا وقت:

$$\text{فاصلہ} = 10 \text{ km} = 10000 \text{ m}$$

$$\text{اوسط ولائی} = 20 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{وقت} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{اوسط ولائی}}$$

$$\text{وقت} = \frac{10000 \text{ m}}{20 \text{ ms}} = 500s$$

دوسرا مرحلہ: سفر کے دوران دوسرے مرحلے کا فاصلہ طے کرنے کا وقت:

$$\text{فاصلہ} = 0.8 \text{ km} = 800 \text{ m}$$

$$\text{اوسط ولائی} = 4 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{وقت} = \frac{\text{فاصلہ}}{\text{اوسط ولائی}}$$

$$\text{وقت} = \frac{800 \text{ m}}{4 \text{ ms}} = 200 \text{ s}$$

تیسرا مرحلہ: کل فاصلہ اور کل وقت:

$$\text{کل فاصلہ} = d = 10000 \text{ m} + 800 \text{ m}$$

$$= d = 10800 \text{ m}$$

$$\text{کل وقت} = t = 500 \text{ s} + 200 \text{ s}$$

$$t = 700 \text{ s}$$

چوتھا مرحلہ: کل سفر کے لیے اوسط ولاشٹی:

$$\text{اوسط ولاشٹی} = \frac{\text{کل فاصلہ}}{\text{کل وقت}}$$

$$v_{av} = \frac{10800 \text{ m}}{700 \text{ s}} = 15.42 \text{ ms}^{-1}$$

$$v_{av} = 15.4 \text{ ms}^{-1}$$

جواب: کار کے کل سفر کے لیے اوسط ولاشٹی 15.4 ms^{-1} ہوگی۔

2.9 ایک گیند کسی ٹاور پر سے گرایا جاتا ہے۔ گیند 5 سیکنڈ میں زمین پر پہنچتا ہے ٹاور کی بلندی اور زمین سے ٹکراتے وقت اس کی ولاشٹی معلوم کریں۔
معلوم:

$$\text{ابتدائی ولاشٹی} = v_i = 0 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{وقت} = t = 5 \text{ s}$$

$$\text{گرہیوی ٹیشنل ایکسلریشن} = g = 10 \text{ ms}^{-2}$$

مطلوب:

$$(a) \text{ ٹاور کی بلندی} = h = ?$$

$$(b) \text{ آخری ولاشٹی} = v_f = ?$$

حل: فارمولا: حرکت کی مساوات میں استعمال کرنے سے

$$h = v_i t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_f = v_i + g t$$

گیند کی آخری ولاشٹی

(b)

(a) ٹاور کی بلندی

$$v_f = v_i + g t$$

$$v_f = 0 + (10 \text{ ms}^{-2}) \times (5 \text{ s})$$

$$v_f = 50 \text{ ms}^{-1}$$

$$h = v_i t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$h = 0 \times 5 \text{ s} + \frac{1}{2} \times (10 \text{ ms}^{-2}) \times (5 \text{ s})^2$$

$$h = 125 \text{ m}$$

جواب: پس ٹاور کی بلندی 125 m ہے اور گیند کی آخری ولائی 50 ms⁻¹ ہے۔

2.10 ایک کرکٹ بال کو ایسے ہٹ لگائی گئی کہ وہ ہوا میں سیدھا اوپر کی طرف چلا گیا۔ ایک مشاہدہ کرنے والے نے نوٹ کیا کہ اپنے بلند ترین نقطے تک پہنچنے میں اسے 3 سیکنڈ لگے۔ گیند کی ابتدائی ولائی کیا تھی؟ اگر گیند زمین سے 1 m اوپر سے ہٹ کیا گیا ہو۔ تو یہ زمین سے کتنی بلندی تک گیا؟ معلوم:

$$v_f = 0 \text{ ms}^{-1} \text{ آخری ولائی}$$

$$t = 3 \text{ s} \text{ وقت}$$

$$g = 10 \text{ ms}^{-2} \text{ گرہی ٹیشنل ایکسلریشن}$$

مطلوب:

$$v_i = ? \text{ ابتدائی ولائی}$$

$$h = ? \text{ بلندی}$$

$$= ? \text{ کل بلندی}$$

حل:

فارمولے: حرکت کی مساواتیں استعمال کرتے ہوئے:

$$v_f = v_i + gt$$

$$2gh = v_f^2 - v_i^2$$

حل:

(b) بلند ترین مقام

(a) گیند کی ابتدائی ولائی

$$2gh = v_f^2 - v_i^2$$

$$2 \times (-10 \text{ ms}^{-2}) \times h = 0 - (30 \text{ ms}^{-1})^2$$

$$h = \frac{-900}{-20} = 45 \text{ m}$$

$$v_f = v_i + gt$$

$$v_f = v_i - gt$$

$$v_i = 0 - (-10 \text{ ms}^{-2}) \times (3 \text{ s})$$

$$v_i = 30 \text{ ms}^{-1}$$


(c) زمین سے کل بلندی 45 m + 1 m = 46 m ہے۔

جواب: (a) گیند کی ابتدائی ولائی 30 ms⁻¹ ہے۔

(b) اگر بال کو 1 میٹر کی بلندی سے اوپر ہٹ کیا گیا تو یہ زمین سے 46 میٹر کی بلندی تک گیا۔

مثالیں

مثال 2.1: نمائندہ لائن کھینچ کر دلاشی ویکٹر v ظاہر کریں کہ 300 ms^{-1} دلاشی شمال سے مشرق کی طرف 60° کا زاویہ بتا رہی ہے۔
حل:



(i) ایک دوسرے پر عموداً دو لائنیں کھینچیں جو کہ شمال جنوب، مشرق اور مغرب کی نشان دہی کریں۔


(ii) ایک مناسب سکیل کا انتخاب کریں۔ اگر $100 \text{ ms}^{-1} = 1 \text{ cm}$ کو 300 ms^{-1} کو

3cm لمبی لائن ظاہر کرے گی۔

(iii) 3 cm لمبی لائن OP، شمال سے مشرق کی طرف 60° کا زاویہ بناتی ہوئی کھینچیں۔

(iv) لائن کے سرے پر تیر کا نشان لگائیں۔ OP ویکٹر v ہے۔

مثال 2.2: ایک فورس ویکٹر F کی نمائندہ لائن کھینچیں جس کی عددی قیمت 350 N ہے اور x-ایکسر کے ساتھ 60° کا زاویہ بناتا ہے۔
حل:



(i) افقی اور عمودی لائنیں کھینچ کر x-ایکسر اور y-ایکسر بنائیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

(ii) سکیل: اگر $100 \text{ N} = 1 \text{ cm}$ تو $350 \text{ N} = 3.5 \text{ cm}$

(iii) 3.5 cm لمبی لائن OQ، x-ایکسر کے ساتھ 60° کا زاویہ بناتی ہوئی کھینچیں۔

(iv) لائن OQ کے سرے پر تیر کا نشان بنائیں۔ OQ فورس ویکٹر F ہے۔

مثال 2.3: ایک عقاب 300 m فاصلے سے زمین کی طرف غوطہ لگاتا ہے۔ اگر اس کی اوسط سپیڈ 60 ms^{-1} ہو تو یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے کتنا وقت لگے گا؟
حل:

$$S = 300 \text{ m} \text{ کل طے کردہ فاصلہ}$$

$$v_{av} = 60 \text{ m s}^{-1} \text{ اوسط سپیڈ}$$

$$t = ? \text{ کل وقت (جو لگے گا)}$$

$$t = \frac{S}{v_{av}} \quad \text{یا} \quad v_{av} = \frac{S}{t} \quad \text{فارمولا: یہ مساوات استعمال کرتے ہوئے}$$

$$t = 300 \text{ m} / 60 \text{ m s}^{-1} = 5 \text{ s}$$

قیمتیں درج کرنے سے

مثال 2.4: ایک ہوائی جہاز رن وے پر ریپٹ کی پوزیشن سے دوڑنا شروع کرتا ہے، جیسا کہ نیچے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ رن وے پر وہ کسی ایکسلریشن سے حرکت کرتے ہوئے 200 میٹروں میں 252 km h^{-1} کی دلاشی پر پہنچ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کا اوسط ایکسلریشن معلوم کریں۔

$$v = 0, t = 0 \quad \text{یا} \quad v = 20 \text{ m s}^{-1}, t = 20 \text{ s}$$



حل:

$$v_i = 0 \text{ ابتدائی ولائی}$$

$$v_f = 252 \text{ km h}^{-1} \text{ آخری ولائی}$$

$$= \frac{252 \times 10^3 \text{ m}}{60 \times 60 \text{ s}} = 70 \text{ ms}^{-1}$$

$$t = 20 \text{ s} \text{ وقت کا دورانیہ}$$

$$a_{av} = ? \text{ اوسط ایکسلریشن}$$

$$a_{av} = \frac{v_f - v_i}{t}$$

فارمولا: یہ فارمولا استعمال کرتے ہوئے

$$a_{av} = \frac{70 \text{ ms}^{-1} - 0}{20 \text{ s}}$$

قیمتیں درج کرنے سے

$$a_{av} = 3.5 \text{ ms}^{-2}$$

مثال 2.5: لوہے کا ایک گولہ کسی ٹاور پر سے گرایا گیا ہے۔ یہ زمین پر 4 سیکنڈ میں پہنچتا ہے۔

(a) ٹاور کی بلندی معلوم کیجیے۔ (b) گولے کی زمین سے ٹکراتے ہوئے ولائی معلوم کیجیے۔

حل: آزادانہ گرنے والی شے کے لیے

$$v_i = 0 \text{ ابتدائی ولائی}$$

$$g = 10 \text{ ms}^{-2} \text{ ایکسلریشن}$$

$$t = 4 \text{ s} \text{ وقت}$$

$$S = h = ? \text{ بلندی (فاصلہ)}$$

$$v_f = ? \text{ آخری ولائی}$$

(a) فارمولا: حرکت کی دوسری مساوات کے مطابق

$$S = v_i t + \frac{1}{2} g t^2$$

قیمتیں درج کرنے سے

$$h = 0 \times 4 \text{ s} + \frac{1}{2} \times (10 \text{ ms}^{-2}) \times (4)^2 \text{ s}^2$$

$$h = 80 \text{ m}$$

(b) فارمولا: حرکت کی پہلی مساوات کے مطابق

$$v_f = v_i + g t$$

$$v_f = 0 + (10 \text{ ms}^{-2}) \times (4 \text{ s}) = 40 \text{ ms}^{-1}$$

مثال 2.6: ایک تیر جب کمان سے عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا۔ تیر جب کمان سے نکلا تو اس کی ولائی 30 ms^{-1} تھی۔ بلند ترین مقام تک پہنچنے کے

لیے اس کا وقت معلوم کریں۔ یہ بھی معلوم کریں کہ تیر زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی ایک پہنچا؟

حل: یہاں ایکسلریشن منفی لیا جائے گا کیوں کہ تیر اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔

ابتدائی ولاشی $= v_i = 30 \text{ ms}^{-1}$

آخری ولاشی $= v_f = 0$

ایکسلریشن $= g = -10 \text{ ms}^{-2}$

وقت $= t = ?$

بلندی $= S = h = ?$

فارمولا: حرکت کی پہلی مساوات کے مطابق

$$v_f = v_i + gt$$

$$t = \frac{v_f - v_i}{g}$$

قیمتیں درج کرنے سے:

$$t = \frac{0 - 30 \text{ ms}^{-1}}{-10 \text{ ms}^{-2}} = 3 \text{ s}$$

فارمولا: حرکت کی تیسری مساوات کے مطابق:

$$2gS = v_f^2 - v_i^2$$

$$S = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2g}$$

درست درج کرنے سے

$$h = \frac{0 - (30)^2 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}}{2 \times (-10 \text{ ms}^{-2})} = 45 \text{ m}$$

کثیر الانتخابی معروضی سوالات

درست جواب کا انتخاب کریں۔

1- ایکسلریشن کا یونٹ ہے:

(الف) ms^{-1} (ب) ms^{-2} (ج) Nm (د) kgm^{-1}

2- ایکسلریشن کا یونٹ کونسا ہے:

(الف) kmh^{-2} (ب) kmh^{-1} (ج) ms^{-1} (د) kms^{-1}

3- دائروں کے راستے کے ساتھ کسی جسم کی حرکت کہلاتی ہے۔

(الف) سرکڑی حرکت (ب) ریمڈی حرکت (ج) ٹرانسلیریٹری حرکت (د) رونیٹری حرکت

4- ان میں سے ولاشی کا یونٹ کونسا ہے:

(الف) ms^{-1} (ب) ms^{-2} (ج) m (د) $\text{m}^{-2} \text{s}^{-2}$

5- میل فی گھنٹہ کی پید ہے:

(الف) 160 kmh^{-1} (ب) 110 kmh^{-1} (ج) 300 kmh^{-1} (د) 450 kmh^{-1}

- 6- دس پلیسٹ کا فارمولا ہے: (الف) $d = v \times t$ (ب) $S = v \times t$ (ج) $S = -v \times t$ (د) $d = v \times t^2$
- 7- فاصلے کا SI یونٹ ہے۔ (الف) m^2 (ب) ms^{-1} (ج) m (د) ms^{-2}
- 8- دو پوائنٹس کے درمیان راستے کی لمبائی کو کہا جاتا ہے: (الف) فاصلہ (ب) ڈس پلیسمنٹ (ج) سپیڈ (د) ولائی
- 9- ولائی میں وقت کے لحاظ سے تبدیلی کی شرح ہے: (الف) ایکسلریشن (ب) ولائی (ج) سپیڈ (د) فاصلہ
- 10- منفی ایکسلریشن کو یہ بھی کہتے: (الف) ایکسلریشن (ب) ولائی (ج) ڈس پلیسمنٹ (د) ب اور ج دونوں
- 11- وقت اور ولائی کا حاصل ضرب ہے: (الف) ماس (ب) فورس (ج) ایکسلریشن (د) ڈس پلیسمنٹ
- 12- ایک کار ریٹ کی حالت سے چلتا شروع کرتی ہے یہ 60s کے بعد $40 ms^{-2}$ کی سپیڈ حاصل کرتی ہے۔ اس دوران کار کے ذریعے طے کردہ فاصلہ ہے: (الف) 2400m (ب) 2000m (ج) 2060m (د) 1900m
- 13- یونٹ ٹائم میں کسی جسم کا طے کردہ فاصلہ کہلاتا ہے: (الف) ولائی (ب) سپیڈ (ج) یکساں سپیڈ (د) غیر یکساں ولائی
- 14- چھتے کی سپیڈ ہے: (الف) $300 kmh^{-1}$ (ب) $200 kmh^{-1}$ (ج) $110 kmh^{-1}$ (د) $90 kmh^{-1}$
- 15- ایک جسم یکساں سپیڈ کے ساتھ دائرے میں حرکت کرتا ہے۔ ان میں سے کون سا بیان ایکسلریشن کے لیے درست ہے؟ (الف) اس میں کوئی ایکسلریشن نہیں ہے۔ (ب) اس کا منفی ایکسلریشن دائرے کے مماس کی طرف ہے (ج) اس کا ایکسلریشن دائرے کے مرکز کی طرف ہے (د) اس کا ایکسلریشن دائرے کے مرکز سے دور ہوتا ہے
- 16- اگر کسی جسم کی ولائی صفر ہو مگر پھر بھی ایکسلریشن ہو رہی ہو، جسم کی حرکت کے متعلق کیا کہیں گے؟ (الف) یہ آرام کی حالت میں ہے (ب) یہ سیدھی لائن کے ساتھ یکساں سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے (ج) یہ سمت تبدیل کر رہا ہے (د) یہ سپیڈ تبدیل کر رہی ہے لیکن ولائی صفر ہے
- 17- ایک شے کا ڈس پلیسمنٹ۔ وقت گراف $2 ms^{-1}$ کی ڈھلوان کے ساتھ سیدھی لائن ہے یہ ڈھلوان اس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ (الف) جسم کا ڈس پلیسمنٹ (ب) جسم کا ایکسلریشن (ج) جسم کی ولائی (د) جسم کی سپیڈ

- 18- g کی قیمت ہے: (الف) 8.8 ms^{-2} (ب) 7.8 ms^{-2} (ج) 9.8 ms^{-2} (د) 6.8 ms^{-2}
- 19- ایک جسم یکساں ایکسلریشن کے ساتھ سیدھی لائن میں حرکت کرتا ہے۔ ان میں سے کون سا بیان اس کی رفتار کے بارے میں ٹھیک/درست ہے۔
 (الف) ولاٹھی یکساں ہے
 (ب) ولاٹھی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے
 (ج) ولاٹھی وقت کے ساتھ کم ہوتی ہے۔
 (د) ولاٹھی تبدیل نہیں ہوتی
- 20- ایک جسم اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔ جب جسم اوپر جاتا ہے تو اس کی ولاٹھی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
 (الف) یہ پہلے جیسی رہتی ہے
 (ب) یہ کم ہوتی ہے جیسے جیسے اوپر جاتی ہے اور اوپر پہنچ کر صفر ہو جاتی ہے
 (ج) یہ بڑھتی ہے جیسے جیسے اوپر جاتی ہے
 (د) بلند ترین مقام پر اس کی سمت بدل جاتی ہے۔
- 21- نیچے کی طرف گرنے والا جسم ایک مثال ہے:
 (الف) لیئر موشن
 (ب) روٹیٹری موشن
 (ج) سرکولر موشن
 (د) ٹرانسلیری موشن
- 22- فیرس وکیل میں سوار کی حرکت مثال ہے:
 (الف) روٹیٹری موشن
 (ب) سرکولر موشن
 (ج) لیئر موشن
 (د) رینڈم موشن
- 23- روشنی کی سپیڈ کیا ہے؟
 (الف) $2 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ (ب) $1 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ (ج) $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ (د) $4 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- 24- _____ ایک ویکٹر مقدار ہے۔
 (الف) ڈس پلیسمنٹ
 (ب) ماس
 (ج) وقت
 (د) لمبائی
- 25- ایک سکیلر مقدار نہیں ہے:
 (الف) سپیڈ
 (ب) انرجی
 (ج) وقت
 (د) ایکسلریشن
- 26- براؤنن حرکت اس کی ایک مثال ہے:
 (الف) رینڈم موشن
 (ب) سرکولر موشن
 (ج) لیئر موشن
 (د) وائبریٹری موشن
- 27- کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کی حرکت کو کہتے ہیں:
 (الف) سرکولر موشن
 (ب) روٹیٹری موشن
 (ج) رینڈم موشن
 (د) لیئر موشن
- 28- ڈس پلیسمنٹ ایک ویکٹر مقدار ہے۔ ان میں سے کون سا بیان ڈس پلیسمنٹ کے بارے میں ٹھیک ہے؟
 (الف) ہمیشہ سے کیے گئے فاصلے کے برابر ہوتے ہیں
 (ب) یہ ابتدائی اور آخری پوزیشن کے درمیان کم ترین راستہ ہے
 (ج) یہ کبھی صفر نہیں ہو سکتا
 (د) یہ ہمیشہ کیے گئے فاصلے سے زیادہ ہوتا ہے
- 29- ایک کار 100 میٹر شمال کی طرف پھر 100 میٹر مشرق کی طرف سفر کرتی ہے ڈس پلیسمنٹ کی کیا قیمت ہے؟
 (الف) 100m (ب) 200m (ج) 141.4m (د) 0m

- 30- ایک پتھر اونچائی سے پھینکا گیا ہے۔ ان میں سے کون سا بیان درست ہے اگر پتھر گر رہا ہو تو؟
 (الف) پتھر کی سپیڈ گریوڈیشنل ایکسلریشن کی وجہ سے زیادہ ہے (ب) پتھر کی سپیڈ یکساں رہے گی
 (ج) پتھر کا ایکسلریشن وقت کے ساتھ کم ہو رہا ہے؟ (د) پتھر کی ولائی ہوا کی مزاحمت کی وجہ سے کم ہو رہی ہے
- 31- دو نقطہ جہاں دو ایکسز ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، کہلاتا ہے:
 (الف) گراف (ب) متغیر (ج) نقطہ آغاز (د) سلوپ
- 32- فاصلہ وقت گراف کا سلوپ ہے:
 (الف) فورس (ب) ڈس پلیسمنٹ (ج) فاصلہ (د) سپیڈ
- 33- ایک جسم آزادانہ گر رہا ہے۔ اس کے ایکسلریشن کی سمت کیا ہے؟
 (الف) اوپر کی طرف (ب) نیچے کی طرف (ج) صفر (د) افقی
- 34- ولائی ٹائم گراف کے نیچے کا رقبہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟
 (الف) ایکسلریشن (ب) ڈس پلیسمنٹ (ج) سپیڈ (د) وقت
- 35- اس کے ایکسلریشن کیا ہوگا جو ریٹ کی حالت میں ہے اور دیے گئے وقت میں ریٹ کی حالت میں ہی رہتا ہے؟
 (الف) صفر (ب) 1 m/s^2 (ج) بڑھ رہا ہے (د) کم ہو رہا ہے
- 36- $v_f^2 - v_i^2 =$
 (الف) at (ب) $2as$ (ج) v_{ave} (د) $\frac{\Delta v}{\Delta t}$
- 37- $v_f = v_i +$
 (الف) $2as$ (ب) v_{ave} (ج) at (د) $v_i t$
- 38- ایک کار 0 m/s کی ابتدائی ولائی سے مخصوص فاصلہ 5 m سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ اگر کار کی آخری ولائی 20 m/s ہو تو 5 m سیکنڈ کے بعد کار کا ایکسلریشن کیا ہوگا؟
 (الف) 4 m/s^2 (ب) 2 m/s^2 (ج) 1 m/s^2 (د) 5 m/s^2
- 39- ایک جسم یکساں ولائی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ تو اس میں سے کوئی لائن درست ہے؟
 (الف) جسم کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے (ب) جسم کی ولائی مسلسل تبدیل ہو رہی ہے
 (ج) جسم کا ایکسلریشن صفر ہے (د) جسم کا ڈس پلیسمنٹ تبدیل نہیں ہو رہا
- 40- ایک جسم یکساں ایکسلریشن سے حرکت کر رہا ہے اس میں سے کون سا بیان ڈس پلیسمنٹ کے لیے درست ہے؟
 (الف) جسم کی ولائی یکساں شرح سے بڑھ رہی ہے (ب) ولائی ایک جیسی رہتی ہے
 (ج) ڈس پلیسمنٹ یکساں رہتا ہے (د) ایکسلریشن صفر ہے
- 41- ایک گاڑی 20 ms^{-1} کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے۔ یہ سپیڈ kmh^{-1} میں ہے:
 (الف) 36 kmh^{-1} (ب) 72 kmh^{-1} (ج) 80 kmh^{-1} (د) 45 kmh^{-1}

- 42- ایک جسم رکھتا ہے اگر یہ وقت کے یکساں وقفوں میں یکساں ڈس پلیسمنٹ طے کرے خواہ یہ وقفے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں۔
(الف) یونیفارم ولاشی (ب) یونیفارم سپیڈ (ج) غیر یکساں سپیڈ (د) غیر یکساں ولاشی

جوابات

ج	7	الف	6	ب	5	الف	4	الف	3	الف	2	ب	1
ج	14	ب	13	الف	12	د	11	د	10	الف	9	الف	8
الف	21	ب	20	ب	19	ج	18	ج	17	د	16	ج	15
ب	28	ج	27	الف	26	د	25	الف	24	ج	23	ب	22
الف	35	ب	34	ب	33	د	32	ج	31	الف	30	ج	29
الف	42	ب	41	الف	40	ج	39	الف	38	ج	37	ب	36

کثیر الانتخابی مختصر سوالات

مختصر سوالات کے جواب دیں۔

- 1- موشن کی تعریف کریں۔
جواب: موشن: اگر کوئی شے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہو تو اسے موشن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔
مثال: جب سوار موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو مشاہدہ کرنے والا شخص دیکھے گا کہ موٹر سائیکل سوار اپنے ارد گرد کی اشیاء کے لحاظ سے مسلسل اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ جب وہ شخص کہے گا کہ موٹر سائیکل سوار موشن کی حالت میں ہے۔
- 2- موشن کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔
جواب: عام طور پر اجسام کی موشن کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
(i) ٹرانسلیری موشن (ii) روٹیری موشن (iii) واپیریٹری موشن
- 3- ٹرانسلیری موشن کی اقسام بیان کریں۔
جواب: ٹرانسلیری موشن تین طرح کی ہو سکتی ہے۔ (i) لی نیئر موشن (ii) ریڈم موشن (iii) سرکلر موشن
- 4- سکیلر کی تعریف کریں مثال بھی دیں۔
جواب: سکیلر ایک طبعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر ظاہر کرنے کے لیے صرف عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔
مثالیں: ماس، فاصلہ، بسائی، وقت، سپیڈ، انرجی اور ٹمپریچر سکیلر مقداریں ہیں۔
- 5- ویکٹر کی مدد سے ویکٹر کی تعریف کریں۔
جواب: ویکٹر ایک ایسی طبعی مقدار ہے جسے مکمل طور پر ظاہر کرنے کے لیے عددی قیمت کے ساتھ سمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔
مثالیں: ڈس پلیسمنٹ، ولاشی، ایکسٹرنل فورس اور وزن۔
- 6- مثال کی مدد سے ریٹ کی تعریف کریں۔
جواب: ریٹ: اگر کوئی شے اپنے ارد گرد کے حوالے سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتی تو یہ ریٹ کی حالت میں کہلاتی ہے۔

مثال: فرض کریں کہ ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر کھڑا ہے۔ کوئی شخص اسے دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی اشیاء مثلاً قریبی عمارت، درخت یا کتے کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہا تو وہ شخص کہے گا کہ موٹر سائیکل سوار ریست کی حالت میں ہے۔

7- سپیڈ۔ وقت گراف کے نیچے کا رقبہ کس کے برابر ہوتا ہے؟

جواب: سپیڈ۔ گراف کے نیچے وقت کے ایکسز تک کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔

8- یکساں ایکسلریشن کی صورت میں حرکت کی مساواتیں لکھیں۔

جواب: (i) $v_f = v_i + at$ (ii) $S = v_i t + \frac{1}{2} at^2$ (iii) $2aS = v_f^2 - v_i^2$

9- یکساں ولاسٹی کی تعریف کریں۔

جواب: کسی جسم کی ولاسٹی یکساں ہوتی ہے اگر وقت کے مساوی وقفوں میں اس کا ڈس پلیسمنٹ یونیفارم ہو۔ خواہ وقت کے یہ وقفے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں۔

10- فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ میں فرق بیان کریں۔

جواب: فاصلہ اور ڈس پلیسمنٹ میں فرق:

ڈس پلیسمنٹ	فاصلہ
• دو پوائنٹس کے درمیان کم سے کم فاصلہ ڈس پلیسمنٹ کہلاتا ہے۔	• دو پوائنٹس کے درمیان راستہ کی لمبائی اس کے درمیان فاصلہ کہلاتی ہے۔
• ڈس پلیسمنٹ ایک ویکٹر مقدار ہے۔	• فاصلہ ایک سکیلر مقدار ہے۔
• ڈس پلیسمنٹ کو d سے ظاہر کیا جاتا ہے۔	• فاصلہ کو 'S' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
• $d = v \times t$	• $S = v \times t$

11- سپیڈ اور ولاسٹی میں فرق واضح کریں۔

جواب: سپیڈ اور ولاسٹی میں فرق:

ولاسٹی	سپیڈ
• کسی جسم کا اکائی وقت میں کسی خاص سمت میں طے کردہ فاصلہ کو اس کی ولاسٹی کہتے ہیں۔	• کسی جسم کے اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ کو اس کی سپیڈ کہتے ہیں۔
• ولاسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے۔	• سپیڈ ایک سکیلر مقدار ہے۔
• ولاسٹی کا فارمولا ہے: $v = \frac{d}{t}$	• سپیڈ کا فارمولا ہے: $v = \frac{S}{t}$

12- ٹریٹل ولاسٹی کی تعریف کریں۔

جواب: جب کوئی جسم ہوا میں سے ہوتا ہوا زمین کی طرف گرتا ہے تو ایک وقت اس جسم کا وزن اور ہوا کا دباؤ آپس میں برابر ہو کر ایک دوسرے کے اثر کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں اب جسم جس ولاسٹی سے نیچے آئے گا وہ اس کی ٹریٹل ولاسٹی کہلائے گی۔

13- فاصلہ سکیلر مقدار ڈس پلیسمنٹ ویکٹر مقدار کیوں ہوتی ہے؟

جواب: فاصلہ سکیلر مقدار ہوتی ہے کیونکہ اس کے اظہار کے لیے صرف عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ڈس پلیسمنٹ ایک ویکٹر مقدار ہے کیونکہ

اس کا اظہار کے لیے عددی قیمت کے ساتھ سمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

-14

پوزیٹو اور نیگیٹو ایکسلریشن سے کیا مراد ہے؟
جواب: پوزیٹو ایکسلریشن: کسی جسم کا ایکسلریشن پوزیٹو ہوتا ہے اگر وقت کے ساتھ اس کی ولاسٹی بڑھ رہی ہو۔ پوزیٹو ایکسلریشن کی سمت وہی ہوتی ہے جس میں جسم بغیر سمت تبدیل کیے حرکت کر رہا ہوتا ہے۔

نیگیٹو ایکسلریشن: کسی جسم کا ایکسلریشن نیگیٹو ہوتا ہے۔ اگر وقت کے ساتھ اس کی ولاسٹی کم ہو رہی ہو۔ نیگیٹو ایکسلریشن کی سمت کے مخالف ہوتی ہے جس میں جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے۔

-15

ایک عقاب 600m فاصلے سے زمین کی طرف غوطہ لگاتا ہے اگر اس کی اوسط سپیڈ 60ms^{-1} ہو تو یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے کتنا وقت لگے گا؟

جواب:

$$S = 600\text{m}$$

$$v_{av} = 60\text{ms}^{-1}$$

$$t = ?$$

مساوات استعمال کرتے ہوئے

$$v_{av} = \frac{S}{t}$$

قیمتیں درج کرنے سے

$$t = \frac{600}{60}$$

$$t = 10\text{ s}$$

-16

گراف سے کیا مراد ہے؟

جواب:

گراف مختلف مقداروں کے درمیان تعلق کے تصویری اظہار کا طریقہ ہے۔

-17

کس صورت میں گراف لائن افقی ہوتا ہے؟

جواب:

اگر کوئی جسم ریسٹ کی حالت میں ہو تو گراف کی لائن افقی صورت میں ہوتی ہے۔

-18

کیا یکساں سپیڈ سے حرکت کرنے والے جسم میں ایکسلریشن ہو سکتا ہے؟

جواب:

جی ہاں کوونسنٹ سپیڈ سے حرکت کرنے والے جسم میں ایکسلریشن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سرکٹریک پر حرکت کرتا ہے کیونکہ سرکٹریک پر جسم کی

-19

سپیڈ۔ وقت گراف کا گریڈینٹ کیا ظاہر کرتا ہے؟

جواب:

سپیڈ بمقابلہ وقت گراف کا گریڈینٹ جسم کے اوسط ایکسلریشن کے برابر ہوتا ہے۔

-20

36 kmh^{-1} کو ms^{-1} میں تبدیل کریں۔

جواب:

$$v = 36\text{ kmh}^{-1} = \frac{36 \times 1000}{3600} \text{ ms}^{-1}$$

$$v = 10 \text{ ms}^{-1}$$

21- گریویٹیشن کے زیر اثر حرکت کرتے ہوئے اجسام کی موٹن کی مساواتیں لکھیں۔

جواب: $v_f = v_i + gt$ (i)

$h = v_i t + \frac{1}{2} at^2$ (ii)

$2gh = v_f^2 - v_i^2$ (iii)

22- کسی ایسے جسم کی مثال دیجیے جو بیک وقت ریٹ اور موٹن میں ہو۔

جواب: بس میں بیٹھا ہوا مسافر بس میں موجود دوسرے مسافروں اور چیزوں کے لحاظ سے ریٹ میں ہے لیکن بس کے باہر موجود کسی دوسرے شخص کے لحاظ سے بس میں موجود تمام مسافر موٹن کی حالت میں ہے۔